

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| □ Réclamation | : contact@mupras.com |
| □ Prise en charge | : pec@mupras.com |
| □ Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1570 Société : 138331

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : MOUSTAFA DOUARNE

Date de naissance : 01/01/1950

Adresse : ROUTE EL KORIBI N 3 SIDI ABDERRAHMANE

ÉTAJADDO

Tél. 0622 604093 Total des frais engagés : 4928,7 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : KHATIRI TOURE Age : 66 ans

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : EL TAMNA

Le : 04/10/2012

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
3/6/2022			300.00	300.00 SIE 2068104 HABIB Dr. Al Mansour - El Jadida TEL: 0523 35 12 66 M 062282

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
SIE 2068104 HABIB Dr. Al Mansour - El Jadida TEL: 0523 35 12 66 M 062282	03/06/2022	300.00

ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX





Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			Coefficient des Travaux
	H 25533412 00000000 35533411	21433552 00000000 11433553	G 00000000 B	MONTANTS DES SOINS
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



POLYDISCIPLINAIRE

مصحة ابن باديس

متعددة الاختصاصات

El Jadida, Le

31/07/2022

Khaifi Tawra'

367°
1) Flexet 2mg (2 partie de 600g)

2) Alg 30 (1/2 c) (2) LQF (SV)

62917.

STE ZDUR PHARM
3, Immeuble La Zalira Jaddia
Sous AIM - n° 100 - El Jadida
Pharmacie HAY AL MANSOUR
TEL: 0523 39 51 11 / 12
Dr. FASSAR Med Jemel
Tél: 0523 39 51 11
Lundi à Vendredi 8h à 17h
Samedi 8h à 12h
Dimanche 14h à 17h
C. N. I. D. U. E. I. B. N. B. A. D. I. S.
C. N. I. D. U. E. I. B. N. B. A. D. I. S.
C. N. I. D. U. E. I. B. N. B. A. D. I. S.

Clinique Ibn Badis

10, Bd Ibn Badis - El Jadida

مصحة ابن باديس

. شارع ابن باديس - الجديدة . 10

Tél : 0523 39 51 11 - 0523 39 51 12 Fax : 0523 37 31 25

Site web : www.cliniqueibnbadis.com E-Mail : cliniquebadis@gmail.com

Fluoxet® 20 mg

60 gélules



es

LOT 2214
EXP 05
PPV 29

armacien.

né dans cette notice. Voir rubrique 4.

ent car elle

acien.

à d'autres

t identiques

de médecin ou à

serait pas

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que FLUOXET 20 mg, gélules et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FLUOXET 20 mg, gélules ?
- Comment prendre FLUOXET 20 mg, gélules ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver FLUOXET 20 mg, gélules ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE FLUOXET 20 mg, gélules ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC: N06AB03

FLUOXET 20 mg, gélules, contient une substance active, la fluoxétine, et fait partie d'un groupe de médicaments appelés antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS).

Ce médicament vous a été prescrit pour traiter :

Chez l'adulte :

- soit un épisode dépressif,
- soit des troubles obsessionnels compulsifs,
- soit la boulimie : FLUOXET est utilisé en complément d'une psychothérapie pour la diminution de la fréquence des crises de boulimie, des vomissements ou de la prise de laxatifs.

Chez l'enfant âgé de 8 ans et plus et l'adolescent :

- Un épisode dépressif modéré à sévère qui ne répond pas à une prise en charge psychothérapeutique après 4 à 6 séances. Chez les enfants et adolescents présentant un épisode dépressif modéré à sévère, FLUOXET ne devrait être proposé qu'en association avec une prise en charge psychothérapeutique.

Comment FLUOXET fonctionne

Tout le monde possède dans son cerveau une substance appelée sérotonine. Les personnes qui sont déprimées, qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs ou de boulimie ont des taux moins élevés de sérotonine que les autres. Le fonctionnement de FLUOXET et des autres ISRS n'est pas totalement expliqué mais ils pourraient aider à augmenter le taux de sérotonine dans le cerveau. Traiter ces maladies est important pour vous aider à vous sentir mieux. Si elle n'est pas traitée, votre maladie peut ne pas disparaître, peut s'aggraver et être plus difficile à soigner.

Il est possible qu'il soit nécessaire que vous suiviez votre traitement pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois afin de s'assurer que les symptômes disparaissent.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FLUOXET 20 mg, gélules ?

Ne prenez jamais FLUOXET 20 mg, gélules :

- Si vous êtes allergique à la fluoxétine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6. Si vous développez une éruption cutanée ou d'autres réactions allergiques (telles que démangeaisons, un gonflement des lèvres ou du visage, ou un essoufflement), arrêtez tout de suite les gélules et contactez votre médecin immédiatement.
- Si vous prenez d'autres médicaments appartenant à la classe des inhibiteurs non sélectifs et irréversibles de la monoamine oxydase (IMAOs) en raison de la survenue possible de réactions graves voire fatales (par exemple l'iproniazide utilisé pour traiter des dépressions).

Le traitement par FLUOXET ne doit être commencé que 2 semaines après l'arrêt de l'IMAO non sélectif et irréversible.

Ne prenez aucun IMAO non sélectif et irréversible pendant au minimum 5 semaines après l'arrêt de votre traitement par FLUOXET. Si FLUOXET vous a été prescrit pendant une longue durée et/ou à des doses élevées, votre médecin devra envisager un intervalle de temps plus long.

- Si vous prenez augmentation du
Faites attention
Adressez-vous
mg, gélules dan

- Problèmes car
- Début de fièvre mental : tels que syndrome appelées » . Bien qu'il vital, contactez pourrait devoir être
- Manie ou antécédents de votre médecine
- Antécédent de saignement inh
- Prise de médicaments et
- Convulsions o constatez que la ment, il pourrait
- Electroconvuls
- Traitement en voir rubrique « A
- Impatiences, in augmentation de
- Diabète : votr d'antidiabétique
- Maladie du foie
- Rythme cardia
- carence en sel
- l'utilisation de tra
- Traitement en
- Glaucome (aug

Idées suicidaires
Si vous souffrez avoir des idées manifestations p ce type de médic. Vous êtes particu cas suivants :

- si vous avez d
- si vous êtes
- comportement s une maladie ps En cas de survient votre mè

Vous pouvez v êtes dépressif c cette notice. V dépression ou comportem

Enfants et ado

Les patients de que tentative de agressivité, com de médicaments 8 à 18 ans que association à un Les données de la puberté, le patients de cette 18 ans il est po souffrez d'épis psychothérapie. FLUOXET à u adressez-vous énumérés ci-de FLUOXET. FLUOXET ne d

Fluoxet® 20 mg

60 gélules



es

LOT 2214
EXP 05
PPV 29

armacien.

né dans cette notice. Voir rubrique 4.

ent car elle

acien.

à d'autres

t identiques

de médecin ou à

serait pas

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que FLUOXET 20 mg, gélules et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FLUOXET 20 mg, gélules ?
- Comment prendre FLUOXET 20 mg, gélules ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver FLUOXET 20 mg, gélules ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE FLUOXET 20 mg, gélules ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC: N06AB03

FLUOXET 20 mg, gélules, contient une substance active, la fluoxétine, et fait partie d'un groupe de médicaments appelés antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS).

Ce médicament vous a été prescrit pour traiter :

Chez l'adulte :

- soit un épisode dépressif,
- soit des troubles obsessionnels compulsifs,
- soit la boulimie : FLUOXET est utilisé en complément d'une psychothérapie pour la diminution de la fréquence des crises de boulimie, des vomissements ou de la prise de laxatifs.

Chez l'enfant âgé de 8 ans et plus et l'adolescent :

- Un épisode dépressif modéré à sévère qui ne répond pas à une prise en charge psychothérapeutique après 4 à 6 séances. Chez les enfants et adolescents présentant un épisode dépressif modéré à sévère, FLUOXET ne devrait être proposé qu'en association avec une prise en charge psychothérapeutique.

Comment FLUOXET fonctionne

Tout le monde possède dans son cerveau une substance appelée sérotonine. Les personnes qui sont déprimées, qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs ou de boulimie ont des taux moins élevés de sérotonine que les autres. Le fonctionnement de FLUOXET et des autres ISRS n'est pas totalement expliqué mais ils pourraient aider à augmenter le taux de sérotonine dans le cerveau. Traiter ces maladies est important pour vous aider à vous sentir mieux. Si elle n'est pas traitée, votre maladie peut ne pas disparaître, peut s'aggraver et être plus difficile à soigner.

Il est possible qu'il soit nécessaire que vous suiviez votre traitement pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois afin de s'assurer que les symptômes disparaissent.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FLUOXET 20 mg, gélules ?

Ne prenez jamais FLUOXET 20 mg, gélules :

- Si vous êtes allergique à la fluoxétine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6. Si vous développez une éruption cutanée ou d'autres réactions allergiques (telles que démangeaisons, un gonflement des lèvres ou du visage, ou un essoufflement), arrêtez tout de suite les gélules et contactez votre médecin immédiatement.
- Si vous prenez d'autres médicaments appartenant à la classe des inhibiteurs non sélectifs et irréversibles de la monoamine oxydase (IMAOs) en raison de la survenue possible de réactions graves voire fatales (par exemple l'iproniazide utilisé pour traiter des dépressions).

Le traitement par FLUOXET ne doit être commencé que 2 semaines après l'arrêt de l'IMAO non sélectif et irréversible.

Ne prenez aucun IMAO non sélectif et irréversible pendant au minimum 5 semaines après l'arrêt de votre traitement par FLUOXET. Si FLUOXET vous a été prescrit pendant une longue durée et/ou à des doses élevées, votre médecin devra envisager un intervalle de temps plus long.

- Si vous prenez augmentation du
Faites attention
Adressez-vous
mg, gélules dan

- Problèmes car
- Début de fièvre mental : tels que syndrome appelées » . Bien qu'il vital, contactez pourrait devoir être
- Manie ou antécédents de votre médecine
- Antécédent de saignement inh
- Prise de médicaments et
- Convulsions o constatez que la ment, il pourrait
- Electroconvuls
- Traitement en voir rubrique « A
- Impatiences, in augmentation de
- Diabète : votr d'antidiabétique
- Maladie du foie
- Rythme cardia
- carence en sel
- l'utilisation de tra
- Traitement en
- Glaucome (aug

Idées suicidaires
Si vous souffrez avoir des idées manifestations p ce type de médic. Vous êtes particu cas suivants :

- si vous avez d
- si vous êtes
- comportement s une maladie ps En cas de survient votre mè

Vous pouvez v êtes dépressif c cette notice. V dépression ou comportem

Enfants et ado

Les patients de que tentative de agressivité, com de médicaments 8 à 18 ans que association à un Les données de la puberté, le patients de cette 18 ans il est po souffrez d'épis psychothérapie. FLUOXET à u adressez-vous énumérés ci-de FLUOXET. FLUOXET ne d

Fluoxet® 20 mg

60 gélules



es

LOT 2214
EXP 05
PPV 29

armacien.

né dans cette notice. Voir rubrique 4.

ent car elle

acien.

à d'autres

t identiques

de médecin ou à

serait pas

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que FLUOXET 20 mg, gélules et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FLUOXET 20 mg, gélules ?
- Comment prendre FLUOXET 20 mg, gélules ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver FLUOXET 20 mg, gélules ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE FLUOXET 20 mg, gélules ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC: N06AB03

FLUOXET 20 mg, gélules, contient une substance active, la fluoxétine, et fait partie d'un groupe de médicaments appelés antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS).

Ce médicament vous a été prescrit pour traiter :

Chez l'adulte :

- soit un épisode dépressif,
- soit des troubles obsessionnels compulsifs,
- soit la boulimie : FLUOXET est utilisé en complément d'une psychothérapie pour la diminution de la fréquence des crises de boulimie, des vomissements ou de la prise de laxatifs.

Chez l'enfant âgé de 8 ans et plus et l'adolescent :

- Un épisode dépressif modéré à sévère qui ne répond pas à une prise en charge psychothérapeutique après 4 à 6 séances. Chez les enfants et adolescents présentant un épisode dépressif modéré à sévère, FLUOXET ne devrait être proposé qu'en association avec une prise en charge psychothérapeutique.

Comment FLUOXET fonctionne

Tout le monde possède dans son cerveau une substance appelée sérotonine. Les personnes qui sont déprimées, qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs ou de boulimie ont des taux moins élevés de sérotonine que les autres. Le fonctionnement de FLUOXET et des autres ISRS n'est pas totalement expliqué mais ils pourraient aider à augmenter le taux de sérotonine dans le cerveau. Traiter ces maladies est important pour vous aider à vous sentir mieux. Si elle n'est pas traitée, votre maladie peut ne pas disparaître, peut s'aggraver et être plus difficile à soigner.

Il est possible qu'il soit nécessaire que vous suiviez votre traitement pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois afin de s'assurer que les symptômes disparaissent.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FLUOXET 20 mg, gélules ?

Ne prenez jamais FLUOXET 20 mg, gélules :

- Si vous êtes allergique à la fluoxétine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6. Si vous développez une éruption cutanée ou d'autres réactions allergiques (telles que démangeaisons, un gonflement des lèvres ou du visage, ou un essoufflement), arrêtez tout de suite les gélules et contactez votre médecin immédiatement.
- Si vous prenez d'autres médicaments appartenant à la classe des inhibiteurs non sélectifs et irréversibles de la monoamine oxydase (IMAOs) en raison de la survenue possible de réactions graves voire fatales (par exemple l'iproniazide utilisé pour traiter des dépressions).

Le traitement par FLUOXET ne doit être commencé que 2 semaines après l'arrêt de l'IMAO non sélectif et irréversible.

Ne prenez aucun IMAO non sélectif et irréversible pendant au minimum 5 semaines après l'arrêt de votre traitement par FLUOXET. Si FLUOXET vous a été prescrit pendant une longue durée et/ou à des doses élevées, votre médecin devra envisager un intervalle de temps plus long.

- Si vous prenez augmentation du
Faites attention
Adressez-vous
mg, gélules dan

- Problèmes car
- Début de fièvre
mental : tels que
syndrome appellé
- Bien qu'
vital, contactez
pourrait devoir être
- Manie ou antécédents
votre médecin in
- Antécédent d'
saignement inh
- Prise de médic
médicaments et
- Convulsions o
constatez que la
ment, il pourrait
- Electroconvuls
- Traitement en
voir rubrique « A
- Impatiences, in
augmentation de
- Diabète : votr
d'antidiabétique
- Maladie du foie
traitement.

- Rythme cardia
carence en sel
l'utilisation de tra
- Traitement en
- Glaucome (aug
Idées suicidaires

Si vous souffrez
avoir des idées
manifestations p
ce type de médic

Vous êtes partic

cas suivants :

- si vous avez d
- si vous êtes
comportemental
une maladie ps

En cas de surv

vient votre mé

Vous pouvez v
êtes dépressif o
cette notice. V
dépression ou v
comportemental

Enfants et ado

Les patients de
que tentative de
agressivité, com
de médicaments
8 à 18 ans que
association à un
Les données de
la puberté, le
patients de cette
18 ans il est po
souffrez d'épis
psychothérapie

FLUOXET à u
adressez-vous
énumérés ci-de

FLUOXET.

FLUOXET ne d

Fluoxet® 20 mg

60 gélules



es

LOT 2214
EXP 05
PPV 29

armacien.

né dans cette notice. Voir rubrique 4.

ent car elle

acien.

à d'autres

t identiques

de médecin ou à

serait pas

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que FLUOXET 20 mg, gélules et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FLUOXET 20 mg, gélules ?
- Comment prendre FLUOXET 20 mg, gélules ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver FLUOXET 20 mg, gélules ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE FLUOXET 20 mg, gélules ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC: N06AB03

FLUOXET 20 mg, gélules, contient une substance active, la fluoxétine, et fait partie d'un groupe de médicaments appelés antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS).

Ce médicament vous a été prescrit pour traiter :

Chez l'adulte :

- soit un épisode dépressif,
- soit des troubles obsessionnels compulsifs,
- soit la boulimie : FLUOXET est utilisé en complément d'une psychothérapie pour la diminution de la fréquence des crises de boulimie, des vomissements ou de la prise de laxatifs.

Chez l'enfant âgé de 8 ans et plus et l'adolescent :

- Un épisode dépressif modéré à sévère qui ne répond pas à une prise en charge psychothérapeutique après 4 à 6 séances. Chez les enfants et adolescents présentant un épisode dépressif modéré à sévère, FLUOXET ne devrait être proposé qu'en association avec une prise en charge psychothérapeutique.

Comment FLUOXET fonctionne

Tout le monde possède dans son cerveau une substance appelée sérotonine. Les personnes qui sont déprimées, qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs ou de boulimie ont des taux moins élevés de sérotonine que les autres. Le fonctionnement de FLUOXET et des autres ISRS n'est pas totalement expliqué mais ils pourraient aider à augmenter le taux de sérotonine dans le cerveau. Traiter ces maladies est important pour vous aider à vous sentir mieux. Si elle n'est pas traitée, votre maladie peut ne pas disparaître, peut s'aggraver et être plus difficile à soigner.

Il est possible qu'il soit nécessaire que vous suiviez votre traitement pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois afin de s'assurer que les symptômes disparaissent.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FLUOXET 20 mg, gélules ?

Ne prenez jamais FLUOXET 20 mg, gélules :

- Si vous êtes allergique à la fluoxétine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6. Si vous développez une éruption cutanée ou d'autres réactions allergiques (telles que démangeaisons, un gonflement des lèvres ou du visage, ou un essoufflement), arrêtez tout de suite les gélules et contactez votre médecin immédiatement.
- Si vous prenez d'autres médicaments appartenant à la classe des inhibiteurs non sélectifs et irréversibles de la monoamine oxydase (IMAOs) en raison de la survenue possible de réactions graves voire fatales (par exemple l'iproniazide utilisé pour traiter des dépressions).

Le traitement par FLUOXET ne doit être commencé que 2 semaines après l'arrêt de l'IMAO non sélectif et irréversible.

Ne prenez aucun IMAO non sélectif et irréversible pendant au minimum 5 semaines après l'arrêt de votre traitement par FLUOXET. Si FLUOXET vous a été prescrit pendant une longue durée et/ou à des doses élevées, votre médecin devra envisager un intervalle de temps plus long.

- Si vous prenez augmentation du
Faites attention
Adressez-vous
mg, gélules dan

- Problèmes car
- Début de fièvre
mental : tels que
syndrome appellé
- Bien qu'
vital, contactez
pourrait devoir être
- Manie ou antécédents
votre médecin in
- Antécédent d'
saignement inh
- Prise de médic
médicaments et
- Convulsions o
constatez que la
ment, il pourrait
- Electroconvuls
- Traitement en
voir rubrique « A
- Impatiences, in
augmentation de
- Diabète : votr
d'antidiabétique
- Maladie du foie
traitement.

- Rythme cardia
carence en sel
l'utilisation de tra
- Traitement en
- Glaucome (aug
Idées suicidaires

Si vous souffrez
avoir des idées
manifestations p
ce type de médic

Vous êtes partic

cas suivants :

- si vous avez d
- si vous êtes
comportemental
une maladie ps

En cas de surv

vient votre mé

Vous pouvez v
êtes dépressif o
cette notice. V
dépression ou v
comportemental

Enfants et ado

Les patients de
que tentative de
agressivité, com
de médicaments
8 à 18 ans que
association à un
Les données de
la puberté, le
patients de cette
18 ans il est po
souffrez d'épis
psychothérapie

FLUOXET à u
adressez-vous
énumérés ci-de

FLUOXET.

FLUOXET ne d