

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour la remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

143949

Déclaration de Maladie : N° S19-0004656

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 3105 Société : RAM

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : HOUARI MOHAMED Date de naissance : 01/02/1951

Adresse : Cité d'JDMAA Jemila 1 Rue 2 N° 3 Casablanca

Tél. : 2661228603 Total des frais engagés : 3.251,20 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 02.01.2023

Nom et prénom du malade : HOUARI MOHAMED Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Diabète sucré


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 06 JAN 2023

Signature de l'adhérent(e) : [Signature]



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
02.10.23	Matiem		CS 300 dhs	Dr. FIKRI MARIEM Spécialiste en Endocrinologie et Métaboliques Nutrition et Matériel Diabétologique 15, Rue 11, Jamila 3, Bd Dr. Harti, Sbata - Casablanca Tel: +212 10 22 59 59 60
05.10.23	Diabétologie, Nutrition et Matériel Diabétologique, Sbata Casablanca		control Dr. FIKRI MARIEM	Spécialiste en Endocrinologie et Métaboliques Nutrition et Matériel Diabétologique 15, Rue 11, Jamila 3, Bd Dr. Harti, Sbata - Casablanca Tel: +212 10 22 59 59 60

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE BOUT KALDI 11/10/95	05/10/23	1291,10
PHARMACIE BOUT KALDI 11/10/95	05/10/23	260100

ANALYSES - RADIOPHGRAPHS

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Laboratoire EL FIRDAUS Jamila 7 Rue 14 N° 90 CASABLANCA TEL: 05 22 57 04 21 - Fax: 05 22 57 04 21	02/10/23	B1030	11405,10 DH

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	G 21433552 00000000 G 00000000 11433553	B	Coefficient des Travaux
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES EL FIRDAOUS

BIOCHIMIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE

Jamila 7, Rue 14, N°90 Cité Djemaâ 20450 -Casablanca (04).

Tél : 0522 57 64 21 – Fax : 0522 55 33 42

Dr Souad EL HAIMER

Médecin Spécialiste en Biologie Médicale

Lauréat de l'Université Hassan II -Faculté de Médecine de Casablanca

Domiciliation Bancaire : Banque populaire -Agence Oued Eddahab

Compte N° : 178 780 21 211 36 24 330 000 346

Identifiant commun de l'entreprise : 001660300000062

Patente : 57432824

INP : 093 000909

CNSS : 6418976

FACTURE N° : 230100028

CASABLANCA le 02-01-2023

Mr HOURRI Mohamed

Récapitulatif des analyses

<i>CN</i>	<i>Analyse</i>	<i>Val</i>	<i>Clefs</i>
9105	Prélèvement sanguin	E25	E
0100	Acide urique	B30	B
0104	Calcium	B30	B
0111	Créatinine	B30	B
0118	Glycémie	B30	B
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
0154	Ferritine	B250	B
0216	Numération formule	B80	B
0223	VS	B30	B
0439	Vitamine D	B450	B

Total des B : 1030

TOTAL DOSSIER : 1405.20 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : mille quatre cent cinq dirhams vingt centimes.

Laboratoire d'Analyses Médicales
EL FIRDAOUS
 Jamila 7 Rue 14 N°90 C.D.
 CASABLANCA
 Tel: 0522 57 64 21 - Fax: 0522 55 33 42

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES EL FIRDAOUS

BIOCHIMIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE

Jamila 7, Rue 14, N°90 Cité Djemaâ 20450 -Casablanca (04).

Tél : 0522 57 64 21 - Fax : 0522 55 33 42

Dr Souad EL HAIMER

Médecin Spécialiste en Biologie Médicale

Lauréat de l'Université Hassan II -Faculté de Médecine de Casablanca

2301020003 – Mr HOURRI Mohamed

Calcium	94 2.34	mg/L mmol/L	(85-105) (2.12-2.61)	104
Créatinine	17.34 153.3	mg/L μmol/L	(6.00-13.00) (53.0-114.9)	30-09-2022 14.69
Acide urique (automate)	78 464	mg/L μmol/L	(35-72) (208-428)	30-09-2022 71
Ferritine	18.50	ng/ml	(25.00-280.00)	

VITAMINOLOGIE

25-(OH)-vitamine D (D2+D3) 12.90 ng/ml

Interprétation :

Dr Sc	Carence	< 20	Ng/ml
Médecin	Taux non optimal	20-29	Ng/ml
Lauréat	Taux recommandé	30-100	Ng/ml
	Toxicité	> 100	Ng/ml

Synthèse des recommandations internationales, rapport HAS 2013 sur l'utilité clinique du dosage de la vitamine D.
Il est à noter que certaines recommandations préconisent un taux optimal à partir de 50 nmol/L au lieu de 75 nmol/L.

Validé par : Dr. Souad EL HAIMER

EL FIRDAOUS
Laboratoire d'Analyses Médicales
Jamila 7, Rue 14, N°90
Casablanca (04)
Tél : 0522 57 64 21
Fax : 0522 55 33 42

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES EL FIRDAOUS

BIOCHIMIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE

Jamila 7, Rue 14, N°90 Cité Djemaâ 20450 -Casablanca (04).

Tél : 0522 57 64 21 – Fax : 0522 55 33 42

Dr Souad EL HAIMER

Médecin Spécialiste en Biologie Médicale

Lauréat de l'Université Hassan II -Faculté de Médecine de Casablanca

2301020003 – Mr HOURRI Mohamed

BIOCHIMIE SANGUINE

Dr So

Médecin

Lauréat

Casablanca


30-09-2022

Glycémie à jeun

1.17 g/l
6 mmol/l

(0.70–1.10)
(4–6)

1.13



Dr So

Médecin

Lauréat

Casablanca


30-09-2022

Hémoglobine glyquée (HbA1c)

6.2 %

(4.0–6.0)

6.3



Dr So

Médecin

Lauréat

Casablanca

24-02-2022

Validé par : Dr. Souad EL HAIMER

Dr. Souad EL HAIMER
Laboratoire EL FIRDAOUS
Jamila 7 Rue 14 N°90 Cité Djemaâ
Casablanca (04) Tél : 0522 57 64 21 - Fax : 0522 55 33 42

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES EL FIRDAOUS

BIOCHIMIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE

Jamila 7, Rue 14, N°90 Cité Djemaâ 20450 -Casablanca (04).

Tél : 0522 57 64 21 – Fax : 0522 55 33 42

Dr Souad EL HAIMER

Médecin Spécialiste en Biologie Médicale

Lauréat de l'Université Hassan II -Faculté de Médecine de Casablanca

2301020003 – Mr HOURRI Mohamed

VITESSE DE SEDIMENTATION

23-12-2019

VS 1ère heure	41 mm/h	(0-10)
VS 2ème heure	72 mm/h	(0-20)

Dr Sc
Médecin
Lauréat

Dr Sc
Médecin
Lauréat

Dr Sc
Médecin
Lauréat

Validé par : Dr. Souad EL HAIMER



LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES EL FIRDAOUS

BIOCHIMIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE

Jamila 7, Rue 14, N°90 Cité Djemaâ 20450 -Casablanca (04).

Tél : 0522 57 64 21 – Fax : 0522 55 33 42

Dr Souad EL HAIMER

Médecin Spécialiste en Biologie Médicale

Lauréat de l'Université Hassan II -Faculté de Médecine de Casablanca

Date du prélèvement : 02-01-2023 à 07:12

Code patient : 1909130033

Né(e) le : 01-07-1951 (71 ans)

Mr HOURRI Mohamed

Dossier N° : 2301020003

Prescripteur : Dr FIKRI MARIEM



Dr So

Médecin
Lauréat

HEMATOLOGIE

HEMOGRAMME

(Sysmex XT-1800i)

27-09-2021

5.90

Hématies

5.26 /mL

(4.50–5.50)

Lignée érythrocytaire

Hémoglobine

15.6 g/dL

(13.0–17.4)

16.8

Hématocrite

46.9 μ ³

(40.0–52.0)

50.7

VGM

89.2 %

(80.0–96.0)

85.9

TCMH

30 pg

(27–32)

28

CCMH

33 %

(30–35)

33

Dr So

Médecin Lauréat

Formule leucocytaire

Leucocytes

6 180 /mm³

(4 000–10 000)

6 110

27-09-2021

Neutrophiles

57 %

soit

3 523 /mm³

(2 000–7 500)

3788

Eosinophiles

2 %

soit

124 /mm³

(100–400)

122

Basophiles

0 %

soit

0 /mm³

(0–150)

0

Lymphocytes

31 %

soit

1 916 /mm³

(1 500–4 000)

1711

Monocytes

10 %

soit

618 /mm³

(200–800)

489

Numération plaquettaire

Plaquettes

182 000 /mm³

(150 000–450 000)

165 000

Validé par : Dr. Souad EL HAIMER

Dr. Souad EL HAIMER
Laboratoire d'Analyses Médicales
EL FIRDAOUS
Jamila 7 Rue 14 Casablanca
Tél : 0522 57 64 21 - Fax : 0522 55 33 42

Dr FIKRI Mariem

Ancien médecin du CHU Ibn Rochd
et de l'hôpital CHP My Rachid / Sidi Othmane
Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie,
Nutrition et Maladies Métaboliques
Echographie thyroïdienne
et Abdominale



الدكتورة فكري مريم

طبيبة سابقة بمستشفى الجامعي ابن رشد
طبيبة سابقة بمستشفى مولاي رشيد سيدى عثمان
اختصاصية في السكري، الغدد،
الهرمونات، مشاكل النمو والكوليسترول
الفحص بالصدى

Casablanca : 02.01.2023 الدار البيضاء :

Dr. LAHLOU KHALDI ILM
1531, Bd. Mohamed VI - Casablanca
Tel: 05 22 79 19 95

Dr. LAHLOU KHALDI ILM
1531, Bd. Mohamed VI - Casablanca
Tel: 05 22 29 50 00

Bandeslettes à glycémie
On Coll Plus
3GC/jour
M al 3més

Dr FIKRI Mariem
Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie,
Nutrition et Maladies Métaboliques
Rue 11, Jamila 3, Bd Driss Harti, Sbata - Casablanca
Tel: 05 22 59 59 60

Dr FIKRI Mariem

Ancien médecin du CHU Ibn Rochd
et de l'hôpital CHP My Rachid / Sidi Othmane
Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie,
Nutrition et Maladies Métaboliques
Echographie thyroïdienne
et Abdominale



الدكتورة فكري مريم

طبيبة سابقة بمستشفى الجامعي ابن رشد
طبيبة سابقة بمستشفى مولاي رشيد سيدى عثمان
اختصاصية في السكري، الغدد،
الهرمونات، مشاكل التمثيل الكوليسترول
الفحص بالصدى

Casablanca : 05/01/2023 الدار البيضاء

Mr Hourri Mohamed

$$43.20 \times 4 = 172,80$$

1.5

1 - Zyloric 300

0 - 0 - 1

$$21.00 \times 4 = 84$$

1.5

2 - Maforum 1000

0 - 1 - 0

$$51.70 \times 3 = 155,10$$

1.5

3 - Glynorm 1 mg

0 - 0 - 1

$$722.70 \times 3 = 2168,10$$

1.5

4 - Trutec

0 - 0 - 1

— III de 3 mois —

$$171,00$$

5 - Nocol 40 mg

0 - 0 - 1 $\frac{1}{2}$

2 mois
spur

Dr. FIKRI Mariem
Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie,
Nutrition et Maladies Métaboliques
15, Rue 11, Jarhila 3, Bd Driss Harti Sbata, Casablanca
Casablanca - 05 22 59 59 60 - INPE : 09 12 05 740

11, حي جميلة 3، شارع إدريس الحارسي، سبلة 60
Casablanca - 05 22 59 59 60 - INPE : 09 12 05 740
E-mail : Dr.mfikri.2010@gmail.com Dr.mfikri.2010@gmail.com

49.00 6- Mycoderme poudre A'S 2 fois/j

184.00 7- ADDAX crème ~~A'S~~ réparatrice 2 fl/jou

Dr FIKRI Majeim
Spécialiste en Enfants, Adolescents, Diabétologie,
Nutrition et maladies Métaboliques
15, Rue 11, Jamila 3, Bd Driss El Moutawakel, Sbata - Casablanca
Tel: +212 (0)52 59 59 60

49.60 8- D-her Fat | charge 15 jours
ampoule pendant 1 mois

56.30 prius
9- D-cm 2L.000 | chg + mois 3 mois
ampoule |
Talcul: 1,10

PHARMACEUTIQUE
DR. LAHLOU KHALDOUN
1331, Bd Mohamed VI - Casablanca
Tél: 29 19 95

Dr FIKRI Majeim
Spécialiste en Enfants, Adolescents, Diabétologie,
Nutrition et maladies Métaboliques
15, Rue 11, Jamila 3, Bd Driss El Moutawakel, Sbata - Casablanca
Tel: +212 (0)52 59 59 60

Dr FIKRI Mariem

Ancien médecin du CHU Ibn Rochd et de l'hôpital CHP My Rachid / Sidi Othmane

Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie,

Nutrition et Maladies Métaboliques

Echographie thyroïdienne

et Abdominale



الدكتورة فكري مريم

طبيبة سابقة بمستشفى الجامعي ابن رشد

طبيبة سابقة بمستشفى مولاي رشيد سيدى عثمان

إختصاصية في السكري، الغدد،

الهرمونات، مشاكل السمو والكوليستروول

الفحص بالصدى

Me Mourri M'hamed

Casablanca :

Dr FIKRI Mariem

Specialist Endocrinologist, Diabetologist,
Nutritionist & Metabolic Diseases
15, Rue 11, Jamila 3, Bd Driss Harti, Sbata - Casablanca
Tel: +212 52 259 59 60

الدار البيضاء

المملكة المغربية

- Glycémie à jeun
- Hémoglobine glyquée
- Triglycerides
- Cholesterol total, HDL, LDL
- Uricémie
- Urée
- Créatinine
- Microalbuminurie
- ECBU
- TGO/TGP/GGT
- NFS - Plaquettes
- CRP
- VS
- PSA
- Calcémie
- Phosphorémie
- PTH
- Vit D2/D3
- Ferritinémie

- TSH
- T4L
- T3L
- Anticorps anti TPO
- Anticorps anti récepteurs TSH
- Anticorps anti Thyroglobuline
- Thyroglobuline
- Calcitonine
- Cortisol libre Urinaire
- Cortisolémie - 8h
- Cortisolémie - 16h
- Prolactinémie
- FSH LH
- IGF1
- Testostérone Oestrogène
- 17 OH Progesterone
- Dérivés méthoxytés
- Aldostérone
- Anti-Gad, Anti-IA2
- Dosage insuline, Peptide C

Tel - 06.61.20.86.03

Ainsi va

03/01/23

NOTICE: INFORMATION

1. DENOMINATION :

MYCODERME® 1%
Flacon
DCI : Nitrate

EUR
LOT: 08222015
PER: 09/2027
PPU: 49,00 DH

Veuillez médica
Gardez Si vous demandez cien.
Ce me donnez identique Si l'ut remarc parlez-

nt de prendre ce in de la relire. s avez un doute, ou à votre pharma- nt prescrit. Ne le cas de symptômes rave ou si vous dans cette notice, bien.

MYCODERME® 1%

Poudre dermatique

Flacon de 30 g



6 118000 230144

2. COM
Composants La sub
MYCODERME contient
Composants Les autres
Acide borique.....
Oxyde de zinc.....
Stéarate de magnésium.....
Silice colloïdale anhydre.....
Talc.....

que flacon de 30 g

3 g
4,5 mg
0,6 g
0,9 g
q.s.p. 30,00 g

LISTE DES EXCIPIENTS À EFFET NOTOIRE
Ce médicament contient de l'acide borique.

3. CLASSE

D'ACTIVITÉ

MYCODERM

de médicament

activité antif

4. INDICATION

Ce médicam

champignon

Ce médicam

oses (af

édozes

raitemen

sous-mamm

Dans certain

tube digestif.

Dermatophytie

Traitemen :

Intertrigo macéré génit

Intertrigo des orteils.

TYPE

groupe
d'une

tre les

certaines

génital,

lement le



3 595894 852752

EMULSION REPARATRICE

LOT: CIX57

EXP: 08/2025

PPC: 187.00 DH

®

NOCOL® 40 mg

30 comprimés pelliculés



6 118000 071150

LOT 223041

EXP 02/25

PPV 171DH00

s antécédents de maladie coronaire avérée, d'ac-

122,10



122,10



122,10



... avec l'errant. De plus, il n'existe pas
homozygote.

mg ne devrait être envisagée après 70 ans que sous une

indésirables (dose-dépendants) à type de rhabdomyolyses

indésirables (dose-dépendants) à type de rhabdomyolyses

ou interrompre le traitement hypocholestérolémiant pendant

rhabdomolyse (diminution du métabolisme hépatique de

On Call® Plus

Blood Glucose Test Strips

[REF] G133-111

Call® Plus

Glucose Test Strips

G133-111



Info Pharma

Distributeur exclusif

Info Pharma

Distributeur exclusif

A CON®



ACON Laboratories
5850 Oberlin Drive
San Diego, CA 92121

www.aconlabs.com

EC | REP
MDSS
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

A CON®



ACON Laboratories
5850 Oberlin Drive
San Diego, CA 92121

www.aconlabs.com

EC | REP
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

Hypoglycémie

L'effet indésirable le plus fréquent est l'hypoglycémie, pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10 (voir rubrique 2 Si vous avez une hypo). Les hypoglycémies sont généralement faibles/modérées mais peuvent occasionnellement entraîner une perte de connaissance ou un coma hypoglycémique. Si cela survient, une assistance médicale est immédiatement nécessaire.

Allergies

Les allergies sont très rares (nouvellement affecter jusqu'à 1 patient sur 10 000). Des symptômes tels que la transpiration excessive, des étourdissements, un rythme cardiaque rapide, des vertiges et une confusion sont des signes d'une réaction anaphylactique.

Autres

Fréqu:

- Dou
- Diar

Rare

- Syn
- Vom

Très rare

- Const
- Prob
- Prob

Fréqu:

- Hypo
- Naus

Si vous informe

51 (40)

r 10)

10

8

6

4

2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

128

130

132

134

136

138

140

142

144

146

148

150

152

154

156

158

160

162

164

166

168

170

172

174

176

178

180

182

184

186

188

190

192

194

196

198

200

202

204

206

208

210

212

214

216

218

220

222

224

226

228

230

232

234

236

238

240

242

244

246

248

250

252

254

256

258

260

262

264

266

268

270

272

274

276

278

280

282

284

286

288

290

292

294

296

298

300

302

304

306

308

310

312

314

316

318

320

322

324

326

328

330

332

334

336

338

340

342

344

346

348

350

352

354

356

358

360

362

364

366

368

370

372

374

376

378

380

382

384

386

388

390

392

394

396

398

400

402

404

406

408

410

412

414

416

418

420

422

424

426

428

430

432

434

436

438

440

442

444

446

448

450

452

454

456

458

460

462

464

466

468

470

472

474

476

478

480

482

484

486

488

490

492

494

496

498

500

502

504

506

508

510

512

514

516

518

520

522

524

526

528

530

532

534

536

538

540

542

544

546

548

550

552

554

556

558

560

562

564

566

568

570

572

574

576

578

580

582

584

586

588

590

592

594

596

598

600

602

604

Notice : Information de l'utilisateur

GLYNORM® 0,5 mg, comprimés

GLYN

GLY

Veuillez lire attentivement
ce qui suit.

elle contient des informations

Gardez cette notice.

Si vous avez d'autres questions,

Ce médicament vous aidera à gérer

vos personnes. Il pourra être

identiques aux vôtres.

Si vous ressentez un effet secondaire, contactez votre pharmacien.

Il est mentionné dans ce document.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est ce que GLYNORM ?
 2. Quelles sont les contre-indications ?
 3. Comment prendre GLYNORM ?
 4. Quels sont les effets secondaires ?
 5. Comment conseiller GLYNORM ?
 6. Contenu de l'emballage.
- S/11/20*

1. Qu'est-ce que GLYNORM, comprimés et dans quel cas est-il utilisé ?

GLYNORM est un antidiabétique oral contenant du répaglinide qui aide votre pancréas à produire plus d'insuline et donc à réduire votre taux de sucre (glucose) dans le sang.

Le diabète de type 2 est une maladie au cours de laquelle votre pancréas ne

- Sympathomimétiques (utilisés dans le traitement de l'asthme)
- Clarithromycine, triméthoprime, rifampicine (antibiotiques)
- Itraconazole, kéroconazole (médicaments antifongiques)
- Gemfibrozil (utilisé pour traiter un taux de graisses élevé dans le sang)
- Ciclosporine (utilisée pour inhiber le système immunitaire)
- Déferasirox (utilisé pour diminuer l'excès de fer chronique)
- Clopidogrel (prévient la formation des caillots sanguins)
- Phénytoïne, carbamazépine, phénobarbital (utilisés dans le traitement de l'épilepsie)
- Millepertuis (médicament à base de plantes).

2. Pourquoi prendre ce médicament car il contient de l'alcool.

L'alcool peut modifier la capacité de GLYNORM à réduire le taux de sucre dans le sang. Faites attention aux signes d'hypoglycémie.

3. Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin avant de prendre ce médicament.

Vous ne devez pas prendre GLYNORM si vous êtes enceinte ou prévoyez de l'être. Vous ne devez pas prendre GLYNORM si vous allaitez.

4. Conduite de véhicules et utilisation de machines

Votre capacité à conduire ou à utiliser des machines peut être altérée si votre taux de sucre dans le sang est bas ou élevé. Rappelez-vous que vous pouvez mettre en danger vous-même ou celle des autres en danger. Consultez votre médecin pour savoir si vous pouvez conduire un véhicule si vous :

- avez souvent des hypoglycémies
- avez peu ou pas de signes annonciateurs d'hypoglycémie.

5. Comment prendre GLYNORM, comprimés ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin en cas de doute.

Votre médecin vous définira votre dose.

Prenez ce médicament car il contient de l'alcool.

GLYNORM® 0,5 mg, comprimés
Boîte de 30 comprimés
AMM N° 69/21/NRQd/DMP/VHA/18

6 118000 023234

Notice : Information de l'utilisateur

GLYNORM® 0,5 mg, comprimés

GLYN

GLY

Veuillez lire attentivement
ce qui suit.

elle contient des informations

Gardez cette notice.

Si vous avez d'autres questions,

Ce médicament vous aidera à gérer

vos personnes. Il pourra être

identiques aux vôtres.

Si vous ressentez un effet secondaire, contactez votre pharmacien.

Il est mentionné dans ce document.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est ce que GLYNORM ?
 2. Quelles sont les contre-indications ?
 3. Comment prendre GLYNORM ?
 4. Quels sont les effets secondaires ?
 5. Comment conseiller GLYNORM ?
 6. Contenu de l'emballage.
- S/11/20*

1. Qu'est-ce que GLYNORM, comprimés et dans quel cas est-il utilisé ?

GLYNORM est un antidiabétique oral contenant du répaglinide qui aide votre pancréas à produire plus d'insuline et donc à réduire votre taux de sucre (glucose) dans le sang.

Le diabète de type 2 est une maladie au cours de laquelle votre pancréas ne

- Sympathomimétiques (utilisés dans le traitement de l'asthme)
- Clarithromycine, triméthoprime, rifampicine (antibiotiques)
- Itraconazole, kéroconazole (médicaments antifongiques)
- Gemfibrozil (utilisé pour traiter un taux de graisses élevé dans le sang)
- Ciclosporine (utilisée pour inhiber le système immunitaire)
- Déferasirox (utilisé pour diminuer l'excès de fer chronique)
- Clopidogrel (prévient la formation des caillots sanguins)
- Phénytoïne, carbamazépine, phénobarbital (utilisés dans le traitement de l'épilepsie)
- Millepertuis (médicament à base de plantes).

2. Pourquoi prendre ce médicament car il contient de l'alcool.

L'alcool peut modifier la capacité de GLYNORM à réduire le taux de sucre dans le sang. Faites attention aux signes d'hypoglycémie.

3. Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin avant de prendre ce médicament.

Vous ne devez pas prendre GLYNORM si vous êtes enceinte ou prévoyez de l'être. Vous ne devez pas prendre GLYNORM si vous allaitez.

4. Conduite de véhicules et utilisation de machines

Votre capacité à conduire ou à utiliser des machines peut être altérée si votre taux de sucre dans le sang est bas ou élevé. Rappelez-vous que vous pouvez mettre en danger vous-même ou celle des autres en danger. Consultez votre médecin pour savoir si vous pouvez conduire un véhicule si vous :

- avez souvent des hypoglycémies
- avez peu ou pas de signes annonciateurs d'hypoglycémie.

5. Comment prendre GLYNORM, comprimés ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin en cas de doute.

Votre médecin vous définira votre dose.

Prenez ce médicament car il contient de l'alcool.

GLYNORM® 0,5 mg, comprimés
Boîte de 30 comprimés
AMM N° 69/21/NRQd/DMP/VHA/18



6 118000 023234

DIAFORMINE® 1000 mg

METFORMINE

COMPOSITION

Chlorhydrate de Metformine 1000,00 mg

Excipients: q. s. pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antidiabétiques oraux

DANS QUEL(S) CAS L

Associé à un régime alimentaire destiné au traitement du diabète de type 2.

Chez l'adulte, il peut être associé à l'insuline.

Chez l'enfant de plus de 10 ans.

ATTENTION !

INFORMATIONS NECESSAIRES

DIAFORMINE 1000 mg

- hypersensibilité connue
- en cas de déséquilibre
- si vous avez une insuffisance rénale avec augmentation de la créatinine
- en cas de maladies infectieuses (par exemple: infection urinaire)
- pendant les deux jours qui suivent
- si vous avez une insuffisance rénale
- si vous avez une insuffisance cardiaque
- en cas de diarrhée persistante
- en cas de consommation importante d'alcool
- pendant l'allaitement.

Prendre des précautions particulières

MISES EN GARDE SPECIALISÉES

Au cours du traitement, la survenue de crampes musculaires ou de réactions d'hypoglycémie grave de votre diabète doit être signalée immédiatement.

Prévenir aussitôt votre médecin.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Tous les patients doivent poursuivre le régime alimentaire, avec une répartition régulière de l'apport glucidique au cours de la journée.

Les patients en surcharge pondérale, doivent poursuivre le régime hypocalorique. Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination des antidiabétiques oraux se fait en grande partie par les reins.

Vous devez faire appel à votre médecin, pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse, bactérienne ou virale : grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire. La survenue de certaines maladies, ou la prise de certains médicaments (Corticoïdes et certains diurétiques, ritodrine, salbutamol, et terbutaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement le diabète.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour toute autre raison, informez le médecin que vous prenez ce médicament.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Prise de DIAFORMINE 1000 mg, comprimé pelliculé avec des aliments et des boissons :

Evitez toute consommation de boissons alcoolisées.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, notamment des corticoïdes, des diurétiques, de la ritodrine, du salbutamol ou de la terbutaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des produits de contraste iodés, ou des médicaments contenant de l'alcool même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

P P V 2 1 D H 0 0
P E R 1 1 / 2 5
L O T L 3 8 1 6

al destiné au traitement

tique oral ou l'insuline.
sociation avec l'insuline.

un comprimé pelliculé.
ns les cas suivants :
s du produit,

reins avec

, infection urinaire),
fuits radiographiques iodés,

rimé pelliculé :


inales accompagnées de
peut être le signe d'un
site.

Diaformine® 1000 mg
Metformine

30 comprimés pelliculés



6 118000 041283



DIAFORMINE® 1000 mg

METFORMINE

COMPOSITION

Chlorhydrate de Metformine 1000,00 mg

Excipients: q. s. pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antidiabétiques oraux

DANS QUEL(S) CAS L

Associé à un régime alimentaire destiné au traitement du diabète de type 2.

Chez l'adulte, il peut être associé à l'insuline.

Chez l'enfant de plus de 10 ans.

ATTENTION !

INFORMATIONS NECESSAIRES

DIAFORMINE 1000 mg

- hypersensibilité connue
- en cas de déséquilibre
- si vous avez une insuffisance rénale avec augmentation de la créatinine
- en cas de maladies infectieuses (par exemple: infection urinaire)
- pendant les deux jours qui suivent
- si vous avez une insuffisance rénale
- si vous avez une insuffisance cardiaque
- en cas de diarrhée persistante
- en cas de consommation importante d'alcool
- pendant l'allaitement.

Prendre des précautions particulières en cas de MISES EN GARDE SPECIAL

Au cours du traitement, la survenue de crampes musculaires ou de réactions d'hypoglycémie grave de votre diabète doit être signalée immédiatement.

Prévenir aussitôt votre médecin si vous présentez des symptômes de maladie infectieuse.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Tous les patients doivent poursuivre le régime alimentaire, avec une répartition régulière de l'apport glucidique au cours de la journée.

Les patients en surcharge pondérale, doivent poursuivre le régime hypocalorique. Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination des antidiabétiques oraux se fait en grande partie par les reins.

Vous devez faire appel à votre médecin, pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse, bactérienne ou virale : grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire. La survenue de certaines maladies, ou la prise de certains médicaments (Corticoïdes et certains diurétiques, ritodrine, salbutamol, et terbutaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement le diabète.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour toute autre raison, informez le médecin que vous prenez ce médicament.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Prise de DIAFORMINE 1000 mg, comprimé pelliculé avec des aliments et des boissons :

Evitez toute consommation de boissons alcoolisées.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, notamment des corticoïdes, des diurétiques, de la ritodrine, du salbutamol ou de la terbutaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des produits de contraste iodés, ou des médicaments contenant de l'alcool même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

P P V 2 1 D H 0 0
P E R 1 1 / 2 5
L O T L 3 8 1 6

al destiné au traitement

tique oral ou l'insuline.
sociation avec l'insuline.

un comprimé pelliculé.
ns les cas suivants :
s du produit,

reins avec

, infection urinaire),
fuits radiographiques iodés,

rimé pelliculé :


inales accompagnées de
peut être le signe d'un
site.

Diaformine® 1000 mg
Metformine

30 comprimés pelliculés



6 118000 041283



DIAFORMINE® 1000 mg

METFORMINE

COMPOSITION

Chlorhydrate de Metformine 1000,00 mg

Excipients: q. s. pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antidiabétiques oraux

DANS QUEL(S) CAS L

Associé à un régime alimentaire destiné au traitement du diabète de type 2.

Chez l'adulte, il peut être associé à l'insuline.

Chez l'enfant de plus de 10 ans.

ATTENTION !

INFORMATIONS NECESSAIRES

DIAFORMINE 1000 mg

- hypersensibilité connue
- en cas de déséquilibre
- si vous avez une insuffisance rénale avec augmentation de la créatinine
- en cas de maladies infectieuses (par exemple: infection urinaire)
- pendant les deux jours qui suivent
- si vous avez une insuffisance rénale
- si vous avez une insuffisance cardiaque
- en cas de diarrhée persistante
- en cas de consommation importante d'alcool
- pendant l'allaitement.

Prendre des précautions particulières

MISES EN GARDE SPECIALES

Au cours du traitement, la survenue de crampes musculaires ou de réactions d'hypoglycémie grave de votre diabète doit être signalée immédiatement.

Prévenir aussitôt votre médecin.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Tous les patients doivent poursuivre le régime alimentaire, avec une répartition régulière de l'apport glucidique au cours de la journée.

Les patients en surcharge pondérale, doivent poursuivre le régime hypocalorique. Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination des antidiabétiques oraux se fait en grande partie par les reins.

Vous devez faire appel à votre médecin, pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse, bactérienne ou virale : grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire. La survenue de certaines maladies, ou la prise de certains médicaments (Corticoïdes et certains diurétiques, ritodrine, salbutamol, et terbutaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement le diabète.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour toute autre raison, informez le médecin que vous prenez ce médicament.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Prise de DIAFORMINE 1000 mg, comprimé pelliculé avec des aliments et des boissons :

Evitez toute consommation de boissons alcoolisées.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, notamment des corticoïdes, des diurétiques, de la ritodrine, du salbutamol ou de la terbutaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des produits de contraste iodés, ou des médicaments contenant de l'alcool même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

P P V 2 1 D H 0 0
P E R 1 1 / 2 5
L O T L 3 8 1 6

al destiné au traitement

tique oral ou l'insuline.
sociation avec l'insuline.

un comprimé pelliculé.
ns les cas suivants :
s du produit,

reins avec

, infection urinaire),
fuits radiographiques iodés,

rimé pelliculé :

inales accompagnées de
peut être le signe d'un
site.

Diaformine® 1000 mg
Metformine

30 comprimés pelliculés



6 118000 041283



DIAFORMINE® 1000 mg

METFORMINE

COMPOSITION

Chlorhydrate de Metformine 1000,00 mg

Excipients: q. s. pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antidiabétiques oraux

DANS QUEL(S) CAS L

Associé à un régime alimentaire destiné au traitement du diabète de type 2.

Chez l'adulte, il peut être associé à l'insuline.

Chez l'enfant de plus de 10 ans.

ATTENTION !

INFORMATIONS NECESSAIRES

DIAFORMINE 1000 mg

- hypersensibilité connue
- en cas de déséquilibre
- si vous avez une insuffisance rénale avec augmentation de la créatinine
- en cas de maladies infectieuses (par exemple: infection urinaire)
- pendant les deux jours qui suivent
- si vous avez une insuffisance rénale
- si vous avez une insuffisance cardiaque
- en cas de diarrhée persistante
- en cas de consommation importante d'alcool
- pendant l'allaitement.

Prendre des précautions particulières

MISES EN GARDE SPECIALES

Au cours du traitement, la survenue de crampes musculaires ou de réactions d'hypoglycémie grave de votre diabète doit être signalée immédiatement.

Prévenir aussitôt votre médecin.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Tous les patients doivent poursuivre le régime alimentaire, avec une répartition régulière de l'apport glucidique au cours de la journée.

Les patients en surcharge pondérale, doivent poursuivre le régime hypocalorique. Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination des antidiabétiques oraux se fait en grande partie par les reins.

Vous devez faire appel à votre médecin, pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse, bactérienne ou virale : grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire. La survenue de certaines maladies, ou la prise de certains médicaments (Corticoïdes et certains diurétiques, ritodrine, salbutamol, et terbutaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement le diabète.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour toute autre raison, informez le médecin que vous prenez ce médicament.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Prise de DIAFORMINE 1000 mg, comprimé pelliculé avec des aliments et des boissons :

Evitez toute consommation de boissons alcoolisées.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, notamment des corticoïdes, des diurétiques, de la ritodrine, du salbutamol ou de la terbutaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des produits de contraste iodés, ou des médicaments contenant de l'alcool même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

P P V 2 1 D H 0 0
P E R 1 1 / 2 5
L O T L 3 8 1 6

al destiné au traitement

tique oral ou l'insuline.
sociation avec l'insuline.

un comprimé pelliculé.
ns les cas suivants :
s du produit,

reins avec

, infection urinaire),
fuits radiographiques iodés,

rimé pelliculé :

inales accompagnées de
peut être le signe d'un
site.

Diaformine® 1000 mg
Metformine

30 comprimés pelliculés



6 118000 041283



- manifestations cutanées de type démangeaisons, rougeurs, vésicules, décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps,
- fièvre associée à une atteinte de l'état général, éruption cutanée, atteinte du foie ou du rein.

Ces manifestations rares peuvent être graves et imposent le plus souvent l'arrêt immédiat du traitement.

raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en lactase (les métaboliques rares).

s d'emploi

le déclenchement d'une crise de goutte, ce médicament devra (pendant les premiers mois de traitement) être associé à la colchicine. Il ne doit pas être utilisé lors
se aiguë c

DE PRENDRE

veillance des fon

de maladie du san

EN CAS DE DOU

Prise ou utilisatio

AFIN D'EVITER

mercaptopurine,

Grossesse

L'utilisation de ce

Si vous découvrez

Allaitement

En raison du pas

Conduite de véh

Dans de rares ca

Liste des excipi

3. COMMENT P

Posologie

La posologie us

DANS TOUS L

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau, après le repas.

Durée du traitement

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Si vous avez pris plus de ZYLORIC, comprimé que vous n'auriez dû :

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir immédiatement votre médecin.

VOTRE MEDECIN en cas de :

L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

TRE
EM

com
mer

nel,

ar de

est fo

ient a

so

l'grossesse.

me

ZYLORIC 300 mg

Bols de 28 comprimés

A.M.A. N° 61 DAMPIERRENT

SOTHEMA BOUSKOURA

Remboursable AMO

6118000 022275

6118000 022275

6118000 022275

6118000 022275

6118000 022275

6118000 022275

6118000 022275

6118000 022275

6118000 022275

6118000 022275

6118000 022275

6118000 022275

6118000 022275

6118000 022275

6118000 022275

6118000 022275

S notamment avec la vidarabine (anti-viral), la didanosine, l'azathioprine ou la
IENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

t la grossesse.

me : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

guin et urinaire en acide urique.

IENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

- manifestations cutanées de type démangeaisons, rougeurs, vésicules, décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps,
- fièvre associée à une atteinte de l'état général, éruption cutanée, atteinte du foie ou du rein.

Ces manifestations rares peuvent être graves et imposent le plus souvent l'arrêt immédiat du traitement.

raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en lactase (les métaboliques rares).

s d'emploi

le déclenchement d'une crise de goutte, ce médicament devra (pendant les premiers mois de traitement) être associé à la colchicine. Il ne doit pas être utilisé lors

se aiguë c

DE PRENDF

veillance des fon

de maladie du san

EN CAS DE DOU

Prise ou utilisatio

AFIN D'EVITER

mercaptopurine,

Grossesse

L'utilisation de ce

Si vous découvrez

Allaitement

En raison du pas

Conduite de véh

Dans de rares ca

Liste des excipi

3. COMMENT P

Posologie

La posologie us

DANS TOUS L

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau, après le repas.

Durée du traitement

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Si vous avez pris plus de ZYLORIC, comprimé que vous n'auriez dû :

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir immédiatement votre médecin.

VOTRE MEDECIN en cas de :

L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

TRE
EM
Remboursable AMO
ZYLORIC 300 mg
Boîte de 28 comprimés
A.M.A. N° 61 DIMP21INTT
SOTHEMA BOUSKOURA



6118000 022275

S notamment avec la vidarabine (anti-viral), la didanosine, l'azathioprine ou la
IENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

t la grossesse.
édecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

guin et urinaire en acide urique.

IENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

- manifestations cutanées de type démangeaisons, rougeurs, vésicules, décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps,
- fièvre associée à une atteinte de l'état général, éruption cutanée, atteinte du foie ou du rein.

Ces manifestations rares peuvent être graves et imposent le plus souvent l'arrêt immédiat du traitement.

raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en lactase (les métaboliques rares).

s d'emploi

le déclenchement d'une crise de goutte, ce médicament devra (pendant les premiers mois de traitement) être associé à la colchicine. Il ne doit pas être utilisé lors

se aiguë c

DE PRENDF

veillance des fon

de maladie du san

EN CAS DE DOU

Prise ou utilisatio

AFIN D'EVITER

mercaptopurine,

Grossesse

L'utilisation de ce

Si vous découvrez

Allaitement

En raison du pas

Conduite de véh

Dans de rares ca

Liste des excipi

3. COMMENT P

Posologie

La posologie us

DANS TOUS L

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau, après le repas.

Durée du traitement

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Si vous avez pris plus de ZYLORIC, comprimé que vous n'auriez dû :

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir immédiatement votre médecin.

VOTRE MEDECIN en cas de :

L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

TRE
EM
Remboursable AMO
ZYLORIC 300 mg
Boîte de 28 comprimés
A.M.A. N° 61 DIMP21INTT
SOTHEMA BOUSKOURA



6118000 022275

S notamment avec la vidarabine (anti-viral), la didanosine, l'azathioprine ou la
IENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

t la grossesse.

medecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

guin et urinaire en acide urique.

IENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

- manifestations cutanées de type démangeaisons, rougeurs, vésicules, décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps,
- fièvre associée à une atteinte de l'état général, éruption cutanée, atteinte du foie ou du rein.

Ces manifestations rares peuvent être graves et imposent le plus souvent l'arrêt immédiat du traitement.

raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en lactase (les métaboliques rares).

s d'emploi

le déclenchement d'une crise de goutte, ce médicament devra (pendant les premiers mois de traitement) être associé à la colchicine. Il ne doit pas être utilisé lors

se aiguë c

DE PRENDF

veillance des fon

de maladie du san

EN CAS DE DOU

Prise ou utilisatio

AFIN D'EVITER

mercaptopurine,

Grossesse

L'utilisation de ce

Si vous découvrez

Allaitement

En raison du pas

Conduite de véh

Dans de rares ca

Liste des excipi

3. COMMENT P

Posologie

La posologie us

DANS TOUS L

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau, après le repas.

Durée du traitement

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Si vous avez pris plus de ZYLORIC, comprimé que vous n'auriez dû :

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir immédiatement votre médecin.

VOTRE MEDECIN en cas de :

L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

TRE
EM

com
mer

nel,

ar de

est fo

6118000 022275


Remboursable AMO

Balles de 28 comprimés

A.M.A. N° 61 DIMP21INTT

SOTHEMA BOUSKOURA

ZYLORIC 300 mg



S notamment avec la vidarabine (anti-viral), la didanosine, l'azathioprine ou la
IENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

t la grossesse.

medecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

guin et urinaire en acide urique.

IENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.