

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| <input type="radio"/> Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| <input type="radio"/> Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| <input type="radio"/> Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1792

Société : 145128

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : EL BAROUDI

1966

Date de naissance :


Adresse : LE SIYAH EL HOUARA 6<sup>e</sup> AS DEL HASS

BOUTAAB N° 2 ASABLAOUS

Tél. : 06 03 16 29 29 Total des frais engagés : 1276,60 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du Médecin :



*Professeur BENNANI Saâd*  
Chirurgien Urologue  
42, Bd. Abdelmoumen - Casa  
Tél: 0522 23 10 23 / 0522 23 10 73

12 JAN 2023

Date de consultation : EL BAROUDI Anissa Age : \_\_\_\_\_

Nom et prénom du malade :

Lui-même  Conjoint  Enfant

Lieu de parenté :

Nature de la maladie :

*Infiltrations urinaires récidivantes*

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie : \_\_\_\_\_

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : \_\_\_\_\_

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 16/01/23

Signature de l'adhérent(e) : El Baroudi

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
12 JAN 2023		C3	340,90	Professeur BENAISSI Sadj Chirurgien orthopéde 42, Bd. Abdelmoumen - Casablanca Tél: 0522 23 10 23 / 0522 23 10 73

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>PHARMACIE Boulevard de Slimane Tél: 05 23 123456789</i>	12/01/2023	496,60

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Professeur ENNADJ Chirurgie 42, Bd. Abdellatif Tél: 0522 23 10 23 / 0522 23 10 23	12 JAN. 2023	235 + 735	500, -

## AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODE.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	21433552 00000000 G 00000000 11433553	B	COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
	<b>(Création, remont, adjonction)</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

#### VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION

**Professeur BENNANI Saâd**

**Chirurgien Urologue**

Membre de l'European Association of Urology  
et de l'Association Française d'Urologie



**الدكتور بناني سعد**

**أستاذ جامعي**

**جراح المسالك البولية والتناسلية**

**عضو الجمعية الأوروبية والفرنسية  
لجراحة المسالك البولية والتناسلية**

12/01/2023

Casablanca, le : .....

### **COMPTE RENDU DE Mme EL BAROUDI ANISSA ECHOGRAPHIE RENALE ET VESICALE**

Les deux reins sont de taille normale, de contours réguliers et d'échostructure homogène, présentant une bonne différenciation cortico-médullaire.  
Absence de dilatation des cavités pyélocalicielles.

Au niveau pelvien, la vessie est de taille normale, de contours irréguliers, à plage homogène et à paroi hypertrophiée.

#### **AU TOTAL**

**Echographie rénale normale avec paroi vésicale hypertrophiée.**

**Pr. BENNANI S.**

*Signature*  
**Professeur BENNANI Saâd**  
Chirurgien Urologue  
42, Bd. Abdelmoumen - Casablanca  
Tél: 0522 23 10 23 / 0522 23 10 73

42، شارع عبد المؤمن - إقامة وليلي - الطابق الخامس - الدار البيضاء

42, Boulevard Abdelmoumen -Résidence Walili - 5<sup>ème</sup> étage - Casablanca

Tél.: 05 22 23 10 23 - Fax : 05 22 23 10 73 - GSM : 06 61 16 65 16

Professeur BENNANI Saâd

Chirurgien Urologue

Membre de l'European Association of Urology  
et de l'Association Française d'Urologie



الدكتور بناني سعد

أستاذ جامعي

جراحة المسالك البولية والتناسلية

عضو الجمعية الأوروبية و الفرنسية  
لجراحة المسالك البولية و التناسلية

12 JAN. 2023

Casablanca, le :

Mr El BAROUDI Amine

Faire :

Echographie rénale  
et vésicale

{ Infections urinaires récidivantes }

Professeur BENNANI Saâd  
Chirurgien Urologue  
42, Bd. Abdelmoumen - Casablanca  
Tél: 0522 23 10 23 / 0522 23 10 23

42، شارع عبد المؤمن - إقامة وليلي - الطابق الخامس - الدار البيضاء

42, Boulevard Abdelmoumen -Résidence Walili - 5<sup>ème</sup> étage - Casablanca

Tél.: 05 22 23 10 23 - Fax : 05 22 23 10 73 - GSM : 06 61 16 65 16

Professeur BENNANI Saâd

Chirurgien Urologue

Membre de l'European Association of Urology  
et de l'Association Française d'Urologie



الدكتور بناني سعد

أستاذ جامعي

جراح المسالك البولية والتناسلية

عضو الجمعية الأوروبية و الفرنسية

لجراحة المسالك البولية و التناسلية

12/01/2023

Casablanca, le :

## FACTURE N°280/01/2023

NOM ET PRENOM : EL BAROUDI ANISSA

- Consultation : 300DH

- Echographie rénale

Et vésicale : 500 DH

**MONTANT GLOBAL : 800 DH**

Arrêtée la présente facture à la somme de :

**Huit cent dirhams**

Professeur BENNANI Saâd

Chirurgien Urologue

42, Bd. Abdelmoumen - Casa

Tél: 0522 23 10 23 / 0522 23 10 73

42، شارع عبد المؤمن - إقامة وليلي - الطابق الخامس - الدار البيضاء

42, Boulevard Abdelmoumen -Résidence Walili - 5<sup>ème</sup> étage - Casablanca

Tél.: 05 22 23 10 23 - Fax : 05 22 23 10 73 - GSM : 06 61 16 65 16

Professeur BENNANI Saâd

Chirurgien Urologue

Membre de l'European Association of Urology  
et de l'Association Française d'Urologie

الدكتور بناني سعد

أستاذ جامعي

جراحة المساك البولية والتناسلية

عضو الجمعية الأوروبية والفرنسية

لجراحة المساك البولية والتناسلية



Casablanca, le : 12 JAN. 2023

Mme EL BAROUBI Anissa

(74,80x2)

① Sepcun 500

1,5

170,00

1cp 2 fois/jj pendant 10 jours

② Cefilo 200

1,5

69,00

1cp 2 fois/jj pendant 08 jours

③ Docivox

1,5

108,00

1 cuill 3 fois/jj

④ VECA 5 mg -

1,5

1cp/jj x 1 mois.

496,60

PHARMACIE MIMOSA

Noureddine MOKHLIS

R.R 322 Km6 Beni Mekraz Mansouria

Ben Slimane - Tél.: 05 23 32 93 41

Professeur BENNANI Saâd  
Chirurgien Urologue  
42, Bd. Abdelmoumen Casablanca  
Tél: 0522 23 10 23 / 0522 23 10 73

42, شارع عبد المؤمن - إقامة وليلي - الطابق الخامس - الدار البيضاء

42, Boulevard Abdelmoumen -Résidence Walili - 5<sup>ème</sup> étage - Casablanca

Tél.: 05 22 23 10 23 - Fax : 05 22 23 10 73 - GSM : 06 61 16 65 16

**NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR**  
**SEPCEN® 250 mg, SEPCEN® 500 mg et SEPCEN® 750 mg**  
**Boîte de 10 comprimés pelliculés**  
**D.C.I : Ciprofloxacine**

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

**\* Que contient cette notice :**

1. Qu'est-ce que SEPCEN® et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SEPCEN® ?
3. Comment prendre SEPCEN® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver SEPCEN® ?
6. Informations supplémentaires.

**1. QU'EST-CE QUE SEPCEN® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

**Classe pharmacothérapeutique :** Fluoroquinolone - code ATC : J01MA02.

SEPCEN® contient une substance active, la ciprofloxacine.

La ciprofloxacine est un antibiotique appartenant à la famille des fluoroquinolones. Elle agit en tuant les bactéries responsables des infections. Elle est active uniquement sur certaines souches spécifiques de bactéries.

**Chez l'adulte :**

SEPCEN® est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des voies respiratoires.
- Infections persistantes ou récurrentes de l'oreille ou des sinus.
- Infections urinaires.
- Infections de l'appareil génital chez l'homme et chez la femme.
- Infections gastro-intestinales et infections intra-abdominales.
- Infections de la peau et des tissus mous.
- Infections des os et des articulations.
- Prévention des infections dues à la bactérie *Neisseria meningitidis*.
- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut être utilisé dans le traitement de patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique additionnel pourra vous être prescrit en complément de SEPCEN®.

**Chez l'enfant et l'adolescent :**

SEPCEN® est utilisé chez l'enfant et l'adolescent, sous le contrôle d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des poumons et des bronches chez l'enfant et l'adolescent atteint de mucoviscidose.
- Infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyélonéphrite).
- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut également être utilisé pour traiter d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et de l'adolescent si votre médecin le juge nécessaire.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SEPCEN® ?**

**\* Ne prenez jamais SEPCEN® :**

- Si vous êtes allergique à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des autres composants contenus dans SEPCEN® (voir rubrique 6).
- Si vous prenez de la tizanidine (voir rubrique 2 : Prise d'autres médicaments).

**\* Mise en garde et précaution d'emploi :**

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre SEPCEN® :

Vous ne devez pas prendre d'antibiotiques de la famille des fluoroquinolones/quinolones, incluant SEPCEN®, si vous avez déjà présenté un effet indésirable grave dans le passé lors de la prise d'une quinolone ou d'une fluoroquinolone. Si tel est le cas, vous devez en informer votre médecin au plus vite.

**Adressez-vous à votre médecin avant de prendre SEPCEN® :**

- Si vous avez déjà présenté des problèmes rénaux car il pourra être nécessaire d'adapter votre traitement.
- Si vous souffrez d'épilepsie ou d'une autre affection neurologique.
- Si vous avez déjà eu des problèmes aux tendons avec des antibiotiques de la même famille que SEPCEN® :

- Si vous êtes diabétique parce que la ciproflo-
- Si vous souffrez de myasthénie (maladie rare d'aggravation des symptômes).
- Si vous savez que vous présentez, ou glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD).
- Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertension (anévrisme aortique ou anévrisme périphérique).
- Si vous avez déjà eu un épisode antérieur de
- Si vous présentez des antécédents familiaux valvulopathie cardiaque congénitale, ou prédisposantes (par exemple, des troubles du syndrome d'Ehlers-Danlos, le syndrome de Turner, inflammatoire), ou des troubles vasculaires comme

maladie de Behcet, l'hy-  
(une maladie des articul-  
• Si vous avez des prob-  
êtes née(e) avec ou ayez  
à l'ECG, qui est un en-  
électrolytique dans le s-  
dans le sang), si vous es-  
affabli (insuffisance car-  
êtes une femme ou une  
anomalies au niveau de  
Pour le traitement de c-  
autre antibiotique en as-  
après 3 jours de traitemen-

**Pendant la prise de SEPCEN®**

Prévenez immédiatement le pharmacien ou le médecin si vous:

- Réaction allergique si, après la première dose, il existe une manifestation par les symptômes d'évanouissement, d'urticaire, d'œdème, d'arrêtez de prendre SEPCEN®.
- Effets indésirables graves, y compris les antibactériens de type Ciprofloxacin, indésirables très rares (années), invalidants ou mortels, ou les muscles et les articulations, sensations异常, engourdissement ou une perte de la vue, du goût, de l'odorat, intense et de troubles sensoriels. Si vous présentez l'un de ces symptômes, contactez votre médecin avant de continuer le traitement en attendant une consultation.

• Une douleur et un gonflement des tendons peuvent survoler (environ 6 mois à 2 ans), si vous avez arrêté de prendre SEPCEN® 48 heures auparavant.

Dès les premiers signes de douleur, gonflement du poignet, du coude, de la cheville ou de la hanche, et mettez le membre au repos et arrêtez de prendre SEPCEN®.

• Si vous ressentez une douleur dans les tendons qui peuvent être douloureux et empêcher l'activité quotidienne, arrêtez immédiatement au moins 48 heures avec des corticostéroïdes.

• Si vous ressentez une douleur dans les tendons, ou si vous remarquez une nouvelle apparition de douleur dans les tendons, vous devez en informer votre médecin.

• Si vous souffrez d'épilepsie, arrêtez immédiatement de prendre SEPCEN® si cela provoque une crise. Si tel était votre cas, consultez votre médecin.

• Dans de rares cas, une sensation de brûlure, de douleur ou de gonflement peut survenir, en particulier dans les tendons, lorsque vous prenez SEPCEN®. Cela peut être un état potentiellement dangereux.

• Des réactions psychologiques peuvent survenir, y compris la souffrance de dépression, de panique ou d'anxiété. Si cela se produit, arrêtez immédiatement de prendre SEPCEN®. Si cela se poursuit, contactez votre médecin.

• Les antibiotiques de la famille des fluoroquinolones peuvent entraîner une diminution du taux de sucre dans le sang (hypoglycémie). Si vous souffrez de diabète, il est important de prendre SEPCEN® avec un repas et de surveiller le taux de sucre dans le sang.

• Vous pouvez souffrir d'effets indésirables, tels que des diarrhées, des nausées, des vomissements et de la constipation, pendant plusieurs semaines après l'arrêt de SEPCEN®.

• Si vous souffrez de maladie de Behcet, l'hyaluronite (une maladie des articulations), ou de la maladie de sarcopathie, arrêtez immédiatement de prendre SEPCEN®.

• Si vous souffrez d'effets indésirables graves, y compris les symptômes d'évanouissement, d'urticaire, d'œdème, d'arrêtez de prendre SEPCEN®.

• Si vous souffrez d'effets indésirables graves, y compris les symptômes d'évanouissement, d'urticaire, d'œdème, d'arrêtez de prendre SEPCEN®.

• Si vous souffrez d'effets indésirables graves, y compris les symptômes d'évanouissement, d'urticaire, d'œdème, d'arrêtez de prendre SEPCEN®.

• Si vous souffrez d'effets indésirables graves, y compris les symptômes d'évanouissement, d'urticaire, d'œdème, d'arrêtez de prendre SEPCEN®.

• Si vous souffrez d'effets indésirables graves, y compris les symptômes d'évanouissement, d'urticaire, d'œdème, d'arrêtez de prendre SEPCEN®.

• Si vous souffrez d'effets indésirables graves, y compris les symptômes d'évanouissement, d'urticaire, d'œdème, d'arrêtez de prendre SEPCEN®.

• Si vous souffrez d'effets indésirables graves, y compris les symptômes d'évanouissement, d'urticaire, d'œdème, d'arrêtez de prendre SEPCEN®.

• Si vous souffrez d'effets indésirables graves, y compris les symptômes d'évanouissement, d'urticaire, d'œdème, d'arrêtez de prendre SEPCEN®.

• Si vous souffrez d'effets indésirables graves, y compris les symptômes d'évanouissement, d'urticaire, d'œdème, d'arrêtez de prendre SEPCEN®.

• Si vous souffrez d'effets indésirables graves, y compris les symptômes d'évanouissement, d'urticaire, d'œdème, d'arrêtez de prendre SEPCEN®.

• Si vous souffrez d'effets indésirables graves, y compris les symptômes d'évanouissement, d'urticaire, d'œdème, d'arrêtez de prendre SEPCEN®.

• Si vous souffrez d'effets indésirables graves, y compris les symptômes d'évanouissement, d'urticaire, d'œdème, d'arrêtez de prendre SEPCEN®.

# OFIKEN®

Céfixime

## Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Elle contient des informations importantes sur votre traitement.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

## DENOMINATION :

OFIKEN® 200 mg, comprimés pelliculés.

OFIKEN® 100 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable.

## COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :

### OFIKEN® 200 mg, comprimés pelliculés

Céfixime trihydraté, quantité correspondant à céfixime anhydre..... 200 mg  
Excipients..... q.s.p un comprimé pelliculé.

### OFIKEN® 100 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable

Céfixime trihydraté, quantité correspondant à céfixime anhydre..... 100 mg  
Excipients..... q.s.p 5 ml de suspension reconstituée.

## FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION :

OFIKEN® 200 mg, comprimé pelliculé, boîtes de 8 et 16.

OFIKEN® 100 mg/5 ml :

Poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml soit 150 doses/kg

Poudre pour suspension buvable en flacon de 60 ml soit 300 doses/kg

Poudre pour suspension buvable en flacon de 100 ml soit 500 doses/kg

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Antibiotiques de la famille des bêta-lactamines du groupe des céphalosporines de 3<sup>ème</sup> génération.

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

### Comprimé pelliculé :

Ce médicament est indiqué dans le traitement des :

- Otites et sinusites aiguës,
- Infections bronchiques et pulmonaires,
- Certaines infections urogénitales.

### Poudre pour suspension buvable :

Ce médicament est indiqué chez l'enfant de plus de 6 mois, dans le traitement

- Infections bronchiques et pulmonaires,
- Otites moyennes aiguës,
- Certaines infections urinaires.

## ATTENTION !

### a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament ?

#### Poudre pour suspension buvable et comprimé pelliculé :

- Allergie connue aux antibiotiques du groupe des céphalosporines, ou à l'un ds .....

#### Comprimé pelliculé :

LOT 223307

EXP 09 24

PPV 170.00 DH

# Veca®

Solifénacine Succinate

Comprimé pelliculé

Veuillez à ce que

t de prendre  
ions

a relire.  
decin ou

Ne le  
ocif, même

lez-en à  
si à tout  
notice.

cas est-il

tre

PPV : PER LOT  
108 06-25 9111  
DH 00

A18780

de pompage du cœur insuffisante) ou une maladie du rein). Si vous avez une infection urinaire, votre médecin vous prescrira un antibiotique (traitement contre certaines infections bactériennes).

#### Autres médicaments et VECA®, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Il est particulièrement important que vous préveniez votre médecin si vous prenez :

- D'autres médicaments anticholinergiques, car les effets et les effets indésirables des deux médicaments peuvent être accentués.
- Des médicaments cholinergiques, car ils peuvent réduire l'effet de VECA®, comprimé pelliculé.
- Des médicaments tels que le métoclopramide ou le cisapride, qui accélèrent le fonctionnement du tube digestif. VECA®, comprimé pelliculé peut réduire les effets de ces médicaments.
- Des médicaments tels que le kéroconazole, le ritonavir, le nelfinavir, l'itraconazole, le vérapamil ou le diltiazem, qui ralentissent la dégradation de VECA®, comprimé pelliculé dans l'organisme.
- Des médicaments tels que la rifampicine, la phénytoïne ou la carbamazépine, car ils peuvent accélérer la dégradation de VECA®, comprimé pelliculé dans l'organisme.
- Des médicaments tels que les bisphosphonates, qui peuvent déclencher ou agraver une œsophagite (inflammation de

succinate. En cas de survenue d'un angioédème, la solifénacine succinate doit être immédiatement arrêté et un traitement et/ou des mesures appropriées doivent être pris.

VECA®, comprimé pelliculé peut provoquer les autres effets indésirables suivants :

#### Très fréquents (peut affecter plus de 1 personne sur 10)

- Sécheresse de la bouche.

#### Fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

- Vision trouble.
- Constipation, nausées, indigestion avec des symptômes tels que lourdeur abdominale, douleur abdominale, régurgitations, nausées et brûlures d'estomac (dyspepsie), gêne au niveau de l'estomac.

#### Peu fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

- Infection urinaire, infection de la vessie.
- Somnolence.
- Perturbation du goût (dysgueusie).
- Sécheresse (irritation) des yeux.
- Sécheresse du nez.
- Reflux gastro-œsophagien.
- Sécheresse de la gorge.
- Sécheresse de la peau.
- Difficultés pour uriner.
- Fatigue.





**Sirop**  
Voie orale

# Docivox

**Sirop naturel sans conservateur**

**Deva**  
Pharmacie

**FORMES ET PRESENTATIONS**

Docivox sirop - Flacon 200 ml - Flacon 125 ml

**PROPRIETES :**

Docivox sirop naturel est à base d'extraits de plantes (le Thym, la Mauve et le Mélèze), d'huile essentielle d'eucalyptus, du miel et de la propolis.

Docivox sirop naturel apaise les voies respiratoires, adoucit la gorge irritée en cas de toux et renforce les défenses naturelles de l'organisme.

Docivox sirop naturel ne contient pas de conservateur.

**UTILISATIONS :**

- Voies respiratoires encombrées - Gorge irritée - Toux - Enrouement.

**POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :**

Adulte : une cuillère à soupe 3 à 4 fois par jour.

Enfant : une cuillère à café 2 à 4 fois par jour.

Dans tous les cas, se conformer à la prescription de votre médecin ou pharmacien.

Docivox sirop naturel est administré par voie orale.

Bien agiter le flacon avant chaque emploi.

**PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

- Déconseillé aux personnes allergiques aux produits de la ruche ou à l'un des constituants.

- Déconseillé chez la femme enceinte, allaitante et nourrisson.

- Le produit peut présenter un léger dépôt, des changements de couleur ou de goût qui sont attribuables aux caractères naturels des plantes; toutefois la qualité et l'efficacité du produit ne sont pas altérées.

- Après ouverture, à conserver au frais et à consommer dans un délai de 4 semaines.

- Tenir hors de la portée des enfants.

**COMPOSITION :**

Sirop de fructose; Arôme naturel de miel; Maltodextrine; Eau purifiée; Extrait de Propolis; Extrait aqueux de plantes obtenu à partir de feuille de Thym (*Thymus vulgaris*); Feuille de Mauve (*Malva sylvestris*); Extrait de Mélèze; Huile essentielle d'eucalyptus; Extrait de rocou; Caramel; Menthol; Acide citrique.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

*Autorisation du Ministère de la Santé n° : DA 20171612029DMP/20UCAv1*



# Docivox® Spray gorge

**Spray**  
Voie orale

**Calme l'irritation et Soulage la douleur de la Gorge**

**Deva**  
Pharmacie

**PROPRIETES :**

Docivox Spray gorge offre l'avantage d'une application très ciblée. Il permet de tapisser directement la muqueuse oro-pharyngée pour un effet immédiat.

Docivox Spray gorge est doté d'un embout pulvérisateur dirigé notamment sur les parties de l'oropharynx difficiles d'accès.

Docivox Spray gorge est à base d'actifs naturels ayant des actions anti-inflammatoires.

Grace à ses propriétés, Docivox Spray gorge est un adjuant spécifique de la sphère oropharyngée provoquées par le froid, les allergènes, la fatigue et les exercices sportifs.

Docivox Spray gorge permet un confort de la gorge irritée par soulager une sécheresse de la gorge, des picotements ou une difficulté à déglutir.

Lot : 220912  
BLUD : 12/2025  
69,00 DH

