

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie

M22- 0041612

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule :	03721	Société :	RAN
<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	ND
Nom & Prénom :		Benchehra Wafa	
Date de naissance :		17/05/1952	
Adresse :		3 Rue 1d Abdele	
Tél. :		0707456876 Total des frais engagés : 876,0 Dhs	

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :	Dr. BENJELLOUN Wafa Pneumologue 202, Bd. Abdellatif Casablanca Tél : 0522 99 20 24		
Date de consultation :	16/01/23	Nom et prénom du malade :	Benchehra Wafa
Lien de parenté :	<input checked="" type="checkbox"/> Lui-même	<input type="checkbox"/> Conjoint	<input type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie :	Affection respiratoire		
Affection longue durée ou chronique :	<input type="checkbox"/> ALD	<input type="checkbox"/> ALC	Pathologie :
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 23/01/2023

Signature de l'adhérent(e) : Tawida

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16.01.23	cl		300 Dhs	Dr. BENJELLOUN Waïa Pneumologue Bd. Abdelmalek Sellal - Casablanca 2023-01-29 20:24

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	16/11 2023	376,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Dr. BENELLOUN Maha Pédiatrie - Radiologie Zouhoura - Casablanca Tél. 0522 99 20 24	26.01.23	Z A2	200 Dhs

AUXILIAIRES MEDICAUX





Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Début d'exécution
				Fin d'exécution
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H	25533412 00000000 D 00000000 35533411	21433552 00000000 G 00000000 11433553	Coefficient des travaux
				Montants des soins
		(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		Date du devis
				Date de l'exécution

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Cabinet de groupe de pneumologie

Dr. AMINA LAMRIKI RHIATI

الدكتورة أمينة المريري

Dr. WAFA BENJELLOUN IDRISI

الدكتورة وفاء بن جلون إدريسي

Spécialistes en pneumo-phtisiologie

Adultes et Enfants

مختصين في أمراض الجهاز التنفسى

كبار وأطفال

Casablanca le: 16/01/2023

Mme BENCHEKROUN FARIDA

RADIOGRAPHIE THORAX FACE

INTERPRETATION :

images trabeculaires basales bilatérales

Dr. BENJELLOUN Wafa
Pneumophtisiologue
202, Bd. Abdelmoumen - Casablanca
Tél : 0522 99 20 24

CABINET DE GROUPE DE PNEUMOLOGIE

Dr. Wafa BENJELLOUN IDRISI

الدكتورة وفاء بن جلون أدرissi

Dr. Amina LAMRIKI RHIATI

الدكتورة آمنة المريري الغياتي

Spécialistes en Pneumophysiologie

Adultes et Enfants

مختصتين في أمراض الجهاز التنفسي

كبار وأطفال

16/01/23

Casablanca, le : 16/01/23

FACTURE

Mme BENCHEKROUN FARIDA

CONSULTATION: 300,00 DH

RADIO THORAX FACE: 200,00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de 500,00 DH

(CINQ CENTS dirhams)

Dr. BENJELLOUN Wafa
Pneumophysiologue
202, Bd Abdelmoumen - Casablanca
Tél.: 0522 99 20 24

Cabinet de groupe de pneumologie

Dr. AMINA LAMRIKI RHIATI
الدكتورة أمينة المرقيفي الخياتي

Dr. WAFA BENJELLOUN IDRISI
الدكتورة وفاء بن جلون إدريسي

Spécialistes en pneumo-phtisiologie

Adultes et Enfants

مختصين في أمراض الجهاز التنفسى
كبار وأطفال

Casablanca, le : 16/01/2023

BENCHEKROUN FARIDA

30,07

1 - Fluibron sirop



24,72 1 cà s x 2/j

2 - Taraxet 25 mg



17,20 1/2 comprimé LE SOIR avant le coucher

3 - Foradil poudre pour inhalation gelule 12 µg



30,60 , 1 inhalation 2fois par jour, pendant 10 Jours

4 - Vita C 1000 (Sans Sucre, cp efferv.)

(15,30x2)

118,50 2 cps le matin pdt 10 j

5 - IXOR (cps effervescents)



1cp le soir

376,00

Dr. BENJELLOUN Wafa
Pneumologue
202, Bd. Abdelloumen - Casablanca
Tel. 0522 99 20 24



1- DENOMINATION DU MEDICAMENT :

AMBROXOL® 0,3%, sirop-flacon de 200 ml
Ambroxol

attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.
Si vous avez des questions ou si vous ne comprenez pas quelque chose de la

notice, vous pourriez avoir besoin de la consulter ou de poser des questions à votre pharmacien.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

30/00

2- COMPOSITION DU MEDICAMENT :

Ambroxol chlorhydrate (DCI) 0,30 g

Pour 100 ml de solution buvable

Excipients : sorbitol liquide, glycérin, acide citrique monohydrate, saccharine sodique, parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyl, arôme, silicon suspension, eau purifiée.

Liste des excipients à effet notoire :

sorbitol liquide, parahydroxybenzoate de propyl, parahydroxybenzoate de méthyle, glycérin.

3- CLASSE PHARMACO THERAPEUTIQUE :

MUCOLYTIQUES.

(R: Système respiratoire).

4- INDICATIONS

Traitements des troubles de la sécrétion bronchique de l'adulte, notamment au cours des affections bronchiques aiguës et des épisodes aigus des bronchopneumopathies chroniques.

Ce médicament est un expectorant. Il facilite l'évacuation par la toux des sécrétions bronchiques.

5- POSOLOGIE :

Posologie

KOR®

(Oméprazole)

MÉDICAMENT

descents dosés à 20 mg en boîte de 7, 14 et 28
descents dosés à 10 mg en boîte de 7, 14 et 28

ment l'intégralité de cette notice avant
ment car elle contient des informations
is.

Tous pourriez avoir besoin de la relire.
questions, demandez plus d'informations
otre pharmacien.

- a été personnellement prescrit. Ne le
donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif,
même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous
remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette
notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que IXOR® et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre IXOR® ?
- Comment prendre IXOR® ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver IXOR® ?
- Informations supplémentaires.

1 - QU'EST-CE QUE IXOR® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

Code ATC : A02BC01

IXOR® comprimé effervescent contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

- Indications thérapeutiques

IXOR® comprimé effervescent est utilisé pour traiter les affections suivantes : Chez les adultes :

- Le reflux gastro-cesophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.
- Les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).

- Les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

- Les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). IXOR® comprimé effervescent peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.

- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une grossesse au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)

Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel $\geq 10 \text{ kg}$

- Le reflux gastro-cesophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

- Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents

- Les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE IXOR® ?

- Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

- Ne prenez jamais IXOR® (Contre-indications)

- Si vous êtes allergique à l'oméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

• Si vous êtes allergique à un autre (par exemple pantoprazole, esoméprazole).

• Si vous prenez un médicament pour traiter l'infection par le VIH.

• Si vous êtes dans une des situations où IXOR® comprimé effervescent, à votre médecin ou votre pharmacien, comprimé effervescent.

• En raison de la présence d'aspéritine indiquée en cas de phényletotonium.

Faites attention avec IXOR® précautions particulières d'utilisation. Prendre en compte la teneur en sucre dans le régime hyposodé strict.

• IXOR® 20 mg : environ 765,7 mg effervescent.

• IXOR® 10 mg : environ 768,6 mg effervescent.

Adressez-vous à votre médecin ou à IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent d'autres maladies. Par conséquent à prendre IXOR® comprimé effervescent pour traiter, vous devez informer l'un des éléments suivants se produisent :

• Vous perdez du poids sans raisonnable.

• Vous avez des douleurs à l'estomac.

• Vous vomissez de la nourriture.

• Vous avez des selles noires (telles que le charbon).

• Vous souffrez de diarrhée sévère et associée à une faible augmentation de la température.

• Si vous avez des problèmes hépatiques.

• Si vous êtes déjà arrivé de dépendance après un traitement avec un médicament qui réduit l'acidité de l'estomac.

• Vous devez faire un examen sanguin.

Si vous prenez IXOR® comprimé effervescent (supérieure à un an), votre médecin de façon régulière. Vous devevez informer de tout symptôme et événements nouveaux que vous avez rencontré. Veuillez votre médecin.

La prise d'un inhibiteur de la pompe à proton (comprimé effervescent, en particulier pendant plus d'un an), peut légèrement augmenter la densité de la hanche, du poignet ou des vertèbres. Vous souffrez d'ostéoporose ou si vous pouvez augmenter le risque d'os fragiles. Si vous avez une éruption sur la peau exposée au soleil, prévenez votre médecin car vous devrez peut-être arrêter de prendre IXOR®.

Rappelez-vous de ne pas mentionner d'effets indésirables tel que des douleurs d'abdomen.

- Enfants

Certains enfants atteints d'ulcères nécessitent un traitement à long terme recommandé. Ne donnez pas ce médicament à un enfant de moins de 1 an ou <10kg.

- Prises d'autres médicaments ou médicaments

- Autres médicaments et IXOR®

Informez votre médecin ou pharmacien concernant les médicaments que vous prenez ou pourriez prendre également les médicaments ordonnancés.

IXOR® comprimé effervescent peut interférer avec d'autres médicaments et certains effets sur IXOR® comprimé effervescent. Vous ne devez pas prendre IXOR® si vous prenez un médicament contenant l'acide de l'estomac (par exemple, le VIH).

Vous devez informer votre médecin de l'un des médicaments suivants :

- Kétoconazole, itraconazole, (utilisés dans le traitement des mycoses).

- Digoxine (utilisé dans le traitement des maladies cardiaques).

- Diazépam (utilisé dans le traitement des maladies psychotropes).

- Phénytoïne (utilisé dans le traitement de la convulsion, une surveillance par votre médecin à partir du début et à l'arrêt de l'administration).

- Médicaments anti-coagulants.

1143919-A21-MA

1746



Fumarette de formotérol

Foradil® 12 µg

NOVARTIS

**TIS
RMATION DE L'UTILISATEUR
du médicament :**

12µg

**halation en gélules. Boîte de 30
de Formotérol dihydraté**



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute,

Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à la conduite et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines.

Grossesse et Allaitement

L'utilisation de Foradil devrait être évitée pendant la grossesse. Les femmes enceintes ou qui souhaitent le devenir doivent en informer leur médecin.

Les mères qui allaitent leur enfant ne doivent pas utiliser Foradil.

Excipient à effet notable :

Monohydrate de lactose : Si vous souffrez d'une intolérance sévère au lactose, parlez-en à votre médecin avant de prendre Foradil.

VITA C 1000®

(Acide ascorbique)

15DH30
15DH24
15DH23
15DH26
PPU P
EXLOT

DU MEDICAMENT

Comprimés effervescents : Boîte de 10

Comprimés effervescents : Boîte de 20 (2 tubes de 10)

S SUCRE, Comprimés effervescents : Boîte de 10

Avant de prendre ce médicament, lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car des informations importantes pour vous.

Pour prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents et dans quel cas sont-ils utilisés ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
3. Comment prendre VITA C 1000® Comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
6. Informations supplémentaires

1 - QU'EST-CE QUE VITA C 1000® COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000® SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

ACIDE ASCORBIQUE (VITAMINE C), NON ASSOCIEE - code ATC : A11GA01.

- Indications thérapeutiques

Ce médicament contient de la vitamine C.

Il est indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte et de l'enfant de plus de 15 ans.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1 mois de traitement.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE VITA C 1000® COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000® SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre VITA C 1000® comprimés effervescents.

- Ne prenez jamais VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents (Contre-indications)

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament
- si vous êtes atteint de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam (VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents)
- si vous présentez une insuffisance rénale sévère (défaillance grave des fonctions du rein)
- si vous présentez ou avez présenté des calculs rénaux
- si vous avez des calculs d'oxalate de calcium (hyperoxalurie)
- si vous avez moins de 15 ans

- Faites attention avec VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents.

- VITA C 1000® comprimés effervescents

• Si votre fatigue s'accompagne d'essoufflement ou de votre pharyngite.

• En raison d'un état de fatigue, la vitamine C en grande quantité.

• Prendre en complément d'autres médicaments comme les médicaments contre la grippe (risque de surdosage).

• La vitamine C peut entraîner une hémochromatose fer), adressez-vous à votre pharmacien pour l'objet de précaution.

• La vitamine C peut favoriser la décoloration des globules rouges.

• La vitamine C peut entraîner une décoloration de la peau et des cheveux si elle est prise en grande quantité.

- VITA C 1000® comprimés effervescents

• Ce médicament doit être pris en complément d'un régime pauvre en sucre et en sel.

• En raison de la présence d'aspartam chez les patients malabsorbant de l'aspartam (maladies héréditaires).

• Ce médicament doit être pris en complément d'un régime pauvre en sucre ou de diabète.

• Ce médicament peut provoquer des réactions allergiques.

- VITA C 1000® comprimés effervescents

• Ce médicament doit être pris en complément d'un régime pauvre en sucre et en sel.

• Ce médicament doit être pris en complément d'un régime pauvre en sucre et en sel.

• Ce médicament doit être pris en complément d'un régime pauvre en sucre et en sel.

• Enfants « et ados » sans objets.

- Prises d'autres médicaments

Informez votre pharmacien avant de prendre ce médicament avec d'autres médicaments qui peuvent contenir de l'aspartam. Ne prendre pas ce médicament avec d'autres médicaments qui peuvent contenir de l'aspartam.

- Aliments et boissons

Prendre ce médicament avec des aliments enrichis et des boissons.

- Utilisation pendant la grossesse

Si vous êtes enceinte, consultez votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

- Grossesse

Par mesure de précaution, il est recommandé de prendre ce médicament pendant la grossesse.

- Allaitement

La vitamine C passe dans le lait maternel. Il est préférable de prendre ce médicament pendant l'allaitement.

15DH30
15DH34
15DH35
15DH36
PPU P
EXLOT

VITA C 1000®

(Acide ascorbique)

DU MEDICAMENT

Comprimés effervescents : Boîte de 10

Comprimés effervescents : Boîte de 20 (2 tubes de 10)

S SUCRE, Comprimés effervescents : Boîte de 10

Avant de prendre ce médicament, lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car des informations importantes pour vous.

Pour prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents et dans quel cas sont-ils utilisés ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
3. Comment prendre VITA C 1000® Comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
6. Informations supplémentaires

1 - QU'EST-CE QUE VITA C 1000® COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000® SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

ACIDE ASCORBIQUE (VITAMINE C), NON ASSOCIEE - code ATC : A11GA01.

- Indications thérapeutiques

Ce médicament contient de la vitamine C.

Il est indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte et de l'enfant de plus de 15 ans.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1 mois de traitement.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE VITA C 1000® COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000® SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre VITA C 1000® comprimés effervescents.

- Ne prenez jamais VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents (Contre-indications)

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament
- si vous êtes atteint de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam (VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents)
- si vous présentez une insuffisance rénale sévère (défaillance grave des fonctions du rein)
- si vous présentez ou avez présenté des calculs rénaux
- si vous avez des calculs d'oxalate de calcium (hyperoxalurie)
- si vous avez moins de 15 ans

- Faites attention avec VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents.

- VITA C 1000® comprimés effervescents

• Si votre fatigue s'accompagne d'essoufflement ou de votre pharynx.

• En raison d'un état de fatigue, la vitamine C en grande quantité.

• Prendre en complément d'autres médicaments comme les médicaments contre la grippe (risque de surdosage).

• La vitamine C peut entraîner une hyperabsorption d'hémochromate de fer, adressez-vous à votre pharmacien pour l'objet de précaution.

• La vitamine C peut favoriser l'absorption des globules rouges, car des personnes atteintes de maladie de Vitamine C peuvent favoriser l'absorption des globules rouges.

• La vitamine C peut également entraîner une augmentation de la glycémie chez les patients diabétiques.

- VITA C 1000® sans sucre

• Ce médicament doit être pris avec de l'eau et du sucre ou de la sucrerie.

• En raison de la présence d'aspartam chez les patients atteints de malabsorption de l'aspartam (maladie héréditaire).

• Ce médicament doit être pris avec de l'eau et du sucre ou de la sucrerie.

• Ce médicament peut provoquer des effets indésirables.

- VITA C 1000® sans sucre

• Ce médicament doit être pris avec de l'eau et du sucre ou de la sucrerie.

• Ce médicament doit être pris avec de l'eau et du sucre ou de la sucrerie.

• Ce médicament doit être pris avec de l'eau et du sucre ou de la sucrerie.

• Enfants « et ados » : sans sucre.

- Prises d'autres médicaments

Informez votre pharmacien avant de prendre ce médicament avec d'autres médicaments.

- Aliments et boissons

Prendre ce médicament avec des aliments enrichis et des boissons.

- Utilisation pendant la grossesse

Si vous êtes enceinte, consultez votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

- Grossesse

Par mesure de précaution, il est recommandé de prendre ce médicament pendant la grossesse.

- Allaitement

La vitamine C passe dans le lait maternel. Il est préférable de prendre ce médicament pendant l'allaitement.