

.....

# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
9/1/23				INP 131069419 CACHET DU MÉDECIN M. AITHAMSI

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	09.01.23	121,50

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES


Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	19 JAN 2023	B 80 + p.m. 80, w	

## AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### VOLET ADHERENT

\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



### O.D.F. PROTHESES DENTAIRES



### DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553
B	

[Création, remont, adjonction]  
Fonctionnel. Thérapeutique. nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION





مختبر التحاليل الطبية  
مستوصف جميلة (4)

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES  
DISPENSARE JAMILA "4"

110, Rue El Bachir Belhoucine (Ex 89), Jamila 4  
Cité Djemâa en face Cimetière Sebata  
Dérrière terrain "Ba Mohammed" - Casablanca  
Tél.: 05 22 29 14 60 / 05 22 38 40 50

ICE : 001677978000093  
INPE : 93000222

**Dr. BERRADA Fathi Khalid**

Docteur en Pharmacie-Biologiste  
Ex attaché des hôpitaux de France

Ancien Pharmacien chef du 3<sup>e</sup> hôpital militaire de LAÂYOUNE  
Diplômé des Facultés de BESANÇON et NANCY - FRANCE

Nom : Mlle RHIZAL

Prénom : SALMA

Dossier : 1LI5952

09/01/2023



Medecin : Dr. AIT HAMMOU RACHID

**HEMOGRAMME**

Analyse	Resultat	Normes	Antécédents
---------	----------	--------	-------------

**NUMERATION**

Globules rouges.....	4.37	M/mm3	(3.8-5.4)
Hématocrite.....	39.0	%	(37-47)
Hémoglobine.....	13.0	g/100ml	(12-15)
VGM.....	89.3	μ3	(80-90)
CCMH.....	33.3	%	(32-35)

**FORMULE LEUCOCYTAIRE**

Globules blancs.....	3 400	/mm3	(4000-9000)
Polynucléaires neutrophiles..	29	%	(55-65)
Polynucléaires éosinophiles..	05	%	(1-4)
Polynucléaires basophiles....	00	%	<1
Lymphocytes.....	55	%	(15-35)
Monocytes.....	11	%	(2-5)
Plaquettes.....	216 000	/mm3	(150000-450000)

LABO DISPENSARE  
JAMILA 4  
Dr. BERRADA F.K  
Tél./Fax: 05 22 38 40 50  
Fax: 05 22 29 14 60

# ORDONNANCE

Casa le

21/1/23

Mr/Mme

RHIZAL  
SALMAN

10/ N-F-S - per

de contrôle



Cachet du médecin





مختبر التحليلات الطبية  
مستوصف جميلة (4)

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES  
DISPENSARE JAMILA "4"

110, Rue El Bachir Belhoucine (Ex 89), Jamila 4  
Cité Djemâa en face Cimetière Sebata  
Dérrière terrain "Ba Mohammed" - Casablanca  
Tél.: 05 22 29 14 60 / 05 22 38 40 50  
ICE : 001677978000093  
INPE : 93000222

**BERRADA FATHI Khalid**  
Docteur en Pharmacie-Biologiste

Facture N° : 338/2023 MUPRAS

Date : 10/01/2023

Analyses Médicales effectuées Le 09/01/2023

Prescription Du Docteur AIT HAMMOU RACHID

Pour RHIZAL SALMA

Réf : 1MA91016



**Bilan :**

NFS

**Cotation : B 80 + Prelevement**

**Montant Net : 80 Dhs**

NFS 80

LABO DISPENSARE  
JAMILA 4  
Dr. BERRADA F.K  
Tél./Fax: 05 22 38 40 50  
Fax: 05 22 29 14 60

# ORDONNANCE

Casa le 9/1/23

Mr/Mme


RHIZAL  
SALMA

10) Tardylferson 80

110.50 x 3  
= 331.50

1 up 1

pd 3 cas



Cachet du médecin



# Tardyferon® 80 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

## Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'une augmentation de la tension qui recevaient des médicaments pour ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie.

## Précautions d'emploi

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

## Autres médicaments et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé

Si vous utilisez déjà les médicaments suivants, vous ne devez pas utiliser TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé sauf si votre médecin le décide. En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps, alors que d'autres médicaments requièrent des changements spécifiques (de dose, de moment de prise par exemple).

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
  - Si vous prenez des médicaments contenant de l'acide acétohydroxamique.
  - Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
  - Si vous prenez des bisphosphonates (les bisphosphonates).
  - Si vous prenez des médicaments pour les articulations (la paracetamol).
  - Si vous prenez des médicaments pour la thyroïde (la thyroïde).
  - Si vous prenez des médicaments pour l'hypertension (l'entacapone, la levodopa).
  - Si vous prenez des médicaments pour le diabète.
  - Si vous prenez un médicament pour le cœur (le nitroglycérine).
- de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon ou



Distribué par COOPER PHARMA  
41, Rue Mohamed Djouri - Casablanca  
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI



# Tardyferon® 80 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

## Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'une augmentation de la tension qui recevaient des médicaments pour ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie.

## Précautions d'emploi

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

## Autres médicaments et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé

Si vous utilisez déjà les médicaments suivants, vous ne devez pas utiliser TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé sauf si votre médecin le décide. En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps, alors que d'autres médicaments requièrent des changements spécifiques (de dose, de moment de prise par exemple).

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
- Si vous prenez des médicaments contenant de l'acide acétohydroxamique.
- Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
- Si vous prenez des médicaments contenant des bisphosphonates (les bisphosphonates).
- Si vous prenez des médicaments contenant de l'acide thyroïdien (la thyroïde) (la thyroïde).
- Si vous prenez des médicaments contenant de l'entacapone, la levodopa.
- Si vous prenez des médicaments contenant du fer.
- Si vous prenez un médicament pour le traitement de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon ou



Distribué par COOPER PHARMA  
41, Rue Mohamed Djouri - Casablanca  
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI



# Tardyferon® 80 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

## Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'une augmentation de la tension qui recevaient des médicaments pour ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie.

## Précautions d'emploi

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

## Autres médicaments et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé

Si vous utilisez déjà les médicaments suivants, vous ne devez pas utiliser TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé sauf si votre médecin le décide. En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps, alors que d'autres médicaments requièrent des changements spécifiques (de dose, de moment de prise par exemple).

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
  - Si vous prenez des médicaments contenant de l'acide acétohydroxamique.
  - Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
  - Si vous prenez des bisphosphonates (les bisphosphonates).
  - Si vous prenez des médicaments pour les articulations (la p...).
  - Si vous prenez des médicaments pour la thyroïde (la th...).
  - Si vous prenez des médicaments pour l'hypertension (l'entacapone, la...).
  - Si vous prenez des médicaments pour le diabète.
  - Si vous prenez un médicament pour le cœur.
- de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon ou



Distribué par COOPER PHARMA  
41, Rue Mohamed Djouri - Casablanca  
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI