

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie
N° M20- 0008920

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 9751 Société : RAM
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☒ Autre : Retraite
Nom & Prénom : Aziz Quadry
Date de naissance : 10/03/1962
Adresse : Hay Noufay Wbde Phah, rue 36 N° 27
cin chack
Tél. : 06-79-15-99-91 Total des frais engagés : 765,60 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : QUADRY Aziz Age : / /

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : stite

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : / /

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : / / Le : / /

Signature de l'adhérent(e) : / /

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

Dr. Brahim EL WAFI
Spécialiste en O.R.L.
Espace Erreda 52 Bd Zerktouni Etage 1
(Face Marché des Fleurs) Casablanca
Tél: 0522 22 61 17 / 0522 47 12 44
23 JAN. 2023

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
20 DEC. 2022	CS		300	Dr. Brahim EL WAFI Spécialiste en O.R.L. Espace Erreda 52 Bd Zerkouni Agdal 48, Rue Lot. Hafdja Les Grênes Casablanca - Tél: 0522.22.61.17 / 0522.47.12.44
19 JAN. 2023	CS		6	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	20/12/2022	465.6
	19/10/23	6400

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.


SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>

O.D.F. PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

	H	
25533412		21433552
00000000		00000000
D		G
00000000		00000000
35533411		11433553
	B	

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession



Coefficient DES TRAVAUX	<input type="text"/>
MONTANTS DES SOINS	<input type="text"/>
DATE DU DEVIS	<input type="text"/>
DATE DE L'EXECUTION	<input type="text"/>

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Brahim EL WAFI

SPECIALISTE EN O.R.L.

Maladies et Chirurgies du :

Nez - Gorge - Oreille - Face et Cou

Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris

Sur Rendez-Vous

دكتور ابراهيم الوافي

إختصاصي في أمراض وجراحة

الأنف - الحنجرة - الأذن - الوجه والعنق

خريج كلية الطب بباريس

بالموعد

Casablanca, le في الدار البيضاء،

QUARDY AZIZ



645
M.Y.K 1%

3gtts oxy- dans l'oreille gde
pd 8 j



099222 10/24
FPC 1640450

نشرة معلوماتية
عن الأدوية المستخدمة

Dr. Brahim EL WAFI
Specialiste en O.R.L.

Espace Erreda 52, Bd Zerkouni Etage 1
(Face Marché des Fleurs) Casablanca
Tél: 0522 22 61 17 / 0522 47 12 44

عمارة الرضا - 52 شارع الزرقطوني - الطابق الأول (أمام سوق الورود) - الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 22 61 17 / 05 22 47 12 44 - الفاكس : 05 22 22 61 77

Espace Erreda - 52, Bd Zerkouni - 1er Etage (Face marché aux Fleurs) - Casablanca - Tél. : 05 22 22 61 17 / 05 22 47 12 44 - Fax : 05 22 22 61 77

Docteur Brahim EL

SPECIALISTE EN O.R.L.

Maladies et Chirurgies du :

Nez - Gorge - Oreille - Face et Cou

Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris

Sur Rendez-Vous

دكتور إبراهيم العولفي

إختصاصي في أمراض وجراحة

الأنف - الحنجرة - الأذن - الوجه والعنق

خريج كلية الطب بباريس

بالموعد

Casablanca, le 20 DEC. 2022 في الدار البيضاء،

QUADRY Aziz

$74^{\circ} \times 2 = 149.6$

- Sepcen 500

$79^{\circ} 1 \text{ cp } 2 \times 1 \text{ d } 10 \text{ j}$
- Amicuboren 20

$118.54 \text{ gtt } 2 \times 1 \text{ d } 2 \text{ dans l'oreille } 10 \text{ j}$
 $\times 2 = 237.00$
- Icar 20

1 cp 4x par

$1 = 465.60$

Dr. Brahim EL WAFI
Spécialiste en O.R.L.
Espace Erreda 52 Bd Zerkouni Etage 1
(Face Marché des Fleurs) Casablanca
Tel: 0522 22 61 17 / 0522 47 12 44

Dr. Brahim EL WAFI
Spécialiste en O.R.L.
Espace Erreda 52 Bd Zerkouni Etage 1
(Face Marché des Fleurs) Casablanca
Tel: 0522 22 61 17 / 0522 47 12 44

عمارة الرضا - 52 شارع الزركطوني - الطابق الأول (السماعة فوق الورد) - الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 22 61 17 / 05 22 47 12 44 / الفاكس : 05 22 22 61 77

Espace Erreda - 52, Bd Zerkouni - 1er Etage (Face marché aux Fleurs) - Casablanca - Tél. : 05 22 22 61 17 / 05 22 47 12 44 - Fax : 05 22 22 61 77

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR
SEPCEN® 250 mg, SEPCEN® 500 mg et SEPCEN® 750 mg
Boîte de 10 comprimés pelliculés
D.C.I. : Ciprofloxacine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'infos à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. En cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet inattendu dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir la rubrique "Effets indésirables".

• Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que SEPCEN® et dans quels cas.
2. Quelles sont les informations à connaître.
3. Comment prendre SEPCEN® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels.
5. Comment conserver SEPCEN® ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE SEPCEN® ET DANS QUELS CAS

Classe pharmacothérapeutique : Fluoroquinolone - code ATC : J01MA02.

SEPCEN® contient une substance active, la ciprofloxacine.

La ciprofloxacine est un antibiotique appartenant à la famille des fluoroquinolones. Elle agit en tuant les bactéries responsables des infections. Elle est active uniquement sur certaines souches spécifiques de bactéries.

Chez l'adulte :

SEPCEN® est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des voies respiratoires.
- Infections persistantes ou récurrentes de l'oreille ou des sinus.
- Infections urinaires.
- Infections de l'appareil génital chez l'homme et chez la femme.
- Infections gastro-intestinales et infections intra-abdominales.
- Infections de la peau et des tissus mous.
- Infections des os et des articulations.
- Prévention des infections dues à la bactérie *Neisseria meningitidis*.
- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut être utilisé dans le traitement de patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique supplémentaire pourra vous être prescrit en complément de **SEPCEN®**.

Chez l'enfant et l'adolescent :

SEPCEN® est utilisé chez l'enfant et l'adolescent, sous le contrôle d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des poumons et des bronches chez l'enfant et l'adolescent atteint de mucoviscidose.
- Infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyélonéphrite).
- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut également être utilisé pour traiter d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et de l'adolescent si votre médecin le juge nécessaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SEPCEN® ?

• Ne prenez jamais SEPCEN® :

- Si vous êtes allergique à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des autres composants contenus dans **SEPCEN®** (voir rubrique 6).
- Si vous prenez de la tizanidine (voir rubrique 2 : Prise d'autres médicaments).

• Mise en garde et précaution d'emploi :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre **SEPCEN®** :

Vous ne devez pas prendre d'antibiotiques de la famille des fluoroquinolones/quinolones, incluant **SEPCEN®**, si vous avez déjà présenté un effet indésirable grave dans le passé lors de la prise d'une quinolone ou d'une fluoroquinolone. Si tel est le cas, vous devez en informer votre médecin au plus vite.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre SEPCEN® :

• Si vous avez déjà présenté des problèmes rénaux car il pourra être nécessaire d'adapter votre traitement ;

• Si vous souffrez d'épilepsie ou d'une autre affection neurologique ;

• Si vous avez déjà eu des problèmes aux tendons avec des antibiotiques de la même famille que **SEPCEN®** ;

• Si vous êtes diabétique parce que la ciprofloxacine risque de vous occasionner une hypoglycémie ;

• Si vous souffrez de myasthénie (maladie rare qui entraîne une faiblesse musculaire) en raison du risque d'aggravation des symptômes ;

• Si vous savez que vous présentez, ou un membre de votre famille présente un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), car la ciprofloxacine peut vous occasionner une anémie ;

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertrophie ou de "renflement" d'un gros vaisseau sanguin (anévrisme aortique ou anévrisme périphérique d'un gros vaisseau) ;

• Si vous avez déjà eu un épisode antérieur de dissection aortique (une déchirure de la paroi aortique) ;

• Si vous présentez des antécédents familiaux d'anévrisme aortique ou de dissection aortique ou de valvulopathie cardiaque congénitale, ou présentez d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme syndrome de Marfan ou le syndrome d'Ehlers-Danlos, le syndrome de Turner, le syndrome de Sjögren (une maladie auto-immune inflammatoire), ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la

SEPCEN® 500 mg

ciprofloxacine

10 comprimés pelliculés



6 118000 230182

indésirables très rares (années), invalidant ou les muscles et les art. sensations anormales engourdissement ou in de la vue, du goût, de l'intense et de troubles Si vous présentez l'un de votre médecin avant de votre traitement en ph. • Une douleur et un gonflement peuvent survenir (ans), si vous avez eu le traitement par des corticoïdes pendant les 48 heures. Dès les premiers signes du poignet, du coude, et mettez le membre à repos et évitez la rupture d'un tendon. • Si vous ressentez une douleur ou une raideur qui peuvent être des signes de corticoïdes. • Si vous ressentez soudainement une douleur, ou si vous remarquez une nouvelle apparition de douleur, vous devez en informer votre médecin. • Si vous souffrez d'épilepsie, un accident vasculaire cérébral ou d'un état de mal, produite. Si tel était votre cas, vous devez en informer votre médecin. • Dans de rares cas, une sensation de brûlure, de picotement, ou de douleur, survenir, en particulier dans les zones de prise de **SEPCEN®**, ou un état potentiellement grave. • Des réactions psychiatriques, telles que la dépression, l'anxiété, l'insomnie, ou la prise de **SEPCEN®**, si cela se présente. • Les antibiotiques de la famille des fluoroquinolones/quinolones, incluant **SEPCEN®**, peuvent occasionner une hypoglycémie (une baisse du sucre dans le sang) ou une hyperglycémie (une augmentation du sucre dans le sang) ou une hypoglycémie (une baisse du sucre dans le sang) ou une hyperglycémie (une augmentation du sucre dans le sang). • Si vous devez souffrir de plusieurs semaines après la prise de ces médicaments, ou si vous présentez des symptômes de ces médicaments, vous devez en informer votre médecin. • Si vous avez des troubles de la vision, consultez immédiatement un ophtalmologiste. • Votre peau devient sensible à la lumière. • **SEPCEN®** : Évitez de vous exposer au soleil ou à la lumière vive, ou d'utiliser des produits cosmétiques ou des produits de soins personnels. • Si vous devez subir une intervention chirurgicale ou un examen de laboratoire d'analyses de sang, informez votre médecin ou votre pharmacien. • Si vous avez des problèmes de digestion, consultez immédiatement votre médecin. • **SEPCEN®** peut provoquer des effets indésirables graves, tels que l'appétit, l'ictère (jaunissement de la peau et des yeux), l'arrêt de la prise de **SEPCEN®** peut entraîner des effets indésirables graves.

SEPCEN® 500 mg et SEPCEN® 750 mg
Boîte de 10 comprimés pelliculés
D.C.I. : Ciprofloxacine

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'infos à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais, en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir la rubrique "Mise en garde et précaution d'emploi".

• Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que SEPCEN® et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SEPCEN® ?
3. Comment prendre SEPCEN® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver SEPCEN® ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE SEPCEN® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Fluoroquinolones.

SEPCEN® contient une substance active, la ciprofloxacine. La ciprofloxacine est un antibiotique appartenant à la famille des fluoroquinolones. Elle agit en tuant les bactéries responsables des infections. Elle est active uniquement sur certaines souches spécifiques de bactéries.

Chez l'adulte :

SEPCEN® est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des voies respiratoires.
- Infections persistantes ou récurrentes de l'oreille ou des sinus.
- Infections urinaires.
- Infections de l'appareil génital chez l'homme et chez la femme.
- Infections gastro-intestinales et infections intra-abdominales.
- Infections de la peau et des tissus mous.
- Infections des os et des articulations.
- Prévention des infections dues à la bactérie *Neisseria meningitidis*.
- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut être utilisé dans le traitement de patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique additionnel pourra vous être prescrit en complément de **SEPCEN®**.

Chez l'enfant et l'adolescent :

SEPCEN® est utilisé chez l'enfant et l'adolescent, sous le contrôle d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des poumons et des bronches chez l'enfant et l'adolescent atteint de mucoviscidose.
- Infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyélonéphrite).
- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut également être utilisé pour traiter d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et de l'adolescent si votre médecin le juge nécessaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SEPCEN® ?

• Ne prenez jamais SEPCEN® :

- Si vous êtes allergique à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des autres composants contenus dans **SEPCEN®** (voir rubrique 6).
- Si vous prenez de la fizinidine (voir rubrique 2 : Prise d'autres médicaments).

• Mise en garde et précaution d'emploi :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre **SEPCEN®** :

Vous ne devez pas prendre d'antibiotiques de la famille des fluoroquinolones/quinolones, incluant **SEPCEN®**, si vous avez déjà présenté un effet indésirable grave dans le passé lors de la prise d'une quinolone ou d'une fluoroquinolone. Si tel est le cas, vous devez en informer votre médecin au plus vite.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre SEPCEN® :

- Si vous avez déjà présenté des problèmes rénaux car il pourra être nécessaire d'adapter votre traitement ;
- Si vous souffrez d'épilepsie ou d'une autre affection neurologique ;
- Si vous avez déjà eu des problèmes aux tendons avec des antibiotiques de la même famille que **SEPCEN®** ;
- Si vous êtes diabétique parce que la ciprofloxacine risque de vous occasionner une hypoglycémie ;
- Si vous souffrez de myasthénie (maladie rare qui entraîne une faiblesse musculaire) en raison du risque d'aggravation des symptômes ;
- Si vous savez que vous présentez, ou un membre de votre famille présente un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), car la ciprofloxacine peut vous occasionner une anémie ;
- Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertrophie ou de "renflement" d'un gros vaisseau sanguin (anévrisme aortique ou anévrisme périphérique d'un gros vaisseau) ;
- Si vous avez déjà eu un épisode antérieur de dissection aortique (une déchirure de la paroi aortique) ;
- Si vous présentez des antécédents familiaux d'anévrisme aortique ou de dissection aortique ou de valvulopathie cardiaque congénitale, ou présentez d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme syndrome de Marfan ou le syndrome d'Ehlers-Danlos, le syndrome de Turner, le syndrome de Sjögren (une maladie auto-immune inflammatoire), ou des troubles vasculaires comme l'artérite à cellules géantes, la

SEPCEN® 500 mg
ciprofloxacine

10 comprimés pelliculés



6 118000 230182

LOT : 00322020
PER : 2012025
EXP : 7/2000 DH

maladie de Behçet, l'hy-
les articu-
des probl-
ou avez-
t'un enre-
dans le s-
si vous a-
ance car-
te ou un-
niveau de-
ue en ac-
à traitem-
de SEP-
diatème
D. Votre
• Réaction allergique s-
membres d'os
existe
les sy-
ou ve-
SEPC-
bles gr-
type
rares
ints ou
les arti-
sensations anormales
engourdissement ou un-
de la vue, du goût, de l'o-
intense et de troubles s-
Si vous présentez l'un d-
votre médecin avant de
votre traitement en envi-
• Une douleur et un gon-
tendons peuvent surven-
ans), si vous avez eu ce
traitement par des corti-
premières 48 heures du
Dès les premiers signes
du poignet, du coude, de
et mettez le membre at-
rupture d'un tendon.
• Si vous ressentez une
qui peuvent être des
immédiatement au servi-
avec des corticostéroïdes
• Si vous ressentez sou-
lit, ou si vous remarque-
nouvelle apparition de p-
vous devez en informer
• Si vous souffrez d'épil-
accident vasculaire céré-
produire. Si tel était vot-
• Dans de rares cas, u-
sensation de brûlure, d-
survenir, en particulier a-
de prendre **SEPCEN®** e-
un état potentiellement
• Des réactions psychia-
souffrez de dépression
SEPCEN® Si cela se pr-
• Les antibiotiques de la
sucre dans le sang au-
sucre dans le sang en cas
hypoglycémique) dans le
est important à prendre
sucre dans le sang doit
• Vous pouvez souffrir d-
plusieurs semaines apr-
de ces diarrhées, ou s-
immédiatement de pres-
médicaments visant à tr-
• Si vous avez des trou-
immédiatement un oph-
• Votre peau devient
SEPCEN® Evitez de vo-
ceux utilisés dans les ca-
• Si vous devez subir
laboratoire d'analyses o-
• Si vous avez des p-
éventuellement être ad-
• **SEPCEN®** peut provo-
de l'appétit, ictere (jaun-
arrêtez de prendre **SEP-**
• **SEPCEN®** peut entra-

IXOR®

(Oméprazole)

• Si vous êtes allergique à un autre médicament contenant l'oméprazole.

IXOR® 20 mg

28 comprimés effervescent



6 118000 032809

médicament par le VIH), des situations graves, votre pharmacien.

ence d'association avec l'oméprazole et IXOR®.

DENOMINATION

IXOR® 20 mg

28 comprimés effervescent

- IXOR® Comprimé effervescent
- IXOR® Comprimé effervescent

Veillez lire attentivement la notice de ce médicament avant de le prendre et chaque fois que vous le prenez.

- Gardez ce médicament à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- Si vous avez des questions, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament doit être conservé dans son emballage d'origine.
- Ne donnez pas ce médicament à d'autres personnes.
- Si l'un de ces effets indésirables apparaît, arrêtez de prendre le médicament et consultez votre médecin.

PPU 118000032809

EXP 09/2024
LOT 26037 2

remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que IXOR® et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre IXOR® ?
3. Comment prendre IXOR® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver IXOR® ?
6. Informations supplémentaires.

1- QU'EST-CE QUE IXOR® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

Code ATC : A02BC01

IXOR® comprimé effervescent contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelés inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

- Indications thérapeutiques

IXOR® comprimé effervescent est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Chez les adultes :

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.
- Les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).
- Les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.
- Les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). IXOR® comprimé effervescent peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une grosseur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison).

Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel ≥ 10 kg

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.
- Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents

- Les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE IXOR® ?

- Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

- Sans objet.
- Ne prenez jamais IXOR® (Contre-indications)
- Si vous êtes allergique à l'oméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

précautions particulières d'emploi

en situation de...

765,7

768,6

le cin d

nt,

cent

équen

efferv

ormer

se proc

ans rais

à avaler.

- Vous avez des douleurs à l'estomac.
- Vous vomissez de la nourriture.
- Vous avez des selles noires (telles que du goudron).
- Vous souffrez de diarrhée sévère.
- Si vous avez des problèmes hépatiques.
- Si vous est déjà arrivé de perdre du poids après un traitement avec un médicament qui réduit l'acidité de l'estomac.

Vous devez faire un examen sanguin si vous prenez IXOR® comprimé effervescent pendant plus d'un an, votre médecin vous le demandera. Vous devez surveiller vos symptômes et événements nouveaux. Consultez votre médecin.

La prise d'un inhibiteur de la pompe à protons pendant plus d'un an, peut légèrement augmenter le risque de fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres. Si vous souffrez d'ostéoporose ou si vous avez des problèmes de densité osseuse, vous pouvez augmenter le risque de fracture. Si vous avez une éruption sur la peau, évitez l'exposition au soleil, prévenez votre médecin. Si vous devez prendre un médicament, rappelez-vous de mentionner à votre médecin que vous prenez IXOR®.

- Enfants

Certains enfants atteints d'une maladie peuvent nécessiter un traitement à long terme. Ne donnez pas ce médicament à un enfant de moins de 1 an ou < 10 kg.

- Prises d'autres médicaments

Autres médicaments et IXOR®
Informez votre médecin ou pharmacien de tous les médicaments que vous prenez, y compris ceux que vous avez récemment pris ou pourriez prendre. Cela concerne également les médicaments en vente libre et les médicaments à ordonnance.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec d'autres médicaments et certains effets sur IXOR® comprimé effervescent. Vous ne devez pas prendre IXOR® comprimé effervescent si vous prenez un médicament contenant du fer (l'infection par le VIH).

Vous devez informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez.

- Kétoconazole, Itraconazole, (utilisés dans le traitement des champignons).
- Digoxine (utilisée dans le traitement de l'insuffisance cardiaque).
- Diazépam (utilisé dans le traitement de l'anxiété ou comme relaxant musculaire).
- Phénytoïne (utilisée dans le traitement de l'épilepsie).
- Phénytoïne, une surveillance particulière est recommandée au début et à l'arrêt de l'administration.
- Médicaments anti-coagulants.

- Si vous êtes allergique à un autre

IXOR® 20 mg
28 comprimés effervescent

6 118000 032809

IXOR® 20 mg

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

6. Informations supplémentaires.

- Si vous êtes allergique à l'oméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

phénytoïne, une surveillance par voie
début et à l'arrêt de l'administration

Auricularum

Poudre auriculaire

AURICULARUM®

Poudre auriculaire pour suspension
pour instillation auriculaire

Remboursable AMO

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice médicament. Elle contient des informations importantes pour le traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de syndrome, cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la consulter.



prescrit. Ne le donnez

ar

LOT 221210

EXP 04 2024

PPV 79.00 DH

J.I.

J.I.

1.000.000 U.I.

10,00 mg

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Poudre

Chlorhydrate d'oxytétracycline

Sulfate de polymyxine B

Nystatine

Phosphate sodique de dexaméthasone

Excipient : Laurylsulfate de sodium

Pour un flacon

Solvant : 10 ml de chlorure de sodium 0,9%

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATION

Poudre auriculaire en flacon avec solvant (10 ml), boîte unitaire.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Corticoïde et Anti-infectieux en association.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

- Ce médicament est indiqué en traitement local de l'otite externe à bactérie ou champignon.
- Ce médicament est indiqué chez les patients atteints d'otite chronique avant ou après intervention chirurgicale de l'oreille dans certaines circonstances déterminées par le médecin généraliste ou le spécialiste en oto-rhino-laryngologie.

ATTENTION !