

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Autre :

- ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est

o Adresses Mails utiles
o Réclamation
Prise en charge

: contact@mupras.com
: pec@mupras.com
: adhesion@mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W21-722920

146098

Autres

Optique

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 0715

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

BENCHEKRONE Mohamed

Nom & Prénom :

01-07-1948

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 0671543864

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Docteur Chafid CHAOUI
Chirurgien orthopédiste
96, Av. Mers Sultan 2ème Etage
Tél: 022 26 54 69 Casablanca

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

BENCHEKRONE Mohamed

Age : 74

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA
Le : 18/01/2023

Signature de l'adhérent(e)

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fourisseur	Date	Montant de la Facture
Dr. Ssaaadouni Yasmine 18 Rue Annastine Beausejour Casablanca - Tél: 0522 36 26 32	08/11/2022	106180

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

BON DE HONORAIRES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

DATE DU
DEVIS

DATE DU
DEVIS

DATE DE
EXÉCUTION

DATE DE
EXÉCUTION

SESSION	DATE DU DEVIS	
	DATE DE L'EXECUTION	
		TISSU ENTIÈREMENT ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Chakib CHAOUI

Chirurgien Urologue

Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris

Ancien attaché des hôpitaux de Paris

Ancien Urologue des hôpitaux des F.A.R

Chirurgie et Endoscopie des reins et des voies

Uro-Génitales

Lithotripsie extra-corporelle - Echographie

Impuissance - Stérilité Masculine - Circoncision

Sur Rendez-Vous



الدكتور شبيب شاوي

خريج كلية الطب بباريس

طیب مساعد سابق یمشتشفیات باریس

جراح سابق بالمستشفيات العسكرية

الكلية الجراحية للأمراض

و المسالك البوالية و التناسلية

الجراحة المجهرية - الفحص بالصدى الصوتي

العقم عند الرجال و ضعف قوة الجماع - ختانة الأطفال

تفتيت حصى الكلى بدون جراحة

بالموعد

M 1 BEN CUTE KRONEN M 2

~~153,35^{ab}~~ PERNIXON $\times 160$;

1 2 3 4

710.2 ¹²) end 03 ¹² 

Y ORGANISATION (2) : (P. 18) MAIAOU

~~Pharmacie Des Clubs
Dr ESSAADOUNI Yasmine
18 Rue Annasine- Beausejour
Casablanca- Tel: 0522 36 26 32
TE 10618 (2 Bous)~~

196 ماج مرس السلطان الطبايق الثاني الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 26 54 69

196, Av. Mers Sultan 2ème Etage Casablanca - Tél.: 05 22 26 54 69

Docteur CHAOUI Chakib
Chirurgien Urologue
196 Avenue Mers Sultan
Casablanca
Tél : 05 22 26 54 69

COMPTE RENDU D'ECHOGRAPHIE

NOM : BEN CATE KROUNE

PRENOM : *Yed*

DATE : 08 NOV 2022

REINS : Les deux reins sont de taille normale ; de contours réguliers.

Bonne différenciation cortico-médulaire.

Absence de dilatation des cavités pyéliques et calicielles.

~~Utricule rénale gauche - 7,5 mm.~~

VÉSSIE : La vessie est d'écho structure homogène ; transonore ; à paroi fine.

PROSTATE : La prostate est d'écho structure homogène ; ses dimensions sont 34...54/34...

Ce qui correspond à un poids d'environ 250 grammes

Dr. CHAOUI Chakib
Chirurgien Urologue
196 Avenue Mers Sultan
Casablanca
Tél : 05 22 26 54 69

*Docteur Chaoui Roqi Chakib
Chirurgien urologue
196, Avenue Mers Sultan
Casablanca
Tel : 05 22 26 56 69*

FACTURE

NOM : BENCHETKROUNE

PRÉNOM : *M*

DATE :

08 Nov 2022

❖ Consultation spécialisée : 200 D.H.

❖ Echographie rénale et vésico-prostatique : 400 D.H

❖ TOTAL : 600 D.H (Soit six cent dirhams)

SIGNER :

*Docteur Chaoui Roqi Chakib
Chirurgien urologue
196, Av Mers Sultan, Casablanca
Tél.: 022 26 56 69*

**GENPHARMA**

Omegen® 10 mg et 20 mg

Oméprazole

COMPOSITION :**Omegen® 10 mg :**

Oméprazole..... 10 mg
Excipients..... q.s.p une gélule

Omegen® 20 mg :

Oméprazole..... 20 mg
Excipients..... q.s.p une gélule

PRESENTATION :

Omegen® 10 mg : Boite de 7, 14 et 28 gélules.
Omegen® 20 mg : Boite de 7, 14 et 28 gélules.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Inhibiteur de la pompe à protons.

INDICATIONS :**Enfant à partir d'un an :**

- Oesophagite érosive ou ulcérale symptomatique par reflux gastro-œsophagien.

Adulte :**• Omegen® 10 mg :**

- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien associé ou non à une œsophagite, en cas de résistance ou d'inadaptation des traitements de première intention (conseils hygiéno-diététiques, antiacides, alginates).

- Traitement d'entretien des œsophagites par reflux.

- Traitement d'entretien des ulcères duodénaux chez les patients non infectés par Helicobacter pylori, ou chez qui l'éradication n'a pas été possible.

• Omegen® 20 mg :

- En association à une bithérapie antibiotique, pour l'éradication de Helicobacter pylori en cas de maladie ulcéruse gastroduodénale.

- Ulcère duodénal évolutif.

- Ulcère gastrique évolutif.

- Oesophagite érosive ou ulcérale symptomatique par reflux gastro-œsophagien.

- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien associé ou non à une œsophagite, en cas de résistance à la posologie de 10 mg d'oméprazole par jour.

- Sync

- Trai

par le

pourst

- Prév

par les

patient

POSO

7/100

Enfani

De 10 à 20 kg : 1 gélule d'omegen® 10 mg par jour.
Plus de 20 kg : 1 gélule d'omegen® 20 mg par jour.

Adulte :**• Omegen® 10 mg :**

- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien : 1 gélule d'omegen® 10 mg par jour.

- Traitement d'entretien des œsophagites par reflux gastro-œsophagien : 10 à 20 mg par jour, adaptée en fonction de la réponse symptomatique et/ou endoscopique.

- Traitement d'entretien des ulcères duodénaux : 1 gélule dosée à 10 mg par jour, cette posologie sera portée à 20 mg, en cas d'inefficacité ou en cas de résistance à un traitement d'entretien par les anti-H2.

• Omegen® 20 mg :

- Eradication de Helicobacter pylori en cas de maladie ulcéruse gastroduodénale : soit 1 gélule Omegen® 20 mg matin et soir associée à deux antibiotiques pendant 7 jours suivi par une gélule par jour pendant 3 à 5 semaines supplémentaires.

- Ulcère duodénal évolutif : 1 gélule d'omegen® 20 mg par jour pendant 4 semaines.

- Ulcère gastrique évolutif : 1 gélule d'omegen® 20 mg par jour pendant 4 à 6 semaines.

- Oesophagite par reflux gastro-œsophagien : 1 gélule de 20 mg par jour pendant 4 semaines.

- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien : La posologie est de 1 gélule dosée à 10 mg par jour. Elle pourra être portée à 20 mg en cas de réponse insuffisante.

induites
rsque la
isable.
induites
chez les

N :

**GENPHARMA**

Omegen® 10 mg et 20 mg

Oméprazole

COMPOSITION :**Omegen® 10 mg :**

Oméprazole..... 10 mg
Excipients..... q.s.p une gélule

Omegen® 20 mg :

Oméprazole..... 20 mg
Excipients..... q.s.p une gélule

PRESENTATION :

Omegen® 10 mg : Boite de 7, 14 et 28 gélules.
Omegen® 20 mg : Boite de 7, 14 et 28 gélules.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Inhibiteur de la pompe à protons.

INDICATIONS :**Enfant à partir d'un an :**

- Oesophagite érosive ou ulcérale symptomatique par reflux gastro-œsophagien.

Adulte :**• Omegen® 10 mg :**

- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien associé ou non à une œsophagite, en cas de résistance ou d'inadaptation des traitements de première intention (conseils hygiéno-diététiques, antiacides, alginates).

- Traitement d'entretien des œsophagites par reflux.

- Traitement d'entretien des ulcères duodénaux chez les patients non infectés par Helicobacter pylori, ou chez qui l'éradication n'a pas été possible.

• Omegen® 20 mg :

- En association à une bithérapie antibiotique, pour l'éradication de Helicobacter pylori en cas de maladie ulcéruse gastroduodénale.

- Ulcère duodénal évolutif.

- Ulcère gastrique évolutif.

- Oesophagite érosive ou ulcérale symptomatique par reflux gastro-œsophagien.

- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien associé ou non à une œsophagite, en cas de résistance à la posologie de 10 mg d'oméprazole par jour.

- Sync

- Trai

par le

pourst

- Prév

par les

patient

POSO

7/100

Enfani

De 10 à 20 kg : 1 gélule d'omegen® 10 mg par jour.
Plus de 20 kg : 1 gélule d'omegen® 20 mg par jour.

Adulte :

• Omegen® 10 mg :

- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien : 1 gélule d'omegen® 10 mg par jour.

- Traitement d'entretien des œsophagites par reflux gastro-œsophagien : 10 à 20 mg par jour, adaptée en fonction de la réponse symptomatique et/ou endoscopique.

- Traitement d'entretien des ulcères duodénaux : 1 gélule dosée à 10 mg par jour, cette posologie sera portée à 20 mg, en cas d'inefficacité ou en cas de résistance à un traitement d'entretien par les anti-H2.

• Omegen® 20 mg :

- Eradication de Helicobacter pylori en cas de maladie ulcéruse gastroduodénale : soit 1 gélule Omegen® 20 mg matin et soir associée à deux antibiotiques pendant 7 jours suivi par une gélule par jour pendant 3 à 5 semaines supplémentaires.

- Ulcère duodénal évolutif : 1 gélule d'omegen® 20 mg par jour pendant 4 semaines.

- Ulcère gastrique évolutif : 1 gélule d'omegen® 20 mg par jour pendant 4 à 6 semaines.

- Oesophagite par reflux gastro-œsophagien : 1 gélule de 20 mg par jour pendant 4 semaines.

- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien : La posologie est de 1 gélule dosée à 10 mg par jour. Elle pourra être portée à 20 mg en cas de réponse insuffisante.

induites
rsque la
isable.
induites
chez les

N :

Permixon 160 mg

GÉLULE

Extrait lipido-stéroïque de Serenoa repens

153,30

Veuillez lire attentivement cette notice informations importantes pour votre traitem

Si vous avez d'autres questions, si vous avez
nécessité d'informations supplémentaires, veuillez
meilleur de votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consulter un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informez votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
3. COMMENT PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER PERMIXON 160 mg, gélule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

AUTRES MEDICAMENTS UTILISES DANS L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE. Ce médicament est préconisé dans le traitement de certains troubles de la miction (émission d'urine) liés à l'hypertrophie (augmentation de volume) de la prostate.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?

Ne prenez jamais PERMIXON 160 mg, gélule dans le cas suivant :

- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de

la gélule.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec PERMIXON 160 mg, gélule : Mises en garde

La prise de ce médicament à jeun peut être la cause de nausées.

L'utilisation de ce médicament ne doit pas dispenser d'une surveillance régulière de la prostate chez votre médecin. PERMIXON 160 mg, gélule ne peut se substituer à l'acte chirurgical lorsque celui-ci est indispensable.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

Précautions d'emploi

La prise de ce médicament à jeun peut parfois être la cause de nausées.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre

Permixon 160 mg

GÉLULE

Extrait lipido-stéroïque de Serenoa repens

153,30

Veuillez lire attentivement cette notice informations importantes pour votre traitem

Si vous avez d'autres questions, si vous avez
nécessité d'informations supplémentaires, veuillez
meilleur de votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consulter un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informez votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
3. COMMENT PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER PERMIXON 160 mg, gélule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

AUTRES MEDICAMENTS UTILISES DANS L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE. Ce médicament est préconisé dans le traitement de certains troubles de la miction (émission d'urine) liés à l'hypertrophie (augmentation de volume) de la prostate.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?

Ne prenez jamais PERMIXON 160 mg, gélule dans le cas suivant :

- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de

la gélule.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec PERMIXON 160 mg, gélule : Mises en garde

La prise de ce médicament à jeun peut être la cause de nausées.

L'utilisation de ce médicament ne doit pas dispenser d'une surveillance régulière de la prostate chez votre médecin. PERMIXON 160 mg, gélule ne peut se substituer à l'acte chirurgical lorsque celui-ci est indispensable.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

Précautions d'emploi

La prise de ce médicament à jeun peut parfois être la cause de nausées.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre

Permixon 160 mg

GÉLULE

Extrait lipido-stéroïque de Serenoa repens

153,30

Veuillez lire attentivement cette notice informations importantes pour votre traitem

Si vous avez d'autres questions, si vous avez
nécessité d'informations supplémentaires, veuillez
meilleur de votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consulter un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informez votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
3. COMMENT PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER PERMIXON 160 mg, gélule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

AUTRES MEDICAMENTS UTILISES DANS L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE. Ce médicament est préconisé dans le traitement de certains troubles de la miction (émission d'urine) liés à l'hypertrophie (augmentation de volume) de la prostate.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?

Ne prenez jamais PERMIXON 160 mg, gélule dans le cas suivant :

- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de

la gélule.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec PERMIXON 160 mg, gélule : Mises en garde

La prise de ce médicament à jeun peut être la cause de nausées.

L'utilisation de ce médicament ne doit pas dispenser d'une surveillance régulière de la prostate chez votre médecin. PERMIXON 160 mg, gélule ne peut se substituer à l'acte chirurgical lorsque celui-ci est indispensable.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

Précautions d'emploi

La prise de ce médicament à jeun peut parfois être la cause de nausées.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre

Permixon 160 mg

GÉLULE

Extrait lipido-stéroïque de Serenoa repens

153,30

Veuillez lire attentivement cette notice informations importantes pour votre traitem

Si vous avez d'autres questions, si vous avez
nécessité d'informations supplémentaires, veuillez
meilleur de votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consulter un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez
un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informez votre médecin ou votre
pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET
DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A
CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON
160 mg, gélule ?
3. COMMENT PRENDRE PERMIXON 160 mg,
gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES
EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER PERMIXON 160 mg,
gélule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AUTRES MEDICAMENTS UTILISES DANS
L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE.
Ce médicament est préconisé dans le traitement
de certains troubles de la miction (émission
d'urine) liés à l'hypertrophie (augmentation de
volume) de la prostate.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?

Ne prenez jamais PERMIXON 160 mg, gélule
dans le cas suivant :

- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de

la gélule.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE
VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec PERMIXON 160 mg, gélule : Mises en garde

La prise de ce médicament à jeun peut être la
cause de nausées.

L'utilisation de ce médicament ne doit pas
dispenser d'une surveillance régulière de la
prostate chez votre médecin. PERMIXON 160 mg,
gélule ne peut se substituer à l'acte chirurgical
lorsque celui-ci est indispensable.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

Précautions d'emploi

La prise de ce médicament à jeun peut parfois
être la cause de nausées.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE
VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre
médicament, y compris un médicament obtenu
sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à
votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre

Permixon 160 mg

GÉLULE

Extrait lipido-stéroïque de Serenoa repens

153,30

Veuillez lire attentivement cette notice informations importantes pour votre traitem

Si vous avez d'autres questions, si vous avez
nécessité d'informations supplémentaires, veuillez
meilleur de votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consulter un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informez votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
3. COMMENT PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER PERMIXON 160 mg, gélule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

AUTRES MEDICAMENTS UTILISES DANS L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE. Ce médicament est préconisé dans le traitement de certains troubles de la miction (émission d'urine) liés à l'hypertrophie (augmentation de volume) de la prostate.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?

Ne prenez jamais PERMIXON 160 mg, gélule dans le cas suivant :

- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de

la gélule.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec PERMIXON 160 mg, gélule : Mises en garde

La prise de ce médicament à jeun peut être la cause de nausées.

L'utilisation de ce médicament ne doit pas dispenser d'une surveillance régulière de la prostate chez votre médecin. PERMIXON 160 mg, gélule ne peut se substituer à l'acte chirurgical lorsque celui-ci est indispensable.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

Précautions d'emploi

La prise de ce médicament à jeun peut parfois être la cause de nausées.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre