

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.



## Déclaration de Maladie

M22- 0029180

### Maladie

### Dentaire

### Optique

### Autres

#### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 00000007

Société : Royal air MAROC

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : AICHA ARRAKKACHI

1943

Date de naissance :

Adresse : HAY HASSANI BLDC 209 N° 94 DB Hassan CASA

Tél. : 0656724970 Total des frais engagés : 782,90 Dhs

#### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

DR CHRAIBI H.Karim  
Chirurgien Ophtalmologiste  
Angle Route d'Azemmour et Bd  
Sidi Abderrahmane Hay Hassani-Casablanca  
Tél: 02204750 - fax: 0522915602 - Gsm: 0684149749

Date de consultation : - 8 DEC. 2021

Nom et prénom du malade : NACIR AICHA Age : 1943

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Q Route Nacir

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :



## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
8 DEC 2011 19 JAN 2013	C2 C2		250.00 8	<del>Dr. CHABABI Karim Chirurgien Ophtalmologiste Angle Route d'Azemmour - Casablanca Télé: 0522915602 - GSM: 0684749749</del> <del>Dr. CHABABI Karim Chirurgien Ophtalmologiste Angle Route d'Azemmour et Bd Rte d'Azemmour, Ants Supérieur Tel: 0522 95.01.16 ICE: 0018352980000082 PHARMACIE SUP ANFA Dr. Mouna CHABACH PHA</del>
<b>EXECUTION DES ORDONNANCES</b>				
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Sidi Abderrahmane Hay Hassan-Casablanca Montant de la Facture 0522915602-Gsm:0684749749 148.70 384.20		

**ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Bachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

#### AUXILIAIRES MEDICAUX

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

## Important


Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F  
PROTHESES DENTAIBLES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553

#### **[Création, remont, adjonction]**



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# CABINET d'ophtalmologie

Dr. CHRAIBI H. Karim  
MALADIES ET CHIRURGIE DE YEUX  
ANGIOGRAPHIE - LAZER - LENTILLE DE CONTACT

Diplômé de l'UNIVERSITÉ BORDEAUX II - FRANCE  
Ancien Chef de Clinique des Hôpitaux de BORDEAUX  
Ancien Attaché des Hôpitaux de BORDEAUX  
MEMBRE de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE d'Ophtalmologie  
MEMBRE de l'AMERICAN ACADEMY of Ophtalmology

الدكتور الشرابي ح. كريم  
اختصاصي في طب وجراحة العيون

خريج جامعة بوردو II بفرنسا

جراح سابقًا بمستشفيات بوردو

عضو بالجمعية الفرنسية لطب العيون

عضو بالأكاديمية الأمريكية لطب العيون

CASABLANCA, LE 19 JAN. 2023

MHir

A. Elayy

192.10 x 2

—

ZJ

B. M. R. A.

3 Bl. 20

محلية أنفا العلبة  
Pôle MACIE SUP ANFA  
Dr. Mouhna CHABACH PHA  
Rte d'Azemmour Anfa Supérieur  
Tel: 05.22.95.01.16  
ICE: 001353293000083



(M) à 20h

Dr CHRAIBI H. Karim  
Chirurgien Ophtalmologiste  
Angle Route d'Azemmour et Bd  
Abderrahmane Hay Hassani, Casablanca  
Tél./fax : 0522 91 56 02 - E-mail : cabinet@karimchraibih.com

IMMEUBLE COMMUNAL HAY HASSANI, ANGLE Bd. Sidi Abderrahmane ET ROUTE d'AZEMOUR, ENTRÉE B

2<sup>ÈME</sup> ÉTADE Appr. N°1 - 20230 CASABLANCA - TÉL. : 0522 90 47 50 / 0684 749 749

TÉL./FAX : 0522 91 56 02 - E-MAIL : cabinet@karimchraibih.com

# CABINET d'OPHTALMOLOGIE

Dr. CHRAIBI H. Karim  
MALADIES ET CHIRURGIE DE YEUX  
ANGIOGRAPHIE - LAZER - LENTILLE DE CONTACT

Diplômé de l'UNIVERSITÉ Bordeaux II - FRANC  
Ancien Chef de Clinique des Hôpitaux de BORDEAUX  
Ancien Attaché des Hôpitaux de BORDEAUX  
Membre de la Société Française d'Ophtalmologie  
Membre de l'AMERICAN Academy of Ophthalmology



6 118001 070619

Laboratoires Sothema Bouskoura  
Travatan® 40 µg/ml collyre en solution, 2,5 ml  
A.M.M. N° 30/20/DMP/21/NRGDNM  
PPV : 148,70 DH

406152 MA

O

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# DuoTrav® 40 microgrammes/mL + 5 mg/mL Collyre en solution Travoprost/Timolol Flacon de 2,5 ml

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin, ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, cela pourrait lui être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin, ou à votre pharmacien.

### Que contient cette notice ?

- 1- Qu'est-ce que DuoTrav et dans quels cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DuoTrav ?
- 3- Comment utiliser DuoTrav ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver DuoTrav ?
- 6- Informations supplémentaires.

### 1- QU'EST-CE QUE DuoTrav ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

DuoTrav collyre en solution est une association de deux principes actifs (travoprost et timolol). Le travoprost est un analogue des prostaglandines qui agit en augmentant l'évacuation de liquide aqueux de l'œil, ce qui diminue la pression. Le timolol est un bêta-bloquant qui agit en réduisant la

Si vous avez utilisé plus de DuoTrav que vous n'auriez dû  
Si vous avez mis trop de DuoTrav dans les yeux, rincez-les avec de l'eau tiède. Ne mettez pas d'autres gouttes jusqu'à ce que le moment soit venu de mettre la goutte suivante.

### Si vous oubliez d'utiliser DuoTrav

Si vous oubliez de mettre DuoTrav de dose double pour compenser l'oubli, ne prenez pas la dose double pour compenser une goutte par jour.

### Si vous arrêtez d'utiliser DuoTrav

Si vous arrêtez d'utiliser DuoTrav de manière non contrôlée, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la pression intra-oculaire.

Si vous utilisez un autre collyre, attendez au moins 5 minutes avant d'utiliser l'autre collyre.

Si vous êtes porteur de lentilles de contact, attendez au moins 5 minutes après avoir utilisé le collyre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de DuoTrav, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

DUOTRAV® 40 µg/mL + 5 mg/mL  
Collyre en solution, 2,5 ml  
Boîte de 1 flacon

Sotherma Bouskoura  
PPV : 192,10 DH  
AMM N° 591/18 DMP / 21/ NRQ

Rémboursable AMO  
407393 MA



### 4- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Vous pouvez généralement continuer à utiliser le collyre, à moins que les effets soient graves. Si vous vous inquiétez, contactez votre médecin ou votre pharmacien. N'interrompez pas l'utilisation de DuoTrav sans en parler à votre médecin.

#### Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 personne sur 10)

##### Effets oculaires

Rougeur de l'œil.

#### Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

##### Effets oculaires

Inflammation de la surface de l'œil avec atteinte superficielle, douleur oculaire, vision floue, vision anormale, œil sec, démangeaison oculaire, gêne oculaire, signes et symptômes d'irritation oculaire (par exemple sensation de brûlure, de picotement).

#### Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

##### Effets oculaires

Inflammation de la surface de l'œil, inflammation des paupières, conjonctive gonflée, augmentation



## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# DuoTrav® 40 microgrammes/mL + 5 mg/mL Collyre en solution Travoprost/Timolol Flacon de 2,5 ml

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin, ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, cela pourrait lui être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin, ou à votre pharmacien.

### Que contient cette notice ?

- 1- Qu'est-ce que DuoTrav et dans quels cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DuoTrav ?
- 3- Comment utiliser DuoTrav ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver DuoTrav ?
- 6- Informations supplémentaires.

### 1- QU'EST-CE QUE DuoTrav ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

DuoTrav collyre en solution est une association de deux principes actifs (travoprost et timolol). Le travoprost est un analogue des prostaglandines qui agit en augmentant l'évacuation de liquide aqueux de l'œil, ce qui diminue la pression. Le timolol est un bêta-bloquant qui agit en réduisant la

Si vous avez utilisé plus de DuoTrav que vous n'auriez dû  
Si vous avez mis trop de DuoTrav dans les yeux, rincez-les avec de l'eau tiède. Ne mettez pas d'autres gouttes jusqu'à ce que le moment soit venu de mettre la goutte suivante.

### Si vous oubliez d'utiliser DuoTrav

Si vous oubliez de mettre DuoTrav de dose double pour compenser l'oubli, ne prenez pas la dose double pour compenser une goutte par jour.

### Si vous arrêtez d'utiliser DuoTrav

Si vous arrêtez d'utiliser DuoTrav de manière non contrôlée, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la pression intra-oculaire.

Si vous utilisez un autre collyre, attendez au moins 5 minutes avant d'utiliser l'autre collyre.

Si vous êtes porteur de lentilles de contact, attendez au moins 5 minutes après avoir utilisé le collyre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de DuoTrav, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

6 118001 071340

DUOTRAV® 40 µg/mL + 5 mg/mL  
Collyre en solution, 2,5 ml  
Boîte de 1 flacon

Sotherma Bouskoura  
PPV : 192,10 DH  
AMM N° 591/18 DMP / 21/ NRQ

Rémboursable AMO  
407393 MA

### 4- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Vous pouvez généralement continuer à utiliser le collyre, à moins que les effets soient graves. Si vous vous inquiétez, contactez votre médecin ou votre pharmacien. N'interrompez pas l'utilisation de DuoTrav sans en parler à votre médecin.

#### Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 personne sur 10)

##### Effets oculaires

Rougeur de l'œil.

#### Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

##### Effets oculaires

Inflammation de la surface de l'œil avec atteinte superficielle, douleur oculaire, vision floue, vision anormale, œil sec, démangeaison oculaire, gêne oculaire, signes et symptômes d'irritation oculaire (par exemple sensation de brûlure, de picotement).

#### Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

##### Effets oculaires

Inflammation de la surface de l'œil, inflammation des paupières, conjonctive gonflée, augmentation