

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : *0392* Société : *PCThité*

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : *Borifenzia YNA*

Date de naissance : *1958*

Adresse : *Hay Puffa Meica Bloc N° 13*

Tél. : *6866822*

Total des frais engagés : *2320,60* Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : *13/01/2023*

Nom et prénom du malade : *Borifenzia YNA*

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Age :

Nature de la maladie : *problème respiratoire*

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) : *[Signature]*



#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
18/10/11	U. GENEILLE Bo. 11 Oods Fac. porte police et concessionnaire	CB + 200 100 100	300 100 100	Dr BENJAMIN Cardinal Al Qods (An Choc) Appt. 666819 Fac. porte police et concessionnaire 5135122525145 Gs

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<b>PIRE 092067099</b> <b>PHARMACIE 10 MAI</b> 851, Bd. Driss El Harrach Salama Sidi Othmane - Casablanca TEL: 05 22 57 71 68	29.10.23	1210,60

#### **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**



## AUXILIAIRES MEDICAUX

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### **Important**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	25533412 00000000 D ————— ————— 00000000 35533411	21433552 00000000 G  ————— 00000000 11433553	B	COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
	<b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS**

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

**Dr BENJELLOUN Mohammed Karim**

**Spécialiste des Maladies du Coeur et des Vaisseaux**

**Hypertension Artérielle, ECG ( tracé du coeur )**

**Cholestérol, Holter ECG et Tensionnel**

**Diplômé d'Echocardiographie Doppler**

**BORDEAUX**

**الدكتور بن جلون محمد كريم**  
اختصاصي في أمراض القلب والشرايين  
والضغط الدموي - الكوليستروл .....  
التخطيط الكهربائي للقلب، الهولتر

**الفحص بالصدى**

**جامعة بوردو**



Casablanca, le ..... 19 - 01 2023

M. Boujentri YMNa

$\frac{137,50 \times 4}{-} \text{ T ref } 80 : \frac{1}{2} - 00$



$21,80 \times 9 \text{ Abégic n° } 0-1 \rightarrow$



$- \text{ mm } 2 \text{ 20 } 21 \rightarrow -$



$87,40 \times 6$


$T = 1210,60$

**PHARMACIE 10 MARS**  
851, 8th Arriss El Hatti, Hay Salama 3  
sidi Othmane - Casablanca  
Tél. 05 22 57 11 68

Dr. BENJELLOUN Mohammed Karim  
Bd Al Chaylogue  
Bd Al Qods (Ain Chock) Apt 38  
511 Jardin Al Qods (California Renault)  
(En Face poste police et concessionnaire RENAULT)  
Tél: 0522 52 57 45 - Gsm: -

Bd. Al Qods, 511, Jardins Al Qods Californie (En Face du concessionnaire RENAULT), 4ème Etage, n° 38  
Ain Chock - Casablanca - Tél. : 0612 65 13 15 / 0660 38 40 03 / 0522 52 57 45

E-mail : drbenjellounkarim@gmail.com



# ASPÉGIC NOURRISSONS 100mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si votre enfant se sent moins bien après 3 jours.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

## 1. QU'EST-CE QUE ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique : AUTRES ANALGÉSIQUES ET ANTIPIRÉTIQUES.

Code ATC : N02BA01.

Ce médicament contient de l'aspirine. L'aspirine appartient à la famille des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens.

L'aspirine peut être utilisée pour calmer la douleur (antalgique), faire baisser la fièvre (anti-pyrétique) et/ou diminuer l'inflammation.

ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose contient 100 mg d'aspirine. Il est utilisé :

- en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires ou courbatures,
- dans le traitement de certaines affections rhumatismales.

Ce dosage est réservé aux nourrissons et aux enfants pesant entre 6 et 22 kg (soit environ de 3 mois à 7 ans).

Pour les enfants ayant un poids différent, il existe d'autres présentations d'aspirine dont le dosage est plus adapté. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant d'utiliser ce médicament.

## Ne prenez jamais ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose :

- Si votre enfant est allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si votre enfant est allergique à un médicament de la même famille que l'aspirine (les anti-inflammatoires non stéroïdiens).

- Si vous êtes enceinte, à partir du début du 6ème mois de grossesse (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100mg par jour.

- Si votre enfant a déjà eu de l'asthme ou des polypes nasaux associés à un asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'un médicament de la même famille.

- Si votre enfant souffre actuellement d'un ulcère de l'estomac ou duodénum.

- Si votre enfant a déjà eu une hémorragie ou une perforation au niveau de l'estomac après avoir pris de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les

anti-inflammatoires non stéroïdiens).

- Si votre enfant a des saignements ou si votre médecin a identifié chez lui des risques de saignements.

- Si votre enfant a une maladie grave du foie, des reins ou du cœur.

- Si votre enfant prend un autre médicament, assurez-vous que l'association avec ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose n'est pas contre-indiquée (voir le paragraphe "Autres médicaments et ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose").

- Si votre enfant est atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.

**EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### Avertissements et précautions

#### Avant d'utiliser ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.

ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose est disponible sans ordonnance. Toutefois, vous devez consulter votre médecin avant de donner ce médicament à votre enfant en cas de :

- maladies rhumatismales;
- maladie héréditaire des globules rouges, également appelée déficit en G6PD (car des doses élevées d'aspirine peuvent provoquer une destruction des globules rouges);
- antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum ou une inflammation de l'estomac (gastrite);

- antécédents de saignements digestifs ( vomissements de sang ou présence de sang dans les selles);

- maladie des reins ou du foie;

- règles abondantes;

- si votre enfant suit déjà un autre traitement anti-inflammatoire ou anticoagulant (réferez-vous au paragraphe "Autres médicaments et ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose" pour avoir plus de détails);

- maladie virale, en particulier varicelle ou syndrome grippal : des cas de syndrome de Reye (maladie rare, très grave associant principalement troubles neurologiques et atteintes du foie) ont été observés chez des enfants présentant une maladie virale et recevant de l'aspirine.

Si votre enfant a moins d'un mois, vous devez d'abord consulter votre médecin avant d'utiliser un médicament contenant de l'aspirine, quel que soit le dosage.

### Pendant le traitement chez l'enfant

Le dosage est adapté pour l'enfant entre 6 kg et 22 kg. Pour les enfants pesant moins de 6 kg ou plus de 22 kg, il existe d'autres présentations d'aspirine dont le dosage est plus adapté.

**Edécin si votre enfant a :  
- vomissements, arrêtez le  
yphie."Avant d'utiliser  
en sachet-dose",  
- survenu de ces effets  
sonnes de faible poids  
stomat et en cas  
édicamente et ASPÉGIC  
et-dose".**

• une crise d'aspirine. Cela peut être le signe d'une allergie à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien.

En cas d'administration prolongée de fortes doses d'antalgiques, vous ne devez pas augmenter les doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS en cas de mal de tête.

L'utilisation régulière de médicaments soulageant la douleur peut conduire à des complications rénales.

**Si votre enfant doit subir une opération**

L'aspirine augmente les risques de saignements même à de très faibles doses, et ce même lorsque la prise de ce médicament date de plusieurs jours.

Prévenez votre médecin traitant, votre chirurgien, l'anesthésiste ou votre dentiste de l'utilisation de ce médicament, si votre enfant doit subir une opération ou une intervention, même mineure.

### Analyses de sang

Prévenez votre médecin si votre enfant doit faire une prise de sang car l'aspirine peut modifier le taux d'acide urique dans le sang.

### Autres médicaments et ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

Ce médicament contient de l'aspirine.

Votre enfant ne doit pas prendre en même temps un autre médicament contenant de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (également appelée les anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'ibuprofène). L'association de ces médicaments à ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose pourrait entraîner un surdosage et augmenter ainsi le risque d'effets indésirables.

Lisez attentivement les notices des autres médicaments que votre enfant prend afin de vous assurer que ces médicaments ne contiennent pas d'aspirine ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens.

### Ne donnez jamais de fortes doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (voir le paragraphe "Posologie") :

- Si votre enfant prend des doses supérieures à 20 mg/semaine de méthotrexate (médicament utilisé pour traiter certains cancers et certains rhumatismes).

- Si votre enfant prend un anticoagulant par voie orale (médicament utilisé pour fluidifier le sang) et qu'il a un antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

**Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas donner :**

#### • de fortes doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (voir le paragraphe "Posologie") si votre enfant prend déjà :

- un anticoagulant oral ou une héparine (médicaments utilisés pour fluidifier le sang),

- un anti-inflammatoire non stéroïdien ou un corticoïde (médicaments utilisés pour traiter une maladie rhumatismales, des douleurs ou une inflammation).

#### • de faibles doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (50 à 375 mg par jour) si votre enfant prend déjà :

- un anticoagulant par voie orale (médicament utilisé pour fluidifier le sang) et qu'il a un antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

#### • ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose quelle que soit la dose, si votre enfant prend déjà un médicament à base de :

- ticlopide ou clopidogrel (médicaments utilisés pour fluidifier le sang),

- benzmazrone ou probénécide (médicaments utilisés pour traiter la goutte),

- lévothyroxine (médicament utilisé pour traiter une insuffisance de sécrétion de la glande thyroïde),

- pémétrexed (médicament pour traiter certains cancers),

- analgrélique (médicament utilisé pour diminuer le nombre de plaquettes dans le sang),

- défrétilotide (médicament utilisé pour le traitement d'une maladie dans laquelle les vaisseaux sanguins du foie sont endommagés et obstrués par des caillots sanguins),

- acétozolamide (médicament utilisé pour diminuer la pression au niveau de l'œil ou le taux de gaz carbonique dans le sang),

- ticagrelor (médicament utilisé pour empêcher l'agrégation des plaquettes).

**Vaccin contre la varicelle :** il est recommandé d'attendre 6 semaines après la vaccination avant de prendre ce médicament.

- nicorandil (médicament utilisé pour traiter l'angine de poitrine)

**Informez votre médecin si vous prenez un médicament à base de :**

- l'acétozolamide,

- antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II, diurétiques ou inhibiteurs de l'enzyme

de conversion (médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle),

- méthotrexate à des doses inférieures ou égales à 20 mg/semaine (médicament utilisé pour traiter certains cancers),

- topiques gastro-intestinaux, antiacides et adsorbants (médicaments utilisés pour traiter les douleurs digestives ou les ulcères digestifs).

- cobimetinib,

- ibritinib,

- anticogulant oral, héparine ou thrombolytiques quel que soit la dose (médicaments utilisés pour fluidifier le sang),

- anti-inflammatoires non stéroïdiens (médicaments utilisés dans le traitement de la douleur ou la fièvre),

- défrétilotide (médicament utilisé pour traiter la surcharge en fer chronique),

- glucocorticoïdes (médicament utilisé pour traiter l'inflammation),

- amitriptyline, clomipramine, duloxétine, imipramine, milacipran, oxiprotriptine, venlafaxine (médicaments utilisés pour traiter la dépression ou l'anxiété),

- pentoxifylline (médicament utilisé pour traiter une pathologie des artères des jambes ainsi que certains troubles neurologiques liés au vieillissement),

- inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (médicaments utilisés pour traiter la dépression ou les troubles anxieux).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avec récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament pour votre enfant.

### ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose avec des aliments, boissons et de l'alcool

La consommation d'alcool doit être évitée pendant le traitement en raison d'un risque augmenté de lésions au niveau gastro-intestinal.

### Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Grossesse

Ce médicament contient de l'aspirine (acide acétylsalicylique). Ne prendre AUCUN AUTRE médicaments contenant de l'aspirine (y compris les médicaments sans ordonnance).

**Jusqu'à 100 mg par jour :** pendant toute la grossesse, si nécessaire, votre médecin spécialiste peut être amené à vous prescrire de l'aspirine à faible doses (inférieures ou égales à 100 mg par jour), dans des circonstances exceptionnelles nécessitant une surveillance spécialisée. Si tel est le cas, il est très important de respecter scrupuleusement l'ordonnance de votre médecin, sans dépasser les doses prescrites.

**Entre 100 et 500mg par jour :** pour mesure de précaution, les recommandations ci-dessous s'appliquent, sauf prescription contraire de votre médecin spécialiste.

#### • A partir de 500 mg par jour :

- Avant le début du 6ème mois de grossesse (jusqu'à la 24ème semaine d'aménorrhée), vous ne devez pas prendre ce médicament, sauf en cas d'absolue nécessité déterminée par votre médecin, en raison du risque potentiel de fausses couches ou de malformations. Dans ce cas, la dose devra être la plus faible possible et la durée du traitement la plus courte possible.

- À partir du début du 6ème mois jusqu'à la fin de la grossesse (à partir de la 24ème semaine d'aménorrhée), ce médicament est contre-indiqué, vous ne devez pas EN AUCUN CAS prendre ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves voire fatales, notamment sur le cœur, les poumons et/ou les reins, et cela même avec une seule prise.

- Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte, parlez-en immédiatement à votre gynécologue obstétricien, afin qu'une surveillance adaptée vous soit proposée si nécessaire.

### Allaitement

L'aspirine passant dans le lait maternel, ce médicament est déconseillé pendant l'allaitement.

**ASPEGIC 100MG  
SACHETS B20**

P.P.V : 21DH80



4000437-01



# ASPÉGIC NOURRISSONS 100mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si votre enfant se sent moins bien après 3 jours.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

## 1. QU'EST-CE QUE ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique : AUTRES ANALGÉSIQUES ET ANTIPIRÉTIQUES.

Code ATC : N02BA01.

Ce médicament contient de l'aspirine. L'aspirine appartient à la famille des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens.

L'aspirine peut être utilisée pour calmer la douleur (antalgique), faire baisser la fièvre (anti-pyrétique) et/ou diminuer l'inflammation.

ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose contient 100 mg d'aspirine. Il est utilisé :

- en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires ou courbatures,
- dans le traitement de certaines affections rhumatismales.

Ce dosage est réservé aux nourrissons et aux enfants pesant entre 6 et 22 kg (soit environ de 3 mois à 7 ans).

Pour les enfants ayant un poids différent, il existe d'autres présentations d'aspirine dont le dosage est plus adapté. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant d'utiliser ce médicament.

## Ne prenez jamais ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose :

- Si votre enfant est allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si votre enfant est allergique à un médicament de la même famille que l'aspirine (les anti-inflammatoires non stéroïdiens).

- Si vous êtes enceinte, à partir du début du 6ème mois de grossesse (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100mg par jour.

- Si votre enfant a déjà eu de l'asthme ou des polypes nasaux associés à un asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'un médicament de la même famille.

- Si votre enfant souffre actuellement d'un ulcère de l'estomac ou duodénum.

- Si votre enfant a déjà eu une hémorragie ou une perforation au niveau de l'estomac après avoir pris de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les

anti-inflammatoires non stéroïdiens).

- Si votre enfant a des saignements ou si votre médecin a identifié chez lui des risques de saignements.

- Si votre enfant a une maladie grave du foie, des reins ou du cœur.

- Si votre enfant prend un autre médicament, assurez-vous que l'association avec ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose n'est pas contre-indiquée (voir le paragraphe "Autres médicaments et ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose").

- Si votre enfant est atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.

**EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### Avertissements et précautions

#### Avant d'utiliser ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.

ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose est disponible sans ordonnance. Toutefois, vous devez consulter votre médecin avant de donner ce médicament à votre enfant en cas de :

- maladie rhumatismales;
- maladie héréditaire des globules rouges, également appelée déficit en G6PD (car des doses élevées d'aspirine peuvent provoquer une destruction des globules rouges);

- antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum ou une inflammation de l'estomac (gastrite);

- antécédents de saignements digestifs ( vomissements de sang ou présence de sang dans les selles);

- maladie des reins ou du foie;
- règles abondantes;

- si votre enfant suit déjà un autre traitement anti-inflammatoire ou anticoagulant (réferez-vous au paragraphe "Autres médicaments et ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose" pour avoir plus de détails);

- maladie virale, en particulier varicelle ou syndrome grippal : des cas de syndrome de Reye (maladie rare, très grave associant principalement troubles neurologiques et atteintes du foie) ont été observés chez des enfants présentant une maladie virale et recevant de l'aspirine.

Si votre enfant a moins d'un mois, vous devez d'abord consulter votre médecin avant d'utiliser un médicament contenant de l'aspirine, quel que soit le dosage.

### Pendant le traitement chez l'enfant

Le dosage est adapté pour l'enfant entre 6 kg et 22 kg. Pour les enfants pesant moins de 6 kg ou plus de 22 kg, il existe d'autres présentations d'aspirine dont le dosage est plus adapté.

**Edécin si votre enfant a :  
impressions, arrêtez le  
yphie."Avant d'utiliser  
en sachet-dose",  
e survenus de ces effets  
sonnes de faible poids  
stomat et en cas  
édicamente et ASPÉGIC  
et-dose".**

• une crise d'aspirine. Cela peut être le signe d'une allergie à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien.

En cas d'administration prolongée de fortes doses d'antalgiques, vous ne devez pas augmenter les doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS en cas de mal de tête.

L'utilisation régulière de médicaments soulageant la douleur peut conduire à des complications rénales.

**Si votre enfant doit subir une opération**

L'aspirine augmente les risques de saignements même à de très faibles doses, et ce même lorsque la prise de ce médicament date de plusieurs jours.

Prévenez votre médecin traitant, votre chirurgien, l'anesthésiste ou votre dentiste de l'utilisation de ce médicament, si votre enfant doit subir une opération ou une intervention, même mineure.

### Analyses de sang

Prévenez votre médecin si votre enfant doit faire une prise de sang car l'aspirine peut modifier le taux d'acide urique dans le sang.

### Autres médicaments et ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

Ce médicament contient de l'aspirine.

Votre enfant ne doit pas prendre en même temps un autre médicament contenant de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (également appelée les anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'ibuprofène). L'association de ces médicaments à ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose pourrait entraîner un surdosage et augmenter ainsi le risque d'effets indésirables.

Lisez attentivement les notices des autres médicaments que votre enfant prend afin de vous assurer que ces médicaments ne contiennent pas d'aspirine ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens.

### Ne donnez jamais de fortes doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (voir le paragraphe "Posologie") :

- Si votre enfant prend des doses supérieures à 20 mg/semaine de méthotrexate (médicament utilisé pour traiter certains cancers et certains rhumatismes).

- Si votre enfant prend un anticoagulant par voie orale (médicament utilisé pour fluidifier le sang) et qu'il a un antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

**Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas donner :**

#### • de fortes doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (voir le paragraphe "Posologie") si votre enfant prend déjà :

- un anticoagulant oral ou une héparine (médicaments utilisés pour fluidifier le sang),
- un anti-inflammatoire non stéroïdien ou un corticoïde (médicaments utilisés pour traiter une maladie rhumatismales, des douleurs ou une inflammation).

#### • de faibles doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (50 à 375 mg par jour) si votre enfant prend déjà :

- un anticoagulant par voie orale (médicament utilisé pour fluidifier le sang) et qu'il a un antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

#### • ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose quelle que soit la dose, si votre enfant prend déjà un médicament à base de :

- ticlopide ou clopidogrel (médicaments utilisés pour fluidifier le sang),
- benz bromarone ou probénécide (médicaments utilisés pour traiter la goutte),
- létovothroxine (médicament utilisé pour traiter une insuffisance de sécrétion de la glande thyroïde).

- pérémexide (médicament pour traiter certains cancers),
- analgrélique (médicament utilisé pour diminuer le nombre de plaquettes dans le sang).

- défrétilotide (médicament utilisé pour le traitement d'une maladie dans laquelle les vaisseaux sanguins du foie sont endommagés et obstrués par des caillots sanguins),
- acétozolamide (médicament utilisé pour diminuer la pression au niveau de l'œil ou le taux de gaz carbonique dans le sang).

- ticagrelor (médicament utilisé pour empêcher l'agrégation des plaquettes).
- Vaccin contre la varicelle : il est recommandé d'attendre 6 semaines après la vaccination avant de prendre ce médicament.

- nicorandil (médicament utilisé pour traiter l'angine de poitrine).

#### Informez votre médecin si vous prenez un médicament à base de :

- l'acétozolamide,
- antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II, diurétiques ou inhibiteurs de l'enzyme

de conversion (médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle).

- méthotrexate à des doses inférieures ou égales à 20 mg/semaine (médicament utilisé pour traiter certains cancers).

- topiques gastro-intestinaux, antiacides et adsorbants (médicaments utilisés pour traiter les douleurs digestives ou les ulcères digestifs).

- cobimetinib,

- ibuprofén,

- anticogulant oral, héparine ou thrombolytiques quel que soit la dose (médicaments utilisés pour fluidifier le sang).

- anti-inflammatoires non stéroïdiens (médicaments utilisés dans le traitement de la douleur ou la fièvre),

- défrétilox (médicament utilisé pour traiter la surcharge en fer chronique),

- glucocorticoïdes (médicament utilisé pour traiter l'inflammation),

- amitriptyline, clomipramine, duloxétine, imipramine, millecigrap, oxipritin,

- pentoxifylline (médicament utilisé pour traiter une pathologie des artères des jambes ainsi que certains troubles neurologiques liés au vieillissement),

- inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (médicaments utilisés pour traiter la dépression ou les troubles anxieux).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avec récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament pour votre enfant.

### ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose avec des aliments, boissons et de l'alcool

La consommation d'alcool doit être évitée pendant le traitement en raison d'un risque augmenté de lésions au niveau gastro-intestinal.

### Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Grossesse

Ce médicament contient de l'aspirine (acide acétylsalicylique). Ne prendre AUCUN AUTRE médicaments contenant de l'aspirine (y compris les médicaments sans ordonnance).

**Jusqu'à 100 mg par jour :** pendant toute la grossesse, si nécessaire, votre médecin spécialiste peut être amené à vous prescrire de l'aspirine à faible doses (inférieures ou égales à 100 mg par jour), dans des circonstances exceptionnelles nécessitant une surveillance spécialisée. Si tel est le cas, il est très important de respecter scrupuleusement l'ordonnance de votre médecin, sans dépasser les doses prescrites.

**Entre 100 et 500mg par jour :** par mesure de précaution, les recommandations ci-dessous s'appliquent, sauf prescription contraire de votre médecin spécialiste.

#### • A partir de 500 mg par jour :

**Avant le début du 6ème mois de grossesse** (jusqu'à la 24ème semaine d'aménorrhée), vous ne devez pas prendre ce médicament, sauf en cas d'absolue nécessité déterminée par votre médecin, en raison du risque potentiel de fausses couches ou de malformations. Dans ce cas, la dose devra être la plus faible possible et la durée du traitement la plus courte possible.

**À partir du début du 6ème mois jusqu'à la fin de la grossesse** (à partir de la 24ème semaine d'aménorrhée), ce médicament est contre-indiqué, vous ne devez EN AUCUN CAS prendre ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves voire fatales, notamment sur le cœur, les poumons et/ou les reins, et cela même avec une seule prise.

Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte, parlez-en immédiatement à votre gynécologue obstétricien, afin qu'une surveillance adaptée vous soit proposée si nécessaire.

### Allaitement

L'aspirine passant dans le lait maternel, ce médicament est déconseillé pendant l'allaitement.


**ASPÉGIC 100MG  
SACHETS B20**

P.P.V : 21DH80



6 118000 061113

4000437-01



# ASPÉGIC NOURRISSONS 100mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si votre enfant se sent moins bien après 3 jours.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

## 1. QU'EST-CE QUE ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique : AUTRES ANALGÉSIQUES ET ANTIPIRÉTIQUES.

Code ATC : N02BA01.

Ce médicament contient de l'aspirine. L'aspirine appartient à la famille des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens.

L'aspirine peut être utilisée pour calmer la douleur (antalgique), faire baisser la fièvre (anti-pyrétique) et/ou diminuer l'inflammation.

ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose contient 100 mg d'aspirine. Il est utilisé :

- en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires ou courbatures,
- dans le traitement de certaines affections rhumatismales.

Ce dosage est réservé aux nourrissons et aux enfants pesant entre 6 et 22 kg (soit environ de 3 mois à 7 ans).

Pour les enfants ayant un poids différent, il existe d'autres présentations d'aspirine dont le dosage est plus adapté. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant d'utiliser ce médicament.

## Ne prenez jamais ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose :

- Si votre enfant est allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si votre enfant est allergique à un médicament de la même famille que l'aspirine (les anti-inflammatoires non stéroïdiens).

- Si vous êtes enceinte, à partir du début du 6ème mois de grossesse (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100mg par jour.

- Si votre enfant a déjà eu de l'asthme ou des polypes nasaux associés à un asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'un médicament de la même famille.

- Si votre enfant souffre actuellement d'un ulcère de l'estomac ou duodénum.
- Si votre enfant a déjà eu une hémorragie ou une perforation au niveau de l'estomac après avoir pris de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les

anti-inflammatoires non stéroïdiens).

- Si votre enfant a des saignements ou si votre médecin a identifié chez lui des risques de saignements.
- Si votre enfant a une maladie grave du foie, des reins ou du cœur.

- Si votre enfant prend un autre médicament, assurez-vous que l'association avec ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose n'est pas contre-indiquée (voir le paragraphe "Autres médicaments et ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose").

- Si votre enfant est atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.

**EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### Avertissements et précautions

#### Avant d'utiliser ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.

ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose est disponible sans ordonnance. Toutefois, vous devez consulter votre médecin avant de donner ce médicament à votre enfant en cas de :

- maladies rhumatismales;
- maladie héréditaire des globules rouges, également appelée déficit en G6PD (car des doses élevées d'aspirine peuvent provoquer une destruction des globules rouges);

- antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum ou une inflammation de l'estomac (gastrite);

- antécédents de saignements digestifs ( vomissements de sang ou présence de sang dans les selles);

- maladie des reins ou du foie;

- règles abondantes;

- si votre enfant suit déjà un autre traitement anti-inflammatoire ou anticoagulant (référez-vous au paragraphe "Autres médicaments et ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose" pour avoir plus de détails);

- maladie virale, en particulier varicelle ou syndrome grippal : des cas de syndrome de Reye (maladie rare, très grave associant principalement troubles neurologiques et atteintes du foie) ont été observés chez des enfants présentant une maladie virale et recevant de l'aspirine.

Si votre enfant a moins d'un mois, vous devez d'abord consulter votre médecin avant d'utiliser un médicament contenant de l'aspirine, quel que soit le dosage.

### Pendant le traitement chez l'enfant

Le dosage est adapté pour l'enfant entre 6 kg et 22 kg. Pour les enfants pesant moins de 6 kg ou plus de 22 kg, il existe d'autres présentations d'aspirine dont le dosage est plus

ad  
Pe  
• c  
tra  
AS  
• c  
au  
co  
d'  
NC

à votre pharmacien.  
**Édeci si votre enfant a :**  
- misessements, arrêtez le  
yphie."Avant d'utiliser  
en sachet-dose",  
e survenus de ces effets  
sonnes de faible poids  
stomat et en cas  
édicamente et ASPÉGIC  
et-dose".

• une crise d'aspirine. Cela peut être le signe d'une allergie à l'aspirine ou à un  
anti-inflammatoire non stéroïdiens.

En cas d'administration prolongée de fortes doses d'antalgiques, vous ne devez pas augmenter les doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS en cas de mal de tête.

L'utilisation régulière de médicaments soulageant la douleur peut conduire à des complications rénales.

**Si votre enfant doit subir une opération**

4000437-01

L'aspirine augmente les risques de saignements même à de très faibles doses, et ce même lorsque la prise de ce médicament date de plusieurs jours.

Prévenez votre médecin traitant, votre chirurgien, l'anesthésiste ou votre dentiste de l'utilisation de ce médicament, si votre enfant doit subir une opération ou une intervention, même mineure.

### Analyses de sang

Prévenez votre médecin si votre enfant doit faire une prise de sang car l'aspirine peut modifier le taux d'acide urique dans le sang.

### Autres médicaments et ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

Ce médicament contient de l'aspirine.

Votre enfant ne doit pas prendre en même temps un autre médicament contenant de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (également appelée les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme par exemple l'ibuprofène). L'association de ces médicaments à ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose pourrait entraîner un surdosage et augmenter ainsi le risque d'effets indésirables.

Lisez attentivement les notices des autres médicaments que votre enfant prend afin de vous assurer que ces médicaments ne contiennent pas d'aspirine ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens.

### Ne donnez jamais de fortes doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (voir le paragraphe "Posologie") :

- Si votre enfant prend des doses supérieures à 20 mg/semaine de méthotrexate (médicament utilisé pour traiter certains cancers et certains rhumatismes).

- Si votre enfant prend un anticoagulant par voie orale (médicament utilisé pour fluidifier le sang) et qu'il a un antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

**Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas donner :**

#### • de fortes doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (voir le paragraphe "Posologie") si votre enfant prend déjà :

- un anticoagulant oral ou une héparine (médicaments utilisés pour fluidifier le sang),
- un anti-inflammatoire non stéroïdiens ou un corticoïde (médicaments utilisés pour traiter une maladie rhumatismales, des douleurs ou une inflammation).

#### • de faibles doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (50 à 375 mg par jour) si votre enfant prend déjà :

- un anticoagulant par voie orale (médicament utilisé pour fluidifier le sang) et qu'il a un antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

#### • ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose quelle que soit la dose, si votre enfant prend déjà un médicament à base de :

- ticlopide ou clopidogrel (médicaments utilisés pour fluidifier le sang),
- benzborazona ou probénécide (médicaments utilisés pour traiter la goutte),
- lévothyroxine (médicament utilisé pour traiter une insuffisance de sécrétion de la glande thyroïde).

- pérémexide (médicament pour traiter certains cancers),
- analgrélique (médicament utilisé pour diminuer le nombre de plaquettes dans le sang),
- défrétilotide (médicament utilisé pour le traitement d'une maladie dans laquelle les vaisseaux sanguins du foie sont endommagés et obstrués par des caillots sanguins),
- acétozolamide (médicament utilisé pour diminuer la pression au niveau de l'œil ou le taux de gaz carbonique dans le sang).

- ticagrél (médicament utilisé pour empêcher l'agrégation des plaquettes),
- Vaccin contre la varicelle : il est recommandé d'attendre 6 semaines après la vaccination avant de prendre ce médicament.

- nicorandil (médicament utilisé pour traiter l'angine de poitrine)

**Informez votre médecin si vous prenez un médicament à base de :**

- l'acétozolamide,
- antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II, diurétiques ou inhibiteurs de l'enzyme

de conversion (médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle).

- méthotrexate à des doses inférieures ou égales à 20 mg/semaine (médicament utilisé pour traiter certains cancers).

- topiques gastro-intestinaux, antiacides et adsorbants (médicaments utilisés pour traiter les douleurs digestives ou les ulcères digestifs).

- cobimetinib,

- ibuprofén,

- anticogulant oral, héparine ou thrombolytiques quel que soit la dose (médicaments utilisés pour fluidifier le sang),

- anti-inflammatoires non stéroïdiens (médicaments utilisés dans le traitement de la douleur ou la fièvre),

- défrétilox (médicament utilisé pour traiter la surcharge en fer chronique),

- glucocorticoïdes (médicament utilisé pour traiter l'inflammation),

- amitriptyline, clomipramine, duloxétine, imipramine, milacipran, oxiprotriptyn, venlafaxine (médicaments utilisés pour traiter la dépression ou l'anxiété),

- pentoxifylline (médicament utilisé pour traiter une pathologie des artères des jambes ainsi que certains troubles neurologiques liés au vieillissement),

- inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (médicaments utilisés pour traiter la dépression ou les troubles anxieux).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avec récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament pour votre enfant.

### ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose avec des aliments, boissons et de l'alcool

La consommation d'alcool doit être évitée pendant le traitement en raison d'un risque augmenté de lésions au niveau gastro-intestinal.

### Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Grossesse

Ce médicament contient de l'aspirine (acide acétylsalicylique). Ne prendre AUCUN AUTRE médicaments contenant de l'aspirine (y compris les médicaments sans ordonnance).

**Jusqu'à 100 mg par jour :** pendant toute la grossesse, si nécessaire, votre médecin spécialiste peut être amené à vous prescrire de l'aspirine à faible doses (inférieures ou égales à 100 mg par jour), dans des circonstances exceptionnelles nécessitant une surveillance spécialisée. Si tel est le cas, il est très important de respecter scrupuleusement l'ordonnance de votre médecin, sans dépasser les doses prescrites.

**Entre 100 et 500mg par jour :** par mesure de précaution, les recommandations ci-dessous s'appliquent, sauf prescription contraire de votre médecin spécialiste.

#### • A partir de 500 mg par jour :


**- Avant le début du 6ème mois de grossesse** (jusqu'à la 24ème semaine d'aménorrhée), vous ne devez pas prendre ce médicament, sauf en cas d'absolue nécessité déterminée par votre médecin, en raison du risque potentiel de fausses couches ou de malformations. Dans ce cas, la dose devra être la plus faible possible et la durée du traitement la plus courte possible.

**- A partir du début du 6ème mois jusqu'à la fin de la grossesse** (à partir de la 24ème semaine d'aménorrhée), ce médicament est contre-indiqué, vous ne devez pas EN AUCUN CAS prendre ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves voire fatales, notamment sur le cœur, les poumons et/ou les reins, et cela même avec une seule prise.

Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte, parlez-en immédiatement à votre gynécologue obstétricien, afin qu'une surveillance adaptée vous soit proposée si nécessaire.

### Allaitement

L'aspirine passant dans le lait maternel, ce médicament est déconseillé pendant l'allaitement.



# ASPÉGIC NOURRISSONS 100mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si votre enfant se sent moins bien après 3 jours.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

## 1. QU'EST-CE QUE ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique : AUTRES ANALGÉSIQUES ET ANTIPIRÉTIQUES.

Code ATC : N02BA01.

Ce médicament contient de l'aspirine. L'aspirine appartient à la famille des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens.

L'aspirine peut être utilisée pour calmer la douleur (antalgique), faire baisser la fièvre (anti-pyrétique) et/ou diminuer l'inflammation.

ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose contient 100 mg d'aspirine. Il est utilisé :

- en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires ou courbatures,
- dans le traitement de certaines affections rhumatismales.

Ce dosage est réservé aux nourrissons et aux enfants pesant entre 6 et 22 kg (soit environ de 3 mois à 7 ans).

Pour les enfants ayant un poids différent, il existe d'autres présentations d'aspirine dont le dosage est plus adapté. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant d'utiliser ce médicament.

## Ne prenez jamais ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose :

- Si votre enfant est allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si votre enfant est allergique à un médicament de la même famille que l'aspirine (les anti-inflammatoires non stéroïdiens).

- Si vous êtes enceinte, à partir du début du 6ème mois de grossesse (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100mg par jour.

- Si votre enfant a déjà eu de l'asthme ou des polypes nasaux associés à un asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'un médicament de la même famille.

- Si votre enfant souffre actuellement d'un ulcère de l'estomac ou duodénum.

- Si votre enfant a déjà eu une hémorragie ou une perforation au niveau de l'estomac après avoir pris de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les

anti-inflammatoires non stéroïdiens).

- Si votre enfant a des saignements ou si votre médecin a identifié chez lui des risques de saignements.

- Si votre enfant a une maladie grave du foie, des reins ou du cœur.

- Si votre enfant prend un autre médicament, assurez-vous que l'association avec ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose n'est pas contre-indiquée (voir le paragraphe "Autres médicaments et ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose").

- Si votre enfant est atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.

**EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### Avertissements et précautions

#### Avant d'utiliser ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.

ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose est disponible sans ordonnance. Toutefois, vous devez consulter votre médecin avant de donner ce médicament à votre enfant en cas de :

- maladies rhumatismales;
- maladie héréditaire des globules rouges, également appelée déficit en G6PD (car des doses élevées d'aspirine peuvent provoquer une destruction des globules rouges);
- antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum ou une inflammation de l'estomac (gastrite);

- antécédents de saignements digestifs ( vomissements de sang ou présence de sang dans les selles);
- maladie des reins ou du foie;
- règles abondantes;

- si votre enfant suit déjà un autre traitement anti-inflammatoire ou anticoagulant (référez-vous au paragraphe "Autres médicaments et ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose" pour avoir plus de détails);

- maladie virale, en particulier varicelle ou syndrome grippal : des cas de syndrome de Reye (maladie rare, très grave associant principalement troubles neurologiques et atteintes du foie) ont été observés chez des enfants présentant une maladie virale et recevant de l'aspirine.

Si votre enfant a moins d'un mois, vous devez d'abord consulter votre médecin avant d'utiliser un médicament contenant de l'aspirine, quel que soit le dosage.

### Pendant le traitement chez l'enfant

Le dosage est adapté pour l'enfant entre 6 kg et 22 kg. Pour les enfants pesant moins de 6 kg ou plus de 22 kg, il existe d'autres présentations d'aspirine dont le dosage est plus adapté.

**Edécin si votre enfant a :  
- vomissements, arrêtez le  
yphie."Avant d'utiliser  
en sachet-dose",  
- survenu de ces effets  
sonnes de faible poids  
stomat et en cas  
édicamente et ASPÉGIC  
et-dose".**

- une crise d'aspirine. Cela peut être le signe d'une allergie à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien.
- En cas d'administration prolongée de fortes doses d'antalgiques, vous ne devez pas augmenter les doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS en cas de mal de tête.
- L'utilisation régulière de médicaments soulageant la douleur peut conduire à des complications rénales.

**Si votre enfant doit subir une opération**

40004637-01

L'aspirine augmente les risques de saignements même à de très faibles doses, et ce même lorsque la prise de ce médicament date de plusieurs jours.

Prévenez votre médecin traitant, votre chirurgien, l'anesthésiste ou votre dentiste de l'utilisation de ce médicament, si votre enfant doit subir une opération ou une intervention, même mineure.

### Analyses de sang

Prévenez votre médecin si votre enfant doit faire une prise de sang car l'aspirine peut modifier le taux d'acide urique dans le sang.

### Autres médicaments et ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

Ce médicament contient de l'aspirine.

Votre enfant ne doit pas prendre en même temps un autre médicament contenant de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (également appelée les anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'ibuprofène). L'association de ces médicaments à ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose pourrait entraîner un surdosage et augmenter ainsi le risque d'effets indésirables.

Lisez attentivement les notices des autres médicaments que votre enfant prend afin de vous assurer que ces médicaments ne contiennent pas d'aspirine ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens.

### Ne donnez jamais de fortes doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (voir le paragraphe "Posologie") :

- Si votre enfant prend des doses supérieures à 20 mg/semaine de méthotrexate (médicament utilisé pour traiter certains cancers et certains rhumatismes).

- Si votre enfant prend un anticoagulant par voie orale (médicament utilisé pour fluidifier le sang) et qu'il a un antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

**Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas donner :**

#### • de fortes doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (voir le paragraphe "Posologie") si votre enfant prend déjà :

- un anticoagulant oral ou une héparine (médicaments utilisés pour fluidifier le sang),
- un anti-inflammatoire non stéroïdien ou un corticoïde (médicaments utilisés pour traiter une maladie rhumatismales, des douleurs ou une inflammation).

#### • de faibles doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (50 à 375 mg par jour) si votre enfant prend déjà :

- un anticoagulant par voie orale (médicament utilisé pour fluidifier le sang) et qu'il a un antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

#### • ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose quelle que soit la dose, si votre enfant prend déjà un médicament à base de :

- ticlopide ou clopidogrel (médicaments utilisés pour fluidifier le sang),
- benzborazona ou probénécide (médicaments utilisés pour traiter la goutte),
- lévothyroxine (médicament utilisé pour traiter une insuffisance de sécrétion de la glande thyroïde).

- pérémexide (médicament pour traiter certains cancers),
- analgrélique (médicament utilisé pour diminuer le nombre de plaquettes dans le sang),
- défrétilotide (médicament utilisé pour le traitement d'une maladie dans laquelle les vaisseaux sanguins du foie sont endommagés et obstrués par des caillots sanguins),
- acétozolamide (médicament utilisé pour diminuer la pression au niveau de l'œil ou le taux de gaz carbonique dans le sang).

- ticagrelor (médicament utilisé pour empêcher l'agrégation des plaquettes),
- Vaccin contre la varicelle : il est recommandé d'attendre 6 semaines après la vaccination avant de prendre ce médicament.

- nicorandil (médicament utilisé pour traiter l'angine de poitrine)

#### Informez votre médecin si vous prenez un médicament à base de :

- l'acétozolamide,
- antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II, diurétiques ou inhibiteurs de l'enzyme

de conversion (médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle),

- méthotrexate à des doses inférieures ou égales à 20 mg/semaine (médicament utilisé pour traiter certains cancers).

- topiques gastro-intestinaux, antiacides et adsorbants (médicaments utilisés pour traiter les douleurs digestives ou les ulcères digestifs).

- cobimetinib,

- ibuprofén,

- anticogulant oral, héparine ou thrombolytiques quel que soit la dose (médicaments utilisés pour fluidifier le sang).

- anti-inflammatoires non stéroïdiens (médicaments utilisés dans le traitement de la douleur ou la fièvre),

- défrétilox (médicament utilisé pour traiter la surcharge en fer chronique),

- glucocorticoïdes (médicament utilisé pour traiter l'inflammation),

- amitriptyline, clomipramine, duloxétine, imipramine, milacipran, oxiprotriptyn, venlafaxine (médicaments utilisés pour traiter la dépression ou l'anxiété),

- pentoxifylline (médicament utilisé pour traiter une pathologie des artères des jambes ainsi que certains troubles neurologiques liés au vieillissement),

- inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (médicaments utilisés pour traiter la dépression ou les troubles anxieux).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avec récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament pour votre enfant.

### ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose avec des aliments, boissons et de l'alcool

La consommation d'alcool doit être évitée pendant le traitement en raison d'un risque augmenté de lésions au niveau gastro-intestinal.

### Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Grossesse

Ce médicament contient de l'aspirine (acide acétylsalicylique). Ne prendre AUCUN AUTRE médicaments contenant de l'aspirine (y compris les médicaments sans ordonnance).

**Jusqu'à 100 mg par jour** : pendant toute la grossesse, si nécessaire, votre médecin spécialiste peut être amené à vous prescrire de l'aspirine à faible doses (inférieures ou égales à 100 mg par jour), dans des circonstances exceptionnelles nécessitant une surveillance spécialisée. Si tel est le cas, il est très important de respecter scrupuleusement l'ordonnance de votre médecin, sans dépasser les doses prescrites.

**Entre 100 et 500mg par jour** : pour mesure de précaution, les recommandations ci-dessous s'appliquent, sauf prescription contraire de votre médecin spécialiste.

#### • A partir de 500 mg par jour :


- Avant le début du 6ème mois de grossesse (jusqu'à la 24ème semaine d'aménorrhée), vous ne devez pas prendre ce médicament, sauf en cas d'absolue nécessité déterminée par votre médecin, en raison du risque potentiel de fausses couches ou de malformations. Dans ce cas, la dose devra être la plus faible possible et la durée du traitement la plus courte possible.

- A partir du début du 6ème mois jusqu'à la fin de la grossesse** (à partir de la 24ème semaine d'aménorrhée), ce médicament est contre-indiqué, vous ne devez pas EN AUCUN CAS prendre ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves voire fatales, notamment sur le cœur, les poumons et/ou les reins, et cela même avec une seule prise.

Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte, parlez-en immédiatement à votre gynécologue obstétricien, afin qu'une surveillance adaptée vous soit proposée si nécessaire.

### Allaitement

L'aspirine passant dans le lait maternel, ce médicament est déconseillé pendant l'allaitement.



# ASPÉGIC NOURRISSONS 100mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si votre enfant se sent moins bien après 3 jours.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

## 1. QU'EST-CE QUE ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique : AUTRES ANALGÉSIQUES ET ANTIPIRÉTIQUES.

Code ATC : N02BA01.

Ce médicament contient de l'aspirine. L'aspirine appartient à la famille des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens.

L'aspirine peut être utilisée pour calmer la douleur (antalgique), faire baisser la fièvre (anti-pyrétique) et/ou diminuer l'inflammation.

ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose contient 100 mg d'aspirine. Il est utilisé :

- en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires ou courbatures,
- dans le traitement de certaines affections rhumatismales.

Ce dosage est réservé aux nourrissons et aux enfants pesant entre 6 et 22 kg (soit environ de 3 mois à 7 ans).

Pour les enfants ayant un poids différent, il existe d'autres présentations d'aspirine dont le dosage est plus adapté. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant d'utiliser ce médicament.

## Ne prenez jamais ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose :

- Si votre enfant est allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si votre enfant est allergique à un médicament de la même famille que l'aspirine (les anti-inflammatoires non stéroïdiens).

- Si vous êtes enceinte, à partir du début du 6ème mois de grossesse (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100mg par jour.

- Si votre enfant a déjà eu de l'asthme ou des polypes nasaux associés à un asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'un médicament de la même famille.

- Si votre enfant souffre actuellement d'un ulcère de l'estomac ou duodénum.

- Si votre enfant a déjà eu une hémorragie ou une perforation au niveau de l'estomac après avoir pris de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les

anti-inflammatoires non stéroïdiens).

- Si votre enfant a des saignements ou si votre médecin a identifié chez lui des risques de saignements.

- Si votre enfant a une maladie grave du foie, des reins ou du cœur.

- Si votre enfant prend un autre médicament, assurez-vous que l'association avec ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose n'est pas contre-indiquée (voir le paragraphe "Autres médicaments et ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose").

- Si votre enfant est atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.

**EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### Avertissements et précautions

#### Avant d'utiliser ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.

ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose est disponible sans ordonnance. Toutefois, vous devez consulter votre médecin avant de donner ce médicament à votre enfant en cas de :

- maladie rhumatismales;
- maladie héréditaire des globules rouges, également appelée déficit en G6PD (car des doses élevées d'aspirine peuvent provoquer une destruction des globules rouges);

- antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum ou une inflammation de l'estomac (gastrite);

- antécédents de saignements digestifs ( vomissements de sang ou présence de sang dans les selles);

- maladie des reins ou du foie;
- règles abondantes;

- si votre enfant suit déjà un autre traitement anti-inflammatoire ou anticoagulant (réferez-vous au paragraphe "Autres médicaments et ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose" pour avoir plus de détails);

- maladie virale, en particulier varicelle ou syndrome grippal : des cas de syndrome de Reye (maladie rare, très grave associant principalement troubles neurologiques et atteintes du foie) ont été observés chez des enfants présentant une maladie virale et recevant de l'aspirine.

Si votre enfant a moins d'un mois, vous devez d'abord consulter votre médecin avant d'utiliser un médicament contenant de l'aspirine, quel que soit le dosage.

### Pendant le traitement chez l'enfant

Le dosage est adapté pour l'enfant entre 6 kg et 22 kg. Pour les enfants pesant moins de 6 kg ou plus de 22 kg, il existe d'autres présentations d'aspirine dont le dosage est plus

ad  
Pe  
• c  
tra  
AS  
• c  
au  
co  
d'  
NC

**ASPÉGIC 100MG  
SACHETS B20**

P.P.V : 21DH80



6 118000 061113

une crise d'aspirine. Cela peut être le signe d'une allergie à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïdiens.

En cas d'administration prolongée de fortes doses d'antalgiques, vous ne devez pas augmenter les doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS en cas de mal de tête.

L'utilisation régulière de médicaments soulageant la douleur peut conduire à des complications rénales.

**Si votre enfant doit subir une opération**

L'aspirine augmente les risques de saignements même à de très faibles doses, et ce même lorsque la prise de ce médicament date de plusieurs jours.

Prévenez votre médecin traitant, votre chirurgien, l'anesthésiste ou votre dentiste de l'utilisation de ce médicament, si votre enfant doit subir une opération ou une intervention, même mineure.

### Analyses de sang

Prévenez votre médecin si votre enfant doit faire une prise de sang car l'aspirine peut modifier le taux d'acide urique dans le sang.

### Autres médicaments et ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

Ce médicament contient de l'aspirine.

Votre enfant ne doit pas prendre en même temps un autre médicament contenant de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (également appelée les anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'ibuprofène). L'association de ces médicaments à ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose pourrait entraîner un surdosage et augmenter ainsi le risque d'effets indésirables.

Lisez attentivement les notices des autres médicaments que votre enfant prend afin de vous assurer que ces médicaments ne contiennent pas d'aspirine ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens.

### Ne donnez jamais de fortes doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (voir le paragraphe "Posologie") :

- Si votre enfant prend des doses supérieures à 20 mg/semaine de méthotrexate (médicament utilisé pour traiter certains cancers et certains rhumatismes).

- Si votre enfant prend un anticoagulant par voie orale (médicament utilisé pour fluidifier le sang) et qu'il a un antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

**Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas donner :**

#### • de fortes doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (voir le paragraphe "Posologie") si votre enfant prend déjà :

- un anticoagulant oral ou une héparine (médicaments utilisés pour fluidifier le sang),
- un anti-inflammatoire non stéroïdiens ou un corticoïde (médicaments utilisés pour traiter une maladie rhumatismales, des douleurs ou une inflammation).

#### • de faibles doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (50 à 375 mg par jour) si votre enfant prend déjà :

- un anticoagulant par voie orale (médicament utilisé pour fluidifier le sang) et qu'il a un antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

#### • ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose quelle que soit la dose, si votre enfant prend déjà un médicament à base de :

- ticlopide ou clopidogrel (médicaments utilisés pour fluidifier le sang),
- benz bromarone ou probénécide (médicaments utilisés pour traiter la goutte),
- lévothYROxine (médicament utilisé pour traiter une insuffisance de sécrétion de la glande thyroïde).

- pérhéroxide (médicament pour traiter certains cancers),
- analgésique (médicament utilisé pour diminuer le nombre de plaquettes dans le sang).

- défrétilotide (médicament utilisé pour le traitement d'une maladie dans laquelle les vaisseaux sanguins du foie sont endommagés et obstrués par des caillots sanguins),
- acétozolamide (médicament utilisé pour diminuer la pression au niveau de l'œil ou le taux de gaz carbonique dans le sang).

- ticagrelor (médicament utilisé pour empêcher l'agrégation des plaquettes).
- Vaccin contre la varicelle : il est recommandé d'attendre 6 semaines après la vaccination avant de prendre ce médicament.

- nicorandil (médicament utilisé pour traiter l'angine de poitrine).

**Informez votre médecin si vous prenez un médicament à base de :**

- l'acétozolamide,

- antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II, diurétiques ou inhibiteurs de l'enzyme

de conversion (médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle).

- méthotrexate à des doses inférieures ou égales à 20 mg/semaine (médicament utilisé pour traiter certains cancers).

- topiques gastro-intestinaux, antiacides et adsorbants (médicaments utilisés pour traiter les douleurs digestives ou les ulcères digestifs).

- cobimetinib,

- ibuprofén,

- anticogulant oral, héparine ou thrombolytiques quel que soit la dose (médicaments utilisés pour fluidifier le sang).

- anti-inflammatoires non stéroïdiens (médicaments utilisés dans le traitement de la douleur ou la fièvre),

- défrétilox (médicament utilisé pour traiter la surcharge en fer chronique),

- glucocorticoïdes (médicament utilisé pour traiter l'inflammation),

- amitriptyline, clomipramine, duloxétine, imipramine, milacipran, oxiprotriptine, venlafaxine (médicaments utilisés pour traiter la dépression ou l'anxiété),

- pentoxifylline (médicament utilisé pour traiter une pathologie des artères des jambes ainsi que certains troubles neurologiques liés au vieillissement),

- inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (médicaments utilisés pour traiter la dépression ou les troubles anxieux).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avec récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament pour votre enfant.

### ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose avec des aliments, boissons et d'alcool

La consommation d'alcool doit être évitée pendant le traitement en raison d'un risque augmenté de lésions au niveau gastro-intestinal.

### Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Grossesse

Ce médicament contient de l'aspirine (acide acétylsalicylique). Ne prendre AUCUN AUTRE médicament contenant de l'aspirine (y compris les médicaments sans ordonnance).

**Jusqu'à 100 mg par jour :** pendant toute la grossesse, si nécessaire, votre médecin spécialiste peut être amené à vous prescrire de l'aspirine à faible doses (inférieures ou égales à 100 mg par jour), dans des circonstances exceptionnelles nécessitant une surveillance spécialisée. Si tel est le cas, il est très important de respecter scrupuleusement l'ordonnance de votre médecin, sans dépasser les doses prescrites.

**Entre 100 et 500mg par jour :** par mesure de précaution, les recommandations ci-dessous s'appliquent, sauf prescription contraire de votre médecin spécialiste.

#### • A partir de 500 mg par jour :


**Avant le début du 6ème mois de grossesse** (jusqu'à la 24ème semaine d'aménorrhée), vous ne devez pas prendre ce médicament, sauf en cas d'absolue nécessité déterminée par votre médecin, en raison du risque potentiel de fausses couches ou de malformations. Dans ce cas, la dose devra être la plus faible possible et la durée du traitement la plus courte possible.

**À partir du début du 6ème mois jusqu'à la fin de la grossesse** (à partir de la 24ème semaine d'aménorrhée), ce médicament est contre-indiqué, vous ne devez pas EN AUCUN CAS prendre ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves voire fatales, notamment sur le cœur, les poumons et/ou les reins, et cela même avec une seule prise.

Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte, parlez-en immédiatement à votre gynécologue obstétricien, afin qu'une surveillance adaptée vous soit proposée si nécessaire.

### Allaitement

L'aspirine passant dans le lait maternel, ce médicament est déconseillé pendant l'allaitement.



# ASPÉGIC NOURRISSONS 100mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si votre enfant se sent moins bien après 3 jours.
- Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

## 1. QU'EST-CE QUE ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique : AUTRES ANALGÉSIQUES ET ANTIPIRÉTIQUES.

Code ATC : N02BA01.

Ce médicament contient de l'aspirine. L'aspirine appartient à la famille des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens.

L'aspirine peut être utilisée pour calmer la douleur (antalgique), faire baisser la fièvre (anti-pyrétique) et/ou diminuer l'inflammation.

ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose contient 100 mg d'aspirine. Il est utilisé :

- en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires ou courbatures,
- dans le traitement de certaines affections rhumatismales.

Ce dosage est réservé aux nourrissons et aux enfants pesant entre 6 et 22 kg (soit environ de 3 mois à 7 ans).

Pour les enfants ayant un poids différent, il existe d'autres présentations d'aspirine dont le dosage est plus adapté. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant d'utiliser ce médicament.

## Ne prenez jamais ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose :

- Si votre enfant est allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si votre enfant est allergique à un médicament de la même famille que l'aspirine (les anti-inflammatoires non stéroïdiens).

• Si vous êtes enceinte, à partir du début du 6ème mois de grossesse (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100mg par jour.

• Si votre enfant a déjà eu de l'asthme ou des polypes nasaux associés à un asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'un médicament de la même famille.

• Si votre enfant souffre actuellement d'un ulcère de l'estomac ou duodénum.

• Si votre enfant a déjà eu une hémorragie ou une perforation au niveau de l'estomac après avoir pris de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les

anti-inflammatoires non stéroïdiens).

- Si votre enfant a des saignements ou si votre médecin a identifié chez lui des risques de saignements.
- Si votre enfant a une maladie grave du foie, des reins ou du cœur.
- Si votre enfant prend un autre médicament, assurez-vous que l'association avec ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose n'est pas contre-indiquée (voir le paragraphe "Autres médicaments et ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose").
- Si votre enfant est atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.

**EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### Avertissements et précautions

#### Avant d'utiliser ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.

ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose est disponible sans ordonnance. Toutefois, vous devez consulter votre médecin avant de donner ce médicament à votre enfant en cas de :

- maladie rhumatismales;
- maladie héréditaire des globules rouges, également appelée déficit en G6PD (car des doses élevées d'aspirine peuvent provoquer une destruction des globules rouges);
- antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum ou une inflammation de l'estomac (gastrite);
- antécédents de saignements digestifs ( vomissements de sang ou présence de sang dans les selles);
- maladie des reins ou du foie;
- règles abondantes;
- si votre enfant suit déjà un autre traitement anti-inflammatoire ou anticoagulant (référez-vous au paragraphe "Autres médicaments et ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose" pour avoir plus de détails);
- maladie virale, en particulier varicelle ou syndrome grippal : des cas de syndrome de Reye (maladie rare, très grave associant principalement troubles neurologiques et atteintes du foie) ont été observés chez des enfants présentant une maladie virale et recevant de l'aspirine.

Si votre enfant a moins d'un mois, vous devez d'abord consulter votre médecin avant d'utiliser un médicament contenant de l'aspirine, quel que soit le dosage.

### Pendant le traitement chez l'enfant

Le dosage est adapté pour l'enfant entre 6 kg et 22 kg. Pour les enfants pesant moins de 6 kg ou plus de 22 kg, il existe d'autres présentations d'aspirine dont le dosage est plus

ad  
Pe  
• c  
tra  
AS  
• c  
au  
co  
d'  
NC

à votre pharmacien.  
**Édeci si votre enfant a :**

• malissements, arrêtez le  
yphie."Avant d'utiliser  
en sachet-dose",  
e survenu de ces effets  
sonnes de faible poids  
stomat et en cas  
édicamente et ASPÉGIC  
et-dose".

• une crise d'aspirine. Cela peut être le signe d'une allergie à l'aspirine ou à un  
anti-inflammatoire non stéroïdiens.

En cas d'administration prolongée de fortes doses d'antalgiques, vous ne devez pas augmenter les doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS en cas de mal de tête.

L'utilisation régulière de médicaments soulageant la douleur peut conduire à des complications rénales.

**Si votre enfant doit subir une opération**

L'aspirine augmente les risques de saignements même à de très faibles doses, et ce même lorsque la prise de ce médicament date de plusieurs jours.

Prévenez votre médecin traitant, votre chirurgien, l'anesthésiste ou votre dentiste de l'utilisation de ce médicament, si votre enfant doit subir une opération ou une intervention, même mineure.

### Analyses de sang

Prévenez votre médecin si votre enfant doit faire une prise de sang car l'aspirine peut modifier le taux d'acide urique dans le sang.

### Autres médicaments et ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

Ce médicament contient de l'aspirine.

Votre enfant ne doit pas prendre en même temps un autre médicament contenant de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (également appelée les anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'ibuprofène). L'association de ces médicaments à ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose pourrait entraîner un surdosage et augmenter ainsi le risque d'effets indésirables.

Lisez attentivement les notices des autres médicaments que votre enfant prend afin de vous assurer que ces médicaments ne contiennent pas d'aspirine ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens.

### Ne donnez jamais de fortes doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (voir le paragraphe "Posologie") :

• Si votre enfant prend des doses supérieures à 20 mg/semaine de méthotrexate (médicament utilisé pour traiter certains cancers et certains rhumatismes).

• Si votre enfant prend un anticoagulant par voie orale (médicament utilisé pour fluidifier le sang) et qu'il a un antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

**Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas donner :**

#### • de fortes doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (voir le paragraphe "Posologie") si votre enfant prend déjà :

• un anticoagulant oral ou une héparine (médicaments utilisés pour fluidifier le sang),

• un anti-inflammatoire non stéroïdiens ou un corticoïde (médicaments utilisés pour traiter une maladie rhumatismales, des douleurs ou une inflammation).

#### • de faibles doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (50 à 375 mg par jour) si votre enfant prend déjà :

• un anticoagulant par voie orale (médicament utilisé pour fluidifier le sang) et qu'il a un antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

#### • ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose quelle que soit la dose, si votre enfant prend déjà un médicament à base de :

• ticlopide ou clopidogrel (médicaments utilisés pour fluidifier le sang),

• benz bromazone ou probénécide (médicaments utilisés pour traiter la goutte),

• létovothroxine (médicament utilisé pour traiter une insuffisance de sécrétion de la glande thyroïde);

• pérémexide (médicament pour traiter certains cancers),

• analgrélique (médicament utilisé pour diminuer le nombre de plaquettes dans le sang),

• défrétilotide (médicament utilisé pour le traitement d'une maladie dans laquelle les vaisseaux sanguins du foie sont endommagés et obstrués par des caillots sanguins),

• acétozolamide (médicament utilisé pour diminuer la pression au niveau de l'œil ou le taux de gaz carbonique dans le sang),

• ticagrelor (médicament utilisé pour empêcher l'agrégation des plaquettes).

**Vaccin contre la varicelle :** il est recommandé d'attendre 6 semaines après la vaccination avant de prendre ce médicament.

- nicorandil (médicament utilisé pour traiter l'angine de poitrine)

**Informez votre médecin si vous prenez un médicament à base de :**

• l'acétozolamide,

• antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II, diurétiques ou inhibiteurs de l'enzyme

de conversion (médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle).

• méthotrexate à des doses inférieures ou égales à 20 mg/semaine (médicament utilisé pour traiter certains cancers).

• topiques gastro-intestinaux, antiacides et adsorbants (médicaments utilisés pour traiter les douleurs digestives ou les ulcères digestifs).

• cobimetinib,

• ibuprofén,

• anticogulant oral, héparine ou thrombolytiques quel que soit la dose (médicaments utilisés pour fluidifier le sang).

• anti-inflammatoires non stéroïdiens (médicaments utilisés dans le traitement de la douleur ou la fièvre),

• défrétilox (médicament utilisé pour traiter la surcharge en fer chronique),

• glucocorticoïdes (médicament utilisé pour traiter l'inflammation),

• amitriptyline, clomipramine, duloxétine, imipramine, milacipran, oxiprotriptyn, venlafaxine (médicaments utilisés pour traiter la dépression ou l'anxiété),

• pentoxifylline (médicament utilisé pour traiter une pathologie des artères des jambes ainsi que certains troubles neurologiques liés au vieillissement),

• inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (médicaments utilisés pour traiter la dépression ou les troubles anxieux).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avec récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament pour votre enfant.

### ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose avec des aliments, boissons et de l'alcool

La consommation d'alcool doit être évitée pendant le traitement en raison d'un risque augmenté de lésions au niveau gastro-intestinal.

### Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Grossesse

Ce médicament contient de l'aspirine (acide acétylsalicylique). Ne prendre AUCUN AUTRE médicaments contenant de l'aspirine (y compris les médicaments sans ordonnance).

• **Jusqu'à 100 mg par jour :** pendant toute la grossesse, si nécessaire, votre médecin spécialiste peut être amené à vous prescrire de l'aspirine à faible doses (inférieures ou égales à 100 mg par jour), dans des circonstances exceptionnelles nécessitant une surveillance spécialisée. Si tel est le cas, il est très important de respecter scrupuleusement l'ordonnance de votre médecin, sans dépasser les doses prescrites.

• **Entre 100 et 500mg par jour :** par mesure de précaution, les recommandations ci-dessous s'appliquent, sauf prescription contraire de votre médecin spécialiste.

#### • A partir de 500 mg par jour :

• Avant le début du 6ème mois de grossesse (jusqu'à la 24ème semaine d'aménorrhée), vous ne devez pas prendre ce médicament, sauf en cas d'absolue nécessité déterminée par votre médecin, en raison du risque potentiel de fausses couches ou de malformations. Dans ce cas, la dose devra être la plus faible possible et la durée du traitement la plus courte possible.

• **A partir du début du 6ème mois jusqu'à la fin de la grossesse** (à partir de la 24ème semaine d'aménorrhée), ce médicament est contre-indiqué, vous ne devez pas EN AUCUN CAS prendre ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves voire fatales, notamment sur le cœur, les poumons et/ou les reins, et cela même avec une seule prise.

Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte, parlez-en immédiatement à votre gynécologue obstétricien, afin qu'une surveillance adaptée vous soit proposée si nécessaire.

### Allaitement

L'aspirine passant dans le lait maternel, ce médicament est déconseillé pendant l'allaitement.



# ASPÉGIC NOURRISSONS 100mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si votre enfant se sent moins bien après 3 jours.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

## 1. QU'EST-CE QUE ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique : AUTRES ANALGÉSIQUES ET ANTIPIRÉTIQUES.

Code ATC : N02BA01.

Ce médicament contient de l'aspirine. L'aspirine appartient à la famille des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens.

L'aspirine peut être utilisée pour calmer la douleur (antalgique), faire baisser la fièvre (anti-pyrétique) et/ou diminuer l'inflammation.

ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose contient 100 mg d'aspirine. Il est utilisé :

- en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires ou courbatures,
- dans le traitement de certaines affections rhumatismales.

Ce dosage est réservé aux nourrissons et aux enfants pesant entre 6 et 22 kg (soit environ de 3 mois à 7 ans).

Pour les enfants ayant un poids différent, il existe d'autres présentations d'aspirine dont le dosage est plus adapté. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant d'utiliser ce médicament.

## Ne prenez jamais ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose :

- Si votre enfant est allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si votre enfant est allergique à un médicament de la même famille que l'aspirine (les anti-inflammatoires non stéroïdiens).

- Si vous êtes enceinte, à partir du début du 6ème mois de grossesse (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100mg par jour.

- Si votre enfant a déjà eu de l'asthme ou des polypes nasaux associés à un asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'un médicament de la même famille.

- Si votre enfant souffre actuellement d'un ulcère de l'estomac ou duodénum.

- Si votre enfant a déjà eu une hémorragie ou une perforation au niveau de l'estomac après avoir pris de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les

anti-inflammatoires non stéroïdiens).

- Si votre enfant a des saignements ou si votre médecin a identifié chez lui des risques de saignements.

- Si votre enfant a une maladie grave du foie, des reins ou du cœur.

- Si votre enfant prend un autre médicament, assurez-vous que l'association avec ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose n'est pas contre-indiquée (voir le paragraphe "Autres médicaments et ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose").

- Si votre enfant est atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.

**EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### Avertissements et précautions

#### Avant d'utiliser ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.

ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose est disponible sans ordonnance. Toutefois, vous devez consulter votre médecin avant de donner ce médicament à votre enfant en cas de :

- maladie rhumatismales;
- maladie héréditaire des globules rouges, également appelée déficit en G6PD (car des doses élevées d'aspirine peuvent provoquer une destruction des globules rouges);

- antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum ou une inflammation de l'estomac (gastrite);

- antécédents de saignements digestifs ( vomissements de sang ou présence de sang dans les selles);

- maladie des reins ou du foie;
- règles abondantes;

- si votre enfant suit déjà un autre traitement anti-inflammatoire ou anticoagulant (réferez-vous au paragraphe "Autres médicaments et ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose" pour avoir plus de détails);

- maladie virale, en particulier varicelle ou syndrome grippal : des cas de syndrome de Reye (maladie rare, très grave associant principalement troubles neurologiques et atteintes du foie) ont été observés chez des enfants présentant une maladie virale et recevant de l'aspirine.

Si votre enfant a moins d'un mois, vous devez d'abord consulter votre médecin avant d'utiliser un médicament contenant de l'aspirine, quel que soit le dosage.

### Pendant le traitement chez l'enfant

Le dosage est adapté pour l'enfant entre 6 kg et 22 kg. Pour les enfants pesant moins de 6 kg ou plus de 22 kg, il existe d'autres présentations d'aspirine dont le dosage est plus adapté.

**Edécin si votre enfant a :  
- malaises, arrêtez le  
yphie."Avant d'utiliser  
en sachet-dose",  
- survêne de ces effets  
sonnes de faible poids  
stomat et en cas  
édicamente et ASPÉGIC  
et-dose".**

• une crise d'aspirine. Cela peut être le signe d'une allergie à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien.

En cas d'administration prolongée de fortes doses d'antalgiques, vous ne devez pas augmenter les doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS en cas de mal de tête.

L'utilisation régulière de médicaments soulageant la douleur peut conduire à des complications rénales.

**Si votre enfant doit subir une opération**

L'aspirine augmente les risques de saignements même à de très faibles doses, et ce même lorsque la prise de ce médicament date de plusieurs jours.

Prévenez votre médecin traitant, votre chirurgien, l'anesthésiste ou votre dentiste de l'utilisation de ce médicament, si votre enfant doit subir une opération ou une intervention, même mineure.

### Analyses de sang

Prévenez votre médecin si votre enfant doit faire une prise de sang car l'aspirine peut modifier le taux d'acide urique dans le sang.

### Autres médicaments et ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

Ce médicament contient de l'aspirine.

Votre enfant ne doit pas prendre en même temps un autre médicament contenant de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (également appelée les anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'ibuprofène). L'association de ces médicaments à ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose pourrait entraîner un surdosage et augmenter ainsi le risque d'effets indésirables.

Lisez attentivement les notices des autres médicaments que votre enfant prend afin de vous assurer que ces médicaments ne contiennent pas d'aspirine ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens.

### Ne donnez jamais de fortes doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (voir le paragraphe "Posologie") :

- Si votre enfant prend des doses supérieures à 20 mg/semaine de méthotrexate (médicament utilisé pour traiter certains cancers et certains rhumatismes).

- Si votre enfant prend un anticoagulant par voie orale (médicament utilisé pour fluidifier le sang) et qu'il a un antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

**Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas donner :**

#### • de fortes doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (voir le paragraphe "Posologie") si votre enfant prend déjà :

- un anticoagulant oral ou une héparine (médicaments utilisés pour fluidifier le sang),

- un anti-inflammatoire non stéroïdien ou un corticoïde (médicaments utilisés pour traiter une maladie rhumatismales, des douleurs ou une inflammation).

#### • de faibles doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (50 à 375 mg par jour) si votre enfant prend déjà :

- un anticoagulant par voie orale (médicament utilisé pour fluidifier le sang) et qu'il a un antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

#### • ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose quelle que soit la dose, si votre enfant prend déjà un médicament à base de :

- ticlopide ou clopidogrel (médicaments utilisés pour fluidifier le sang),

- benz bromarone ou probénécide (médicaments utilisés pour traiter la goutte),

- létovothroxine (médicament utilisé pour traiter une insuffisance de sécrétion de la glande thyroïde),

- pérhexidine (médicament pour traiter certains cancers),

- analgésique (médicament utilisé pour diminuer le nombre de plaquettes dans le sang),

- défrétilotide (médicament utilisé pour le traitement d'une maladie dans laquelle les vaisseaux sanguins du foie sont endommagés et obstrués par des caillots sanguins),

- acétozolamide (médicament utilisé pour diminuer la pression au niveau de l'œil ou le taux de gaz carbonique dans le sang),

- ticagrelor (médicament utilisé pour empêcher l'agrégation des plaquettes).

**Vaccin contre la varicelle :** il est recommandé d'attendre 6 semaines après la vaccination avant de prendre ce médicament.

- nicorandil (médicament utilisé pour traiter l'angine de poitrine)

**Informez votre médecin si vous prenez un médicament à base de :**

- l'acétozolamide,

- antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II, diurétiques ou inhibiteurs de l'enzyme

de conversion (médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle).

- méthotrexate à des doses inférieures ou égales à 20 mg/semaine (médicament utilisé pour traiter certains cancers).

- topiques gastro-intestinaux, antiacides et adsorbants (médicaments utilisés pour traiter les douleurs digestives ou les ulcères digestifs).

- cobimetinib,

- ibuprofén,

- anticogulant oral, héparine ou thrombolytiques quel que soit la dose (médicaments utilisés pour fluidifier le sang).

- anti-inflammatoires non stéroïdiens (médicaments utilisés dans le traitement de la douleur ou la fièvre),

- défrétilotide (médicament utilisé pour traiter la surcharge en fer chronique),

- glucocorticoïdes (médicament utilisé pour traiter l'inflammation),

- amitriptyline, clomipramine, duloxétine, imipramine, milacipran, oxiprotriptine, venlafaxine (médicaments utilisés pour traiter la dépression ou l'anxiété),

- pentoxifylline (médicament utilisé pour traiter une pathologie des artères des jambes ainsi que certains troubles neurologiques liés au vieillissement),

- inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (médicaments utilisés pour traiter la dépression ou les troubles anxieux).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avec récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament pour votre enfant.

### ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose avec des aliments, boissons et d'alcool

La consommation d'alcool doit être évitée pendant le traitement en raison d'un risque augmenté de lésions au niveau gastro-intestinal.

### Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Grossesse

Ce médicament contient de l'aspirine (acide acétylsalicylique). Ne prendre AUCUN AUTRE médicaments contenant de l'aspirine (y compris les médicaments sans ordonnance).

**Jusqu'à 100 mg par jour :** pendant toute la grossesse, si nécessaire, votre médecin spécialiste peut être amené à vous prescrire de l'aspirine à faible doses (inférieures ou égales à 100 mg par jour), dans des circonstances exceptionnelles nécessitant une surveillance spécialisée. Si tel est le cas, il est très important de respecter scrupuleusement l'ordonnance de votre médecin, sans dépasser les doses prescrites.

**Entre 100 et 500mg par jour :** pour mesure de précaution, les recommandations ci-dessous s'appliquent, sauf prescription contraire de votre médecin spécialiste.

#### • A partir de 500 mg par jour :

**Avant le début du 6ème mois de grossesse** (jusqu'à la 24ème semaine d'aménorrhée), vous ne devez pas prendre ce médicament, sauf en cas d'absolue nécessité déterminée par votre médecin, en raison du risque potentiel de fausses couches ou de malformations. Dans ce cas, la dose devra être la plus faible possible et la durée du traitement la plus courte possible.

**À partir du début du 6ème mois jusqu'à la fin de la grossesse** (à partir de la 24ème semaine d'aménorrhée), ce médicament est contre-indiqué, vous ne devez pas EN AUCUN CAS prendre ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves voire fatales, notamment sur le cœur, les poumons et/ou les reins, et cela même avec une seule prise.

Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte, parlez-en immédiatement à votre gynécologue obstétricien, afin qu'une surveillance adaptée vous soit proposée si nécessaire.

### Allaitement

L'aspirine passant dans le lait maternel, ce médicament est déconseillé pendant l'allaitement.

**ASPÉGIC 100MG  
SACHETS B20**

P.P.V : 21DH80



4000437-01



# ASPÉGIC NOURRISSONS 100mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si votre enfant se sent moins bien après 3 jours.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

## 1. QU'EST-CE QUE ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique : AUTRES ANALGÉSIQUES ET ANTIPIRÉTIQUES.

Code ATC : N02BA01.

Ce médicament contient de l'aspirine. L'aspirine appartient à la famille des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens.

L'aspirine peut être utilisée pour calmer la douleur (antalgique), faire baisser la fièvre (anti-pyrétique) et/ou diminuer l'inflammation.

ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose contient 100 mg d'aspirine. Il est utilisé :

- en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires ou courbatures,
- dans le traitement de certaines affections rhumatismales.

Ce dosage est réservé aux nourrissons et aux enfants pesant entre 6 et 22 kg (soit environ de 3 mois à 7 ans).

Pour les enfants ayant un poids différent, il existe d'autres présentations d'aspirine dont le dosage est plus adapté. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant d'utiliser ce médicament.

## Ne prenez jamais ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose :

- Si votre enfant est allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si votre enfant est allergique à un médicament de la même famille que l'aspirine (les anti-inflammatoires non stéroïdiens).

- Si vous êtes enceinte, à partir du début du 6ème mois de grossesse (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100mg par jour.

- Si votre enfant a déjà eu de l'asthme ou des polypes nasaux associés à un asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'un médicament de la même famille.

- Si votre enfant souffre actuellement d'un ulcère de l'estomac ou duodénum.

- Si votre enfant a déjà eu une hémorragie ou une perforation au niveau de l'estomac après avoir pris de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les

anti-inflammatoires non stéroïdiens).

- Si votre enfant a des saignements ou si votre médecin a identifié chez lui des risques de saignements.

- Si votre enfant a une maladie grave du foie, des reins ou du cœur.

- Si votre enfant prend un autre médicament, assurez-vous que l'association avec ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose n'est pas contre-indiquée (voir le paragraphe "Autres médicaments et ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose").

- Si votre enfant est atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.

**EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### Avertissements et précautions

#### Avant d'utiliser ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.

ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose est disponible sans ordonnance. Toutefois, vous devez consulter votre médecin avant de donner ce médicament à votre enfant en cas de :

- maladie rhumatismales;
- maladie héréditaire des globules rouges, également appelée déficit en G6PD (car des doses élevées d'aspirine peuvent provoquer une destruction des globules rouges);

- antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum ou une inflammation de l'estomac (gastrite);

- antécédents de saignements digestifs ( vomissements de sang ou présence de sang dans les selles);

- maladie des reins ou du foie;
- règles abondantes;

- si votre enfant suit déjà un autre traitement anti-inflammatoire ou anticoagulant (réferez-vous au paragraphe "Autres médicaments et ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose" pour avoir plus de détails);

- maladie virale, en particulier varicelle ou syndrome grippal : des cas de syndrome de Reye (maladie rare, très grave associant principalement troubles neurologiques et atteintes du foie) ont été observés chez des enfants présentant une maladie virale et recevant de l'aspirine.

Si votre enfant a moins d'un mois, vous devez d'abord consulter votre médecin avant d'utiliser un médicament contenant de l'aspirine, quel que soit le dosage.

### Pendant le traitement chez l'enfant

Le dosage est adapté pour l'enfant entre 6 kg et 22 kg. Pour les enfants pesant moins de 6 kg ou plus de 22 kg, il existe d'autres présentations d'aspirine dont le dosage est plus adapté.

**Edécin si votre enfant a :  
- malaises, arrêtez le  
yphie."Avant d'utiliser  
en sachet-dose",  
- survêne de ces effets  
sonnes de faible poids  
stomat et en cas  
édicamente et ASPÉGIC  
et-dose".**

• une crise d'aspirine. Cela peut être le signe d'une allergie à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien.

En cas d'administration prolongée de fortes doses d'antalgiques, vous ne devez pas augmenter les doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS en cas de mal de tête.

L'utilisation régulière de médicaments soulageant la douleur peut conduire à des complications rénales.

**Si votre enfant doit subir une opération**

L'aspirine augmente les risques de saignements même à de très faibles doses, et ce même lorsque la prise de ce médicament date de plusieurs jours.

Prévenez votre médecin traitant, votre chirurgien, l'anesthésiste ou votre dentiste de l'utilisation de ce médicament, si votre enfant doit subir une opération ou une intervention, même mineure.

### Analyses de sang

Prévenez votre médecin si votre enfant doit faire une prise de sang car l'aspirine peut modifier le taux d'acide urique dans le sang.

### Autres médicaments et ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

Ce médicament contient de l'aspirine.

Votre enfant ne doit pas prendre en même temps un autre médicament contenant de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (également appelée les anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'ibuprofène). L'association de ces médicaments à ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose pourrait entraîner un surdosage et augmenter ainsi le risque d'effets indésirables.

Lisez attentivement les notices des autres médicaments que votre enfant prend afin de vous assurer que ces médicaments ne contiennent pas d'aspirine ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens.

### Ne donnez jamais de fortes doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (voir le paragraphe "Posologie") :

- Si votre enfant prend des doses supérieures à 20 mg/semaine de méthotrexate (médicament utilisé pour traiter certains cancers et certains rhumatismes).

- Si votre enfant prend un anticoagulant par voie orale (médicament utilisé pour fluidifier le sang) et qu'il a un antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

**Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas donner :**

#### • de fortes doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (voir le paragraphe "Posologie") si votre enfant prend déjà :

- un anticoagulant oral ou une héparine (médicaments utilisés pour fluidifier le sang),

- un anti-inflammatoire non stéroïdien ou un corticoïde (médicaments utilisés pour traiter une maladie rhumatismales, des douleurs ou une inflammation).

#### • de faibles doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (50 à 375 mg par jour) si votre enfant prend déjà :

- un anticoagulant par voie orale (médicament utilisé pour fluidifier le sang) et qu'il a un antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

#### • ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose quelle que soit la dose, si votre enfant prend déjà un médicament à base de :

- ticlopide ou clopidogrel (médicaments utilisés pour fluidifier le sang),

- benz bromarone ou probénécide (médicaments utilisés pour traiter la goutte),

- létovothroxine (médicament utilisé pour traiter une insuffisance de sécrétion de la glande thyroïde);

- pérémexide (médicament pour traiter certains cancers),

- analgrélique (médicament utilisé pour diminuer le nombre de plaquettes dans le sang),

- défrétilotide (médicament utilisé pour le traitement d'une maladie dans laquelle les vaisseaux sanguins du foie sont endommagés et obstrués par des caillots sanguins),

- acétozolamide (médicament utilisé pour diminuer la pression au niveau de l'œil ou le taux de gaz carbonique dans le sang),

- ticagrél (médicament utilisé pour empêcher l'agrégation des plaquettes).

**Vaccin contre la varicelle :** il est recommandé d'attendre 6 semaines après la vaccination avant de prendre ce médicament.

- nicorandil (médicament utilisé pour traiter l'angine de poitrine)

**Informez votre médecin si vous prenez un médicament à base de :**

- l'acétozolamide,

- antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II, diurétiques ou inhibiteurs de l'enzyme

de conversion (médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle).

- méthotrexate à des doses inférieures ou égales à 20 mg/semaine (médicament utilisé pour traiter certains cancers).

- topiques gastro-intestinaux, antiacides et adsorbants (médicaments utilisés pour traiter les douleurs digestives ou les ulcères digestifs).

- cobimetinib,

- ibritinib,

- anticogulant oral, héparine ou thrombolytiques quel que soit la dose (médicaments utilisés pour fluidifier le sang).

- anti-inflammatoires non stéroïdiens (médicaments utilisés dans le traitement de la douleur ou la fièvre),

- défrétilotide (médicament utilisé pour traiter la surcharge en fer chronique),

- glucocorticoïdes (médicament utilisé pour traiter l'inflammation),

- amitriptyline, clomipramine, duloxétine, imipramine, milacipran, oxiprtixine, venlafaxine (médicaments utilisés pour traiter la dépression ou l'anxiété),

- pentoxifylline (médicament utilisé pour traiter une pathologie des artères des jambes ainsi que certains troubles neurologiques liés au vieillissement),

- inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (médicaments utilisés pour traiter la dépression ou les troubles anxieux).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avec récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament pour votre enfant.

### ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose avec des aliments, boissons et de l'alcool

La consommation d'alcool doit être évitée pendant le traitement en raison d'un risque augmenté de lésions au niveau gastro-intestinal.

### Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Grossesse

Ce médicament contient de l'aspirine (acide acétylsalicylique). Ne prendre AUCUN AUTRE médicaments contenant de l'aspirine (y compris les médicaments sans ordonnance).

**Jusqu'à 100 mg par jour :** pendant toute la grossesse, si nécessaire, votre médecin spécialiste peut être amené à vous prescrire de l'aspirine à faible doses (inférieures ou égales à 100 mg par jour), dans des circonstances exceptionnelles nécessitant une surveillance spécialisée. Si tel est le cas, il est très important de respecter scrupuleusement l'ordonnance de votre médecin, sans dépasser les doses prescrites.

**Entre 100 et 500mg par jour :** pour mesure de précaution, les recommandations ci-dessous s'appliquent, sauf prescription contraire de votre médecin spécialiste.

#### • A partir de 500 mg par jour :

**Avant le début du 6ème mois de grossesse** (jusqu'à la 24ème semaine d'aménorrhée), vous ne devez pas prendre ce médicament, sauf en cas d'absolue nécessité déterminée par votre médecin, en raison du risque potentiel de fausses couches ou de malformations. Dans ce cas, la dose devra être la plus faible possible et la durée du traitement la plus courte possible.

**À partir du début du 6ème mois jusqu'à la fin de la grossesse** (à partir de la 24ème semaine d'aménorrhée), ce médicament est contre-indiqué, vous ne devez pas EN AUCUN CAS prendre ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves voire fatales, notamment sur le cœur, les poumons et/ou les reins, et cela même avec une seule prise.

Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte, parlez-en immédiatement à votre gynécologue obstétricien, afin qu'une surveillance adaptée vous soit proposée si nécessaire.

### Allaitement

L'aspirine passant dans le lait maternel, ce médicament est déconseillé pendant l'allaitement.

**ASPÉGIC 100MG  
SACHETS B20**

P.P.V : 21DH80



4000437-01



# ASPÉGIC NOURRISSONS 100mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si votre enfant se sent moins bien après 3 jours.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

## 1. QU'EST-CE QUE ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique : AUTRES ANALGÉSIQUES ET ANTIPIRÉTIQUES.

Code ATC : N02BA01.

Ce médicament contient de l'aspirine. L'aspirine appartient à la famille des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens.

L'aspirine peut être utilisée pour calmer la douleur (antalgique), faire baisser la fièvre (anti-pyrétique) et/ou diminuer l'inflammation.

ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose contient 100 mg d'aspirine. Il est utilisé :

- en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires ou courbatures,
- dans le traitement de certaines affections rhumatismales.

Ce dosage est réservé aux nourrissons et aux enfants pesant entre 6 et 22 kg (soit environ de 3 mois à 7 ans).

Pour les enfants ayant un poids différent, il existe d'autres présentations d'aspirine dont le dosage est plus adapté. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant d'utiliser ce médicament.

## Ne prenez jamais ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose :

- Si votre enfant est allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si votre enfant est allergique à un médicament de la même famille que l'aspirine (les anti-inflammatoires non stéroïdiens).

- Si vous êtes enceinte, à partir du début du 6ème mois de grossesse (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100mg par jour.

- Si votre enfant a déjà eu de l'asthme ou des polypes nasaux associés à un asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'un médicament de la même famille.

- Si votre enfant souffre actuellement d'un ulcère de l'estomac ou duodénum.

- Si votre enfant a déjà eu une hémorragie ou une perforation au niveau de l'estomac après avoir pris de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les

anti-inflammatoires non stéroïdiens).

- Si votre enfant a des saignements ou si votre médecin a identifié chez lui des risques de saignements.

- Si votre enfant a une maladie grave du foie, des reins ou du cœur.

- Si votre enfant prend un autre médicament, assurez-vous que l'association avec ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose n'est pas contre-indiquée (voir le paragraphe "Autres médicaments et ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose").

- Si votre enfant est atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.

**EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### Avertissements et précautions

#### Avant d'utiliser ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.

ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose est disponible sans ordonnance. Toutefois, vous devez consulter votre médecin avant de donner ce médicament à votre enfant en cas de :

- maladie rhumatismales;
- maladie héréditaire des globules rouges, également appelée déficit en G6PD (car des doses élevées d'aspirine peuvent provoquer une destruction des globules rouges);

- antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum ou une inflammation de l'estomac (gastrite);

- antécédents de saignements digestifs ( vomissements de sang ou présence de sang dans les selles);

- maladie des reins ou du foie;
- règles abondantes;

- si votre enfant suit déjà un autre traitement anti-inflammatoire ou anticoagulant (réferez-vous au paragraphe "Autres médicaments et ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose" pour avoir plus de détails);

- maladie virale, en particulier varicelle ou syndrome grippal : des cas de syndrome de Reye (maladie rare, très grave associant principalement troubles neurologiques et atteintes du foie) ont été observés chez des enfants présentant une maladie virale et recevant de l'aspirine.

Si votre enfant a moins d'un mois, vous devez d'abord consulter votre médecin avant d'utiliser un médicament contenant de l'aspirine, quel que soit le dosage.

### Pendant le traitement chez l'enfant

Le dosage est adapté pour l'enfant entre 6 kg et 22 kg. Pour les enfants pesant moins de 6 kg ou plus de 22 kg, il existe d'autres présentations d'aspirine dont le dosage est plus adapté.

**Edécin si votre enfant a :  
- malaises, arrêtez le  
yphie."Avant d'utiliser  
en sachet-dose",  
- survenu de ces effets  
sonnes de faible poids  
stomat et en cas  
édicamente et ASPÉGIC  
et-dose".**

• une crise d'aspirine. Cela peut être le signe d'une allergie à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien.

En cas d'administration prolongée de fortes doses d'antalgiques, vous ne devez pas augmenter les doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS en cas de mal de tête.

L'utilisation régulière de médicaments soulageant la douleur peut conduire à des complications rénales.

**Si votre enfant doit subir une opération**

L'aspirine augmente les risques de saignements même à de très faibles doses, et ce même lorsque la prise de ce médicament date de plusieurs jours.

Prévenez votre médecin traitant, votre chirurgien, l'anesthésiste ou votre dentiste de l'utilisation de ce médicament, si votre enfant doit subir une opération ou une intervention, même mineure.

### Analyses de sang

Prévenez votre médecin si votre enfant doit faire une prise de sang car l'aspirine peut modifier le taux d'acide urique dans le sang.

### Autres médicaments et ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

Ce médicament contient de l'aspirine.

Votre enfant ne doit pas prendre en même temps un autre médicament contenant de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (également appelée les anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'ibuprofène). L'association de ces médicaments à ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose pourrait entraîner un surdosage et augmenter ainsi le risque d'effets indésirables.

Lisez attentivement les notices des autres médicaments que votre enfant prend afin de vous assurer que ces médicaments ne contiennent pas d'aspirine ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens.

### Ne donnez jamais de fortes doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (voir le paragraphe "Posologie") :

- Si votre enfant prend des doses supérieures à 20 mg/semaine de méthotrexate (médicament utilisé pour traiter certains cancers et certains rhumatismes).

- Si votre enfant prend un anticoagulant par voie orale (médicament utilisé pour fluidifier le sang) et qu'il a un antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

**Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas donner :**

#### • de fortes doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (voir le paragraphe "Posologie") si votre enfant prend déjà :

- un anticoagulant oral ou une héparine (médicaments utilisés pour fluidifier le sang),

- un anti-inflammatoire non stéroïdien ou un corticoïde (médicaments utilisés pour traiter une maladie rhumatismales, des douleurs ou une inflammation).

#### • de faibles doses d'ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (50 à 375 mg par jour) si votre enfant prend déjà :

- un anticoagulant par voie orale (médicament utilisé pour fluidifier le sang) et qu'il a un antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

#### • ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose quelle que soit la dose, si votre enfant prend déjà un médicament à base de :

- ticlopide ou clopidogrel (médicaments utilisés pour fluidifier le sang),

- benz bromarone ou probénécide (médicaments utilisés pour traiter la goutte),

- létovothroxine (médicament utilisé pour traiter une insuffisance de sécrétion de la glande thyroïde),

- pérhexidine (médicament pour traiter certains cancers),

- analgésique (médicament utilisé pour diminuer le nombre de plaquettes dans le sang),

- défrétilotide (médicament utilisé pour le traitement d'une maladie dans laquelle les vaisseaux sanguins du foie sont endommagés et obstrués par des caillots sanguins),

- acétozolamide (médicament utilisé pour diminuer la pression au niveau de l'œil ou le taux de gaz carbonique dans le sang),

- ticagrelor (médicament utilisé pour empêcher l'agrégation des plaquettes).

**Vaccin contre la varicelle :** il est recommandé d'attendre 6 semaines après la vaccination avant de prendre ce médicament.

- nicorandil (médicament utilisé pour traiter l'angine de poitrine)

**Informez votre médecin si vous prenez un médicament à base de :**

- l'acétozolamide,

- antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II, diurétiques ou inhibiteurs de l'enzyme

de conversion (médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle).

- méthotrexate à des doses inférieures ou égales à 20 mg/semaine (médicament utilisé pour traiter certains cancers).

- topiques gastro-intestinaux, antiacides et adsorbants (médicaments utilisés pour traiter les douleurs digestives ou les ulcères digestifs).

- cobimetinib,

- ibuprofén,

- anticogulant oral, héparine ou thrombolytiques quel que soit la dose (médicaments utilisés pour fluidifier le sang).

- anti-inflammatoires non stéroïdiens (médicaments utilisés dans le traitement de la douleur ou la fièvre),

- défrétilotide (médicament utilisé pour traiter la surcharge en fer chronique),

- glucocorticoïdes (médicament utilisé pour traiter l'inflammation),

- amitriptyline, clomipramine, duloxétine, imipramine, milacipran, oxiprotriptine, venlafaxine (médicaments utilisés pour traiter la dépression ou l'anxiété),

- pentoxifylline (médicament utilisé pour traiter une pathologie des artères des jambes ainsi que certains troubles neurologiques liés au vieillissement),

- inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (médicaments utilisés pour traiter la dépression ou les troubles anxieux).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avec récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament pour votre enfant.

### ASPÉGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose avec des aliments, boissons et de l'alcool

La consommation d'alcool doit être évitée pendant le traitement en raison d'un risque augmenté de lésions au niveau gastro-intestinal.

### Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Grossesse

Ce médicament contient de l'aspirine (acide acétylsalicylique). Ne prendre AUCUN AUTRE médicaments contenant de l'aspirine (y compris les médicaments sans ordonnance).

**Jusqu'à 100 mg par jour :** pendant toute la grossesse, si nécessaire, votre médecin spécialiste peut être amené à vous prescrire de l'aspirine à faible doses (inférieures ou égales à 100 mg par jour), dans des circonstances exceptionnelles nécessitant une surveillance spécialisée. Si tel est le cas, il est très important de respecter scrupuleusement l'ordonnance de votre médecin, sans dépasser les doses prescrites.

**Entre 100 et 500mg par jour :** pour mesure de précaution, les recommandations ci-dessous s'appliquent, sauf prescription contraire de votre médecin spécialiste.

#### • A partir de 500 mg par jour :

**Avant le début du 6ème mois de grossesse** (jusqu'à la 24ème semaine d'aménorrhée), vous ne devez pas prendre ce médicament, sauf en cas d'absolue nécessité déterminée par votre médecin, en raison du risque potentiel de fausses couches ou de malformations. Dans ce cas, la dose devra être la plus faible possible et la durée du traitement la plus courte possible.

**À partir du début du 6ème mois jusqu'à la fin de la grossesse** (à partir de la 24ème semaine d'aménorrhée), ce médicament est contre-indiqué, vous ne devez pas EN AUCUN CAS prendre ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves voire fatales, notamment sur le cœur, les poumons et/ou les reins, et cela même avec une seule prise.

Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte, parlez-en immédiatement à votre gynécologue obstétricien, afin qu'une surveillance adaptée vous soit proposée si nécessaire.

### Allaitement

L'aspirine passant dans le lait maternel, ce médicament est déconseillé pendant l'allaitement.

**ASPÉGIC 100MG  
SACHETS B20**

P.P.V : 21DH80



6 118000 061113

4000437-01

# Omiz®

Oméprazole

## Microgranules gastrorésistants en gélule

### PRESENTATIONS :

**OMIZ® 20 mg** : Boîte de 7 gélules  
Boîte de 14 gélules  
Boîte de 28 gélules

**OMIZ® 10 mg** : Boîte de 7 gélules  
Boîte de 14 gélules  
Boîte de 28 gélules

### COMPOSITION :

**OMIZ® 20mg**  
Oméprazole..... 20 mg  
Excipients q.s.p..... 1 gélule  
Excipient à effet notoire : saccharose

### COMPOSITION :

**OMIZ® 10mg**  
Oméprazole..... 10 mg  
Excipients q.s.p..... 1 gélule  
Excipient à effet notoire : saccharose

### CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Inhibiteur de la pompe à protons (appareil digestif et métabolisme). Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

### INDICATIONS :

#### - Chez l'adulte :

- En association à une bithérapie antibiotique, éradication de Helicobacter pylori en cas de maladie ulcéreuse gastroduodénale,
- Ulcère duodénal évolutif,
- Ulcère gastrique évolutif,
- (Esophagite érosive ou ulcération symptomatique par reflux gastro-oesophagien,
- Traitement symptomatique du reflux gastro-oesophagien associé ou non à une oesophagite, en cas de résistance à la posologie de 10 mg d'oméprazole par jour,
- Traitement d'entretien des ulcères duodénaux chez les patients non infectés par Helicobacter pylori ou chez qui l'éradication n'a pas été possible,
- Traitement d'entretien des oesophagites par reflux gastro-oesophagien,
- Syndrome de Zollinger-Ellison,
- Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens lorsque la poursuite des anti-inflammatoires est indispensable,
- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients à risques (notamment âge supérieur à 65 ans, antécédent d'ulcère gastroduodenal) pour lesquels un traitement anti-inflammatoire est indispensable.

#### - Chez l'enfant à partir d'un an :

### CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des constitutants
- En association avec l'atazanavir associé

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE

### MISES EN GARDE / PRÉCAUTIONS

#### Mises en garde :

En raison de la présence de saccharose galactosé ou de déficit en sucrase-isom

#### Précautions d'emploi :

Utiliser ce médicament avec précaution  
EN CAS DE DOUCE NE PAS HESITER A

### INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS :

Avec l'atazanavir associé à ritonavir (médicament anti-infectieux). Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

81,40

du glucose et du

# Omiz®

Oméprazole

## Microgranules gastrorésistants en gélule

### PRESENTATIONS :

**OMIZ® 20 mg** : Boîte de 7 gélules  
Boîte de 14 gélules  
Boîte de 28 gélules

**OMIZ® 10 mg** : Boîte de 7 gélules  
Boîte de 14 gélules  
Boîte de 28 gélules

### COMPOSITION :

**OMIZ® 20mg**  
Oméprazole..... 20 mg  
Excipients q.s.p..... 1 gélule  
Excipient à effet notoire : saccharose

### COMPOSITION :

**OMIZ® 10mg**  
Oméprazole..... 10 mg  
Excipients q.s.p..... 1 gélule  
Excipient à effet notoire : saccharose

### CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Inhibiteur de la pompe à protons (appareil digestif et métabolisme). Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

### INDICATIONS :

#### - Chez l'adulte :

- En association à une bithérapie antibiotique, éradication de Helicobacter pylori en cas de maladie ulcéreuse gastroduodénale,
- Ulcère duodénal évolutif,
- Ulcère gastrique évolutif,
- (Esophagite érosive ou ulcération symptomatique par reflux gastro-oesophagien,
- Traitement symptomatique du reflux gastro-oesophagien associé ou non à une oesophagite, en cas de résistance à la posologie de 10 mg d'oméprazole par jour,
- Traitement d'entretien des ulcères duodénaux chez les patients non infectés par Helicobacter pylori ou chez qui l'éradication n'a pas été possible,
- Traitement d'entretien des oesophagites par reflux gastro-oesophagien,
- Syndrome de Zollinger-Ellison,
- Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens lorsque la poursuite des anti-inflammatoires est indispensable,
- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients à risques (notamment âge supérieur à 65 ans, antécédent d'ulcère gastroduodenal) pour lesquels un traitement anti-inflammatoire est indispensable.

#### - Chez l'enfant à partir d'un an :

### CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des constitutants
- En association avec l'atazanavir associé

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE

### MISES EN GARDE / PRÉCAUTIONS

#### Mises en garde :

En raison de la présence de saccharose galactosé ou de déficit en sucrase-isom

#### Précautions d'emploi :

Utiliser ce médicament avec précaution  
EN CAS DE DOUCE NE PAS HESITER A

### INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS :

Avec l'atazanavir associé à ritonavir (médicament anti-infectieux). Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

81,40

du glucose et du

# Omiz®

Oméprazole

## Microgranules gastrorésistants en gélule

### PRESENTATIONS :

**OMIZ® 20 mg** : Boîte de 7 gélules  
Boîte de 14 gélules  
Boîte de 28 gélules

**OMIZ® 10 mg** : Boîte de 7 gélules  
Boîte de 14 gélules  
Boîte de 28 gélules

### COMPOSITION :

**OMIZ® 20mg**  
Oméprazole..... 20 mg  
Excipients q.s.p..... 1 gélule  
Excipient à effet notoire : saccharose

### COMPOSITION :

**OMIZ® 10mg**  
Oméprazole..... 10 mg  
Excipients q.s.p..... 1 gélule  
Excipient à effet notoire : saccharose

### CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Inhibiteur de la pompe à protons (appareil digestif et métabolisme). Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

### INDICATIONS :

#### - Chez l'adulte :

- En association à une bithérapie antibiotique, éradication de Helicobacter pylori en cas de maladie ulcéreuse gastroduodénale,
- Ulcère duodénal évolutif,
- Ulcère gastrique évolutif,
- (Esophagite érosive ou ulcération symptomatique par reflux gastro-oesophagien,
- Traitement symptomatique du reflux gastro-oesophagien associé ou non à une oesophagite, en cas de résistance à la posologie de 10 mg d'oméprazole par jour,
- Traitement d'entretien des ulcères duodénaux chez les patients non infectés par Helicobacter pylori ou chez qui l'éradication n'a pas été possible,
- Traitement d'entretien des oesophagites par reflux gastro-oesophagien,
- Syndrome de Zollinger-Ellison,
- Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens lorsque la poursuite des anti-inflammatoires est indispensable,
- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients à risques (notamment âge supérieur à 65 ans, antécédent d'ulcère gastroduodenal) pour lesquels un traitement anti-inflammatoire est indispensable.

#### - Chez l'enfant à partir d'un an :

### CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des constitutants
- En association avec l'atazanavir associé

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE

### MISES EN GARDE / PRÉCAUTIONS

#### Mises en garde :

En raison de la présence de saccharose galactosé ou de déficit en sucrase-isom

#### Précautions d'emploi :

Utiliser ce médicament avec précaution  
EN CAS DE DOUCE NE PAS HESITER A

### INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS :

Avec l'atazanavir associé à ritonavir (médicament anti-infectieux). Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

81,40

du glucose et du

# Omiz®

Oméprazole

## Microgranules gastrorésistants en gélule

### PRESENTATIONS :

**OMIZ® 20 mg** : Boîte de 7 gélules  
Boîte de 14 gélules  
Boîte de 28 gélules

**OMIZ® 10 mg** : Boîte de 7 gélules  
Boîte de 14 gélules  
Boîte de 28 gélules

### COMPOSITION :

**OMIZ® 20mg**  
Oméprazole..... 20 mg  
Excipients q.s.p..... 1 gélule  
Excipient à effet notoire : saccharose

### COMPOSITION :

**OMIZ® 10mg**  
Oméprazole..... 10 mg  
Excipients q.s.p..... 1 gélule  
Excipient à effet notoire : saccharose

### CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Inhibiteur de la pompe à protons (appareil digestif et métabolisme). Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

### INDICATIONS :

#### - Chez l'adulte :

- En association à une bithérapie antibiotique, éradication de Helicobacter pylori en cas de maladie ulcéreuse gastroduodénale,
- Ulcère duodénal évolutif,
- Ulcère gastrique évolutif,
- (Esophagite érosive ou ulcération symptomatique par reflux gastro-oesophagien,
- Traitement symptomatique du reflux gastro-oesophagien associé ou non à une oesophagite, en cas de résistance à la posologie de 10 mg d'oméprazole par jour,
- Traitement d'entretien des ulcères duodénaux chez les patients non infectés par Helicobacter pylori ou chez qui l'éradication n'a pas été possible,
- Traitement d'entretien des oesophagites par reflux gastro-oesophagien,
- Syndrome de Zollinger-Ellison,
- Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens lorsque la poursuite des anti-inflammatoires est indispensable,
- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients à risques (notamment âge supérieur à 65 ans, antécédent d'ulcère gastroduodenal) pour lesquels un traitement anti-inflammatoire est indispensable.

#### - Chez l'enfant à partir d'un an :

### CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des constitutants
- En association avec l'atazanavir associé

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE

### MISES EN GARDE / PRÉCAUTIONS

#### Mises en garde :

En raison de la présence de saccharose galactosé ou de déficit en sucrase-isom

#### Précautions d'emploi :

Utiliser ce médicament avec précaution  
EN CAS DE DOUCE NE PAS HESITER A

### INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS :

Avec l'atazanavir associé à ritonavir (médicament anti-infectieux). Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

81,40

du glucose et du

# Omiz®

Oméprazole

## Microgranules gastrorésistants en gélule

### PRESENTATIONS :

**OMIZ® 20 mg** : Boîte de 7 gélules  
Boîte de 14 gélules  
Boîte de 28 gélules

**OMIZ® 10 mg** : Boîte de 7 gélules  
Boîte de 14 gélules  
Boîte de 28 gélules

### COMPOSITION :

**OMIZ® 20mg**  
Oméprazole..... 20 mg  
Excipients q.s.p..... 1 gélule  
Excipient à effet notoire : saccharose

### COMPOSITION :

**OMIZ® 10mg**  
Oméprazole..... 10 mg  
Excipients q.s.p..... 1 gélule  
Excipient à effet notoire : saccharose

### CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Inhibiteur de la pompe à protons (appareil digestif et métabolisme). Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

### INDICATIONS :

#### - Chez l'adulte :

- En association à une bithérapie antibiotique, éradication de Helicobacter pylori en cas de maladie ulcéreuse gastroduodénale,
- Ulcère duodénal évolutif,
- Ulcère gastrique évolutif,
- (Esophagite érosive ou ulcération symptomatique par reflux gastro-oesophagien,
- Traitement symptomatique du reflux gastro-oesophagien associé ou non à une oesophagite, en cas de résistance à la posologie de 10 mg d'oméprazole par jour,
- Traitement d'entretien des ulcères duodénaux chez les patients non infectés par Helicobacter pylori ou chez qui l'éradication n'a pas été possible,
- Traitement d'entretien des oesophagites par reflux gastro-oesophagien,
- Syndrome de Zollinger-Ellison,
- Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens lorsque la poursuite des anti-inflammatoires est indispensable,
- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients à risques (notamment âge supérieur à 65 ans, antécédent d'ulcère gastroduodenal) pour lesquels un traitement anti-inflammatoire est indispensable.

#### - Chez l'enfant à partir d'un an :

### CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des constitutants
- En association avec l'atazanavir associé

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE

### MISES EN GARDE / PRÉCAUTIONS

#### Mises en garde :

En raison de la présence de saccharose galactosé ou de déficit en sucrase-isom

#### Précautions d'emploi :

Utiliser ce médicament avec précaution  
EN CAS DE DOUCE NE PAS HESITER A

### INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS :

Avec l'atazanavir associé à ritonavir (médicament anti-infectieux). Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

81,40

du glucose et du

# Omiz®

Oméprazole

## Microgranules gastrorésistants en gélule

### PRESENTATIONS :

**OMIZ® 20 mg** : Boîte de 7 gélules  
Boîte de 14 gélules  
Boîte de 28 gélules

**OMIZ® 10 mg** : Boîte de 7 gélules  
Boîte de 14 gélules  
Boîte de 28 gélules

### COMPOSITION :

**OMIZ® 20mg**  
Oméprazole..... 20 mg  
Excipients q.s.p..... 1 gélule  
Excipient à effet notoire : saccharose

### COMPOSITION :

**OMIZ® 10mg**  
Oméprazole..... 10 mg  
Excipients q.s.p..... 1 gélule  
Excipient à effet notoire : saccharose

### CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Inhibiteur de la pompe à protons (appareil digestif et métabolisme). Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

### INDICATIONS :

#### - Chez l'adulte :

- En association à une bithérapie antibiotique, éradication de Helicobacter pylori en cas de maladie ulcéreuse gastroduodénale,
- Ulcère duodénal évolutif,
- Ulcère gastrique évolutif,
- (Esophagite érosive ou ulcération symptomatique par reflux gastro-oesophagien,
- Traitement symptomatique du reflux gastro-oesophagien associé ou non à une oesophagite, en cas de résistance à la posologie de 10 mg d'oméprazole par jour,
- Traitement d'entretien des ulcères duodénaux chez les patients non infectés par Helicobacter pylori ou chez qui l'éradication n'a pas été possible,
- Traitement d'entretien des oesophagites par reflux gastro-oesophagien,
- Syndrome de Zollinger-Ellison,
- Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens lorsque la poursuite des anti-inflammatoires est indispensable,
- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients à risques (notamment âge supérieur à 65 ans, antécédent d'ulcère gastroduodenal) pour lesquels un traitement anti-inflammatoire est indispensable.

#### - Chez l'enfant à partir d'un an :

### CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des constitutants
- En association avec l'atazanavir associé

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE

### MISES EN GARDE / PRÉCAUTIONS

#### Mises en garde :

En raison de la présence de saccharose galactosé ou de déficit en sucrase-isom

#### Précautions d'emploi :

Utiliser ce médicament avec précaution  
EN CAS DE DOUCE NE PAS HESITER A

### INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS :

Avec l'atazanavir associé à ritonavir (médicament anti-infectieux). Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

81,40

du glucose et du



## Dénomination du médicament :

Tareg® 40 mg

Tareg® 80 mg

Tareg® 160 mg

DCI : Valsartan

combinaison avec  
tolérez pas certains  
secondaires.  
Votre médecin peut  
patients après un  
Tareg ne doit être

## 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Tareg ?

Une hypertension artérielle, des lésions au niveau des reins et le cerveau et ne ressentir aucun symptôme de hypertension non

telles qu'une attaque cardiaque ou une insuffisance cardiaque. Ce médicament peut entraîner une conduite et l'aptitude à la conduire.

- Prévenez votre médecin si vous :
  - souffrez d'une maladie de cœur,
  - souffrez de voies respiratoires de forte dose en excès dans les 24 dernières heures,
  - Si vous présentez des symptômes de la langue (saignement, douleur), évitez de prendre Tareg. Dans ce cas, consultez votre médecin.

Il est important que vous suivez les instructions de votre médecin au début du traitement pour éviter les vomissements, de la nausée et de la diarrhée.

La prudence est recommandée lorsque vous prenez Tareg car il peut être un inhibiteur de l'ECA.

Si vous avez une hypertension artérielle, suivez votre traitement avec un autre médicament et modifiez les doses si nécessaire.

Si vous prenez Tareg avec certains médicaments, il peut être nécessaire de modifier la dose ou de prendre un autre médicament.

Si vous prenez Tareg avec certains médicaments, il peut être nécessaire de modifier la dose ou de prendre un autre médicament.

Si vous prenez Tareg avec certains médicaments, il peut être nécessaire de modifier la dose ou de prendre un autre médicament.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit.
- Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice ?
2. Qu'est-ce que tareg et dans quel cas est-il utilisé ?
3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre tareg ?
4. Comment prendre tareg ?
5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
6. Comment conserver tareg ?

### 1. Qu'est-ce que Tareg et dans quel cas est-il utilisé ?

Tareg contient une substance active régulant la pression artérielle de l'organisme. Il dilate les vaisseaux sanguins et réduit la pression artérielle. Votre médecin peut prescrire ce médicament en prenant votre tension artérielle. Tareg est utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle modérée chez les adultes ainsi que chez les adolescents de 6 à 18 ans.

Votre médecin peut aussi vous prescrire Tareg pour traiter l'insuffisance cardiaque légère ou modérée, la maladie du muscle cardiaque, le rendement



6 18001030316

TAREG 80 mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 131.50 DH

EXP  
LOT

02 2025  
BCXR2



## Dénomination du médicament :

Tareg® 40 mg

Tareg® 80 mg

Tareg® 160 mg

DCI : Valsartan

combinaison avec  
tolérez pas certains  
secondaires.  
Votre médecin peut  
patients après un  
Tareg ne doit être

## 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Tareg ?

Une hypertension artérielle, des lésions au niveau des reins et le cerveau et ne ressentir aucun symptôme de hypertension non

telles qu'une attaque cardiaque ou une insuffisance cardiaque. Ce médicament peut entraîner une conduite et l'aptitude à la conduire.

- Prévenez votre médecin si vous :
  - souffrez d'une maladie de cœur,
  - souffrez de voies respiratoires de forte dose en excès dans les 24 dernières heures,
  - Si vous présentez des symptômes de la langue (saignement, douleur), évitez de prendre Tareg. Dans ce cas, consultez votre médecin.

Il est important que vous suivez les instructions de votre médecin au début du traitement pour éviter les vomissements, de la nausée et de la diarrhée.

La prudence est recommandée lorsque vous prenez Tareg car il peut être un inhibiteur de l'ECA.

Si vous avez une hypertension artérielle, suivez votre traitement avec un autre médicament et modifiez les doses si nécessaire.

Si vous prenez Tareg avec certains médicaments, il peut être nécessaire de modifier la dose ou de prendre un autre médicament.

Si vous prenez Tareg avec certains médicaments, il peut être nécessaire de modifier la dose ou de prendre un autre médicament.

Si vous prenez Tareg avec certains médicaments, il peut être nécessaire de modifier la dose ou de prendre un autre médicament.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit.
- Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice ?
2. Qu'est-ce que tareg et dans quel cas est-il utilisé ?
3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre tareg ?
4. Comment prendre tareg ?
5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
6. Comment conserver tareg ?

### 1. Qu'est-ce que Tareg et dans quel cas est-il utilisé ?

Tareg contient une substance active régulant la pression artérielle de l'organisme. Il dilate les vaisseaux sanguins et réduit la pression artérielle. Votre médecin peut prescrire ce médicament en prenant votre tension artérielle. Tareg est utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle modérée chez les adultes ainsi que chez les adolescents de 6 à 18 ans.

Votre médecin peut aussi vous prescrire Tareg pour traiter l'insuffisance cardiaque légère ou modérée, la maladie du muscle cardiaque, le rendement



6 18001030316

TAREG 80 mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 131.50 DH

EXP  
LOT

02 2025  
BCXR2



## Dénomination du médicament :

Tareg® 40 mg

Tareg® 80 mg

Tareg® 160 mg

DCI : Valsartan

combinaison avec  
tolérez pas certains  
secondaires.  
Votre médecin peut  
patients après un  
Tareg ne doit être

## 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Tareg ?

Une hypertension artérielle, des lésions au niveau des reins et le cerveau et ne ressentir aucun symptôme de hypertension non

telles qu'une attaque cardiaque ou une insuffisance cardiaque. Ce médicament peut entraîner une conduite et l'aptitude à la conduire.

- Prévenez votre médecin si vous :
  - souffrez d'une maladie de cœur,
  - souffrez de voies respiratoires de forte dose en excès dans les 24 dernières heures,
  - Si vous présentez des symptômes de la langue (saignement, douleur, gonflement),

Tareg. Dans ce cas, il est important que vous consultiez votre médecin.

Il est important que vous consultiez votre médecin au début du traitement pour évaluer les symptômes de vomissements, de nausées et de diarrhée.

La prudence est recommandée lorsque vous prenez Tareg. Il est important que vous consultiez votre médecin si vous avez une insuffisance cardiaque ou une hypertension artérielle.

Évitez de prendre Tareg si vous avez une maladie de cœur.

Si vous prenez Tareg avec un autre médicament, il est recommandé de modifier les doses.

Si vous prenez Tareg avec certains médicaments, il est recommandé de prendre Tareg avec un autre médicament.

Si vous prenez Tareg avec certains médicaments, il est recommandé de prendre Tareg avec un autre médicament.

Si vous prenez Tareg avec certains médicaments, il est recommandé de prendre Tareg avec un autre médicament.

Si vous prenez Tareg avec certains médicaments, il est recommandé de prendre Tareg avec un autre médicament.

Si vous prenez Tareg avec certains médicaments, il est recommandé de prendre Tareg avec un autre médicament.

Si vous prenez Tareg avec certains médicaments, il est recommandé de prendre Tareg avec un autre médicament.

Si vous prenez Tareg avec certains médicaments, il est recommandé de prendre Tareg avec un autre médicament.

Si vous prenez Tareg avec certains médicaments, il est recommandé de prendre Tareg avec un autre médicament.

Si vous prenez Tareg avec certains médicaments, il est recommandé de prendre Tareg avec un autre médicament.

Si vous prenez Tareg avec certains médicaments, il est recommandé de prendre Tareg avec un autre médicament.

Si vous prenez Tareg avec certains médicaments, il est recommandé de prendre Tareg avec un autre médicament.

Si vous prenez Tareg avec certains médicaments, il est recommandé de prendre Tareg avec un autre médicament.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit.
- Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice ?
2. Qu'est-ce que tareg et dans quel cas est-il utilisé ?
3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre tareg ?
4. Comment prendre et utiliser tareg ?
5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
6. Comment conserver tareg ?

### 1. Qu'est-ce que Tareg et dans quel cas est-il utilisé ?

Tareg contient une substance active régulant la pression artérielle de l'organisme. Il dilate les vaisseaux sanguins et réduit la pression artérielle. Votre médecin peut prescrire Tareg en prenant votre pression artérielle. Tareg est utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle modérée chez les adultes ainsi que chez les adolescents de 6 à 18 ans.

Votre médecin peut aussi vous prescrire Tareg pour traiter l'insuffisance cardiaque légère ou modérée, la maladie cardiaque, le rendement



6 18001030316

TAREG 80 mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 131.50 DH

EXP  
LOT

02 2025  
BCXR2



## Dénomination du médicament :

Tareg® 40 mg

Tareg® 80 mg

Tareg® 160 mg

DCI : Valsartan

combinaison avec  
tolérez pas certains  
secondaires.  
Votre médecin peut  
patients après un  
Tareg ne doit être

## 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Tareg ?

Une hypertension artérielle, des lésions au niveau des reins et le cerveau et ne ressentir aucun symptôme de hypertension non

telles qu'une attaque cardiaque ou une insuffisance cardiaque. Ce médicament peut entraîner une conduite et l'aptitude à la conduire.

- Prévenez votre médecin si vous :
  - souffrez d'une maladie de cœur,
  - souffrez de voies respiratoires de forte dose en excès dans les 24 dernières heures,
  - Si vous présentez des symptômes de la langue (saignement, douleur), évitez de prendre Tareg. Dans ce cas, consultez votre médecin.

Il est important que vous suivez les instructions de votre médecin au début du traitement pour éviter les vomissements, de la nausée et de la diarrhée.

La prudence est recommandée lorsque vous prenez Tareg car il peut être un inhibiteur de l'ECA.

Si vous avez une hypertension artérielle, suivez votre traitement avec un autre médicament et modifiez les doses si nécessaire.

Si vous prenez Tareg avec certains médicaments, il peut être nécessaire de modifier la dose ou de prendre un autre médicament.

Si vous prenez Tareg avec certains médicaments, il peut être nécessaire de modifier la dose ou de prendre un autre médicament.

Si vous prenez Tareg avec certains médicaments, il peut être nécessaire de modifier la dose ou de prendre un autre médicament.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit.
- Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice ?
2. Qu'est-ce que tareg et dans quel cas est-il utilisé ?
3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre tareg ?
4. Comment prendre tareg ?
5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
6. Comment conserver tareg ?

### 1. Qu'est-ce que Tareg et dans quel cas est-il utilisé ?

Tareg contient une substance active régulant la pression artérielle de l'organisme. Il dilate les vaisseaux sanguins et réduit la pression artérielle. Votre médecin peut prescrire ce médicament en prenant votre tension artérielle. Tareg est utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle modérée chez les adultes ainsi que chez les adolescents de 6 à 18 ans.

Votre médecin peut aussi vous prescrire Tareg pour traiter l'insuffisance cardiaque légère ou modérée, la maladie du muscle cardiaque, le rendement



6 18001030316

TAREG 80 mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 131.50 DH

EXP  
LOT

02 2025  
BCXR2