

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie

M22- 0042743 147815

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : Société :
☒ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : **RMAIL MOUHSEN**
 Date de naissance : **11-09-1977**
 Adresse :
 Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : **Dr. YASSINE BENKADMIR**
 الدكتور ياسين ابن قديمير
NEUROLOGUE
 اختصاصي أمراض الدماغ والأعصاب
 Date de consultation : **23/12/2022**
 Nom et prénom du malade : **RMAIL MOUHSEN** Age:
 Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie : **Insomnie**
 Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le :
 Signature de l'adhérent(e) :
MUPRAS
02 FEB. 2023
ACCUEIL

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Dr. YASSINE BENKADMIR

Neurologue

- Ancien médecin au:
CHU Averroès-Casablanca
CHR Hassan II - Agadir



الدكتور ياسين ابن قديمير

إختصاصي أمراض الدماغ والأعصاب

العمود الفقري والعضلات

طبيب سابق بالمستشفى الجامعي ابن رشد - الدار البيضاء
و المستشفى الجهوي الحسن II - أكادير

■ Electro-encéphalogramme

■ Electro-neuromyogramme

IF: 34447033

ICE: 00317876200009

Mohammedia Le 23/12/22 : المحمدية في

■ التخطيط الكهربائي للدماغ (الشبكة)

■ التخطيط الكهربائي للأعصاب و العضلات

certificat medical

Mr RMAIL Nouha

une en consultation

neurologique pour affection

neurologique. Nécessite un

traitement avec repos de

01 jour : 23/12/22

sans complication

Dr. YASSINE BENKADMIR

الدكتور ياسين ابن قديمير

NEUROLOGUE

إختصاصي أمراض الدماغ والأعصاب

INPE: 041194564

شارع محمد السادس، تجزئة المسيرة، FB29، الطابق 1، رقم 7 (قرب مدرسة رودان) المحمدية

Bd Mohammed VI, Lot Massira, FB29, Etg 1, N° 7 (à côté de l'école Rodin) Mohammedia

☎ 05 23 27 08 08 📠 07 60 43 20 17 📧 Dr.benkadmir@gmail.com

Dr. YASSINE BENKADMIR

Neurologue

- Ancien médecin au:
CHU Averroès-Casablanca
CHR Hassan II - Agadir



الدكتور ياسين ابن قديمير

إختصاصي أمراض الدماغ والأعصاب

العمود الفقري والعضلات

طبيب سابق بالمستشفى الجامعي ابن رشد - الدار البيضاء
و المستشفى الجهوي الحسن II - أكادير

■ Electro-encéphalogramme

■ Electro-neuromyogramme

IF: 34447033

ICE: 00317876200099

Mohammedia Le :

23/12/2022 في : محمدية

■ التخطيط الكهربائي للدماغ (الشبكة)

■ التخطيط الكهربائي للأعصاب و العضلات

RAHIL Mouhcene :

① Lyronxia 10mg

39, 80 $\frac{1}{4}$ - 0 - $\frac{1}{2}$ au coucher

② Lonaxyl solution

04 gouttes au coucher

HA de 02 mois

contrôle après 2 semaines

Dr. YASSINE BENKADMIR

الدكتور ياسين ابن قديمير

NEUROLOGUE

إختصاصي أمراض الدماغ والأعصاب

INPE: 041194564

شارع محمد السادس، تجزئة المسيرة، FB29، الطابق 1، رقم 7 (قرب مدرسة رودان) المحمدية
Bd Mohammed VI, Lot Massira, FB29, Etg 1, N° 7 (à côté de l'école Rodin) Mohammedia

☎ 05 23 27 08 08 📠 07 60 43 20 17 📧 Dr.benkadmir@gmail.com

Laroxyl® 40 mg/ml

Solution buvable en gouttes
Amitriptyline

Composition

Solution buvable dosée à 4% d'amitriptyline (présente sous forme de chlorhydrate d'amitriptyline).

Excipients : alcool éthylique, glycérine, eau purifiée.

Excipients à effet notoire : alcool éthylique, glycérine.

Fiacon compte - gouttes de 20 ml. 1 goutte = 1 mg.

Dans quels cas utiliser ce médicament (indications)

Ce médicament est un antidépresseur.

Il est indiqué :

- dans des épisodes dépressifs d'intensité légère, modérée ou sévère,
- dans certaines douleurs ne répondant pas aux antalgiques habituels,
- dans l'énurésie nocturne de l'enfant (émission involontaire d'urine la nuit).

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament (contre-indications)

Faites attention avec LAROXYL® 40 mg/ml, solution buvable :

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- allergie connue à l'amitriptyline
- risque de glaucome par fermeture de l'angle (augmentation de la pression à l'intérieur de l'oeil),
- difficulté pour uriner d'origine prostatique ou autre,
- infarctus du myocarde récent,
- traitement par un autre antidépresseur (iproniazide, nialamide) ou par le sultopride.

Le médicament ne doit généralement pas être utilisé dans les cas suivants, sauf avis contraire médecin :

- traitement par un autre antidépresseur (moclobémide, toloxatone) ou par des médicaments agissant sur le système cardiovasculaire (et/ou apparentés, et adrénaline, noradrénaline, dopamine par voie injectable).

Mises en garde spéciales

Ne pas interrompre brutalement le traitement. De rares cas de syndrome de sevrage (céphalées, nausées, anxiété, troubles du sommeil) ayant été observés à l'arrêt du traitement, il est recommandé de réduire progressivement et de surveiller tout particulièrement le patient pendant cette période.

La prise concomitante d'amitriptyline, de l'alcool, de la clonidine, de la guanfacine, ou de médicaments sélectifs (moclobémide, toloxatone), du lithium ou un sympathomimétique alpha et bêta (par exemple) est déconseillée (voir Interactions).

Comme pour tous les autres antidépresseurs, l'action de ce médicament ne se manifeste qu'au bout de plusieurs jours. Il est donc important de poursuivre le traitement régulièrement, même en l'absence d'amélioration immédiate, sauf avis contraire de votre médecin.

Idees suicidaires et aggravation de votre dépression ou de votre trouble anxieux :

Si vous souffrez de dépression et/ou de troubles

anxieux, vous pouvez parfois avoir des idées d'auto-agression (agression envers vous-même) ou de suicide. Ces manifestations peuvent être majorées au début d'un traitement par antidépresseur, car ce type de médicament n'agit pas tout de suite mais seulement après 2 semaines ou plus de traitement. Vous êtes plus susceptible de présenter ce type de manifestations dans les cas suivants :

- si vous avez déjà eu des idées suicidaires ou d'auto-agression dans le passé.

- si vous êtes un jeune adulte. Les études cliniques ont montré que le risque de comportement suicidaire était accru chez les adultes de moins de 25 ans présentant une maladie psychiatrique et traités par antidépresseur.

Si vous avez des idées suicidaires ou d'auto-agression, contactez immédiatement votre médecin ou allez directement à l'hôpital.

Précautions d'emploi

Insomnie ou nervosité en début de traitement peuvent justifier une diminution de la posologie ou un traitement transitoire symptomatique.

En cas de virage maniaque franc, le traitement par l'amitriptyline sera interrompu et, le plus souvent, un neuroleptique sédatif sera prescrit.

Chez les patients épileptiques ou ayant des antécédents d'épilepsie, il est prudent de renforcer la surveillance clinique et électrique, en raison de la possibilité d'abaissement du seuil épileptogène. La survenue de crises convulsives impose l'arrêt du traitement.

L'amitriptyline doit être utilisée avec prudence :

- chez le sujet âgé présentant :
- une plus grande sensibilité à l'hypotension orthostatique et à l'hyperthermie.

Laroxyl® 40 mg/ml

Amitriptyline

Gouttes buvables 20 ml



PPV: 39DH80

PER: 09/25

LOT: L2832