

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

## Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 8498

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre : Veuve

147965

Nom & Prénom : DICKHAR SAKIMA

Date de naissance : 08/08/1971

Adresse : Rue A81 NR 89 GR F° OULFA  
CASABLANCA

Tél. : 06 36 899117

Total des frais engagés : Dhs

## Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 01/02/2022

Nom et prénom du malade : DICKHAR SAKIMA Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Colopathie

## En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 01/02/2023

Signature de l'adhérent(e) :



### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
02/02/23	C	0		<i>Dr Mustapha Omnipraticien Ancien Médecin des Hôpitaux Militaires Lissasta Extension n° 353 - Casablanca Tél 0522 65 07 04</i>

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie T Dr. BENAH JADAR 02, Bd Cheikh Sébou - CASABLANCA Tél 05 22 00 18	02/02/23	283,40

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Dr Mustapha NAJJI Omnipraticien Ancien Médecin des Hôpitaux Militaires Lissasta Extension n° 353 - Casablanca Tél 0522 65 07 04	02/02/23	ASP	150,00 DH

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	


### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION



ODF  
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	G	21433552
D	00000000	B	00000000
G	00000000	H	35533411
B	35533411	G	11433553

[Création, remont, adjonction]  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

## عيادة

طب الأطفال  
داء السكري - الكوليسترونول  
ارتفاع الضغط الدموي - التخطيط الكهربائي للقلب  
أمراض الغدد / عقم الزوجين / أمراض المفاصل  
الطب النفسي - أمراض الجهاز العصبي



## الدكتور الناجي مصطفى

خريج المدرسة الملكية للصحة العسكرية بالرباط  
خريج كلية الطب بالرباط  
طبيب عسكري سابق بالمستشفى العسكري - الرباط  
طبيب سابق بالمستشفى العسكري الفرنسي - باريس

Casablanca, le :

02-01-22

Nom et Prénom :

deKKar Selhima

ASP

Dr Mustapha NAJ  
Omnipraticien  
Ancien Médecin  
des Hôpitaux Militaires  
Lissasla Extension n° 353 - Casablanca  
Tél 0522 65 07 04

# الدكتور الناجي مصطفى

خريج المدرسة الملكية للصحة العسكرية بالرباط  
خريج كلية الطب بالرباط  
طبيب عسكري سابق بالمستشفى العسكري - الرباط  
طبيب سابق بالمستشفى العسكري الفرنسي - باريس



## عيادة

طب الأطفال  
داء السكري - الكوليسترونول  
ارتفاع الضغط الدموي - التخطيط الكهربائي للقلب  
أمراض الغدد / عقم الزوجين / أمراض المفاصل  
الطب النفسي - أمراض الجهاز العصبي

Casablanca, le : 02/10/2023

Nom et Prénom : Dekkun Sakina

Radiographie abdomen sans préparation .

Niveau hydro -aérique colique .

Dr Mustapha Naji  
Omnipraticien  
Ancien Médecin  
des Hôpitaux Militaires  
Lissasta Extension n° 353 - Casablanca  
Tél 0522 65 07 04

## عيادة

طب الأطفال  
داء السكري - الكوليسترون  
ارتفاع الضغط الدموي - التخطيط الكهربائي للقلب  
أمراض الغدد / عقم الزوجين / أمراض المفاصل  
الطب النفسي - أمراض الجهاز العصبي



## الدكتور الناجي مصطفى

خريج المدرسة الملكية للصحة العسكرية بالرباط  
خريج كلية الطب بالرباط  
طبيب عسكري سابق بالمستشفى العسكري - الرباط  
طبيب سابق بالمستشفى العسكري الفرنسي - باريس

Casablanca, le : ٥٢١٥٢١٢٣

Nom et Prénom : Dekkar Sakina

## FACTURE 894

### RADIOGRAPHIE :

ASP

### MONTANT :

**150.00DH**

Dr Mustapha NAJ  
Omnipraticien  
Ancien Médecin  
des Hôpitaux Militaires  
Lissasfa Extension n° 353 - Casablanca.  
Tél 0522 65 07 04

## عيادة

طب الأطفال  
داء السكري - الكوليستيرون  
ارتفاع الضغط الدموي - التخطيط الكهربائي للقلب  
أمراض الغدد / عقم الزوجين / أمراض المفاصل  
الطب النفسي - أمراض الجهاز العصبي



## الدكتور الناجي مصطفى

خريج المدرسة الملكية للصحة العسكرية بالرباط  
خريج كلية الطب بالرباط  
طبيب عسكري سابق بالمستشفى العسكري - الرباط  
طبيب سابق بالمستشفى العسكري الفرنسي - باريس

Casablanca, le :

02.02.23

Nom et Prénom :

deKKan Salima

123 60

Inflamm 40 → 115

79 TAM  
Pharmacie TAM  
Dr. BENANI Jaafar  
302, Bd Oued Sebou, Ouir  
CASABLANCA  
Tél: 05 22 65 07 04

Metformin: 2-2 ~75  
(S.V) TAM

79 283, 60

Dr Mustapha NAJI  
Omnipraticien  
Ancien Médecin  
des Hôpitaux Militaires  
Lissasfa Extension n° 353 - Casablanca  
Tél: 0522 65 07 04

Pharmacie TAM  
Dr. BENANI Jaafar  
302, Bd Oued Sebou, Ouir  
- CASABLANCA -  
Tél: 05 22 65 07 04

- recommandée est d'un comprimé gastro-résistant de l'INexium 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines. Si votre œsophage n'est pas encore cicatrisé, votre médecin peut vous dire de prendre encore la même dose pendant 4 semaines.
- Une fois l'œsophage cicatrisé, la dose recommandée est d'un comprimé gastro-résistant de l'INexium 20 mg, une fois par jour.
- Si votre œsophage n'est pas blessé, la dose recommandée est d'un comprimé gastro-résistant de l'INexium 20 mg chaque jour. Lorsque les symptômes seront sous contrôle, le médecin pourra vous recommander de prendre votre médicament uniquement quand vous en sentirez le besoin, jusqu'à un maximum d'un comprimé gastro-résistant de l'INexium 20 mg par jour.
- Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

#### Traitement des ulcères dus à des infections par *Helicobacter pylori* et prévention de leur récidive :

- La dose recommandée est d'un comprimé gastro-résistant de l'INexium 20 mg deux fois par jour pendant une semaine.
- Votre médecin vous prescrira également des antibiotiques, par exemple amoxycilline et clarithromycine.

#### Traitement des ulcères gastriques causés par des AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) :

- La dose recommandée est d'un comprimé gastro-résistant de l'INexium 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

#### Prévention des ulcères gastriques si vous prenez des AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) :

- La dose recommandée est d'un comprimé gastro-résistant de l'INexium 20 mg une fois par jour.

#### Traitement de l'acidité accrue dans l'estomac due à une tumeur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison) :

- La dose recommandée est l'INexium 40 mg deux fois par jour.
- Votre médecin ajustera la dose en fonction de vos besoins et décidera également combien de temps vous devez prendre le médicament. La dose maximale est de 80 mg deux fois par jour.

#### Poursuite du traitement après la prévention d'une récidive hémorragique d'ulcères avec l'INexium par voie intraveineuse :

- La dose recommandée est d'un comprimé de l'INexium 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

#### Utilisation chez les adolescents âgés de 12 ans ou plus

##### Traitement du brûlant causé par la maladie du reflux gastro-œsophagien (RGO) :

- Si votre médecin a diagnostiqué une légère lésion de votre œsophage, la dose recommandée est d'un comprimé gastro-résistant de l'INexium 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines. Si votre œsophage n'est pas encore cicatrisé, votre médecin peut vous dire de prendre encore la même dose pendant 4 semaines.
- Une fois l'œsophage cicatrisé, la dose recommandée est d'un comprimé gastro-résistant de l'INexium 20 mg, une fois par jour.
- Si votre œsophage n'est pas blessé, la dose recommandée est d'un comprimé gastro-résistant de l'INexium 20 mg chaque jour.
- Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

- Erlotinib (utilisé pour traiter le cancer).

disponible en deux dosages contenant 20 mg ou 40 mg d'ésomeprazole (sous forme de magnésium trihydraté).

- Les autres composants sont : monostéarate de glycérol 40-55, hydrolyse, hypromellose, oxyde de fer (20 mg brun-rougeâtre, jaune, 40 mg brun-rougeâtre) (E172), stéarate de magnésium, copolymère de l'éthylacrylate de l'acide méthacrylique (1:1) dispersion à 30%, cellulose microcristalline, paraffine synthétique, macrogol, polysorbate 80, crospovidone, stéarylumate sodique, sphères de sucre (saccharose et amidon de maïs), talc, dioxyde de titane (E171), citrate de triéthyl.

#### Aspect de l'INexium et contenu de l'emballage extérieur

- Les comprimés gastro-résistants de l'INexium 20 mg sont rose pâle, dont une face est gravée avec A/EH d'un côté et 20 mg de l'autre côté.
- Les comprimés gastro-résistants de l'INexium 40 mg sont roses, dont une face est gravée avec A/EI d'un côté et 40 mg de l'autre côté.
- Vos comprimés sont disponibles sous blister dans des boîtes contenant 20 mg ou 40 mg : Emballage sous blister en carton de 28 comprimés.

#### Liste II

N° AMM l'INexium 20mg : 640/15 DMP/21/NRQ

N° AMM l'INexium 40mg : 641/15 DMP/21/NRQ

#### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

AstraZeneca UK Ltd

600 Capability Green, Luton

LU1 3LU, Royaume-Uni

#### Fabricant, Conditionneur et Libérateur :

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje-Suède

La dernière révision de cette notice est mars 2019.

© AstraZeneca 2019

l'INexium est une marque déposée du groupe AstraZeneca.

Les informations suivantes sont destinées exclusivement aux professionnels de la santé :

#### Administration par sonde gastrique

- Placez le comprimé dans une seringue appropriée, remplissez approximativement 5 ml d'air. Avec certaines sondes, placez le comprimé dans 50 ml d'eau afin d'éviter le colmatage.
  - Agitez aussiôt la seringue pendant 2 minutes environ.
  - Tenez la seringue avec l'embout vers le haut et vérifiez.
  - Reliez la seringue à la sonde en la maintenant dans ce positionnement.
  - Agitez la seringue et placez-la avec l'embout vers le bas dans la sonde. Retournez ensuite la seringue et agitez l'embout vers le haut pour éviter le colmatage.
  - Tournez la seringue l'embout vers le bas et injectez 1 ml à 10 ml dans la sonde. Répétez ce processus jusqu'à ce que la seringue soit vide.
  - Remplissez la seringue avec 25 ml d'eau et laissez 5 ml, nécessaire afin d'éliminer tout sédiment dans la seringue. Avec certaines sondes, un volume de 50 ml d'eau sera nécessaire.
- INTEMEDIC  
22 rue zubert brossé à la cassabianca  
64170 BAYONNE  
INEXIUM  
40 mg  
Bouteille 14  
61150MP/21/NRQ P.P.V.123,60 DH  
020607  
Cgr GR  
118001  
61150MP/21/NRQ P.P.V.123,60 DH  
020607  
environ et  
dispenser  
jles.  
ié.  
i-10 ml  
avec  
on de 5 à  
si

La dernière révision de cette notice est mars 2019.

© AstraZeneca 2019

l'INexium est une marque déposée du groupe AstraZeneca

- Agressivité.

# CARBOLINE®

## Présentation galénique :

Boîte de 30 comprimés sous blister.

## Composition par comprimé :

Charbon activé (210mg), Saccharose, Dextrose Stabilisant: Cellulose microcristalline, Extrait de fenouil (34,98mg), Arôme anis, Anti-agglomérants : Dioxyde de silicium et stéarate de magnésium.

## Propriétés traditionnellement reconnues des principaux composants:

### Charbon végétal

Le charbon végétal est obtenu par carbonisation, un procédé permet ensuite de créer tout un réseau de pores qui augmente considérablement la surface spécifique d'adsorption du charbon. Il constitue, ainsi, le plus puissant adsorbant d'origine naturelle, actuellement connu. Le charbon végétal progresse dans le tube digestif où il est parfaitement toléré. Il a la capacité d'adsorber, c'est à dire, de fixer sur sa surface diverses substances, telles les bactéries, les toxines et les gaz. Il est traditionnellement reconnu comme étant bénéfique pour traiter les troubles fonctionnels du système digestif, tels les douleurs abdominales, les troubles du transit et les ballonnements.

Le charbon végétal est traditionnellement reconnu pour supprimer rapidement et efficacement l'aérophagie, les éructations et les gaz intestinaux désagréables. Il est également traditionnellement réputé pour être l'un des antidotes les plus reconnus des intoxications gastro-intestinales.

### Fenouil

Diététiquement très intéressant parce que riche en fibres douces bien tolérées, le fenouil l'est aussi pour ses propriétés médicinales. Le fenouil est reconnu pour son activité stimulante sur la mobilité gastro-intestinale. C'est pourquoi il est traditionnellement indiqué en cas de troubles digestifs tels que les ballonnements douloureux, la lenteur digestive, les éructations et les flatulences.

## Conseils d'utilisation:

Croquer ou avaler 1 à 2 comprimés avec un peu d'eau.

Ne pas dépasser 4 comprimés.

## Précautions d'emploi

Se conformer aux conseils d'utilisation.

Conserver à l'abri de l'humidité.


A utiliser dans le cadre d'un traitement.

Ce produit est pas un médicament mais un complément alimentaire.

Best before	Lot n°	Manufacturing date	de préférence avant fin
09/25	D354P	IPHA/DRM	
UVA :	Lot :		
PPC : 79,00 DH			
CARBOLINE CP 30			

V008 - 10/21 - ETCALI449

3 525720 004499



# MeteoSpasmyl®

Capsule molle - Boîte de 20

Citrate d'alvérine et Siméticone

Ne prendre que sur avis de votre médecin

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que METEOSPASMYL® et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à prendre avant de prendre METEOSPASMYL® ?
3. Comment prendre METEOSPASMYL® molle ?
4. Quels sont les effets indésirables ?
5. Comment conserver METEOSPASMYL® molle ?
6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE METEOSPASMYL®, capsule molle ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

### METEOSPASMYL® B 20 caps molles

Alvérine citrate 60 mg / Siméticone 300 mg

P.P.V. : 40,40 DH

Distribué par COOPER PHARMA  
41, rue Mohamed Diouri - Casablanca

6 118001 100293



Si vous écoulez une partie du gélule, il ne faut pas la jeter. Les substances peuvent être absorbées par le système digestif. Il est préférable de prendre une autre gélule.

Il est préférable de prendre une autre gélule si vous avez des difficultés pour avaler une gélule.

Il est préférable de prendre une autre gélule si vous avez des difficultés pour avaler une gélule.

**METEOSPASMYL, capsule molle avec des aliments, boissons et de l'alcool**  
Sans objet.

## Grossesse et allaitement

### Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Allaitement

Vous devez éviter de prendre ce médicament si vous allaitez.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

de véhicules et utilisation de machines probable que METEOSPASMYL ait une autre aptitude à conduire des véhicules ou les machines. Toutefois, METEOSPASMYL provoque des vertiges et cela peut avoir une autre aptitude à conduire des véhicules et à utiliser les machines.

## 3. COMMENT PRENDRE METEOSPASMYL, capsule molle ?

### Posologie

RESERVE A L'ADULTE

1 capsule 2 à 3 fois par jour.

# MeteoSpasmyl®

Capsule molle - Boîte de 20

Citrate d'alvérine et Siméticone

Le nom de ce médicament et son nom commercial sont protégés par un marquage déposé.

Veuillez, lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que METEOSPASMYL, capsule molle et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
3. Comment prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver METEOSPASMYL, capsule molle ?
6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE METEOSPASMYL, capsule molle ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

## METEOSPASMYL, capsule molle avec des aliments, boissons et de l'alcool

Sans objet.

## Grossesse et allaitement

### Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Allaitement

Vous devez éviter de prendre ce médicament si vous allaitez.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## Conduite de véhicules et utilisation de machines

### METEOSPASMYL® 8 20 caps molles

Alvérine citrate 60 mg / Siméticone 300 mg

P.P.V. : 40,40 DH

Distribué par COOPER PHARMA

41,rue Mohamed Diouri - Casablanca

6 118001 100293

## METEOSPASMYL, capsule molle .

### Posologie

RESERVE A L'ADULTE

1 capsule 2 à 3 fois par jour