

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : <u>07724</u>	Société : <u>RAM</u>
<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)
<input type="checkbox"/> Autre : <u>148803</u>	
Nom & Prénom : <u>BOUJAMAA JILALI</u>	
Date de naissance : <u>01/01/1951</u>	
Adresse : <u>ESiada I N°26 Sidi HADDOUJI</u> <u>Casablanca 20190</u>	
Tél. : <u>0666824145</u>	Total des frais engagés : <u>182419</u> Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :			
Date de consultation : <u>23/01/2023</u>			
Nom et prénom du malade : <u>BOUJAMAA JILALI</u>	Age: <u>68ans</u>		
Lien de parenté : <input type="checkbox"/> Lui-même	<input type="checkbox"/> Conjoint	<input type="checkbox"/> Enfant	
Nature de la maladie : <u>HTA</u>			

En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Signature de l'adhérent(e) : BOUJAMAA JILALI



26 FEV. 2023

ACCOUEIL

26 FEV. 2023

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
03-01-2023	Co + EG	300 Dhs	Dr. HADJ EL HADJ PARISIENNE 169, Bd Sidi El Mekki El Dandouzi Tunis - Macrout - Casablanca Tél: 0522 58 48 57 - 06 50 69 53 3	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
17-01-2023	G Galihdr. Hanafi	150,- 80,- Marrouti 1er Elago. 50,- 10,- Casablanca T. 0522.58.48.87

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Médecin	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Samira KOUFIA MHDJARAB <i>Dr. Soufiane, Lot. L'Alma Kadiri Sidi Maarouf CASABLANCA Tél: 05 22 88 36 56 - 06 22 58 18 05</i>	18.10.1993	B 740	750.00 Dhs

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES		Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient																			
					Coefficient DES TRAVAUX																		
					MONTANTS DES SOINS																		
					DEBUT D'EXECUTION																		
					FIN D'EXECUTION																		
O.D.F PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">25533412</td> <td style="padding: 0 5px;">21433552</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">00000000</td> <td style="padding: 0 5px;">00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><hr/></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">00000000</td> <td style="padding: 0 5px;">00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><hr/></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">G</td> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">35533411</td> <td style="padding: 0 5px;">11433553</td> </tr> </table>			H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	<hr/>			B	00000000	00000000	<hr/>			G	35533411	11433553	Coefficient DES TRAVAUX
H	25533412	21433552																					
D	00000000	00000000																					
<hr/>																							
B	00000000	00000000																					
<hr/>																							
G	35533411	11433553																					
		(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS																		
					DATE DU DEVIS																		
					DATE DE L'EXECUTION																		

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr Houda EL HADI

CARDIOLOGUE

Diplômée de la Faculté de Médecine
et de Pharmacie de Casablanca

DIU Echocardiographie de l'Université
Bordeaux II

DU Epreuve d'effort et réadaptation cardiovasculaire
de l'Université Bordeaux II



الدكتورة هدى الهادي

اختصاصية في أمراض القلب والشرايين

خريجة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء

دبلوم الفحص بالصيدلاني بجامعة بوردو II

دبلوم اختبار المجهد بجامعة بوردو II

Casablanca, le

03 / 01 / 2023

Dr Houda EL HADI

Régime pour sole

180 g

1/ TARES 160 mg

10

198,20 x 3 comp. / jour (le matin
(1boute)

2/ LOTEVAN 5/160 mg

10

1cp matin
(III de 03 mai)

774,90

Dr. Houda EL HADI
CARDIOLOGUE
159, Bd Sidi Maârouf (Lot. Dandoun)
1er Etage, Sidi Maârouf - Casablanca
Tél: 0522.58.48.57 - 06.50.69.53.36

Pharmacie Hay Essaada
Bazwi Am
Essaada N°262 - Sidi Maârouf
0522.97.22.70/0522.97.25.63
Casablanca

159, Bd Sidi Maârouf (Lot. Dandoun) Sidi Maârouf - 1^{er} étage - Casablanca

Tél : 05 22 58 48 57 - Urgences : 06 50 69 53 36 - E-mail : dr.elhadi@cardio@gmail.com



LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES MIJHARLAB

Hématologie - Immunologie - Biochimie - Parasitologie - Mycologie - Bactériologie - Virologie

Docteur Samira KOUTAIR

Spécialiste en Biologie Médicale

D.U. Qualité Biologie Médicale - Bordeaux

2301182032 – Mr Jilali BOUJAMAA

LDL-Cholestérol	0.88 g/L 2.28 mmol/L	(<1.60) (<4.14)
-----------------	-------------------------	--------------------

Objectifs thérapeutiques à atteindre selon les recommandations AFFSAPS de mars 2005 :

- 0 Facteur de risque : LDL < 5,70 mmol/L (2,20 g/L)
- 1 Facteur de risque : LDL < 4,90 mmol/L (1,90 g/L)
- 2 Facteurs de risque : LDL < 4,14 mmol/L (1,60 g/L)
- Plus de 2 facteurs de risque : LDL < 3,36 mmol/L (1,30 g/L)
- Antécédent de maladie cardiovasculaire avérée : LDL < 2,58 mmol/L (1,00 g/L)

Triglycérides	1.11 g/L 1.27 mmol/L	(<1.50) (<1.71)
---------------	-------------------------	--------------------

Acide Urique	44 mg/L 262 µmol/L	(35–75) (208–446)
--------------	-----------------------	----------------------

MARQUEURS TUMORAUX

PSA total (Technique immuno-fluorescence AIA-360)	2.589 ng/mL 2.589 µg/L	(<4.000) (<4.000)
------------------------------------------------------	---------------------------	----------------------

Le toucher rectal, le massage prostatique, une cytoscopie, une échographie transrectale, une biopsie, augmentent temporairement le taux de PSA

Samira KOUTAIR
MIJHARLAB
Centre Commercial Soufiane, Lot Chaima
Bd Abou Bakr EL KADIRI, Sidi Maarouf
CASABLANCA
Tel: 05 22 58 35 56 - 06 32 16 30 36
Page 3/3

Centre commercial Soufiane, Lot Chaima, Bd Abou Bakr EL KADIRI, Sidi Maarouf, Casablanca
Tél: 05 22 58 35 56 - 06 32 16 30 36 - Contactez pour RDV: 06 64 46 14 35 - <http://rdvcovidmaroc.com/mijharlab>

IF : 15252767 - TP : 36167325 - CNSS : 43023445 - ICE : 000114256000076 - E-mail : mijharlab@yahoo.fr

Dr Houda EL HADI

Nom : BOUJAMAA JILALI

Sexe : Homme Clinique :

Age : Lit :


SN:0002024 Service :

Date: 03/01/2023 11:44:54 Cas :

Fréquence :	1000 Hz	Intervalle PR	172 ms	Prompt:
Temps d'échantillon	13 s	Intervalle QT	396 ms	
HR:	63 bpm	Intervalle QTc	407 ms	
Intervalle P	64 ms	Axe P	28,77°	
Intervalle QRS	84 ms	Axe QRS	24,48°	
Intervalle T	202 ms	Axe T	36,09°	

Dr. Houda EL HADI
159, Bd Sidi Maârouf, (lot B - Sidi Bouzid) - 1er Etage, Sidi Maârouf - Cité Sidi Bouzid - 53 100
Tél: 0322 58 18 55 - 03 33 53 16

Signature du médecin :



25mm/s 10mV



LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES MIJHARLAB

Hématologie - Immunologie - Biochimie - Parasitologie - Mycologie - Bactériologie - Virologie

Docteur Samira KOUTAIR

Spécialiste en Biologie Médicale

D.U. Qualité Biologie Médicale - Bordeaux


2301182032 – Mr Jilali BOUJAMAA

04-10-2022

**Hémoglobine glycosylée
(HbA1C)**
(HPLC TOSOH-GX)

6.7 %

6.7



Valeurs de référence :

Sujet normoglycémique : 4 à 6 %

Sujet diabétique équilibré : Objectif ciblé autour de 6.5 %

Diabète mal équilibré : Taux supérieur à 8%

Créatinine
(Méthode enzymatique)

7.60 mg/L
67.26 µmol/L
(7.00–13.00)
(61.95–115.05)

Cholestérol total

1.64 g/L
4.24 mmol/L
(<2.00)
(<5.17)

HDL-Cholestérol

0.54 g/L
1.40 mmol/L
(0.50–0.82)
(1.29–2.12)

Samira KOUTAIR
MIJHARLAB
Centre commercial Soufiane, Lot Chaima
Bd Abou Bakr El KADIRI, Sidi Maarouf
CASABLANCA
Tel: 05 22 58 35 56 - 06 32 16 30 36 - Page 2/3

Centre commercial Soufiane, Lot Chaima, Bd Abou Bakr EL KADIRI, Sidi Maarouf, Casablanca
Tél: 05 22 58 35 56 - 06 32 16 30 36 - Contactez pour RDV: 06 64 46 14 35 - <http://rdvcovidmaroc.com/mijharlab>

IF : 15252767 - TP : 36167325 - CNSS : 43023445 - ICE : 000114256000076 - E-mail : mijharlab@yahoo.fr



LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES MIJHARLAB

Hématologie - Immunologie - Biochimie - Parasitologie - Mycologie - Bactériologie - Virologie

Docteur Samira KOUTAIR

Spécialiste en Biologie Médicale

D.U. Qualité Biologie Médicale - Bordeaux

Prélèvement du : 18-01-2023 à 10:35

Identifiant : 2110282039

Edition : 18-01-2023

Patient : Mr BOUIJAMAA Jilali

Date de naissance : 01-01-1957

Référence : 2301182032

Prescripteur : Dr EL HADI HOUDA

HEMATOCYTOLOGIE

Hémogramme : NFS

Cytométrie de flux(Pentra 60C+)

Hématies :	5.05	$10^6/\mu\text{L}$	(4.00–5.65)
Hémoglobine :	15.9	/g/dL	(12.5–17.2)
Hématocrite :	47.0	%	(37.0–49.0)
VGM :	93.0	fL	(80.0–101.0)
TCMH :	31.6	pg	(27.0–34.0)
CCMH :	33.9	g/dL	(30.0–36.0)
Leucocytes :	5.20	$10^3/\mu\text{L}$	(3.60–10.50)
Polynucléaires Neutrophiles :	34.0	%	
Soit:	1.76	$10^3/\mu\text{L}$	(1.50–7.70)
Polynucléaires Eosinophiles :	3.0	%	
Soit:	0.16	$10^3/\mu\text{L}$	(0.02–0.50)
Polynucléaires Basophiles :	0.0	%	
Soit:	0.00	$10^3/\mu\text{L}$	(<0.20)
Lymphocytes :	58.0	%	
Soit:	3.02	$10^3/\mu\text{L}$	(1.00–4.00)
Monocytes :	5.0	%	
Soit:	0.26	$10^3/\mu\text{L}$	(0.10–0.90)
Plaquettes :	139	$10^3/\mu\text{L}$	(160–370)

Frottis sanguin

Thrombopénie contrôlée sur frottis sanguin.

BIOCHIMIE SANGUINE

28-10-2021

Glycémie a jeun	1.09	g/L	(0.70–1.10)	1.23
	6.05	mmol/L	(3.89–6.11)	

Samira KOUTAIR
MIJHARLAB
Centre commercial Soufiane, Lot Chaima, Bd Abou Bakr EL KADIRI, Sidi Maarouf, Casablanca
Tél: 05 22 58 35 56 - 06 32 16 30 36 - Contactez pour RDV: 06 64 46 14 35 - http://rdvcovidmaroc.com/mijharlab
Page 1/3

Centre commercial Soufiane, Lot Chaima, Bd Abou Bakr EL KADIRI, Sidi Maarouf, Casablanca

Tél: 05 22 58 35 56 - 06 32 16 30 36 - Contactez pour RDV: 06 64 46 14 35 - http://rdvcovidmaroc.com/mijharlab

IF : 15252767 - TP : 36167325 - CNSS : 43023445 - ICE : 000114256000076 - E-mail : mijharlab@yahoo.fr

Dr Houda EL HADI

CARDIOLOGUE

Diplômée de la Faculté de Médecine
et de Pharmacie de Casablanca

DIU Echocardiographie de l'Université
Bordeaux II

DU Epreuve d'effort et réadaptation cardiovasculaire
de l'Université Bordeaux II



الدكتورة هدى الهايدي

إختصاصية في أمراض القلب والشرايين

خريجة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء.

دبلوم الفحص بالصدى بجامعة بوردو ||

دبلوم اختبار المجهد بجامعة بوردو ||

Casablanca, le

17/01/2023

Mr Boujada J. Rali

Samira KOUTAIR
MIJHARLA
Centre Commercial Soufiane, Lot Chaima
Bd. Abou Bar, El Kadiri Sidi Maârouf
CASABLANCA
Tél: 06 22 58 86 66 - 06 22 55 78 05

- GAT
- HbA_{1c}
- Cholestérol - HDL - LDL
- TG
- Crétatine
- NFS - Pg
- PSA
- A. urique

Dr. Houda EL HADI
CARDIOLOGUE

159, Bd Sidi Maârouf, (Lot Dandoun)
1^{er} Etage, Sidi Maârouf - Casablanca
Tél: 0522 58 48 57 - 06 50 69 53 36

159, Bd Sidi Maârouf (Lot. Dandoun) Sidi Maârouf - 1^{er} étage - Casablanca

Tél : 05 22 58 48 57 - Urgences : 06 50 69 53 36 - E-mail : dr.elhadicardio@gmail.com

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES MIJHARLAB

Centre commercial Soufiane, Lot Chaima, Bd Abou Bakr EL KADIRI,

Sidi Maarouf, Casablanca

Tél : 0522583556 - Fax : 0522581805

IF: 15252767 - TP: 36167325 - CNSS: 43023445 - ICE: 000114256000076 - INPE: 093061760

FACTURE N° : 230000768

Casablanca le 18-01-2023

Mr Jilali BOUJAMAA

Demande N° 2301182032

Date de l'examen : 18-01-2023

Analyses :

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
0100	Acide urique	B30	B
0106	Cholestérol total	B30	B
0110	Cholestérol HDL+ L D L	B80	B
0111	Créatinine	B30	B
0118	Glycémie	B30	B
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
0134	Triglycérides	B60	B
0216	Numération formule	B80	B
0361	PSA	B300	B

Total des B : 740

TOTAL DOSSIER : 750.00 DH

Type de règlement : Carte bancaire le 18-01-2023

Arrêtée la présente facture à la somme de : sept cent cinquante dirham s

Samira KOUTAÏD
Mijharlab
Centre Commercial Soufiane, Lot Chaima
Bd. Abou Bakr El Kadiri Sidi Maarouf
CASABLANCA
Tél: 0522 58 35 55 - 0522 58 18 00

لوتيقان® 5 ملجم/160 ملجم، 10 ملجم/160 ملجم، 5 ملجم/320 ملجم.

10 ملجم/320 ملجم، أقراص مغلفة

الاسمي الدولي الموحد (DCI): أمولوديبين/فالسارتان

يجب قراءة هذه النشرة كاملة قبل تناول هذا الدواء.

- يرجى الاحتفاظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قرائتها مرة ثانية.

- إذا كان لديك أي سؤال أو شله، يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.

- لقد تم وصف هذا الدواء كدواء شخصياً، ولا يجوز إعطاؤه لشخص آخر وإن تشابه الأعراض، فـ

- في حالة وجود آثار جانبية حادة، أو آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، يرجى استشارة

AMM N°: 460/15 DMP/21/NNP

PPV: 198.20 Dhs

N° Lot: 2HW454
Fab.: 09/2022
Per.: 09/2024



شعور بد
سعال،
والغماص
ناردة (قد
طنين الأنـ
عدم القراءـ

مع أعراض مثل: تشنج ضectoral،
الجسم، حكة، تشنج ضectoral.

إذا كان أي من هذه الآثار يؤثر عليك بشكل حاد، أحبر طبيبك.
تم تسوييل الآثار الجانبية التالية عند تناول العلاج المفرد من أمولوديبين
أو فالسارتان، ولم تلاحظ عند استعمال أمولوديبين/فالسارتان أو لوحظت بتكرار أكثر
من استعمال أمولوديبين/فالسارتان:

امولوديبين
استثر طبيبك أولاً إذا حصل لديك أي من الآثار الجانبية التالية التي تحدث بشكل حاد
ويمتد جداً بعد تناول هذا الدواء:

- أزيز تنفسمي ماجني، ألم الصدر، قصر النفس أو صعوبات في التنفس.
- تورم المفخن، الروجه أو الشفاف.

- تورم اللسان والحلق الذي يسبب صعوبة بالغة في التنفس.
- تفاعلات بلدية حادة تتضمن مفعظ جلدي حاد، الشرى، مفعح جلدي في جميع أنحاء

الجسم، حكة حادة، تتفاقم، تفشير و تورم الجلد، التهاب الأغشية المخاطية (متلازمة
ستيفن جونسون) أو تفاعلات تحسسية أخرى.

- نوبة قلبية، عدم انتظام نبضات القلب.

- التهاب الكيركياس الذي من الممكن أن يسبّ ألم حاد في البطن والظهر وإيقافه شعور
بالمرض الشديد.

سيحلل الآثار الجانبية التالية، إذا تسببت أي منها بحدوث مشكل أو إذا استمرت لمدة
أطول من أسبوع، يجب عليك الاتصال بطبيبك.

(الإحساس ببعضات القلب)، احمرار الوجه، تورم الكاحل (أو ديدما)، ألم في البطن،

1 - ما هو لوتيقان، أقراص مغلفة وما هي دواعي الاستعمال؟

2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول لوتيقان، أقراص مغلفة؟

3 - كيف يستعمل لوتيقان، أقراص مغلفة؟

4 - ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

5 - كيف يحفظ لوتيقان، أقراص مغلفة؟

6 - معلومات إضافية.

1. ما هو لوتيقان، أقراص مغلفة وما هي دواعي الاستعمال؟

يحتوي لوتيقان على أمولوديبين، وهو عبارة عن مادة فعالة تتنفس إلى مجموعة

مضادات الكالسيوم، و فالسارتان، الذي ينتهي إلى مجموعة تعرف بمضادات

ستقبلات أميجوتنس 2، تساعد كلا المادتين في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

يقوم أمولوديبين بتعسر قنوات الكالسيوم للأوعية الدموية، يعمل فالسارتان عن طريق

حدّر موقع الارتباط الداخلي، بشكل انتقائي (تعرف بأميجوتنس 2).

يُنصح عن ذلك استرخاء الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

يستعمل لوتيقان لعلاج ارتفاع ضغط الدم الأساسي.

يستعمل لوتيقان لعلاج المرضى البالغين الذين لا تسيطره على ارتفاع ضغط الدم

لديهم بشكل كافي عند استعمال العلاج المفرد من أمولوديبين أو فالسارتان.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول لوتيقان، أقراص مغلفة؟

قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم المطلوب على سبيل المثال إلى تلف الأوعية الدموية في

الدماغ، القلب، والكلى، وبالتالي حدوث سكتة دماغية، احتشاء عضلي قلبي أو قصور

في وظيفة الكلم، تقل خطورة العرض لمثل هذه الأمراض عن طريق تخفيف ضغط

الدم لديك إلى المعدل الطبيعي.

موازن الاستعمال:

لا تتناول أقراص مغلفة في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من الحساسية لأمولوديبين أو لأي من مكوناته، تناول الكالسيوم
(الآخر)، ذلك قد يسبب حكة، احمرار الجلد، ألم في العين،

لوتيقان® 5 ملجم/160 ملجم، 10 ملجم/160 ملجم، 5 ملجم/320 ملجم.

10 ملجم/320 ملجم، أقراص مغلفة

الاسمي الدولي الموحد (DCI): أمولوديبين/فالسارتان

يجب قراءة هذه النشرة كاملة قبل تناول هذا الدواء.

- يرجى الاحتفاظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قرائتها مرة ثانية.

- إذا كان لديك أي سؤال أو شله، يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.

- لقد تم وصف هذا الدواء كدواء شخصياً، ولا يجوز إعطاؤه لشخص آخر وإن تشابه الأعراض، فـ

- في حالة وجود آثار جانبية حادة، أو أثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، يرجى استشارة

AMM N°: 460/15 DMP/21/NNP

PPV: 198.20 Dhs

N° Lot: 2HW454
Fab.: 09/2022
Per.: 09/2024



شعور بد
سعال،
والغماص
ناردة (قد
طنين الأنـ
عدم القراءـ

مع أعراض مثل: تشنج ضectoral،
الجسم، حكة، تشنج ضectoral.

إذا كان أي من هذه الآثار يؤثر عليك بشكل حاد، أحبر طبيبك.
تم تسوييل الآثار الجانبية التالية عند تناول العلاج المفرد من أمولوديبين
أو فالسارتان، ولم تلاحظ عند استعمال أمولوديبين/فالسارتان أو لوحظت بتكرار أكثر
من استعمال أمولوديبين/فالسارتان:

امولوديبين
استثر طبيبك أولاً إذا حصل لديك أي من الآثار الجانبية التالية التي تحدث بشكل حاد
ويمتد جداً بعد تناول هذا الدواء:

- أزيز تنفسمي ماجني، ألم الصدر، قصر النفس أو صعوبات في التنفس.
- تورم المفخن، الروجه أو الشفاف.

- تورم اللسان والحلق الذي يسبب صعوبة بالغة في التنفس.
- تفاعلات بلدية حادة تتضمن مفعظ جلدي حاد، الشرى، مفعح جلدي في جميع أنحاء

الجسم، حكة حادة، تتفاقم، تفشير و تورم الجلد، التهاب الأغشية المخاطية (متلازمة
ستيفن جونسون) أو تفاعلات تحسسية أخرى.

- نوبة قلبية، عدم انتظام نبضات القلب.

- التهاب الكيركياس الذي من الممكن أن يسبّ ألم حاد في البطن والظهر وإيقافه شعور
بالمرض الشديد.

سيحلل الآثار الجانبية التالية، إذا تسببت أي منها بحدوث مشكل أو إذا استمرت لمدة
أطول من أسبوع، يجب عليك الاتصال بطبيبك.

(الإحساس ببعضات القلب)، احمرار الوجه، تورم الكاحل (أو ديدما)، ألم في البطن،

1 - ما هو لوتيقان، أقراص مغلفة وما هي دواعي الاستعمال؟

2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول لوتيقان، أقراص مغلفة؟

3 - كيف يستعمل لوتيقان، أقراص مغلفة؟

4 - ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

5 - كيف يحفظ لوتيقان، أقراص مغلفة؟

6 - معلومات إضافية.

1. ما هو لوتيقان، أقراص مغلفة وما هي دواعي الاستعمال؟

يحتوي لوتيقان على أمولوديبين، وهو عبارة عن مادة فعالة تتنفس إلى مجموعة
مضادات الكالسيوم، و فالسارتان، الذي ينتهي إلى مجموعة تعرف بمضادات

ستقبلات أميجوتنس 2، تساعد كلا المادتين في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.
يقوم أمولوديبين بتعفير قنوات الكالسيوم للأوعية الدموية، يعمل فالسارتان عن طريق

حدّر موقع الارتباط الداخلي، بشكل انتقائي (تعرف بأميجوتنس 2).
يُنصح عن ذلك استرخاء الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

يستعمل لوتيقان لعلاج ارتفاع ضغط الدم الأساسي.
يستعمل لوتيقان لعلاج المرضى البالغين الذين لا تسيطره على ارتفاع ضغط الدم
لديهم بشكل كافي عند استعمال العلاج المفرد من أمولوديبين أو فالسارتان.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول لوتيقان، أقراص مغلفة؟

قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم المطلوب على سبيل المثال إلى تلف الأوعية الدموية في
الدماغ، القلب، والكلى، وبالتالي حدوث سكتة دماغية، احتشاء عضلي قلبي أو قصور

في وظيفة الكلى، تقل خلوة العرض لمثل هذه الأمراض عن طريق تخفيف ضغط
الدم الذي يدلك إلى المعدل الطبيعي.

موازن الاستعمال:

لا تتناول لوتيقان في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من الحساسية لأمولوديبين أو لأي من مكوناته، تناول الكالسيوم
(الآخر)، ذلك قد يسبب حكة، احمرار الجلد، ألم في العضلات، صعوبة في التنفس.

لوتيقان® 5 ملجم/160 ملجم، 10 ملجم/160 ملجم، 5 ملجم/320 ملجم.

10 ملجم/320 ملجم، أقراص مغلفة

الاسمي الدولي الموحد (DCI): أمولوديبين/فالسارتان

يجب قراءة هذه النشرة كاملة قبل تناول هذا الدواء.

- يرجى الاحتفاظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قرائتها مرة ثانية.

- إذا كان لديك أي سؤال أو شله، يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.

- لقد تم وصف هذا الدواء كدواء شخصياً، ولا يجوز إعطاؤه لشخص آخر وإن تشابه الأعراض، فـ

- في حالة وجود آثار جانبية حادة، أو أثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، يرجى استشارة

AMM N°: 460/15 DMP/21/NNP

PPV: 198.20 Dhs

N° Lot: 2HW454
Fab.: 09/2022
Per.: 09/2024



شعور بد
سعال،
والغماص
ناردة (قد
طنين الأن
عدم القراءة

مع أعراض مثل: تشنج ضectoral،
الجسم، حكة، تشنج ضectoral.

إذا كان أي من هذه الآثار يؤثر عليك بشكل حاد، أحبر طبيبك.
تم تسوييل الآثار الجانبية التالية عند تناول العلاج المفرد من أمولوديبين
أو فالسارتان، ولم تلاحظ عند استعمال أمولوديبين/فالسارتان أو لوحظت بتكرار أكثر
من استعمال أمولوديبين/فالسارتان:

استثر طبيبك أولاً إذا حصل لديك أي من الآثار الجانبية التالية التي تحدث بشكل حاد
وإذار جدأ بعد تناول هذا الدواء:

- أزيز تنفسمي ماجني، ألم الصدر، قصر النفس أو صعوبات في التنفس.
- تورم المفخون، الروجه أو الشفاف.

- تورم اللسان والحلق الذي يسبب صعوبة بالغة في التنفس.
- تفاعلات بلدية حادة تتضمن مفعظ جلدي حاد، الشرى، مفعح جلدي في جميع أنحاء

الجسم، حكة حادة، تتفاقم، تفشير و توفر الجلد، التهاب الأغشية المخاطية (متلازمة
ستيفن جونسون) أو تفاعلات تحسسية أخرى.

- نوبة قلبية، عدم انتظام نبضات القلب.

- التهاب الكيركياس الذي من الممكن أن يسبّ ألم حاد في البطن والظهر وإيقافه شعور
بالمرض الشديد.

سيحل الآثار الجانبية التالية، إذا تسببت أي منها بحدوث مشكل أو إذا استمرت لمدة
أطول من أسبوع، يجب عليك الاتصال بطبيبك.

(الإحساس بتدهورات القلب)، احمرار الوجه، تورم الكاحل (أو ديدما)، ألم في البطن،

1 - ما هو لوتيقان، أقراص مغلفة وما هي دواعي الاستعمال؟

2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول لوتيقان، أقراص مغلفة؟

3 - كيف يستعمل لوتيقان، أقراص مغلفة؟

4 - ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

5 - كيف يحفظ لوتيقان، أقراص مغلفة؟

6 - معلومات إضافية.

1. ما هو لوتيقان، أقراص مغلفة وما هي دواعي الاستعمال؟

يحتوي لوتيقان على أمولوديبين، وهو عبارة عن مادة فعالة تتنفس إلى مجموعة
مضادات الكالسيوم، و فالسارتان، الذي ينتهي إلى مجموعة تعرف بمضادات
ستقبولات أميجوتنس 2 تساعد كلا المادتين في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.
يقوم أمولوديبين بتعسر قنوات الكالسيوم للأوعية الدموية يعمل فالسارتان عن طريق
حدّر موقع الارتباط الداخلي بكل انتقائي (تعرف بأميجوتنس 2).

يُنصح عن ذلك استرخاء الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.
يستعمل لوتيقان لعلاج ارتفاع ضغط الدم الأساسي.
يستعمل لوتيقان لعلاج المرضى البالغين الذين لا تسيطره على ارتفاع ضغط الدم
لديهم بشكل كافي عند استعمال العلاج المفرد من أمولوديبين أو فالسارتان.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول لوتيقان، أقراص مغلفة؟

قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم المطلوب على سبيل المثال إلى تلف الأوعية الدموية في
الدماغ، القلب، والكلى، وبالتالي حدوث سكتة دماغية، احتشاء عضلي قلبي أو قصور
في وظيفة الكل، تقل خلودرة العرض لمثل هذه الأمراض عن طريق تخفيف ضغط
الدم الذي يزيد إلى المعدل الطبيعي.

موازن الاستعمال:

لا تتناول لوتيقان في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من الحساسية لأموليوديبين أو لأي من مكوناته، تناول الكالسيوم
(الآخر)، ذلك قد يسبب حكة، احمرار الجلد، ألم في البطن،

Dénomination du médicament :

Tareg® 40 mg**Tareg® 80 mg****Tareg® 160 mg**

DCI : Valsartan

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice car elle contient des informations importantes.

Si vous avez besoin de la notice, si vous avez un doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.



- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice ?
2. Qu'est-ce que tareg et dans quel cas est-il utilisé ?
3. Quelles sont les informations à connaître avant <de prendre> <d'utiliser> tareg ?
4. Comment <prendre> <utiliser> tareg ?
5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
6. Comment conserver tareg ?

1. Qu'est-ce que Tareg et dans quel cas est-il utilisé ?

Tareg contient une substance active qui influence le système régulant la pression artérielle de l'organisme. Il produit une dilatation des vaisseaux sanguins et fait baisser ainsi la pression artérielle. Votre médecin peut contrôler l'effet du médicament en prenant votre tension.

Tareg est utilisé dans le traitement de l'hypertension légère à modérée chez les adultes ainsi que chez les enfants et les adolescents de 6 à 18 ans.

Votre médecin peut aussi vous prescrire Tareg en cas d'insuffisance cardiaque légère à modérée (faiblesse du muscle cardiaque, rendement insuffisant du cœur) en

combinaison avec d'autres médicaments lorsque vous ne tolérez pas certains médicaments à cause de leurs effets secondaires.

Votre médecin peut aussi prescrire Tareg pour traiter les patients après un infarctus du myocarde. Tareg ne doit être pris que sur prescription médicale.

2. Quelles sont les informations à connaître avant <de prendre> <d'utiliser> Tareg?

Une hypertension artérielle non traitée peut entraîner des lésions au niveau des organes vitaux comme le cœur, les reins et le cerveau. Vous pouvez vous sentir en parfaite santé et ne ressentir aucune manifestation de maladie mais une hypertension non traitée peut entraîner des séquelles tardives telles qu'une attaque cérébrale, un infarctus du myocarde, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale ou la cécité. Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à la conduite et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines.

- Prévenez votre médecin avant de prendre Tareg si vous
- souffrez d'une maladie grave des reins ou du foie,
 - souffrez de vomissements ou de diarrhée ou si vous prenez de fortes doses de diurétiques (qui servent à éliminer l'eau en excès dans votre organisme).
 - Si vous présentez des réactions telles qu'un gonflement du visage, des bras et des jambes, des yeux, des lèvres ou de la langue (signes d'un angio-oedème) après la prise de Tareg. Dans ces cas, vous devez être surveillé et recevoir éventuellement un traitement approprié.

Il est important qu'un manque de sel et/ou qu'une hydratation insuffisante de votre organisme soient corrigés avant le début du traitement. Ceci peut se produire en cas de forts vomissements, de diarrhées ou si vous prenez des diurétiques. La prudence est recommandée si vous êtes traité par un inhibiteur de l'ECA ou l'aliskirène (médicaments contre l'hypertension artérielle).

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez un autre médicament en plus de Tareg car il faudra peut-être modifier les doses, prendre certaines précautions ou, dans certains cas, cesser de prendre l'un des médicaments. Ceci concerne les médicaments sur ordonnance ainsi que ceux en vente libre et tout particulièrement

- les médicaments utilisés pour le traiter l'hypertension, en particulier les diurétiques de l'ECA ou l'aliskirène,
- les médicaments d'épargne potassique destinés à compenser un manque de p

et d'acide urique, de la diabète ou de l'insuline. Les inhibiteurs du récepteur de