

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0013418

Maladie

Dentaire


Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 1925 Société : R.A.M
 Actif Pensionné(e) Autre : 149386
 Nom & Prénom : Boudchar M'HAMED
 Date de naissance : 17.7.1955
 Adresse : 32, Bd JANVIER ANFA TOHAMMEDIA
 Tél. 066.11.923.24 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

 Date de consultation : 27.12.22
 Nom et prénom du malade : Boudchar M'HAMED Age :
 Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant
 Nature de la maladie : GNC
 Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.
 M J 16 FEV. 2023
 Fait à : ACCUEIL Le :
 Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
27/12/22		2	300,00	Docteur EL MEJDI M. Spécialiste des Prothèses dentaires Centre d'Henri Cailleau 125 Bd Oujda Belvédère Casablanca N° P. 0910 110 001

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE EL AALI Dr. KHALID ZIoud 104 Bd. El Houcine El Alia Mohammedia Tél : 05 23 32 77 68	27/12/2022	699,80

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Dr. Et HAJAJ Dr. Mohamed Central Tél: 05 23 31 20 31	26/12/2022	81,30	200,00
		1/2	0,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	


RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION




O.D.F
PROTHESSES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	00000000	00000000
G	35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

مركز أمراض الكلى والكلية الاصطناعية بلڤيدير


CENTRE D'HÉMODIALYSE ET DE NEPHROLOGIE - BELVÉDÈRE

Dr. M. EL MEHDI

Docteur d'Etat Français de Médecine
Spécialiste des Maladies des Reins
(Major de promotion du CES Français)
Ex Prof Assistant au CHU de Marseille.
Ex Attaché d'enseignement à la Faculté de Médecine de Marseille.

Ex Chef de Service de Néphrologie Hémodialyse
de la Polyclinique de la CNSS de Casablanca.

Ex 1^{er} Vice Président de la Société Marocaine de Néphrologie (SMN).
Ex Secrétaire Général de la Société Marocaine des Maladies Rénaliennes.



الدكتور م.المهدي

الدكتورة الفرنسية لطب
اختصاصي في أمراض الكلى
(متخصص الدفع في اختصاص أمراض الكلى في فرنسا)
أستاذ مساعد بمستشفيات مارسيليا سابقا.
ملحق بالتعليم سابق بكلية الطب مارسيليا.
رئيس مصلحة أمراض الكلى و الكلية الاصطناعية.
سابقا بمصحة الضمان الاجتماعي بالدار البيضاء.



Casablanca, le

26/10/22



Dr. M. EL MEHDI
Spécialiste des Maladies des Reins
Centre d'Hémodialyse
Belvédère Casablanca

126, Bd.d'Oujda - 2^{ème} étage - Belvédère (face gare des voyageurs) Casablanca - Tel : 05 22 40 07 56 / 24 61 43 - fax : 05 22 40 96 96 - Email : elmehdim55@gmail.com - موقعنا على الأنترنيت : www.hemodialysebelvedere.ma - العنوان : 126 شارع وحدة بلطفة (الدار البيضاء) - الباركود : 001691193000054 - IF : 46700800 - ت.م : 2342468 - CNSS : 2342468 - ت.ف : 05 22 40 07 56 - PA : 625013 - رقم. : 0918297 - ص.م.م. : 2004 - Patente : 32502235 - الموقع الإلكتروني : www.hemodialysebelvedere.ma

LABORATOIRE CENTRAL D'ANALYSES MEDICALES

Dr. EL HAJAJI MOHAMED
Abderahmane serghni- Mohammedia.

ICE: 001855144000069

Pat: 39574999

IF: 20719572

INPE



093002509

FACTURE N° : 221200754

MOHAMMEDIA le 26-12-2022

Mr BOUDCHAR M HAMED
2212260024

INPE

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
9105	Prélèvement sanguin	E25	E
0111	Créatinine	B30	B
	Rapport protéinurie sur créatinurie	B100	B

Total des B : 130

22122600

TOTAL DOSSIER : 200.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : deux cents dirham s.





LABORATOIRE
CENTRAL

المختبر المركزي للتحاليل الطبية

LABORATOIRE CENTRAL ANALYSES MEDICALES

الحمدية - (في إتجاه باب القصبة)

Microbiologie - Hématologie - Toxicologie - Biochimie - Hormonologie - Immunologie - Fécondation in vitro

Dr. Mohamed EL HAJAJI

الدكتور محمد الحاجي

Date du prélèvement : 26-12-2022 à 08:43

Code patient : 1811070066

Né(e) le : 17-07-1955 (67 ans)

Edition du : 26-12-2022

INPE



093002509

Mr BOUDCHAR M HAMED

Référence : 2212260024

Prescripteur : Dr EL MEHDI.M

BIOCHIMIE SANGUINE

25-10-2022

Créatinine

(Test de coloration cinétique)

10.250 mg/L
90.200 µmol/L

(8.100-14.400)
(71.280-126.720)

10.742
94.530

Clairance calculée:

(par méthode de filtration glomérulaire MDRD)

77 ml/mn/1.73²

25-10-2022

73

Interprétation (Selon l'ANASE):

- >ou=60 : Absence d'atteinte rénale si aucun marqueur anormal
- >ou=60 : Maladie rénale chronique si un ou plusieurs marqueurs (Stade 1)
- 30-59 : Insuffisance rénale modérée (Stade 2)
- 15-29 : Insuffisance rénale sévère (Stade 3)
- <15 : Insuffisance rénale terminale (Stade 4)

BIOCHIMIE URINAIRE

Rapport protéinurie / créatinurie sur échantillon urinaire

Créatinurie:

1 457.80 mg/l

Protéinurie :

139.31 mg/l

Rapport protéinurie sur créatinurie:

0.10 g/g

25-10-2022

1 520.10

176.30

(0.00-0.16) * 0.12



Résultats confirmés (RC)

En vous remerciant pour votre confiance

www.labocentral.ma

Dr. Mohamed EL HAJAJI

الطابق السفلي عماره الدرر ، شارع عبد الرحمن السرغيني (في اتجاه القصبة) - العددية

RDC : 1 Immeuble EL HORE , Blv Abderahmane Serghini - Mohammedia - Maroc

Tél. : 05 23 31 20 31 / Fax : 05 23 31 01 46 - E-mail: lc2amohammed@gmail.com

Pour le Prélèvement à Domicile Veuillez Contacter : 06 73 74 73 88

مركز أمراض الكلى والكلية الاصطناعية بلفدير

CENTRE D'HÉMODIALYSE ET DE NEPHROLOGIE - BELVÉDÈRE

Dr. M. EL MEHDI

Docteur d'Etat Français de Médecine
Spécialiste des Maladies des Reins
(Major de promotion du CES Français)
Ex Prof Assistant au CHU de Marseille.
Ex Attaché d'enseignement à la Faculté
de Médecine de Marseille.

Ex Chef de Service de Néphrologie Hémodialyse
de la Polyclinique de la CNSS de Casablanca.

Ex 1^{er} Vice Président de la Société Marocaine de Néphrologie (SMN).
Ex Secrétaire Général de la Société Marocaine des Maladies Rénale.



الدكتور م.المهدي


الدكتورة الفرنسية للطب
اختصاصي في أمراض الكلى
(متعدد الفعقة في اختصاص أمراض الكلى في فرنسا)
أستاذ مساعد بمستشفيات مارسيليا سابقا.
ملحق بالتعليم سابقا بكلية الطب مارسيليا.
رئيس مصلحة أمراض الكلى و الكلية الاصطناعية.
سابقا بمصلحة الضمان الاجتماعي بالدار البيضاء.



Casablanca, le

27/12/22

Mr Boudchar Nhan



22.80X3
Cortancyl 5 mg
1/1 3 Bah
13.40X5
Btancyl 1 mg
1/1 3 Bah
75.20X2
Amef 10 1/2 1/1 3 Bah
22.00X2 Amel 10 1/2 1/1 3 Bah
12.20 Curotox 10 1/1 3 Bah

Dr. MEHDI M.
Spécialiste des Maladies des Reins
Centre d'Hémodialyse
Belvédère - Casablanca

PHARMACIE EL AÏA
Dr. KHALID ZIOUD
394 Bd. El Houda
10000 Casablanca

-699.80

126, Bd.d'Oujda - 2^{ème} étage - Belvédère (face-gare des voyageurs) Casablanca - Site web : www.hemodialysebelvedere.ma

الموقع الإلكتروني : Site web : www.hemodialysebelvedere.ma - البريد الإلكتروني : elmehdim55@gmail.com

Tel : 05 22 40 07 56 / 24 61 43 - Fax : 05 22 40 96 96 - Email : elmehdim55@gmail.com - المكتب : 126, Bd.d'Oujda - 2^{ème} étage - Belvédère - Casablanca

ICE : 001691193000054 - Cass : 2342468 - ت.م : 46700800 - ض.م : 625043 - Patente : 32502235

Patente : 32502235 - ت.م : 46700800 - ض.م : 625043



Cortancyl® 5mg

Prednisone

Comprimé sécable

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous sera prescrit. Ne le donnez pas à d'autrui, même si les signes sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez quelque chose de désirable, parlez-en à votre pharmacien. Ceci n'aurait leur être nocif, même si les signes sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez quelque chose de désirable, parlez-en à votre pharmacien. Ceci n'aurait leur être nocif, même si les signes sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez quelque chose de désirable, parlez-en à votre pharmacien. Ceci n'aurait leur être nocif, même si les signes sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez quelque chose de désirable, parlez-en à votre pharmacien. Ceci n'aurait leur être nocif, même si les signes sont identiques aux vôtres.

PER-01-2002
01-2002
CP SEC 360
CORTANCYL 5mg
mg, comprimé sécable ET
DA

mg, comprimé sécable ET
DA
Code ATC : H02AB07
Systématique
(H. Hormones systémiques, non sexuelles).

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un corticoïde (également appelé anti-inflammatoire stéroïdien).

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans et de plus de 20 kg.

Ce médicament est utilisé dans de nombreuses maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire. Son action est utilisée dans le traitement de nombreuses affections inflammatoires ou allergiques.

À fortes doses, ce médicament diminue les réactions immunitaires et est donc également utilisé pour prévenir ou traiter le rejet de greffes d'organes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CORTANCYL 5 mg, comprimé sécable ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais CORTANCYL 5 mg, comprimé sécable :

- Si vous êtes allergique à la prednisone ou à l'un des autres composants contenus dans CORTANCYL 5 mg, comprimé

sécable, mentionnés à la rubrique 6.*

- Si vous avez une infection.
- Si vous souffrez actuellement d'une maladie virale (hépatite virale, varicelle) ou qui peut réapparaître (herpès, zona).
- Si vous avez des problèmes mentaux et que vous n'êtes pas traité pour ceux-ci.
- Si vous devez être vacciné par un vaccin vivant (par exemple contre la rougeole, la varicelle, la fièvre jaune...).
- Chez l'enfant de moins de 6 ans car il peut avaler de travers le comprimé et s'étouffer.

Avertissements et précautions

Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale.

Avant le traitement, prévenez votre médecin :

- Si vous avez été vacciné récemment,
- Si vous avez un ulcère digestif, une maladie du gros intestin, ou si vous avez été opéré récemment pour un problème d'intestin,
- Si vous avez du diabète (taux de sucre trop élevé dans le sang), ou une tension artérielle élevée,
- Si vous avez une infection (notamment si vous avez eu la tuberculose),
- Si vos reins ou votre foie ne fonctionnent pas correctement,
- Si vous souffrez d'ostéoporose (maladie des os avec une fragilité des os) et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire),
- Si vous avez séjourné dans les régions tropicale, subtropicale ou le sud de l'Europe, en raison du risque de maladie parasitaire,
- Si vous avez une maladie des glandes surrénales appelée Syndrome de Cushing,
- Si vous avez des problèmes rénaux ou un taux élevé d'acide urique dans votre sang avant de commencer le traitement par CORTANCYL 5 mg, comprimé sécable. Vous devez informer votre médecin si vous présentez des symptômes du syndrome de lyse tumorale tels que crampes musculaires, faiblesse musculaire, confusion, perte de vision ou troubles visuels, essoufflement, convulsions, rythme cardiaque irrégulier ou insuffisance rénale (diminution de la quantité d'urine ou assombrissement de l'urine) au cas où vous souffririez d'une tumeur maligne hématologique (voir rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables éventuels »).

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre CORTANCYL 5 mg, comprimé sécable si vous souffrez de:

- Sclérodermie (également connue sous le nom de sclérose systémique, un trouble auto-immun), car des doses journalières de 15 mg ou plus peuvent augmenter le risque

de développement de la sclérose, sont, entre autres, une pression artérielle élevée et une augmentation de la pression artérielle.

Pendant le traitement

- Prévenez votre médecin si vous avez des douleurs articulaires, douleurs musculaires, douleurs favorisées par le temps, la position ou la manière de faire certaines choses.
- Ce médicament peut entraîner des effets indésirables liés à la surrénaux, à l'ovaire ou à la thyroïde.
- Évitez les situations de stress, de fatigue ou de tension.
- Privilégiez une alimentation équilibrée et une activité physique régulière.
- Votre médecin peut vous prescrire des médicaments pour prévenir les effets indésirables.



Cortancyl® 5mg

Prednisone

Comprimé sécable

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été prescrit personnellement. Ne le donnez pas à d'autr^es, il pourrait leur être nocif, même si les signes sont identiques aux vôtres.
 - Si vous ressentez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien. Ceci s'applique également à toute personne qui ne serait pas mentionnée dans la rubrique 4.

1. QU'F mg, comprimé sécable ET
DA' ISE ?

Classe n°

Close phar-

GEOCORPORATE MANAGEMENT

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un corticoïde (également appelé anti-inflammatoire stéroïdien).

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans et de plus de 20 kg.

Ce médicament est utilisé dans de nombreuses maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire. Son action est utile dans le traitement de nombreuses affections inflammatoires ou allergiques.

À fortes doses, ce médicament diminue les réactions immunitaires et est donc également utilisé pour prévenir ou traiter le rejet de greffes d'organes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CORTANCYL 5 mg, comprimé sécable ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais CORTANCYL 5 mg, comprimé sécable :

- Si vous êtes allergique à la prednisone ou à l'un des autres composants contenus dans CORTANCYL 5 mg, comprimé

sécable, mentionnés à la rubrique 6.

- Si vous avez une infection.
 - Si vous souffrez actuellement d'une maladie virale (hépatite virale, varicelle) ou qui peut réapparaître (herpès, zona).
 - Si vous avez des problèmes mentaux et que vous n'êtes pas traité pour ceux-ci.
 - Si vous devez être vacciné par un vaccin vivant (par exemple contre la rougeole, la varicelle, la fièvre jaune...).
 - Chez l'enfant de moins de 6 ans car il peut avaler de travers le comprimé et s'étouffer.

Avertissements et précautions

Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale.

Avant le traitement, prévenez votre médecin :

- Si vous avez été vacciné récemment,
 - Si vous avez un ulcère digestif, une maladie du gros intestin, ou si vous avez été opéré récemment pour un problème d'intestin,
 - Si vous avez du diabète (taux de sucre trop élevé dans le sang), ou une tension artérielle élevée,
 - Si vous avez une infection (notamment si vous avez eu la tuberculose),
 - Si vos reins ou votre foie ne fonctionnent pas correctement,
 - Si vous souffrez d'ostéoporose (maladie des os avec une fragilité des os) et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire),
 - Si vous avez séjourné dans les régions tropicale, subtropicale ou le sud de l'Europe, en raison du risque de maladie parasitaire,
 - Si vous avez une maladie des glandes surrénales appelée Syndrome de Cushing,
 - Si vous avez des problèmes rénaux ou un taux élevé d'acide urique dans votre sang avant de commencer le traitement par CORTANCYL 5 mg, comprimé sécable. Vous devez informer votre médecin si vous présentez des symptômes du syndrome de lyse tumorale tels que crampes musculaires, faiblesse musculaire, confusion, perte de vision ou troubles visuels, essoufflement, convulsions, rythme cardiaque irrégulier ou insuffisance rénale (diminution de la quantité d'urine ou assombrissement de l'urine) au cas où vous souffrirez d'une tumeur maligne hématologique (voir rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables éventuels »).

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre CORTANCYL 5 mg, comprimé sécable si vous souffrez de:

- **Sclérodermie** (également connue sous le nom de sclérose systémique, un trouble auto-immun), car des doses journalières de 15 mg ou plus peuvent augmenter le risque

de dévelo
scléroder
sont, ent
et une di
peut vous
pression

Pendant

- Prévence douleurs douleurs favorise manière Ce médic liées à la surrénal
 - Evitez ou de gray
 - Pré ce tra dâ
 - V
 - P



Cortancyl® 5mg

Prednisone

Comprimé sécable

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été prescrit personnellement. Ne le donnez pas à d'autre, même si les signes sont identiques aux vôtres.
 - Si vous ressentez des effets indésirables, contactez votre pharmacien. Ceci aide à identifier les effets indésirables qui ne seraient pas signalés dans la rubrique 4.

1. QU'F mg, comprimé sécable ET
DA ISE ?

Classe n°

Glucocorticoids

SECOSECORTICOL (H. Hormones systématiques)

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un corticoïde (également appelé anti-inflammatoire stéroïdien).

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans et de plus de 20 kg.

Ce médicament est utilisé dans de nombreuses maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire. Son action est utile dans le traitement de nombreuses affections inflammatoires ou allergiques.

À fortes doses, ce médicament diminue les réactions immunitaires et est donc également utilisé pour prévenir ou traiter le rejet de greffes d'organes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CORTANCYL 5 mg, comprimé sécable ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais CORTANCYL 5 mg, comprimé sécable :

- Si vous êtes allergique à la prednisone ou à l'un des autres composants contenus dans CORTANCYL 5 mg, comprimé

séable, mentionnés à la rubrique 6.7.

- Si vous avez une infection.
 - Si vous souffrez actuellement d'une maladie virale (hépatite virale, varicelle) ou qui peut réapparaître (herpès, zona).
 - Si vous avez des problèmes mentaux et que vous n'êtes pas traité pour ceux-ci.
 - Si vous devez être vacciné par un vaccin vivant (par exemple contre la rougeole, la varicelle, la fièvre jaune...).
 - Chez l'enfant de moins de 6 ans car il peut avaler de travers le comprimé et s'étouffer.

Avertissements et précautions

Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale.

Avant le traitement, prévenez votre médecin :

- Si vous avez été vacciné récemment,
 - Si vous avez un ulcère digestif, une maladie du gros intestin, ou si vous avez été opéré récemment pour un problème d'intestin,
 - Si vous avez du diabète (taux de sucre trop élevé dans le sang), ou une tension artérielle élevée,
 - Si vous avez une infection (notamment si vous avez eu la tuberculose),
 - Si vos reins ou votre foie ne fonctionnent pas correctement,
 - Si vous souffrez d'ostéoporose (maladie des os avec une fragilité des os) et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire),
 - Si vous avez séjourné dans les régions tropicale, subtropicale ou le sud de l'Europe, en raison du risque de maladie parasitaire,
 - Si vous avez une maladie des glandes surrénales appelée Syndrome de Cushing,
 - Si vous avez des problèmes rénaux ou un taux élevé d'acide urique dans votre sang avant de commencer le traitement par CORTANCYL 5 mg, comprimé sécable. Vous devez informer votre médecin si vous présentez des symptômes du syndrome de lyse tumorale tels que crampes musculaires, faiblesse musculaire, confusion, perte de vision ou troubles visuels, essoufflement, convulsions, rythme cardiaque irrégulier ou insuffisance rénale (diminution de la quantité d'urine ou assombrissement de l'urine) au cas où vous souffrirez d'une tumeur maligne hématologique (voir rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables éventuels »).

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre CORTANCYL 5 mg, comprimé sécable si vous souffrez de:

- **Sclérodermie** (également connue sous le nom de sclérose systémique, un trouble auto-immun), car des doses journalières de 15 mg ou plus peuvent augmenter le risque

de dévelo
scléroder
sont, ent
et une di
peut vous
pression

Pendant

- Prévence douleurs douleurs favorise manière Ce médic liées à la surrénal
 - Evitez ou de gray
 - Pré ce tra dâ
 - V
 - P

Ramipril

Comprimé

sanofi aventis

Cette notice étant régulièrement remise attentivement avant d'utiliser une nouvelle fois, ne pas hésiter à contacter votre médecin.

convient de la lire toute question ne

COMPOSITION

TRIATEC® 1,25 mg : Ramipril ...

TRIATEC® 2,5 mg : Ramipril ...

TRIATEC® 5 mg : Ramipril ...

TRIATEC® Protect 10 mg : R...

Excipients (communs) : fécule de préégélatinisé, cellulose microcristalline, fer jaune (pour TRIATEC® 10 mg).

1,25 mg/comprimé.

.... 2,5 mg/comprimé.

..... 5 mg/comprimé.

..... 10 mg/comprimé.

cellulose, amidon de maïs, amarate de sodium, oxyde de fer rouge (pour TRIATEC® 5 mg).

FORME PHARMACEUTIQUE

TRIATEC® 1,25 mg : 25 mg, boîte de 30.

TRIATEC® 2,5 mg : 25 mg, boîte de 30.

TRIATEC® 5 mg : 25 mg, boîtes de 15 et 30.

TRIATEC® Protect 10 mg : dosés à 10 mg, boîtes de 15 et 30.

TONS

25 mg, boîte de 30.

25 mg, boîte de 30.

25 mg, boîtes de 15 et 30.

dosés à 10 mg, boîtes de 15 et 30.

INDICATION

- Hypertension artérielle
- Insuffisance cardiaque aigüe d'un infarctus du myocarde.
- Réduction de la mortalité et de la morbidité dans les cas d'insuffisance cardiaque après la phase aiguë d'un infarctus du myocarde.
- Néphropathie glomérulaire manifeste avec ou sans diabète.
- Début de néphropathie diabétique chez les patients souffrant de diabète du type II et d'hypertension artérielle.
- Maladie vasculaire avec athérosclérose établie (avec ou sans diabète de type II) : prévention de l'infarctus du myocarde, de l'accident vasculaire cérébral ou des décès cardiovasculaires.

CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité au ramipril, à un autre inhibiteur de l'enzyme de la转换酶.

TRIATEC®

1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg, 10 mg

Ramipril

Comprimé

sanofi aventis

Cette notice étant régulièrement remise attentivement avant d'utiliser une nouvelle fois, ne pas hésiter à contacter votre médecin.

convient de la lire toute question ne

COMPOSITION

TRIATEC® 1,25 mg : Ramipril ...

TRIATEC® 2,5 mg : Ramipril ...

TRIATEC® 5 mg : Ramipril ...

TRIATEC® Protect 10 mg : R...

Excipients (communs) : fécule de préégélatinisé, cellulose microcristalline, fer jaune (pour TRIATEC® 10 mg).

1,25 mg/comprimé.

.... 2,5 mg/comprimé.

..... 5 mg/comprimé.

..... 10 mg/comprimé.

cellulose, amidon de maïs, amarate de sodium, oxyde de fer rouge (pour TRIATEC® 5 mg).

FORME PHARMACEUTIQUE

TRIATEC® 1,25 mg : 25 mg, boîte de 30.

TRIATEC® 2,5 mg : 25 mg, boîte de 30.

TRIATEC® 5 mg : 25 mg, boîtes de 15 et 30.

TRIATEC® Protect 10 mg : dosés à 10 mg, boîtes de 15 et 30.

TONS

25 mg, boîte de 30.

25 mg, boîte de 30.

25 mg, boîtes de 15 et 30.

dosés à 10 mg, boîtes de 15 et 30.

INDICATION

- Hypertension artérielle
- Insuffisance cardiaque aigüe d'un infarctus du myocarde.
- Réduction de la mortalité et de la morbidité dans les cas d'insuffisance cardiaque après la phase aiguë d'un infarctus du myocarde.
- Néphropathie glomérulaire manifeste avec ou sans diabète.
- Début de néphropathie diabétique chez les patients souffrant de diabète du type II et d'hypertension artérielle.
- Maladie vasculaire avec athérosclérose établie (avec ou sans diabète de type II) : prévention de l'infarctus du myocarde, de l'accident vasculaire cérébral ou des décès cardiovasculaires.

CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité au ramipril, à un autre inhibiteur de l'enzyme de la转换酶.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Cortancyl® 1 mg, comprimé

Prednisone

SANOFI 

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de
 - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre m
 - Ce médicament vous a été personnellement presc noci, même si les signes de leur maladie sont iden
 - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas men

**Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Cortancyl 1 mg., cp b
P.P.V.: 13.40 DH**

PAPERS : 1970 EDITION

5 118001 0802

6-118001 - 0803

quel cas est-il utilisé

prendre CORTANCYL

pièce CORIANTE

COLLECTOR'S

ມາດຕະຖານດາວິທະາບອນ

www.oxfordjournals.org

IGV 12.5.2018 10:20:00

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CORTANCYL 1 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CORTANCYL 1 mg, comprimé ?
 3. Comment prendre CORTANCYL 1 mg, comprimé ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver CORTANCYL 1 mg, comprimé ?
 6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE CORTANCYL 1 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC: H02AB07
GLUCOCORTICOIDES - USAGE SYSTEMIQUE.
(H. Hormones systémiques non sexuelles).

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un corticoïde (également appelé anti-inflammatoire stéroïdien).

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Cortancyl® 1 mg, comprimé

Prednisone

SANOFI 

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de
 - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre m
 - Ce médicament vous a été personnellement presc nociif, même si les signes de leur maladie sont ide
 - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas men

**Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Cortancyl 1 mg., cp b
P.P.V.: 13.40 DH**

PAPERS : 1970 EDITION

5 118001 0802

6-118001 - 0803

quel cas est-il utilisé

prendre CORTANCYL

pièce CORIANTE

COLLECTOR'S

ມາດຕະຖານດາວິທະາບອນ

↳ [View Article Online](#)

IGV 12.5.2018 10:20:00

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CORTANCYL 1 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CORTANCYL 1 mg, comprimé ?
 3. Comment prendre CORTANCYL 1 mg, comprimé ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver CORTANCYL 1 mg, comprimé ?
 6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE CORTANCYL 1 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC: H02AB07
GLUCOCORTICOIDES - USAGE SYSTEMIQUE.
(H. Hormones systémiques non sexuelles).

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un corticoïde (également appelé anti-inflammatoire stéroïdien).

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Cortancyl® 1 mg, comprimé

Prednisone

SANOFI 

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de
 - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre m
 - Ce médicament vous a été personnellement presc nociif, même si les signes de leur maladie sont ide
 - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas men

**Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Cortancyl 1 mg., cp b
P.P.V.: 13.40 DH**

PAPERS : 1970 EDITION

5 118001 0802

6-118001 - 0803

quel cas est-il utilisé

prendre CORTANCYL

prendre CONFIANCE

www.english-test.net

ພາບທີ ၃၇၆ ຂອງພົມ ၂၀၁

Digitized by srujanika@gmail.com

Revista Andina de Ciencias Sociales

IGV 12.5.2019 10:20:00

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CORTANCYL 1 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CORTANCYL 1 mg, comprimé ?
 3. Comment prendre CORTANCYL 1 mg, comprimé ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver CORTANCYL 1 mg, comprimé ?
 6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE CORTANCYL 1 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

**Classe pharmacothérapeutique - code ATC: H02AB07
GLUCOCORTICOIDES - USAGE SYSTEMIQUE.
(H. Hormones systémiques non sexuelles).**

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un corticoïde (également appelé anti-inflammatoire stéroïdien).

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Cortancyl® 1 mg, comprimé

Prednisone

SANOFI 

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de
 - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre m
 - Ce médicament vous a été personnellement presc nociif, même si les signes de leur maladie sont ide
 - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas men

**Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Cortancyl 1 mg, cp b
P.P.V.: 13.40 DH**

FIG. 9. - 12,000

5 11888.1 8802

6-118001 - 0803

quel cas est-il utilisé

prendre CORTANCYL

prende CORRANCE

1100-1103

תורת הרים. סדרה זו

Revista Andina de Ciencias Sociales

GOV 12.30.1997 10:30 AM

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CORTANCYL 1 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CORTANCYL 1 mg, comprimé ?
 3. Comment prendre CORTANCYL 1 mg, comprimé ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver CORTANCYL 1 mg, comprimé ?
 6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE CORTANCYL 1 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC: H02AB07
GLUCOCORTICOIDES - USAGE SYSTEMIQUE.
(H. Hormones systémiques non sexuelles).

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un corticoïde (également appelé anti-inflammatoire stéroïdien).

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Cortancyl® 1 mg, comprimé

Prednisone

SANOFI 

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de
 - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre m
 - Ce médicament vous a été personnellement presc nociif, même si les signes de leur maladie sont ide
 - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas men

**Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Cortancyl 1 mg., cp b
P.P.V.: 13.40 DH**

PAPERS : 1970 EDITION

5 118001 0802

6-118001 - 0803

quel cas est-il utilisé

prendre CORTANCYL

prendre CONFIANCE

www.english-test.net

ພາບທີ ၃၇၆ ຂອງພົມ ၂၀၁

Digitized by srujanika@gmail.com

Revista Andina de Ciencias Sociales

IGV 12.5.2019 10:20:00 2019

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CORTANCYL 1 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CORTANCYL 1 mg, comprimé ?
 3. Comment prendre CORTANCYL 1 mg, comprimé ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver CORTANCYL 1 mg, comprimé ?
 6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE CORTANCYL 1 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC: H02AB07
GLUCOCORTICOIDES - USAGE SYSTEMIQUE.
(H. Hormones systémiques non sexuelles).

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un corticoïde (également appelé anti-inflammatoire stéroïdien).

