

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Ahaisen Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horizon
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W21-782684

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 8545

Société : Royal Air Maroc

☒ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : ABDELGHANI EL AISSOU

Date de naissance : 10/10/1967

Adresse :

Tél. :

Total des frais engagés :

3148,30

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Docteur Hassan JAMMI
CARDIOLOGUE
20, Rue Oumaima SAYAH
Bd. Al Massira Al Khadra - Casa
Tél : 0522 39 31 01 - Fax : 0522 36 79 35
Tél : 0522 39 31 01 - Fax : 0522 36 79 35
Tél : 0522 39 31 01 - Fax : 0522 36 79 35

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

M. ELAISSOU Abdelghani Age: 56 ans

Lien de parenté :

☐ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

MUPRAS

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes	
C2 K16 (ECG)		300 DH	Docteur Haima TAMMAM CARDIOLOGUE 20 Rue Oumaima SAHRA - Casablanca Tel: 0522 360218 - Fax: 0522 360218 091060218 - 091060218 - 480000061	

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
ARMATIQUE EQUIPEMENT Ex. Pharmacie BIDA Boulevard OUM ERRAHJAY HASSANI, CASABLANCA Tel. 0522 88 72	29/02/23	2848.30

[illegible][illegible]


RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

Important :
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement caninaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

Veuillez joindre les radiographies
INP :


SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE									
	H G <table style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 2px 5px;">25533412</td> <td style="padding: 2px 5px;">21433552</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 2px 5px;">00000000</td> <td style="padding: 2px 5px;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 2px 5px;">00000000</td> <td style="padding: 2px 5px;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 2px 5px;">35533411</td> <td style="padding: 2px 5px;">11433553</td> </tr> </table> D B	25533412	21433552	00000000	00000000	00000000	00000000	35533411	11433553	COEFFICIENT DES TRAVAUX
	25533412	21433552								
	00000000	00000000								
	00000000	00000000								
	35533411	11433553								
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession	MONTANTS DES SOINS								
		DATE DU DEVIS								
		DATE DE L'EXECUTION								

ATTESTANT L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



CABINET DE CARDIOLOGIE ET D'EXPLORATIONS CARDIO-VASCULAIRES

Résidence Star Youness, Rue Oumaima Sayah, N°20, 2ème étage, Appt. N°6
Boulevard Al Massira Al Khadra, Quartier Raah, Casablanca 20000

الدكتور حسن جمعي
أمراض القلب و الشرايين

Dr. Hassan JAMMI
CARDIOLOGUE

Diplômé de l'Université
de Nice - Sophia Antipolis
Ex. Assistant spécialiste
des Hôpitaux de France

PHARMACIE OUM ERRABII
Dr. Adhane BIDAH
49. Boulevard OUM ERRABII HAY HASSANI,
ELOULFA - CASABLANCA Tel. 05 22 90 88 72

17 FEV. 2023

9

Aissouf

Aloulfa

87.50 x7

Nebi lar 5 (S) rev x24

131.50 x4 Tney 20.5 (S) rev net

255.00 x6 Ome fa 0.2-2

89.90 x2 Naxi Dne 9 (S) (2)
rev net as mi

PHARMACIE OUM ERRABII
Dr. Adhane BIDAH
49. Boulevard OUM ERRABII HAY HASSANI,
ELOULFA - CASABLANCA Tel. 05 22 90 88 72

Docteur Hassan JAMMI
CARDIOLOGUE
20, Rue Oumaima SAYAH
Bd. Al Massira Al Khadra, Casa
Tél. 0522 39 31 01 - Fax. 0522 36 79 35
INP : 091080218
ICE : 001698128000061

GSM : 06.61 14 94 22
Tél : 05 22 39 31 01
Fax : 05 22 36 79 35

2848.30

Maxitone

Comprimé Effervescent

FORME ET PRESENTATION : Comprimés Effervescents : Boîte de 20 comprimés effervescents.

COMPOSITION : Vitamine C, Extrait de guarana (Paullinia cupana), Extrait de maté (ilex paraguayensis), Extrait de ginseng (panax ginseng), Vitamines (B3, B5, B2, B6, B9, B12). Acidifiant : acide citrique, Edulcorants : sorbitol, acésulfate de potassium, saccharinate de sodium. Régulateur d'acidité : bicarbonate de sodium, Antiagglomérant : polyéthylène glycol.

6

111259

970137



Maxitone

Comprimé Effervescent

FORME ET PRESENTATION : Comprimés Effervescents : Boîte de 20 comprimés effervescents.

COMPOSITION : Vitamine C, Extrait de guarana (Paullinia cupana), Extrait de maté (ilex paraguayensis), Extrait de ginseng (panax ginseng), Vitamines (B3, B5, B2, B6, B9, B12). Acidifiant : acide citrique, Edulcorants : sorbitol, acésulfate de potassium, saccharinate de sodium. Régulateur d'acidité : bicarbonate de sodium, Antiagglomérant : polyéthylène glycol.

6

111259

970137



Chez les patients souffrant d'insuffisance rénale, la dose initiale recommandée est de 2,5 mg par jour (1/2 comprimé). Si nécessaire, la dose journalière peut être augmentée à 5 mg par jour. Chez les sujets âgés de plus de 65 ans, la dose initiale recommandée est de 2,5 mg par jour (1/2 comprimé). Si nécessaire, la dose journalière peut être augmentée à 5 mg par jour. Cependant du fait de l'expérience limitée chez les patients de plus de 75 ans, la prudence s'impose et une surveillance étroite doit être assurée.

Insuffisance cardiaque chronique

Le traitement de l'insuffisance cardiaque doit être instauré pendant les premières semaines par un médecin ayant l'expérience de la prise en charge de patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique, et la posologie ne doit pas être modifiée sans son avis. Si la première dose est bien tolérée, le traitement sera poursuivi avec une posologie progressivement croissante.

L'initiation du traitement par nébivolol nécessite une surveillance particulière. Elle comprend une

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Peuvent apparaître un pouls anormalement faible, une baisse de la pression artérielle, des difficultés respiratoires et des problèmes cardiaques. Avant l'arrivée du médecin, vous pouvez prendre du charbon activé (disponible en pharmacie) qui adsorbera le produit dans l'estomac.

Si vous oubliez de prendre NEBILET®, contactez votre pharmacien pour un comprimé quadriséable :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, NEBILET® comprimé quadriséable est susceptible de provoquer des effets indésirables.

Dans l'hypertension artérielle essentielle, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont :
• Maux de tête

* VIGNETTE

NEBILET® 5mg

28 comprimés

PPV 87DH50

V140977/01

Chez les patients souffrant d'insuffisance rénale, la dose initiale recommandée est de 2,5 mg par jour (1/2 comprimé). Si nécessaire, la dose journalière peut être augmentée à 5 mg par jour. Chez les sujets âgés de plus de 65 ans, la dose initiale recommandée est de 2,5 mg par jour (1/2 comprimé). Si nécessaire, la dose journalière peut être augmentée à 5 mg par jour. Cependant du fait de l'expérience limitée chez les patients de plus de 75 ans, la prudence s'impose et une surveillance étroite doit être assurée.

Insuffisance cardiaque chronique

Le traitement de l'insuffisance cardiaque doit être instauré pendant les premières semaines par un médecin ayant l'expérience de la prise en charge de patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique, et la posologie ne doit pas être modifiée sans son avis. Si la première dose est bien tolérée, le traitement sera poursuivi avec une posologie progressivement croissante.

L'initiation du traitement par nébivolol nécessite une surveillance particulière. Elle comprend une

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Peuvent apparaître un pouls anormalement faible, une baisse de la pression artérielle, des difficultés respiratoires et des problèmes cardiaques. Avant l'arrivée du médecin, vous pouvez prendre du charbon activé (disponible en pharmacie) qui adsorbera le produit dans l'estomac.

Si vous oubliez de prendre NEBILET®, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

Ne prenez pas de dose double pour rattraper la dose simple que vous avez oubliée.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, NEBILET® peut provoquer des effets indésirables. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont :

Dans l'hypertension artérielle essentielle, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont :

* VIGNETTE

NEBILET® 5mg

28 comprimés

PPV 87DH50

V140977/01

Chez les patients souffrant d'insuffisance rénale, la dose initiale recommandée est de 2,5 mg par jour (1/2 comprimé). Si nécessaire, la dose journalière peut être augmentée à 5 mg par jour. Chez les sujets âgés de plus de 65 ans, la dose initiale recommandée est de 2,5 mg par jour (1/2 comprimé). Si nécessaire, la dose journalière peut être augmentée à 5 mg par jour. Cependant du fait de l'expérience limitée chez les patients de plus de 75 ans, la prudence s'impose et une surveillance étroite doit être assurée.

Insuffisance cardiaque chronique

Le traitement de l'insuffisance cardiaque doit être instauré pendant les premières semaines par un médecin ayant l'expérience de la prise en charge de patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique, et la posologie ne doit pas être modifiée sans son avis. Si la première dose est bien tolérée, le traitement sera poursuivi avec une posologie progressivement croissante.

L'initiation du traitement par nébivolol nécessite une surveillance particulière. Elle comprend une

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Peuvent apparaître un pouls anormalement faible, une baisse de la pression artérielle, des difficultés respiratoires et des problèmes cardiaques. Avant l'arrivée du médecin, vous pouvez prendre du charbon activé (disponible en pharmacie) qui adsorbera le produit dans l'estomac.

Si vous oubliez de prendre NEBILET®, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

Ne prenez pas de dose double pour rattraper la dose simple que vous avez oubliée.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, NEBILET® peut provoquer des effets indésirables. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont :

Dans l'hypertension artérielle essentielle, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont :

* VIGNETTE

NEBILET® 5mg

28 comprimés

PPV 87DH50

V140977/01

Chez les patients souffrant d'insuffisance rénale, la dose initiale recommandée est de 2,5 mg par jour (1/2 comprimé). Si nécessaire, la dose journalière peut être augmentée à 5 mg par jour. Chez les sujets âgés de plus de 65 ans, la dose initiale recommandée est de 2,5 mg par jour (1/2 comprimé). Si nécessaire, la dose journalière peut être augmentée à 5 mg par jour. Cependant du fait de l'expérience limitée chez les patients de plus de 75 ans, la prudence s'impose et une surveillance étroite doit être assurée.

Insuffisance cardiaque chronique

Le traitement de l'insuffisance cardiaque doit être instauré pendant les premières semaines par un médecin ayant l'expérience de la prise en charge de patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique, et la posologie ne doit pas être modifiée sans son avis. Si la première dose est bien tolérée, le traitement sera poursuivi avec une posologie progressivement croissante.

L'initiation du traitement par nébivolol nécessite une surveillance particulière. Elle comprend une

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Peuvent apparaître un pouls anormalement faible, une baisse de la pression artérielle, des difficultés respiratoires et des problèmes cardiaques. Avant l'arrivée du médecin, vous pouvez prendre du charbon activé (disponible en pharmacie) qui adsorbera le produit dans l'estomac.

Si vous oubliez de prendre NEBILET®, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

Ne prenez pas de dose double pour rattraper la dose simple que vous avez oubliée.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, NEBILET® peut provoquer des effets indésirables. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont :

Dans l'hypertension artérielle essentielle, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont :

* VIGNETTE

NEBILET® 5mg

28 comprimés

PPV 87DH50

V140977/01

Chez les patients souffrant d'insuffisance rénale, la dose initiale recommandée est de 2,5 mg par jour (1/2 comprimé). Si nécessaire, la dose journalière peut être augmentée à 5 mg par jour. Chez les sujets âgés de plus de 65 ans, la dose initiale recommandée est de 2,5 mg par jour (1/2 comprimé). Si nécessaire, la dose journalière peut être augmentée à 5 mg par jour. Cependant du fait de l'expérience limitée chez les patients de plus de 75 ans, la prudence s'impose et une surveillance étroite doit être assurée.

Insuffisance cardiaque chronique

Le traitement de l'insuffisance cardiaque doit être instauré pendant les premières semaines par un médecin ayant l'expérience de la prise en charge de patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique, et la posologie ne doit pas être modifiée sans son avis. Si la première dose est bien tolérée, le traitement sera poursuivi avec une posologie progressivement croissante.

L'initiation du traitement par nébivolol nécessite une surveillance particulière. Elle comprend une

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Peuvent apparaître un pouls anormalement faible, une baisse de la pression artérielle, des difficultés respiratoires et des problèmes cardiaques. Avant l'arrivée du médecin, vous pouvez prendre du charbon activé (disponible en pharmacie) qui adsorbera le produit dans l'estomac.

Si vous oubliez de prendre NEBILET®, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

Ne prenez pas de dose double pour rattraper la dose simple que vous avez oubliée.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, NEBILET® peut provoquer des effets indésirables. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont :

Dans l'hypertension artérielle essentielle, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont :

* VIGNETTE

NEBILET® 5mg

28 comprimés

PPV 87DH50

V140977/01

Chez les patients souffrant d'insuffisance rénale, la dose initiale recommandée est de 2,5 mg par jour (1/2 comprimé). Si nécessaire, la dose journalière peut être augmentée à 5 mg par jour. Chez les sujets âgés de plus de 65 ans, la dose initiale recommandée est de 2,5 mg par jour (1/2 comprimé). Si nécessaire, la dose journalière peut être augmentée à 5 mg par jour. Cependant du fait de l'expérience limitée chez les patients de plus de 75 ans, la prudence s'impose et une surveillance étroite doit être assurée.

Insuffisance cardiaque chronique

Le traitement de l'insuffisance cardiaque doit être instauré pendant les premières semaines par un médecin ayant l'expérience de la prise en charge de patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique, et la posologie ne doit pas être modifiée sans son avis. Si la première dose est bien tolérée, le traitement sera poursuivi avec une posologie progressivement croissante.

L'initiation du traitement par nébivolol nécessite une surveillance particulière. Elle comprend une

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Peuvent apparaître un pouls anormalement faible, une baisse de la pression artérielle, des difficultés respiratoires et des problèmes cardiaques. Avant l'arrivée du médecin, vous pouvez prendre du charbon activé (disponible en pharmacie) qui adsorbera le produit dans l'estomac.

Si vous oubliez de prendre NEBILET®, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

Ne prenez pas de dose double pour rattraper la dose simple que vous avez oubliée.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, NEBILET® peut provoquer des effets indésirables. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont :

Dans l'hypertension artérielle essentielle, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont :

* VIGNETTE

NEBILET® 5mg

28 comprimés

PPV 87DH50

V140977/01

Chez les patients souffrant d'insuffisance rénale, la dose initiale recommandée est de 2,5 mg par jour (1/2 comprimé). Si nécessaire, la dose journalière peut être augmentée à 5 mg par jour. Chez les sujets âgés de plus de 65 ans, la dose initiale recommandée est de 2,5 mg par jour (1/2 comprimé). Si nécessaire, la dose journalière peut être augmentée à 5 mg par jour. Cependant du fait de l'expérience limitée chez les patients de plus de 75 ans, la prudence s'impose et une surveillance étroite doit être assurée.

Insuffisance cardiaque chronique

Le traitement de l'insuffisance cardiaque doit être instauré pendant les premières semaines par un médecin ayant l'expérience de la prise en charge de patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique, et la posologie ne doit pas être modifiée sans son avis. Si la première dose est bien tolérée, le traitement sera poursuivi avec une posologie progressivement croissante.

L'initiation du traitement par nébivolol nécessite une surveillance particulière. Elle comprend une

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Peuvent apparaître un pouls anormalement faible, une baisse de la pression artérielle, des difficultés respiratoires et des problèmes cardiaques. Avant l'arrivée du médecin, vous pouvez prendre du charbon activé (disponible en pharmacie) qui adsorbera le produit dans l'estomac.

Si vous oubliez de prendre NEBILET®, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, NEBILET® peut provoquer des effets indésirables. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont :

Dans l'hypertension artérielle essentielle, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont :

* VIGNETTE

NEBILET® 5mg

28 comprimés

PPV 87DH50

V140977/01

Chez les patients souffrant d'insuffisance rénale, la dose initiale recommandée est de 2,5 mg par jour (1/2 comprimé). Si nécessaire, la dose journalière peut être augmentée à 5 mg par jour. Chez les sujets âgés de plus de 65 ans, la dose initiale recommandée est de 2,5 mg par jour (1/2 comprimé). Si nécessaire, la dose journalière peut être augmentée à 5 mg par jour. Cependant du fait de l'expérience limitée chez les patients de plus de 75 ans, la prudence s'impose et une surveillance étroite doit être assurée.

Insuffisance cardiaque chronique

Le traitement de l'insuffisance cardiaque doit être instauré pendant les premières semaines par un médecin ayant l'expérience de la prise en charge de patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique, et la posologie ne doit pas être modifiée sans son avis. Si la première dose est bien tolérée, le traitement sera poursuivi avec une posologie progressivement croissante.

L'initiation du traitement par nébivolol nécessite une surveillance particulière. Elle comprend une

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Peuvent apparaître un pouls anormalement faible, une baisse de la pression artérielle, des difficultés respiratoires et des problèmes cardiaques. Avant l'arrivée du médecin, vous pouvez prendre du charbon activé (disponible en pharmacie) qui adsorbera le produit dans l'estomac.

Si vous oubliez de prendre NEBILET®, contactez votre pharmacien pour un comprimé quadriséable :

Ne prenez pas de dose double pour rattrapper la dose simple que vous avez oubliée.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, NEBILET® comprimé quadriséable est susceptible de provoquer des effets indésirables.

Dans l'hypertension artérielle essentielle, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont :
• Maux de tête

* VIGNETTE

NEBILET® 5mg

28 comprimés

PPV 87DH50

V140977/01



1256

sivement à 1 comprimé
1 comprimé filmé à
action au médicament.

2 heures après un
ble de 20 mg 2 fois
dose sur une période
u'à la dose la mieux
le de 160 mg
en partageant un

pris avec une
nt des repas

primés
rtension, par
aque ou après

haine dose à

re chef.

acien lorsque
est trop

mé filmé de
de 35 kg et
adolescents
otre
térielle au

uffisance
enfants

it,

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

La prise de Tareg peut provoquer les effets secondaires suivants :

Les effets indésirables les plus fréquents associés à la prise de Tareg sont les vertiges dus à une chute de tension, surtout lors du passage de la position assise ou couchée à la position debout, ainsi que les infections virales.

Les effets occasionnels suivants ont été rapportés : infections des voies respiratoires supérieures, inflammations des sinus (sinusites) et de la gorge, pertes de connaissance, insomnies, diminution de la libido, vertiges, tension artérielle basse, toux, diarrhées et maux de ventre, fatigue, états de faiblesse, gonflement (œdème) ou rétention de liquide et maux de dos. Parmi les effets secondaires rares, on note l'étourdissement et des troubles de la fonction rénale.

Il a été, mais très rarement, fait état de rhume, céphalées, nausées et vomissements, rougeurs ou démangeaisons, douleurs articulaires ou musculaires, réactions allergiques avec visage enflé et pulsations cardiaques irrégulières. Avec une fréquence inconnue, des bulles peuvent se former sur la peau.

Diarrhées, nausée, douleurs dans les articulations et dans le dos et engourdissement peuvent survenir plus souvent chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque. Le médecin contrôlera la fonction rénale des patients souffrant d'insuffisance cardiaque.

Ces effets secondaires ne sont pas forcément dus à Tareg, car ils ont également été constatés chez les patients qui n'ont pas pris ce médicament.

Si vous ressentez une réaction allergique avec gonflement du visage, des lèvres, de la gorge et/ou de la langue (difficulté de déglutition ou de respiration), interrompez la prise de Tareg et contactez immédiatement votre médecin.

Lorsque Tareg est pris suite à un infarctus du myocarde, des troubles rénaux ou une tension basse peuvent apparaître chez env. 1% des patients. Dans la plupart des cas ces effets secondaires peuvent être supprimés en diminuant la dose. Avertissez votre médecin ou votre pharmacien si vous observez d'autres effets secondaires ne figurant pas ci-dessus.

5. Comment conserver Tareg ?

Les comprimés pelliculés de Tareg doivent être conservés à l'abri de l'humidité et pas au-dessus de 30 °C.

Conserver ce médicament hors de la portée des enfants.

1256



Ne jetez aucun médicament aux
ordures ménagères ».

Demandez à votre pharmacien
que vous n'utilisez plus. Ces
l'environnement.

6. Informations supplémentaires

Que contient ?

Tareg 40 mg

Comprimés pelliculés contenant

Tareg 80 mg

Comprimés pelliculés contenant

Tareg 160 mg

Comprimés pelliculés contenant

**Nom et adresse de l'établissement
tutelaire de l'AMM au Maroc**

Novartis Pharma Maroc

82, Boulevard Chefchaoui, Q.I.

20590 Casablanca - Maroc.

Nom et adresse du Fabricant

- Novartis Pharma Stein AG,
CH-4332 Stein - Suisse.

- Novartis Farmaceutica S.A.,
08210 Barberà del Vallès/B.

La dernière date à laquelle ce médicament a été révisé

Février 2016 sur la base du NPI 2014-PSB/GLC-0728-s

Conditions de prescription et de délivrance

Tableau A. Liste I.



6118001030316

TAREG 80 mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 131.50 DH



6118001030316

TAREG 80 mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 131.50 DH



6118001030316

TAREG 80 mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 131.50 DH



6118001030316

TAREG 80 mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 131.50 DH

1134100-A20-MA