

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



## Déclaration de Maladie

N° W21-725739

*P. Boussetta*

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent(e)			
Matricule : <b>00372</b> Société : <b>RAM</b>			
<input type="checkbox"/> Actif <input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e) <input type="checkbox"/> Autre			
Nom & Prénom : <b>Boussette Halima</b>			
Date de naissance : <b>01/01/1946</b>			
Adresse : <b>Assif G de 319</b>			
Téléphone : <b>0661208926</b> Total des frais engagés : <b>973,50 Dhs</b>			

**Autorisation N° : A-A-215/2019**

Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin : <b>Dr SARA DILAI</b>			
Date de consultation : <b>22/02/2023</b>			
Nom et prénom du malade : <b>Boussette Halima</b> Age : <b>77 ans</b>			
Lien de parenté : <input type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant			
Nature de la maladie : <b>HTA + Hypertension</b>			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.  
Fait à : **Maroc** Le : **22/02/2023**  
Signature de l'adhérent(e): *[Signature]*

<p><b>VOLET ADHÉRENT</b></p> <p>Déclaration de maladie</p> <p>N° W21-725739</p> <p>Remplissez ce volet, découpez le et conservez le. Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.</p> <p>Coupon à conserver par l'adhérent(e).</p>	<p>Matricule : <b>00372</b></p> <p>Nom de l'adhérent(e) : <b>Boussette</b></p> <p>Total des frais engagés : <b>973,50</b></p> <p>Date de dépôt :</p>
---	--

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
22/02 23	CON + ECG	C1	250 DH	<i>INSTITUT M6775DI Spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux sanguins Dr. Abdellatif Karim - 5 Avenue Al-Khandaq - El Fassi - Marrakech Tél : 05 24 291 293</i>

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie KAMILIA Dr. Bouchra BAGHDAD S-7D, Lot. Bouamra Assif (C) Marrakech Tél : 09 24 30 63 22	22 02 23	250 DH

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### VOLET ADHERENT

\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.


### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.


#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'O.D.F.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : [ ]



### O.D.F PROTHESES DENTAIRES



### DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	00000000	00000000
G	35533411	11433553

#### [Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX [ ]

MONTANTS DES SOINS [ ]

DEBUT D'EXECUTION [ ]

FIN D'EXECUTION [ ]

COEFFICIENT DES TRAVAUX [ ]

MONTANTS DES SOINS [ ]

DATE DU DEVIS [ ]

DATE DE L'EXECUTION [ ]



- الفحص بالصدى الصوتي
- قياس دقات القلب والضغط الدموي على المدى الطويل
- امتحان الجهد

Marrakech, le : 22/02/23.

Mme Boussetta Halima

**Dr. SARA DILAI**  
Spécialiste des maladies du cœur  
et des vaisseaux  
et Appr. N°1 Imm. 5 Angle Allal El Fassi  
et Abdelkarim El Khattabi Marrakech  
Tél./Fax : 0524 291 293


**Pharmacie KAMAL**  
Dr. Bouchra BAGHDAD  
15-7D, Lot. Bouamna - Assif (C)  
Marrakech 40000  
Tél. : 0524 291 293

- Imexium 20 mg

1 g/1g le Matin

- Prosturax 5/1,25

1 g/1g le Matin



عن طريق الفم

Ne laisser ni à la vue ni à la portée des enfants.  
يحفظ الدواء بعيداً عن رؤية و متناول الأطفال.



Fabriqué et distribué par les laboratoires SOTHEMA

Sous licence des  
es ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

aspen

LOT 222272  
EXP 06 2026  
PPV 46.70 DH

ZYLORIC 100 mg  
Boîte de 100 comprimés  
A.M.M. N° 63 OMP/21/NTT  
SOTHEMA BOUSKOURA Remarque AMO



6 118000 022268

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

**MERCK**

# CARDENSIEL®, comprimé pelliculé

Si vous pouvez prendre CARDENSIEL pendant votre grossesse.

On ignore si le bisoprolol passe dans le lait maternel humain. Par conséquent, l'allaitement n'est pas recommandé.

### Sportifs

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

La capacité à conduire un véhicule ou à utiliser des machines peut être altérée sous traitement par CARDENSIEL, en cas de modification de posologie ainsi qu'en cas de consommation d'alcool.

### 3. COMMENT PRENDRE CARDENSIEL ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute. Une surveillance régulière par le médecin est requise lors du traitement par CARDENSIEL. Elle est tout particulièrement nécessaire en début de traitement et en cas d'augmentation de la dose et lorsque vous arrêtez le traitement.

Prenez le comprimé avec un peu d'eau, le matin, avant, pendant ou après le petit-déjeuner. Les comprimés ne doivent pas être mâchés ou écrasés.

Les comprimés sécables peuvent être divisés en deux demi-doses égales.

- ralentissement du rythme cardiaque (plus de 1 personne sur 10)
- diminution de l'efficacité du diurétique (moins de 1 personne sur 10)

كاردينسيل + الحمل = خط  
+ سلسيل قوي  
- غير ملائم للمرأة في سن  
الإنجاب دون استعمال وسائل  
مع الحمل الفطلي.  
- المرأة الحامل، إلا في حالة عدم  
وجود مخاطر.



6 118001 100873

Cardensiel® 5 mg  
Comprimés pelliculés sécables B/30  
PPV: 58,10 DH

7862160239

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

**MERCK**

# CARDENSIEL<sup>®</sup>, comprimé pelliculé

Si vous pouvez prendre CARDENSIEL pendant votre grossesse.

On ignore si le bisoprolol passe dans le lait maternel humain. Par conséquent, l'allaitement n'est pas recommandé.

### Sportifs

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

La capacité à conduire un véhicule ou à utiliser des machines peut être altérée sous traitement par CARDENSIEL, en cas de modification de posologie ainsi qu'en cas de consommation d'alcool.

### 3. COMMENT PRENDRE CARDENSIEL ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute. Une surveillance régulière par le médecin est requise lors du traitement par CARDENSIEL. Elle est tout particulièrement nécessaire en début de traitement et en cas d'augmentation de la dose et lorsque vous arrêtez le traitement.

Prenez le comprimé avec un peu d'eau, le matin, avant, pendant ou après le petit-déjeuner. Les comprimés ne doivent pas être mâchés ou écrasés.

Les comprimés sécables peuvent être divisés en deux demi-doses égales.

- ralentissement du rythme cardiaque (plus de 1 personne sur 10)
- diminution de l'efficacité du diurétique (moins de 1 personne sur 10)

كاردينسيل + الحمل = خط  
+ سلسيل فوري  
- غير ملائم للمرأة في سن  
الإنجاب دون استعمال وسائل  
مع الحمل الفطلي.  
- المرأة الحامل، إلا في حالة عدم  
وجود مخاطر.



6 118001 100873

Cardensiel<sup>®</sup> 5 mg  
Comprimés pelliculés sécables B/30  
PPV: 58,10 DH

7862160239

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

**MERCK**

# CARDENSIEL<sup>®</sup>, comprimé pelliculé

Si vous pouvez prendre CARDENSIEL pendant votre grossesse.

On ignore si le bisoprolol passe dans le lait maternel humain. Par conséquent, l'allaitement n'est pas recommandé.

### Sportifs

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

La capacité à conduire un véhicule ou à utiliser des machines peut être altérée sous traitement par CARDENSIEL, en cas de modification de posologie ainsi qu'en cas de consommation d'alcool.

### 3. COMMENT PRENDRE CARDENSIEL ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute. Une surveillance régulière par le médecin est requise lors du traitement par CARDENSIEL. Elle est tout particulièrement nécessaire en début de traitement et en cas d'augmentation de la dose et lorsque vous arrêtez le traitement.

Prenez le comprimé avec un peu d'eau, le matin, avant, pendant ou après le petit-déjeuner. Les comprimés ne doivent pas être mâchés ou écrasés.

Les comprimés sécables peuvent être divisés en deux demi-doses égales.

- ralentissement du rythme cardiaque (plus de 1 personne sur 10)
- diminution de l'efficacité du diurétique (moins de 1 personne sur 10)

كاردينسيل + الحمل = خط  
+ سلسيل فوري  
- غير ملائم للمرأة في سن  
الإنجاب دون استعمال وسائل  
مع الحمل الفطلي.  
- المرأة الحامل، إلا في حالة عدم  
وجود مخاطر.



6 118001 100873

Cardensiel<sup>®</sup> 5 mg  
Comprimés pelliculés sécables B/30  
PPV: 58,10 DH

7862160239

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

**MERCK**

# CARDENSIEL<sup>®</sup>, comprimé pelliculé

Si vous pouvez prendre CARDENSIEL pendant votre grossesse.

On ignore si le bisoprolol passe dans le lait maternel humain. Par conséquent, l'allaitement n'est pas recommandé.

### Sportifs

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

La capacité à conduire un véhicule ou à utiliser des machines peut être altérée sous traitement par CARDENSIEL, en cas de modification de posologie ainsi qu'en cas de consommation d'alcool.

### 3. COMMENT PRENDRE CARDENSIEL ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute. Une surveillance régulière par le médecin est requise lors du traitement par CARDENSIEL. Elle est tout particulièrement nécessaire en début de traitement et en cas d'augmentation de la dose et lorsque vous arrêtez le traitement.

Prenez le comprimé avec un peu d'eau, le matin, avant, pendant ou après le petit-déjeuner. Les comprimés ne doivent pas être mâchés ou écrasés.

Les comprimés sécables peuvent être divisés en deux demi-doses égales.

- ralentissement du rythme cardiaque (plus de 1 personne sur 10)
- diminution de l'efficacité du diurétique (moins de 1 personne sur 10)

كاردينسيل + الحمل = خط  
+ سلسيل فوري  
- غير ملائم للمرأة في سن  
الإنجاب دون استعمال وسائل  
مع الحمل الفطلي.  
- المرأة الحامل، إلا في حالة عدم  
وجود بديل علاجي.



6 118001 100873  
**Cardensiel<sup>®</sup> 5 mg**  
Comprimés pelliculés sécables B/30  
PPV: 58,10 DH

7862160239

**BiPretex® Arginine 5 mg / 1,25 mg**

Le médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

#### **NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR**

Comprime pellicule

6"118000"100324

0 comprimés pelliculés

**Bipreterax®**

Médicament autorisé n°83 DMP/21/NCV

• médicaments pour traiter le diabète tels qu'insuline, metformine ou gliquines,  
• calcium Y compris les suppléments calciums,

Le docteur ne donne pas d'autre  
détail ou voie permettant

Ne le donner pas à d'autres personnes. Il pourra être très nocif, même si les signes de leur maladie sont nés en a voté médecin ou voté pharmaciens. Ces s'applique aussi à tout effet indésirable qu'a le secret des

Le BIRTEF-EVRAZ programme a mis en place plusieurs initiatives pour améliorer l'efficacité et la sécurité de ses opérations. Ces initiatives comprennent :

- (a) : L'adoption d'un système de gestion de la sécurité et de l'environnement (SGSE) qui vise à intégrer les meilleures pratiques de sécurité dans toutes les opérations de l'entreprise.
- (b) : La mise en place d'un programme de formation et de développement des compétences pour assurer la sécurité et la qualité dans tous les niveaux de l'organisation.
- (c) : La mise en place d'un système de suivi et de contrôle des performances pour évaluer l'efficacité et la sécurité des opérations.

**PREDILECTION DE L'ARTERIE FEMORALE**  
L'artérite de l'artère fémorale est la forme la plus courante de l'artérite périphérique. Elle se manifeste par une douleur dans la cuisse et le membre inférieur qui peut être d'origine mécanique ou inflammatoire. La douleur est souvent nocturne et peut être accompagnée d'un engorgement des membres. Les symptômes peuvent évoluer vers une nécrose tissulaire si l'artérite n'est pas traitée.

**Grossesse** Vous devrez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible d'être) enceinte.

• gressesse et de dot pas epe pris si vous elas greceme de plus de 3 mois.  
pourrait nulle grevement à votre emtai.

**BiPretex® Arginine 5 mg / 1,25 mg**

- 9 -

#### **NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR**

#### Comprime pellicule

6"118000"100324

0 comprimés pelliculés

**Bibreterax®**

Médicament autorisé n°83 DMP/21/NCV

**Ne le donner pas à d'autres personnes.** Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont déjà au stade terminal.

[View all posts by \*\*John Doe\*\*](#) | [View all posts in \*\*Category A\*\*](#) | [View all posts in \*\*Category B\*\*](#)

'se insuline, medotrimine ou glibunes'.

medicaments utilisés pour traiter les troubles mentaux tels que l'anxiété et la dépression. Ces substances sont des antidiépresseurs. Les psychotropes sont des substances qui agissent sur le système nerveux central (SNC) pour modifier la transmission de certains signaux.

Le théophylline (pour le traitement d'urticaire, rhinitis, bronchospasmes, etc.) et les sels de calcium (pour la prévention des crises d'épilepsie) peuvent entraîner une augmentation de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque. Ces médicaments doivent être utilisés avec prudence chez les patients souffrant d'hypertension artérielle ou d'insuffisance cardiaque.

une procédure permettant de déterminer la quantité d'antécédent nécessaire pour assurer la sécurité de l'animal. La quantité d'antécédent nécessaire pour assurer la sécurité de l'animal est déterminée par la formule suivante :  $Q = \frac{M}{C}$ , où  $Q$  est la quantité d'antécédent nécessaire,  $M$  est la dose quotidienne recommandée et  $C$  est la concentration de l'antécédent dans le produit.

**BiPretex® Arginine 5 mg / 1,25 mg**

t de prendre ce medicament car elle contient des informations importantes pour vous.

#### **NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR**

#### **Comprime pellicule**

6"118000"100324

0 comprimés pelliculés

**Bipreterax®**

Médicament autorisé n°83 DMP/21/NCV

medicaments pour traiter le diabète tels qu'insuline, méthformine ou glicunes, calcium y compris les suppléments calciums.

Une le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont déjà en voie médical ou votre pharmacien. Cela s'applique aussi à tout effet indésirable qu'il ne sera pas permis.

- Sur-inflammatoires non-stéroïdiens (ex: ibuprofène) ou dose élevée de salicylate utilisés pour soulager la douleur et faire mieux睡. Notez que pour empêcher l'formation de caillots sanguins).

grossesse et ne doit pas être si vaste que celle de la grossesse à terme. La grossesse à terme dure 3 mois, et la grossesse à prétermature dure 2 mois. La grossesse à prématurité dure 3 mois.

Причины, по которым люди становятся агрессивными, могут быть различными.

**BILLETTEHAK** Arginine 2 mg, L-5 mg, combined per tablet. Each tablet contains 100 mg of L-arginine and 50 mg of L-lysine.

