

**RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR  
ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS**

**Conditions générales :**

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

**Pharmacie :**

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

**Radiologie et Biologie :**

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

**Optique :**

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

**Rééducation :**

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

**Dentaire :**

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

**Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :**

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

**Adresses Mails utiles**

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



**Déclaration de Maladie**

N° P19- 057401

152328

- Maladie       Dentaire       Optique       Autres

**Cadre réservé à l'adhérent (e)**

Matricule : 0002082 Société : .....

Actif       Pensionné(e)       Autre : .....

Nom & Prénom : LATOUCHE Aicha Yousef Bensafalia Abderrahim

Date de naissance : 1960

Adresse : .....

Tél. : 06 60 51 29 41 Total des frais engagés : 666,00 DH Dhs

**Cadre réservé au Médecin**

Dr. Abdelhakim BOUABID  
Spécialiste O.R.L  
Chirurgie Cervico Faciale  
Tél : 05 22 32 64 60

Cachet du médecin :

Date de consultation : 02/03/2023

Nom et prénom du malade : LATOUCHE Aicha Age : 62ans

Lien de parenté :  Lui-même       Conjoint       Enfant

Nature de la maladie : Goutte apécée

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : .....

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) :

**RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le paiement des Actes
02/03/2023			200DH	

**EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	02/03/2023	466.00

**ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

**AUXILIAIRES MEDICAUX**


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

**RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

**Important :**

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.


SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>

**O.D.F PROTHESES DENTAIRES**

**DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE**

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
B	
00000000	00000000
35533411	11433553

**[Création, remont, adjonction]**  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession



Coefficient DES TRAVAUX	<input type="text"/>
MONTANTS DES SOINS	<input type="text"/>
DATE DU DEVIS	<input type="text"/>
DATE DE L'EXECUTION	<input type="text"/>

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

**Docteur**  
**BOUABID Abdelhakim**



**الدكتور**  
**بوعبيد عبد الحكيم**

**Spécialiste en ORL et Chirurgie**  
**CERVICO - FACIALE**  
**Exploration Endoscopique**  
**Exploration Vertige et Surdité**

إختصاصي في أمراض و جراحة الأنف و الأذن  
و الحنجرة و الوجه و العنق  
إختيارات الدوخة و وظائف السمع  
الفحص بالمنظار و المعجر

**INPE : 061126140**

Berrechid le :

02/03/2023

Laator Aicha

صيدلية ابن رشييد  
Pharmacie IBN ROCHD  
Dr. ELHACHIMI HAFSA  
30, Rue Moulay Idriss Laazhar  
BERRECHID - Tél.: 0522 32 70 49

2h.00 a 9

Leval

130.0

Besti

37.00

See freed

14.00

Audal

64.00

feib polis

14.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00


1.00

1.00

1.00

1.00

1.00



effervescent aux doses maximales (4 g/jour) pendant plus de 4 jours nécessite une surveillance renforcée des examens biologiques dont notamment de l'INR. Dans ce cas, consultez votre médecin.

L'efficacité du paracétamol peut être diminuée si vous prenez simultanément des résumés... médicament qui diminue le taux de cholestérol dans le sang (respecter un intervalle de plus de 2 heures entre les 2 prises).

Si vous recevez en même temps que du paracétamol, un traitement par fluoxaciline (un antibiotique), vous risquez de présenter une acidose métabolique (sang trop acide à l'origine d'une accélération de la fréquence respiratoire).

La toxicité du paracétamol peut être augmentée, si vous prenez :

- des médicaments potentiellement toxiques pour le foie,
- les médicaments qui favorisent la production du métabolite toxique du paracétamol tels que les médicaments anti-épileptiques (phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine, topiramate),
- de la rifampicine (un antibiotique),
- en même temps de l'alcool.

### ANDOL 1000 mg, comprimé effervescent avec des alliments, boissons et de l'alcool

La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.

### 9 - UTILISATION EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

#### Grossesse et allaitement

Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement. Utilisez la dose minimale permettant de réduire votre douleur et/ou votre fièvre, pendant une durée aussi courte que possible et le moins fréquemment possible. Contactez votre médecin ou votre sage-femme si la douleur et/ou fièvre ne diminue pas ou si vous avez besoin de prendre ce médicament plus fréquemment au cours de votre grossesse.

### Fertilité

Il est possible que le paracétamol puisse affecter la fertilité des femmes, de façon réversible à l'arrêt du traitement.

### Sans effet

### 10- LES EFFETS POSSIBLES DU TRAITEMENT SUR LA CAPACITÉ A CONDUIRE UN VEHICULE OU A UTILISER CERTAINES MACHINES

Sans objet.

### 11- SYMPTÔMES ET CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien en cas de surdosage.

Le surdosage peut être à l'origine d'une maladie du foie (insuffisance hépatique), d'un saignement gastro-intestinal, d'une maladie du cerveau (encéphalopathie), d'un coma, voire d'un décès, et notamment chez les populations plus à risque telles que les jeunes enfants, les personnes âgées et dans certaines situations (maladie du foie, alcoolisme, malnutrition chronique). Dans les 24 premières heures, les principaux symptômes d'intoxication sont : nausées, vomissements, perte d'appétit, douleurs abdominales, pâleur.

Le surdosage peut également entraîner : une atteinte du pancréas (pancréatite), une hyperamylasémie (augmentation du taux d'amylase dans le sang), une maladie des reins (insuffisance rénale aiguë), et un problème de sang dans lequel les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sont tous réduits en nombre ce qui entraîne :

- une fatigue, un souffle court et une pâleur ;
- des infections fréquentes accompagnées de fièvre et de frissons importants, des maux de gorge ou des ulcères de la bouche ;
- une tendance à saigner ou à présenter des ecchymoses spontanées, des saignements de nez.

### 12- CONDUITE À TENIR EN CAS D'OMISSION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

### 13- MENTION, SI NÉCESSAIRE, D'UN RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE

Sans objet.

Conditions de prescription et de délivrance : Médicament non soumis à prescription médicale.

- Précaution particulière de conservation : A conserver

à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte

- La dernière date à laquelle cette notice a été

approuvée : Octobre 2018

Nom et Adresse de l'Établissement de l'AMM au Maroc



41, Rue Mohamed DIOURI, 20 110 Casablanca

Nom et Adresse du fabricant : MC Pharma, ZI Ouled Saïah - Nouaceur

## ANDOL® 1000 mg

Tube of 8 Effervescent tablets Paracetamol

Read this entire leaflet carefully before you start taking this medicine.

Keep this leaflet. You may need to read it again.

If you have any further questions, if you have a doubt, ask your doctor or pharmacist.

This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.

If any of the side effects get serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

### 1. COMPOSITION OF MEDICINE

Active ingredient:

Paracetamol.

Excipients: Anhydrous citric acid, Sodium Bicarbonate, Anhydrous sodium carbonate, Povidone K29-32, 6000, Orange flavour 74016-71, Apricot flavour Sodium saccharin, Aspartame, Beta-carotene 1%, stearate...s.q.11 effervescent tablet.

List of excipients with known effect: Sodium, Sorbitol.

### 2. PHARMACO-THERAPEUTIC GROUP OR ACTIVITY

Pharmacotherapeutic group: OTHER ANTALGIC ANTIPYRETIC ANILIDES - ATC code: N02BE01.

### 3. THERAPEUTIC INDICATIONS

ANDOL is an analgesic (calms the pain) and an antipyretic (lowers the fever).

The active substance of this medicine is paracetamol. It is indicated in case of pain and / or fever such as the flu, dental pain, body aches, and period pain.

It may also be prescribed by your doctor for osteoarthritis.

This presentation is reserved for adult and children weighing 50 kg (from about 15 years old); read carefully the section "Posology".

For children weighing less than 50kg, there are other presentations of ANDOL whose dosage is more suitable. Ask your doctor or pharmacist for advice.

#### 4. Posology

Attention! This presentation contains 1000 mg of paracetamol per unit: do not take 2 tablets at a time.

Always follow the dose prescribed by your doctor. If in doubt, consult your doctor or pharmacist.

This presentation is reserved for adults and children weighing from 50 kg (i.e. from about 15 years old).

For children weighing less than 50 kg, there are other ANDOL presentations that are more suitable for dosing. Do not hesitate to ask your doctor or pharmacist for advice.

Dosage in adult and child from 50 kg (i.e. from about 15 years old)

The usual dosage is 1 tablet at 1000 mg per dose, to be renewed after 6 to 8 hours. If necessary, the intake can be repeated after 4 hours minimum.

Paracetamol dose never to exceed

• in an adult or child weighing more than 50 kg:

It is generally not necessary to exceed 3 grams of paracetamol per day (3 effervescent tablets per day).

However, in case of more intense pain, and under instruction of your doctor or pharmacist, the total dose can be increased up to 4 g per day (i.e. 4 effervescent tablets per day).

NEVER TAKE MORE THAN 4 GRAMS OF PARACETAMOL PER

DAY (taking into account all medicines containing

paracetamol in their formula).

#### Special situations

The maximum daily dose should not exceed 60 mg / kg

(without exceeding 3 g per day in the following situations:

• if you weigh less than 50 kg,

• if you have liver disease or severe kidney disease,

• if you drink alcohol frequently or stop drinking alcohol recently,

• if you suffer from dehydration,

• For example, if you suffer from chronic malnutrition, if you are fasting, if you have lost a lot of weight recently, if you are over 75 years old, or if you are over 65 years and have long illnesses duration, if you have the AIDS virus or chronic viral hepatitis, if you have cystic fibrosis (genetic and hereditary disease characterized by serious respiratory infections), or if you have Gilbert's disease (disease hereditary associated with an increase in the level of bilirubin in the blood).

IF IN DOUBT, ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST.

#### Method and route of administration

This medicine is used orally.

You must dissolve the tablet in a glass of water. Wait for complete dissolution before drinking immediately after the contents of the glass.

#### Frequency of administration

Systematic intakes make it possible to avoid the oscillations of pain or fever: see section "Posology".

In children, they should be regularly spaced, including at night, preferably 6 hours and at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.

If you have a fever, you should take at least 4 hours. Severe kidney failure, you should take at least 4 hours.



EXP :  
LOT N° :

14150



Comprimé  
Voie orale

# FITOPOLIS®

## FORME ET PRESENTATION :

Comprimé, boîte de 30.

## COMPOSITION :

Agent de charge (sorbitol, cellulose micostalline), extrait (8 % bioflavonoïdes), extrait sec de racine d'échinacée de feuilles thym (*Thymus vulgaris*) (5:1), extrait sec de *emarginata* (25 % acide ascorbique «vitamine C»), et monoammoniacal, anti-agglomérant (stéarate de ma

LOT: 305403  
PER: 12/2023  
PPC: 64.50 DH

## PROPRIETES ET UTILISATIONS :

FITOPOLIS® comprimés est à base d'actifs naturels tels que la propolis et l'échinacée, ainsi que la vitamine C qui aident à renforcer les défenses naturelles de l'organisme et à lutter contre le refroidissement (Etat grippal, Rhume...).

## CONSEILS UTILISATIONS :

Les comprimés sont à avaler ou à croquer.

Adultes : 1 à 2 comprimés 3 fois par jour.

Enfants à partir de 6 ans : 1 comprimé 3 fois par jour.

## PRECAUTIONS D'UTILISATION :

- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
- Maintenir hors de la portée des enfants.
- Conserver dans un endroit frais et sec.
- Ne pas administrer chez l'enfant de moins de 6 ans.
- À utiliser en complément d'une alimentation variée

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament .

Fabriqué par Plameca - Barcelona - Espagne.

Importé et Distribué au Maroc par Medipro Pharma. Casablanca.

Autorisation du Ministère de la Santé n° : DA20201406286DMP/20UCA/MAv2

# BIOTIC PLUS®

## Amoxicilline + Acide clavulanique

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE Biotic Plus®, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Biotic Plus® ?
3. COMMENT PRENDRE Biotic Plus® ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER Biotic Plus® ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

### 1. QU'EST-CE QUE Biotic Plus®, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

#### Classe pharmacothérapeutique

- Amoxicilline : Antibiotique bactéricide à large spectre de la famille des bêta-lactamines du groupe des aminopénicillines.
- Acide clavulanique : puissant inhibiteur de bêta-lactamases.

#### Indications thérapeutiques

Elles sont limitées aux infections causées par les germes sensibles, notamment dans certaines situations où les espèces bactériennes responsables de l'infection peuvent être multiples et/ou résistantes aux antibiotiques actuellement disponibles, en particulier les germes producteurs de bêta-lactamases.

BIOTIC PLUS® est particulièrement conseillé dans les infections suivantes :

- sinusite bactérienne aiguë (diagnostiquée de façon appropriée), angines récidivantes, otite moyenne aiguë, exacerbation de bronchite chronique, pneumonie aiguë communautaire, cystite, pyélonéphrite, infections de la peau et des tissus mous, en particulier cellulite, morsures animales, abcès dentaire sévère avec propagation de cellulite, infections des os et des articulations, en particulier ostéomyélite. Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibiotiques.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Biotic Plus® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise des médicaments

#### Ne prenez jamais Biotic Plus® dans les cas suivants :

- Si vous avez une allergie ou des antécédents d'allergie aux pénicillines et aux céphalosporines, ou une hypersensibilité aux autres composants contenus dans Biotic Plus®.
- Si vous avez des antécédents d'ictère / si vous souffrez d'atteinte hépatique liée à l'association amoxicilline / acide clavulanique poudre pour suspension buvable (tous dosages).
- Si vous êtes atteint de phénylcétonurie, en raison de la présence d'aspartame.

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

#### Faites attention avec Biotic Plus® :

#### MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Réactions d'hypersensibilité (anaphylaxie) exceptionnellement sévères et parfois fatales. Un interrogatoire préalable est nécessaire.
- Devant des antécédents d'allergie typique à ces produits, la contre-indication est formelle.
- L'utilisation concomitante d'allopurinol pendant le traitement par amoxicilline peut augmenter la probabilité de survenue de réactions cutanées allergiques.
- En cas d'insuffisance rénale, adapter la posologie en fonction de la clairance de la créatinine ou de la créatininémie.
- L'association amoxicilline/acide clavulanique doit être utilisée avec prudence chez les patients présentant des signes d'insuffisance hépatique.
- En cas d'administration de doses élevées d'amoxicilline, un apport hydrique suffisant doit être assuré, pour réduire les risques de cristallurie.
- En cas de traitement prolongé, il est recommandé de surveiller les fonctions hépatique et rénale.
- En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

**BIOTIC PLUS® est un médicament. Ne pas laisser à la portée des enfants.**

Enfants et adolescents : sans objet

Prise ou utilisation d'autres médicaments :  
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.  
Associations déconseillées : - Méthotrexate : augmentation des effets et de la toxicité hématologique du méthotrexate par inhibition de la sécrétion tubulaire rénale par les pénicillines.  
Associations à prendre en compte :  
- Allopurinol : risque accru de réactions cutanées.  
- Anticoagulants oraux : surveiller avec attention le temps de Quik et l'INR.

- Probenécide : L'utilisation concomitante de probénécide peut conduire à une augmentation prolongée de la concentration sanguine d'amoxicilline et d'acide clavulanique.  
Interactions avec d'autres médicaments :  
- Les contraceptifs oraux, sans objet de thérapie ou thérapie.

le clavulanique peut être  
ecin ou bien de som  
ment.

ation amoxicilline-acide  
et les quantités ingérées  
ues. En conséquence,  
à cet antibiotique.  
médicament) en cas de  
ruption cutanée chez les

cles ou à utiliser des  
indésirables (par ex.,  
ns) susceptibles de  
chez les personnes

suivant un régime  
machines :  
BIOTIC PLUS®

réactions allerg  
réduire la capaci  
- Tenir compte de

suivant un régime

- BIOTIC PLUS® enfant et nourrisson contient de l'aspartame, qui est une source de phénylalanine. Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients atteints de phénylcétonurie.

- Tenir compte de la teneur en sodium dans la poudre en suspension et sachets , chez les personnes suivant un régime hyposodé strict.

- En raison de la présence de lactose, la forme poudre pour sachets est contre-indiquée en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase.

### 3. COMMENT PRENDRE Biotic Plus® ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

#### POSOLOGIE (Exprimée en Amoxicilline)

Dans tous les cas, se conformer strictement à la prescription de votre médecin traitant. En général :  
Comprimés 500 mg, Sachets 500 mg et Sachets 1 g Adulte ;  
Adulte normorénal (poids > 40 kg) ;  
2 g/jour (4 comprimés, 4 sachets à 500 mg ou 2 sachets à 1 g) en 2 prises dans les indications suivantes :

- Sinusites maxillaires aiguës ;
- Angines récidivantes, amygdalites chroniques ;
- Surinfections de bronchites aiguës du patient à risque, notamment éthylique chronique, tabagique, âgé de plus de 65 ans, en cas de risque évolutif ou en seconde intention ;
- Exacerbations de bronchopneumopathies chroniques ;
- Parodontites.
- 3 g/jour (6 comprimés, 6 sachets à 500 mg ou 3 sachets à 1 g) en 3 prises dans les indications suivantes :
- Autres formes de sinusites ;
- Otites moyennes aiguës ;
- Cystites aiguës récidivantes, cystites non compliquées de la femme et pyélonéphrites aiguës non compliquées dues à des germes sensibles ;
- Infections gynécologiques hautes, en association à un autre antibiotique actif sur les chlamydiae ;
- Infections stomatologiques sévères : abcès, phlegmons, cellulites ;
- Pneumopathies aiguës du patient à risque notamment éthylique chronique, tabagique, âgé de plus de 65 ans ou présentant des troubles de la déglutition ;
- Traitement de relais de la voie injectable.

Adulte insuffisant rénal (poids > 40 kg) :  
Clairance de la créatinine : > 30 ml/min : Pas d'adaptation nécessaire entre 10 et 30 ml/min : 2 comprimés, 2 sachets à 500 mg ou 1 sachet toutes les 12 à 24 heures.

< 10 ml/min : Pour les patients traités ou non par hémodialyse, les conditions d'utilisation n'ont pas été établies.

Sujet âgé / pas d'adaptation posologique sauf si la clairance de la créatinine est > 30 ml/min.

Sachets 500 mg Enfant, Suspension 100 mg Enfant et Suspension 100 mg Nourrisson ;

- Adultes et enfants de 40 kg ou plus : Ces sachets et suspensions ne sont généralement pas recommandés pour les adultes et les enfants pesant 40 kg ou plus.
- Enfants pesant moins de 40 kg : Toutes les doses sont établies



BIOTIC PLUS® sachets  
500 mg

# NEOPRED®

20 mg et 5 mg  
comprimé effervescent  
Prednisolone

**Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Dans cette notice :**

1. QU'EST-CE QUE NEOPRED®, comprimé effervescent ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE NEOPRED®, comprimé effervescent ?
3. COMMENT PRENDRE NEOPRED®, comprimé effervescent ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER NEOPRED®, comprimé effervescent ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE NEOPRED®, comprimé effervescent ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :  
GLUCOCORTICOIDES - USAGE SYSTEMIQUE.  
(H: Hormones systémiques non sexuelles).

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un corticoïde.  
Il est indiqué dans certaines maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE NEOPRED®, comprimé effervescent ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications :

**N'utilisez jamais NEOPRED®, comprimé effervescent dans les cas suivants :**

- la plupart des infections,
- certaines maladies virales en évolution (hépatites virales, herpès, varicelle, zona),
- certains troubles mentaux non traités,
- vaccination par des vaccins vivants,
- si vous êtes allergique à la prednisolone ou à l'un des autres composants.

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

Précautions d'emploi : mises en garde spéciales :

Faites attention avec NEOPRED®, comprimé effervescent :

Mises en garde spéciales

Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale.

Instructions pour un bon usage : Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement :

**Posologie**

NEOPRED® 20 mg est adapté aux traitements d'attaque ou aux traitements de courte durée nécessitant des doses moyennes ou fortes chez l'adulte et l'enfant de plus de 10 kg.

NEOPRED® 5mg est indiqué pour les traitements d'entretien.

La dose à utiliser est déterminée par votre médecin, en fonction de votre poids et de la maladie traitée.

Elle est strictement individuelle.

Il est très important de suivre régulièrement le traitement et de ne pas le modifier, ni l'arrêter brutalement sans l'avis de votre médecin.

**Mode et voie d'administration :**

**Voie orale.**

En général, dissoudre les comprimés dans un verre d'eau en une prise le matin, au cours du repas. Respecter la prescription de votre médecin.

**Durée du traitement :**

Elle est déterminée par votre médecin.

En cas de traitement prolongé, ne pas arrêter brutalement le traitement mais suivre les recommandations de votre médecin pour la diminution des doses.

Symptômes et instructions en cas de surdosage : Sans objet.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

**Si vous oubliez de prendre NEOPRED®, comprimé effervescent :**

Pour être efficace, ce médicament doit être utilisé régulièrement. Cependant, si vous omettez de prendre une dose, continuez le traitement normalement.

Risque de syndrome de sevrage : Sans objet.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

**Description des effets indésirables :**

Comme tous les médicaments, NEOPRED®, comprimé effervescent est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Ce médicament, indispensable à votre santé, est le plus souvent bien toléré lorsque l'on suit les recommandations et notamment le régime pauvre en sel, en sucre et riche en protéines.

Il peut néanmoins entraîner, selon la dose et la durée du traitement, des effets plus ou moins gênants.

**Les plus fréquemment rencontrés :**

- Modification de certains paramètres de votre régime ou nécessiter un régime ou

- Apparition de bleus.
- Elevation de la tension artérielle.
- Insuffisance cardiaque.
- Troubles de l'humeur.
- Syndrome de Cushing (prise de poids, un gonflement du visage).
- Fragilité osseuse : os fragiles.
- Atteintes douloureuses des os (ostéonécrose).

• Modification de certains paramètres de votre régime ou nécessiter un régime ou

• Apparition de bleus.

• Elevation de la tension artérielle.

• Insuffisance cardiaque.

• Troubles de l'humeur.

• Syndrome de Cushing (prise de poids, un gonflement du visage).

• Fragilité osseuse : os fragiles.

• Atteintes douloureuses des os (ostéonécrose).

• Faiblesse musculaire, rupture des ligaments.

• Troubles digestifs : ulcère digestif, hémorragies et perforations digestives, pancréatites surtout chez l'enfant.

• Fragilisation de la peau, retard de cicatrisation, acné.

• Confusion, convulsion, état dépressif à l'arrêt du traitement,







1888م الحادي عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1265هـ

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله  
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده  
والله اعلم بالصواب

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله  
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده  
والله اعلم بالصواب

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله  
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده  
والله اعلم بالصواب

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

6 118001 102020  
Levothyrox® 100 µg  
Comprimés sécables B/30  
PPV: 24,40 DH

1888م الحادي عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1265هـ

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله  
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده  
والله اعلم بالصواب

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله  
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده  
والله اعلم بالصواب

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله  
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده  
والله اعلم بالصواب

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

6 118001 102020  
Levothyrox® 100 µg  
Comprimés sécables B/30  
PPV: 24,40 DH

1888م الحادي عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1265هـ

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله الذي جعل العلم نوراً يضيء في قلوب عباده  
الذين آمنوا به وحده لا شريك له  
والعلم هو نور الله الذي لا يخبئ عنه شيء من العلم  
الذي عنده ولا يعلم الخلق ما عند الله الا بما يشاء  
والله اعلم بالصواب

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله الذي جعل العلم نوراً يضيء في قلوب عباده

الحمد لله الذي جعل العلم نوراً يضيء في قلوب عباده  
الذين آمنوا به وحده لا شريك له  
والعلم هو نور الله الذي لا يخبئ عنه شيء من العلم  
الذي عنده ولا يعلم الخلق ما عند الله الا بما يشاء  
والله اعلم بالصواب

الحمد لله الذي جعل العلم نوراً يضيء في قلوب عباده  
الذين آمنوا به وحده لا شريك له  
والعلم هو نور الله الذي لا يخبئ عنه شيء من العلم  
الذي عنده ولا يعلم الخلق ما عند الله الا بما يشاء  
والله اعلم بالصواب

1888م الحادي عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1265هـ



الحمد لله الذي جعل العلم نوراً يضيء في قلوب عباده





1888م الحادي عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1265هـ

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله  
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده  
والله اعلم بالصواب

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله  
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده  
والله اعلم بالصواب

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله  
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده  
والله اعلم بالصواب

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

6 118001 102020  
Levothyrox® 100 µg  
Comprimés sécables B/30  
PPV: 24,40 DH

78713916187

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

4- استعمال الليفوتيروكسين قرص قرص في 3-4 أسابيع

استخدام الليفوتيروكسين في علاج قصور الغدة الدرقية وارتفاع الكوليسترول

الليفوتيروكسين هو دواء يستخدم لعلاج قصور الغدة الدرقية وارتفاع الكوليسترول. يعمل على تحفيز إنتاج هرمون الغدة الدرقية في الجسم، مما يساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي وخفض مستويات الكوليسترول في الدم. يجب استخدامه بانتظام وفقًا لتعليمات الطبيب.

الليفوتيروكسين هو دواء يستخدم لعلاج قصور الغدة الدرقية وارتفاع الكوليسترول. يجب استخدامه بانتظام وفقًا لتعليمات الطبيب.

4- استعمال الليفوتيروكسين قرص قرص في 3-4 أسابيع

- 1- ما هو الليفوتيروكسين قرص قرص في 3-4 أسابيع؟
- 2- ما هي الأعراض التي يجب الانتباه إليها عند تناول الليفوتيروكسين قرص قرص في 3-4 أسابيع؟
- 3- كيف يجب تناول الليفوتيروكسين قرص قرص في 3-4 أسابيع؟
- 4- كيف يجب تناول الليفوتيروكسين قرص قرص في 3-4 أسابيع؟
- 5- ما هي الآثار الجانبية للليفوتيروكسين قرص قرص في 3-4 أسابيع؟
- 6- محتويات العلبة و تعليمات الاستخدام

تحتوي هذه العبوة على:

الليفوتيروكسين قرص قرص في 3-4 أسابيع هو دواء يستخدم لعلاج قصور الغدة الدرقية وارتفاع الكوليسترول. يجب استخدامه بانتظام وفقًا لتعليمات الطبيب.

الليفوتيروكسين قرص قرص في 3-4 أسابيع

الليفوتيروكسين قرص قرص في 3-4 أسابيع

محتويات العلبة



7871391098

9 118001 102006  
**Levothyrox® 25 µg,**  
 Comprimés sécables B/30  
 PPV: 6,80 DH

7862160335

الليفوتيروكسين قرص قرص في 3-4 أسابيع