

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS :Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W21-786900

AS2252

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 8227

Optique

Autres

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : LAHLALI

OMAR

Date de naissance : 23 - 11 - 64

Adresse :

Tél. : 06 61 96 70 67

Total des frais engagés : 136,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin



Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : KAWASAKI

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 08/10/13

Signature de l'adhérent(e) :







Autorisation CNDP N° : AA-215/2019

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
09/02/23	C S		100,00	INP : 09193748 DR. ABDERRAHMANE SKIREI Al Roudia 15-16 Rue Kergomar Résidence Ambar Casablanca - Tel. 0522 79 79 01

EXECUTION DES ORDONNANCES			
Cachet du Pharmacien	Date	Montant de la Facture	
PHARMACIE SKIREI ABBEDERRAHMANE SKIREI Al Roudia 15-16 Rue Kergomar Résidence Ambar Casablanca - Tel. 0522 79 79 01	09/02/2023	136,00	

ANALYSES - RADIGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX					
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre		Montant détaillé des Honoraires	
		A M	P C	I M	I V

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.				
Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.				
SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				<input type="text"/> CCOEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				<input type="text"/> MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			<input type="text"/> DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
	H 25533412 D 00000000 B 35533411	G 21433552 00000000 11433553	<input type="text"/> FIN D'EXECUTION <input type="text"/>	
	<input type="text"/> (Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			<input type="text"/> COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				<input type="text"/> MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				<input type="text"/> DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				<input type="text"/> DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS				
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION				

CLINIQUE ATFAL



090003690

CASABLANCA Le : 09-02-2023

Facture N° 02335/23

A. Identification

N° Dossier : ATF23B09192530

N° Identifiant : 002392/21

Nom & Prénom : Enf. LAHLALI SHIRINE

C.I.N :

Adresse : VILLA RAJA RUE GOLF D'ADEN AIN DIAB

C. Débiteur

page 1/1

Organisme : Payant

ICE : Adresse :

D. Période d'Hospitalisation

Date Entrée : 09-02-2023

Date Sortie : 09-02-2023

Traitements :

Médecin traitant : DR . GAAD KELTOUM

Qté	Prestations	Observation	Prix U.	L.C.	Coef	Total
PRESTATIONS						
1	CONSULTATION		400,00			400,00
Total Rubrique :						
PARTIE CLINIQUE : 400,00						
PARTIE HONORAIRES ET ACTES EXTERNES : 0,00						
Arrêté la présente facture à la somme de :						TOTAL GENERAL
						400,00

QUATRE CENTS DIRHAMS

Arrêté la présente facture à la somme de la part organisme de :

signature de l'assuré

*Clinique Pédiatrique
ATFAL
50, Bd. Abderrahim Bouabid
Oasis Casablanca
Tél : 0522 23 18 18 - INPF - 090003690*



AKDITAL

Clinique Atfal
مصحة أطفال

Casablanca, le.....

09/2/2023

LAHLALI Shmine 48M

2720 x 5

1's

Age 65 Sachet

136,00 Dpt 7 semaines
1 sachet x 2f/ jours

PHARMACIE SIDI ABDERRAHMANE
SKIREDJ Roukia
15-16 Rue Kergomar Résidence Anbar
Casablanca - Tel. 0522 79 79 01

Dr. Kelloun GANDI
Dr Mohamed Kelloun GANDI
Sidi Moussem Casablanca
Tel. 0522 27634

50, Bd. Abderrahim Bouabid, Oasis, Casablanca

Tél. : 05 22 23 18 18 (8LG) / 05 22 23 50 73 - Fax : 0522 23 50 28

E-mail : atfalclinique@gmail.com

Site web : www.cliniqueatfal.ma



ASPEGIC 500 mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dose

LOT 222010
PER 12/2024

ASPEGIC 500 MG
SACHETS B20

P.P.V : 27DH20



6 118000 061090

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
 - Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
 - Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
 - Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous sentez moins bien après 3 jours.
- Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

1. QU'EST-CE QUE ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : AUTRES ANALGÉSQUES ET ANTIPIRÉTIQUES
- code ATC : N02BA01.

Ce médicament contient de l'aspirine. L'aspirine appartient à la famille des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens.

L'aspirine peut être utilisée pour calmer la douleur (antalgique), faire baisser la fièvre (anti-pyrétique) et/ou diminuer l'inflammation.

ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose contient 500 mg d'aspirine.

Il est utilisé :

- En cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures **chez l'adulte et l'enfant de plus de 30 kg (environ de 9 à 15 ans)**,

Dans le traitement de certaines affections rhumatismales **chez l'adulte et l'enfant de plus de 20 kg (soit environ 6 ans) après avis médical**. Un suivi médical est nécessaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose :

- Si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes allergique à un médicament de la même famille que l'aspirine (les anti-inflammatoires non stéroïdiens).
- Si vous êtes enceinte, à partir du début du 6ème mois de grossesse (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée).
- Si vous avez ou avez déjà eu de l'asthme ou des polypes nasaux associés à un asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'un médicament de la même famille.
- Si vous souffrez actuellement d'un ulcère de l'estomac ou duodénum.
- Si vous avez déjà eu une hémorragie ou une perforation au niveau de l'estomac après avoir pris de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les anti-inflammatoires non stéroïdiens).
- Si vous avez des saignements ou si votre médecin a identifié chez vous des risques de saignements.
- Si vous avez une maladie grave du foie, des reins ou du cœur.
- Si vous prenez un autre médicament, assurez-vous que l'association avec

re pour solution buvable en sachet-dose n'est pas : paragraphe "Autres médicaments et ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose").

une mastocytose (maladie des cellules impliquées aiguës) car il existe un risque de réactions allergiques

N'AS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN
AVANT DE PRENDRE CE MEDICAMENT.

Avertissements et précautions

Avant d'utiliser ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose est disponible sans ordonnance. Toutefois, vous devez consulter votre médecin avant de prendre ce médicament en cas de :

- maladies rhumatismales,
- maladie héréditaire des globules rouges, également appelée déficit en G6PD (car des doses élevées d'aspirine peuvent provoquer une destruction des globules rouges),
- antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum ou une inflammation de l'estomac (gastrite),
- antécédents de saignements digestifs (vomissements de sang ou présence de sang dans les selles),
- maladie des reins ou du foie,
- règles abondantes,
- si vous suivez déjà un autre traitement anti-inflammatoire ou anticoagulant (référez-vous au paragraphe "Autres médicaments et ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose" pour plus d'informations),
- maladie virale, en particulier varicelle ou syndrome grippal, syndrome de Reye (maladie rare, très grave associant principalement troubles neurologiques et atteintes du foie) ont été observés chez des enfants présentant une maladie virale et recevant de l'aspirine.

Si votre enfant a moins d'un mois, vous devez d'abord consulter votre médecin avant d'utiliser un médicament contenant de l'aspirine, quel que soit le dosage.

Pendant le traitement chez l'enfant

Ce dosage est adapté pour l'adulte et l'enfant de plus de 30 kg (à partir d'environ 9 ans) en cas de douleur ou de fièvre et pour l'adulte et l'enfant de plus de 20 kg (à partir d'environ 6 ans) en cas de rhumatisme. Pour les enfants ayant un poids différent, il existe d'autres présentations d'aspirine dont le dosage est plus adapté. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Pendant le traitement, consultez immédiatement votre médecin si vous avez :

- des troubles de la conscience ou du comportement et des vomissements, arrêtez le traitement car un syndrome de Reye est possible (voir le paragraphe « Avant d'utiliser ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose »),
 - des saignements ou des douleurs dans le ventre. Le risque de survenue de ces effets augmente avec la dose, chez les personnes âgées, chez les personnes de faible poids corporel, chez les personnes ayant déjà souffert d'ulcère de l'estomac et en cas d'association à certains médicaments (voir rubrique « Autres médicaments et ASPEGIC 500 mg, poudre solution buvable en sachet-dose »),
 - une crise d'asthme. Cela peut être le signe d'une allergie à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien.
- En cas d'administration prolongée de fortes doses d'antalgiques, vous ne devez pas augmenter les doses d'ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de maux de tête.
- L'utilisation régulière de médicaments soulageant la douleur peut conduire à des complications rénales.

40000414101



ASPEGIC 500 mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament

LOT : 22E001
PER : 03 2024

ASPEGIC 500 MG
SACHETS B20

P.P.V : 27DH20



6 18000 061 090

ASPEGIC + GROSSESSE = INTERDIT



أسيجيك + حمل = ممنوع

Ne pas utiliser chez la femme enceinte.

لا يستعمل لدى النساء الحوامل.

(environ de 9 à 15 ans),

• Dans le traitement de certaines affections rhumatismales chez l'adulte et l'enfant de plus de 20 kg (soit environ 6 ans) après avis médical. Un suivi médical est nécessaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose :

- Si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes allergique à un médicament de la même famille que l'aspirine (les anti-inflammatoires non stéroïdiens).

- Si vous êtes enceinte, à partir du début du 6ème mois de grossesse (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée).

- Si vous avez ou avez déjà eu de l'asthme ou des polypes nasaux associés à un asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'un médicament de la même famille.

- Si vous souffrez actuellement d'un ulcère de l'estomac ou du duodénum.

- Si vous avez déjà eu une hémorragie ou une perforation au niveau de l'estomac après avoir pris de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les anti-inflammatoires non stéroïdiens).

- Si vous avez des saignements ou si votre médecin a identifié chez vous des risques de saignements.

- Si vous avez une maladie grave du foie, des reins ou du cœur.

- Si vous prenez un autre médicament, assurez-vous que l'association avec

ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose n'est pas contre-indiquée (voir le paragraphe "Autres médicaments et ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose").

- Si vous êtes atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

• **d'utiliser ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en**

sachet-dose

• 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose est sans ordonnance. Toutefois, vous devez consulter votre médecin pour ce médicament en cas de : rhumatismales,

héritéitaire des globules rouges, également appelée déficit en doses élevées d'aspirine peuvent provoquer une destruction des rouges),

ents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum ou une inflammation (gastrite),

nts de saignements digestifs (vomissements de sang ou présence des selles),

des reins ou du foie, jondantes,

juivez déjà un autre traitement anti- inflammatoire ou (référez-vous au paragraphe "Autres médicaments et ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose") plus de

virale, en particulier varicelle ou syndrome de Reye (maladie rare, très grave associant poumonaires et atteintes du foie) ont été observées. Tenant une maladie virale et recevant pendant au moins d'un mois, vous devez d'abord consulter votre avant d'utiliser un médicament contenant de l'aspirine, quel que soit le dosage.

Pendant le traitement chez l'enfant

Ce dosage est adapté pour l'adulte et l'enfant de plus de 30 kg (à partir d'environ 9 ans) en cas de douleur ou de fièvre pour l'adulte et l'enfant de plus de 20 kg (à partir d'environ 6 ans) en cas de rhumatisme. Pour les enfants ayant un poids différent, il existe d'autres présentations d'aspirine dont le dosage est plus adapté. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Pendant le traitement, consultez immédiatement votre médecin si vous avez :

- des troubles de la conscience ou du comportement et des vomissements, arrêtez le traitement car un syndrome de Reye est possible (voir le paragraphe « Avant d'utiliser ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose »),

- des saignements ou des douleurs dans le ventre. Le risque de survenue de ces effets augmente avec la dose, chez les personnes âgées, chez les personnes de faible poids corporel, chez les personnes ayant déjà souffert d'ulcère de l'estomac et en cas d'association à certains médicaments (voir rubrique « Autres médicaments et ASPEGIC 500mg, poudre solution buvable en sachet-dose »),

- une crise d'asthme. Cela peut être le signe d'une allergie à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien.

En cas d'administration prolongée de fortes doses d'antalgiques, vous ne devrez pas augmenter les doses d'ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de maux de tête. L'utilisation régulière de médicaments soulageant la douleur peut conduire à des complications rénales.



ASPEGIC 500 mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament

LOT : 22E001
PER : 03 2024

ASPEGIC 500 MG
SACHETS B20

P.P.V : 27DH20



6 18000 061 090

ASPEGIC + GROSSESSE = INTERDIT



أسيجيك + حمل = ممنوع

Ne pas utiliser chez la femme enceinte.

لا يستعمل لدى النساء الحوامل.

(environ de 9 à 15 ans),

• Dans le traitement de certaines affections rhumatismales chez l'adulte et l'enfant de plus de 20 kg (soit environ 6 ans) après avis médical. Un suivi médical est nécessaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose :

- Si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes allergique à un médicament de la même famille que l'aspirine (les anti-inflammatoires non stéroïdiens).

- Si vous êtes enceinte, à partir du début du 6ème mois de grossesse (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée).

- Si vous avez ou avez déjà eu de l'asthme ou des polypes nasaux associés à un asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'un médicament de la même famille.

- Si vous souffrez actuellement d'un ulcère de l'estomac ou du duodénum.

- Si vous avez déjà eu une hémorragie ou une perforation au niveau de l'estomac après avoir pris de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les anti-inflammatoires non stéroïdiens).

- Si vous avez des saignements ou si votre médecin a identifié chez vous des risques de saignements.

- Si vous avez une maladie grave du foie, des reins ou du cœur.

- Si vous prenez un autre médicament, assurez-vous que l'association avec

ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose n'est pas contre-indiquée (voir le paragraphe "Autres médicaments et ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose").

- Si vous êtes atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

• **d'utiliser ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en**

sachet-dose

• 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose est sans ordonnance. Toutefois, vous devez consulter votre médecin pour ce médicament en cas de : rhumatismales,

héritéitaire des globules rouges, également appelée déficit en doses élevées d'aspirine peuvent provoquer une destruction des rouges),

ents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum ou une inflammation (gastrite),

nts de saignements digestifs (vomissements de sang ou présence des selles),

des reins ou du foie, jondantes,

juivez déjà un autre traitement anti- inflammatoire ou (référez-vous au paragraphe "Autres médicaments et ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose") plus de

virale, en particulier varicelle ou syndrome de Reye (maladie rare, très grave associant poumonaires et atteintes du foie) ont été observées. Tenant une maladie virale et recevant pendant au moins d'un mois, vous devez d'abord consulter votre avant d'utiliser un médicament contenant de l'aspirine, quel que soit le dosage.

Pendant le traitement chez l'enfant

Ce dosage est adapté pour l'adulte et l'enfant de plus de 30 kg (à partir d'environ 9 ans) en cas de douleur ou de fièvre pour l'adulte et l'enfant de plus de 20 kg (à partir d'environ 6 ans) en cas de rhumatisme. Pour les enfants ayant un poids différent, il existe d'autres présentations d'aspirine dont le dosage est plus adapté. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Pendant le traitement, consultez immédiatement votre médecin si vous avez :

- des troubles de la conscience ou du comportement et des vomissements, arrêtez le traitement car un syndrome de Reye est possible (voir le paragraphe « Avant d'utiliser ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose »),

- des saignements ou des douleurs dans le ventre. Le risque de survenue de ces effets augmente avec la dose, chez les personnes âgées, chez les personnes de faible poids corporel, chez les personnes ayant déjà souffert d'ulcère de l'estomac et en cas d'association à certains médicaments (voir rubrique « Autres médicaments et ASPEGIC 500mg, poudre solution buvable en sachet-dose »),

- une crise d'asthme. Cela peut être le signe d'une allergie à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien.

En cas d'administration prolongée de fortes doses d'antalgiques, vous ne devrez pas augmenter les doses d'ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de maux de tête. L'utilisation régulière de médicaments soulageant la douleur peut conduire à des complications rénales.



ASPEGIC 500 mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament

LOT : 22E001
PER : 03 2024

ASPEGIC 500 MG
SACHETS B20

P.P.V : 27DH20



6 18000 061 090

ASPEGIC + GROSSESSE = INTERDIT



أسيجيك + حمل = ممنوع

Ne pas utiliser chez la femme enceinte.

لا يستعمل لدى النساء الحوامل.

(environ de 9 à 15 ans),

• Dans le traitement de certaines affections rhumatismales chez l'adulte et l'enfant de plus de 20 kg (soit environ 6 ans) après avis médical. Un suivi médical est nécessaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose :

- Si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes allergique à un médicament de la même famille que l'aspirine (les anti-inflammatoires non stéroïdiens).

- Si vous êtes enceinte, à partir du début du 6ème mois de grossesse (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée).

- Si vous avez ou avez déjà eu de l'asthme ou des polypes nasaux associés à un asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'un médicament de la même famille.

- Si vous souffrez actuellement d'un ulcère de l'estomac ou du duodénum.

- Si vous avez déjà eu une hémorragie ou une perforation au niveau de l'estomac après avoir pris de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les anti-inflammatoires non stéroïdiens).

- Si vous avez des saignements ou si votre médecin a identifié chez vous des risques de saignements.

- Si vous avez une maladie grave du foie, des reins ou du cœur.

- Si vous prenez un autre médicament, assurez-vous que l'association avec

ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose n'est pas contre-indiquée (voir le paragraphe "Autres médicaments et ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose").

- Si vous êtes atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

• **d'utiliser ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en**

sachet-dose

• 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose est sans ordonnance. Toutefois, vous devez consulter votre médecin pour ce médicament en cas de : rhumatismales,

héritéitaire des globules rouges, également appelée déficit en doses élevées d'aspirine peuvent provoquer une destruction des rouges),

ents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum ou une inflammation (gastrite),

nts de saignements digestifs (vomissements de sang ou présence des selles),

des reins ou du foie, jondantes,

juivez déjà un autre traitement anti- inflammatoire ou (référez-vous au paragraphe "Autres médicaments et ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose") plus de

virale, en particulier varicelle ou syndrome de Reye (maladie rare, très grave associant poumonaires et atteintes du foie) ont été observées. Tenant une maladie virale et recevant pendant au moins d'un mois, vous devez d'abord consulter votre avant d'utiliser un médicament contenant de l'aspirine, quel que soit le dosage.

Pendant le traitement chez l'enfant

Ce dosage est adapté pour l'adulte et l'enfant de plus de 30 kg (à partir d'environ 9 ans) en cas de douleur ou de fièvre pour l'adulte et l'enfant de plus de 20 kg (à partir d'environ 6 ans) en cas de rhumatisme. Pour les enfants ayant un poids différent, il existe d'autres présentations d'aspirine dont le dosage est plus adapté. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Pendant le traitement, consultez immédiatement votre médecin si vous avez :

- des troubles de la conscience ou du comportement et des vomissements, arrêtez le traitement car un syndrome de Reye est possible (voir le paragraphe « Avant d'utiliser ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose »),

- des saignements ou des douleurs dans le ventre. Le risque de survenue de ces effets augmente avec la dose, chez les personnes âgées, chez les personnes de faible poids corporel, chez les personnes ayant déjà souffert d'ulcère de l'estomac et en cas d'association à certains médicaments (voir rubrique « Autres médicaments et ASPEGIC 500mg, poudre solution buvable en sachet-dose »),

- une crise d'asthme. Cela peut être le signe d'une allergie à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien.

En cas d'administration prolongée de fortes doses d'antalgiques, vous ne devrez pas augmenter les doses d'ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de maux de tête. L'utilisation régulière de médicaments soulageant la douleur peut conduire à des complications rénales.



ASPEGIC 500 mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament

LOT : 22E001
PER : 03 2024

ASPEGIC 500 MG
SACHETS B20

P.P.V : 27DH20



6 18000 061 090

ASPEGIC + GROSSESSE = INTERDIT



أسيجيك + حمل = ممنوع

Ne pas utiliser chez la femme enceinte.

لا يستعمل لدى النساء الحوامل.

(environ de 9 à 15 ans),

• Dans le traitement de certaines affections rhumatismales chez l'adulte et l'enfant de plus de 20 kg (soit environ 6 ans) après avis médical. Un suivi médical est nécessaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose :

- Si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes allergique à un médicament de la même famille que l'aspirine (les anti-inflammatoires non stéroïdiens).

- Si vous êtes enceinte, à partir du début du 6ème mois de grossesse (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée).

- Si vous avez ou avez déjà eu de l'asthme ou des polypes nasaux associés à un asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'un médicament de la même famille.

- Si vous souffrez actuellement d'un ulcère de l'estomac ou du duodénum.

- Si vous avez déjà eu une hémorragie ou une perforation au niveau de l'estomac après avoir pris de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les anti-inflammatoires non stéroïdiens).

- Si vous avez des saignements ou si votre médecin a identifié chez vous des risques de saignements.

- Si vous avez une maladie grave du foie, des reins ou du cœur.

- Si vous prenez un autre médicament, assurez-vous que l'association avec

ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose n'est pas contre-indiquée (voir le paragraphe "Autres médicaments et ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose").

- Si vous êtes atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

• **d'utiliser ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en**

sachet-dose

• 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose est sans ordonnance. Toutefois, vous devez consulter votre médecin pour ce médicament en cas de : rhumatismales,

héritéitaire des globules rouges, également appelée déficit en doses élevées d'aspirine peuvent provoquer une destruction des rouges),

ents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum ou une inflammation (gastrite),

nts de saignements digestifs (vomissements de sang ou présence des selles),

des reins ou du foie, jondantes,

juivez déjà un autre traitement anti- inflammatoire ou (référez-vous au paragraphe "Autres médicaments et ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose") plus de

virale, en particulier varicelle ou syndrome de Reye (maladie rare, très grave associant pouvoirs neurologiques et atteintes du foie) ont été observées. Tenant une maladie virale et recevant de moins d'un mois, vous devez d'abord consulter votre avant d'utiliser un médicament contenant de l'aspirine, quel que soit le dosage.

Pendant le traitement chez l'enfant

Ce dosage est adapté pour l'adulte et l'enfant de plus de 30 kg (à partir d'environ 9 ans) en cas de douleur ou de fièvre pour l'adulte et l'enfant de plus de 20 kg (à partir d'environ 6 ans) en cas de rhumatisme. Pour les enfants ayant un poids différent, il existe d'autres présentations d'aspirine dont le dosage est plus adapté. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Pendant le traitement, consultez immédiatement votre médecin si vous avez :

- des troubles de la conscience ou du comportement et des vomissements, arrêtez le traitement car un syndrome de Reye est possible (voir le paragraphe « Avant d'utiliser ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose »),

- des saignements ou des douleurs dans le ventre. Le risque de survenue de ces effets augmente avec la dose, chez les personnes âgées, chez les personnes de faible poids corporel, chez les personnes ayant déjà souffert d'ulcère de l'estomac et en cas d'association à certains médicaments (voir rubrique « Autres médicaments et ASPEGIC 500mg, poudre solution buvable en sachet-dose »),

- une crise d'asthme. Cela peut être le signe d'une allergie à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien.

En cas d'administration prolongée de fortes doses d'antalgiques, vous ne devrez pas augmenter les doses d'ASPEGIC 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de maux de tête. L'utilisation régulière de médicaments soulageant la douleur peut conduire à des complications rénales.

4000044101