

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1526 Société : RAM

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : ARIRENE HASSAN


Date de naissance : 01/01/49

Adresse : LOT ATTADAMOUNE RUE 6 N° 50 OULFA CASA

Tél. : 06 76 02 7441 Total des frais engagés : 570,90 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 21/12/08

Nom et prénom du malade : ARIRENE HASSAN Age : 74 ans

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Patho des

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA Le : 07/02/2013

Signature de l'adhérent(e) :



### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
<i>2023</i>		<i>* 250,00 Dhs</i>		<i>Dr. M. GUARDI Spécialiste Entérologie et Proctologie Casablanca - Tél: 06 23 86 23 41 INPE = 250000 Dhs</i>

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>Ste PHARMACIE EL IMRANE N° 2386210 Industriel Al Omrane Sahel Had Tél: 06 23 86 23 41</i>	<i>07-02-23</i>	<i>STE PHARMACIE EL IMRANE N° 2386210 Industriel Al Omrane Sahel Had Tél: 06 23 86 23 41</i>

### ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	


### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				<b>COEFFICIENT DES TRAVAUX</b>
				<b>MONTANTS DES SOINS</b>
				<b>DEBUT D'EXECUTION</b>
				<b>FIN D'EXECUTION</b>
				<b>COEFFICIENT DES TRAVAUX</b>
				<b>MONTANTS DES SOINS</b>
				<b>DATE DU DEVIS</b>
				<b>DATE DE L'EXECUTION</b>




**O.D.F PROTHESES DENTAIRES**

**DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE**

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	35533411	11433553
G		

**[Création, remont, adjonction]**  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

SPÉCIALISTE

Maladies de l'Appareil Digestif

foie-estomac-intestin-vesicule biliaire

hémostoïdes-fissure-fistule

Diplômée de la faculté de médecine de casablanca

Membre de la société nationale

française de gastro-entérologie

Echographie-gastroscopie-coloscopie

Proctologie médicale et chirurgicale



إختصاصية

في أمراض الجهاز الهضمي

الكبد-المعدة-المراة-الأمعاء

ال بواسير-أمراض المخرج

خريجة كلية الطب بالدار البيضاء

عضوة بالجمعية الوطنية الفرنسية لأمراض الجهاز الهضمي

الفحص بالصدى الفوقي بالمنظار

جراحة المخرج

Casablanca, le : st 02.02.23

ARIENE HASSAN

123,60 11 imexium long 81 SV  
igel le mpm x 145.

99,00 2) Pradeferm sachet SV  
AS 1J x 28m

52,10 3) ~~201~~ sone A2 sachet SV  
AS x 21J x 3J

65,90 4) TAHMEDA 21J sachet SV  
x 3J

~~STE PHARMACIE EL ARIANE~~  
N°31 Bldc 2 Indimaj Pole Urbain  
et Industriel Omani Suhel Had  
Boualem Berrechid  
Tél : 06 23 86 23 41

Meriem EL OUARDI  
Spato - Gastro - Entérologue  
et Proctologue  
ot Haj Fateh Imm 10 - Olfa  
Hassan Tel : 05 22 90 72 98

# إينكسيوم 20 ملخ، قرص صامد لمجموعة المعدة

# إينكسيوم 40 ملخ، قرص صامد لمجموعة المعدة

[إزميبرازول]

لعلاج الفرجات الناتجة عن الإصابة بعدوى **هيليكوباكتر**  
 • البرة المنصوح بها هي قرص واحد صامد لمجموعة  
 في اليوم لمدة أسبوع واحد.

• سيفصل لك الطبيب أيضاً مضادات حيوية، مثل الأدواء  
 تناول الدوا.

• يمكنك تناول الأقراص في أي وقت من اليوم.

• يمكنك تناول الأقراص مع الطعام أو على مدة  
 تناول الأقراص كاملة مع كوب من الماء، لا **تفتح** ولا

جيبيان مغلفة تمنع تغير الدوا، بفضل أحاضن المعدة

ماذا تفعل إذا كانت لديك مشاكل في ابتلاع الأقراص:

• إذا كانت لديك مشاكل في ابتلاع الأقراص:  
 - ضعها في كوب من الماء (غير غازي)، لا تستخدم

- حرك إلى غاية تحلل القرص (المزبج غير مساق).

- غضون 30 دقيقة. حرك دانما المزبج قبل الشر

- للتأكد من تناول البرجة كاملة، أطشط جيداً إلـا

تحتوي المضادات الصلبة على الدوا، يجب أن

في حالة استعماله عن طريق أنبوب مباشرة في ا

الاستعمال لدى الأطفال أقل من 12 سنة

لا ينصح باستعمال إينكسيوم، قرص صامد لمجموعة المعدة

المعلومات المتعلقة بالمراعات الخاصة بالأطفال بغير

مرفقة في نشرة إينكسيوم كبس (استشر الطبيب أو

المرضى كبار السن

لا حاجة إلى تعديل البرجة لدى المرضى كبار السن.

إذا تناولت جرعة زائدة من إينكسيوم

إذا نسيت تناول إينكسيوم

إذا نسيت تناول جرعة واحدة، تناولها بمجرد ذكره

التالية، لا تتناول البرجة المنسية.

لا تتناول جرعة زائدة (جرتين انتهن في نفس اليوم)

إذا كانت لديك أية أستلة حول استعمال هذا الدوا،

الصيدي.

## 4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة

كغيره من الأدوية، من المحتمل أن يسبب هذا الدوا

المرضى بالضرورة.

إذا لاحظت أحد الآثار الجانبية التالية، توقف عن تنا

صعوبة مفاجئة في التنفس، تورم الشفتين، اللسان

الوعي أو صعوبة في البلع (تفاعل أرجي شديد).

• احمرار الجلد مصموب بشكل فقاعات أو نشراف، قد

في الشفتين، العينين، الفم، الأنف والأعضاء، التنا

سيتنفس - جونسون» أو «**افتئال الأنفية المفتوحة**» التي

تون الجلد بالأصفر، يول داكن وتعجب قد تكون أ

هذه الآثار نادرة وقد تسبب حتى شخص واحد من 100

تشتمل الآثار الأخرى على:

**شلل شفاعة** (قد تسبب حتى شخص واحد من 10)

• ألام في الرأس.

• التأثيرات على المعدة أو الأمعاء: إسهال، ألام في

غثيان أو تقيّء.

• أورام حميدة في المعدة.

**غير شفاعة** (قد تسبب حتى شخص واحد من 100)

• تورم في القدمين والكافيين.

• اضطرابات النوم (ارق).

يرجى قراءة هذه النشرة بتمعن قبل الشروع في استعمال هذا الدوا لأنها تحتوي على معلومات تهمك.

• احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قرأتها من جديد.

• إذا كانت لديك أستلة أخرى، استشر الطبيب أو الصيدلي على هذا الدوا، لك شخصياً، لا تصفه لشخص آخر حتى إذا ظهرت عليه نفس

الأعراض يمكن لذلك أن يضر به.

• إذا تفاقم أحد الآثار أو لاحظت ظهر أي آثر جانبى غير مذكور في هذه النشرة أبلغ الطبيب أو الصيدلي. راجع القسم 4

## على ماذا تحتوي هذه النشرة

1. ما هو إينكسيوم وما هي دواعي استعماله

2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول إينكسيوم

3. كيف تناول إينكسيوم

4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة

5. كيف يحفظ إينكسيوم

6. محتوى العلبة ومعلومات إضافية.

## 1. ما هو إينكسيوم وما هي دواعي استعماله

يحتوي إينكسيوم على مكون يدعى الإزميبرازول. ينتمي إلى مجموعة الأدوية التي تسمى «مثبطات مضخة البروتون». تعمل من خلال تقليل إفراز الحمض في المعدة.

يستعمل إينكسيوم لعلاج الحالات التالية:

البالغين:

• داء القرمز المعددي المفجري RG0 الذي يسبب خروج حمض المعدة إلى المري، (الأنبوب

الذي يربط بين الملق والمعدة) مما يسبب الألم، الالتباس والحرقة.

• قرحة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء، المصابة بالكتيريا المسماة «هيليكوباكتر بيلوري».

في هذه الحالة، قد يصف لك الطبيب بعض المضادات الحيوية لعلاج الدوى والسلام

للفرجة بالشفاء.

• قرحة المعدة الناجمة عن الأدوية المسماة «مضادات الالتهاب اللاستيرويدية» AINS. يمكن

أيضاً استعمال إينكسيوم لإيقاف عملية تشكيل الفرجات في حالة تناول مضادات الالتهاب

اللاستيرويدية AINS.

• زيادة حموضة المعدة سبب وجود روم في التكيراس (متلازمة زولنغر - إليسون).

• وأوصالة العلاج بعد الوقاية من تكرار ظهور تزيف في القرحة عند استعمال إينكسيوم عن

طريق الحقن الوريدي.

المرأهقين البالغين 12 سنة وأكثر:

• داء القرمز المعددي المفجري RG0 الذي يسبب خروج حمض المعدة إلى المري، (الأنبوب

الذي يربط بين الملق والمعدة) مما يسبب الألم، الالتباس والحرقة.

• قرحة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء، المصابة بالكتيريا المسماة «هيليكوباكتر

بيلوري». في هذه الحالة، قد يصف لك الطبيب بعض المضادات الحيوية لعلاج العدوى

والسلام للقرحة بالشفاء.

## 2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول إينكسيوم

لا تتناول أبداً إينكسيوم

إذا كنت تعاني من المساسية إزاء الإزميبرازول أو إزا، أي من المكونات الأخرى التي

يحتوي عليها هذا الدوا، (وهي مذكورة في القسم 6).

إذا كنت تعاني من المساسية إزاء الأدوية الأخرى التي تعمل على تثبيط مضخة البروتون

(مثل الباكتوبرازول، اللازوبروازول، الإيبوبرازول، الأزميبرازول).

إذا كنت تتناول دواً يحتوي على التنفيناifer (يستخدمن لعلاج فيروس نقص المناعة

البشرية VIH).

لا تتناول إينكسيوم إذا انطقت عليك أي من الحالات المذكورة أعلاه. في حالة الشك، استشر

الطبيب أو الصيدلي قبل تناول إينكسيوم.

## التحذيرات والاحتياطات

استشر الطبيب أو الصيدلي قبل تناول إينكسيوم:

• إذا كنت تعاني من مشاكل كثوية خطيرة،

• إذا كنت تعاني من مشاكل كثوية خطيرة،

• إذا سبق وأن أصبت بتفاعل جلدي بعد العلاج باستعمال دواً، مشابه لإينكسيوم يقلل من

# INexium 20 mg

## INexium

EXP  
LOT 09-2025  
2PLT

résistants  
-stants

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car il contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice :

- Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium
- Comment prendre INexium
- Quels sont les effets indésirables éventuels
- Comment conserver INexium
- Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé

INexium contient un médicament appelé esoméprazole. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelé "inhibiteurs de la pompe à protons". Ceux-ci agissent en diminuant la quantité d'acide produite par l'estomac.

INexium est utilisé dans le traitement des affections suivantes :

#### Adultes

- «La maladie du reflux gastro-oesophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.
- Ulcères gastriques dus à des médicaments appelés AINS (médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens). INexium est également indiqué dans la prévention des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS.
- Acidité gastrique accrue due à une tumeur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger- Ellison).
- Poursuite du traitement après la prévention d'une récidive hémorragique d'ulcères avec INexium par voie intraveineuse.

#### Adolescents âgés de 12 ans et plus

- «La maladie du reflux gastro-oesophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.

### 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium

#### Ne prenez jamais INexium

- Si vous êtes allergique à l'esoméprazole ou à l'un des autres composants contenu dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- Si vous êtes allergique à d'autres médicaments inhibiteurs de la pompe à protons (par exemple pantoprazole, lansoprazole, rabéprazole, oméprazole).
- Si vous prenez un médicament qui contient du nelfinavir (utilisé dans le traitement du VIH).

Ne prenez pas INexium si l'une des situations ci-dessus vous concerne. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre INexium.

#### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre INexium :

- Si vous souffrez de problèmes hépatiques sévères.
- Si vous souffrez de problèmes rénaux sévères.
- Si vous avez déjà développé une réaction cutanée après un traitement par un médicament similaire à INexium réduisant l'acide gastrique.
- Si vous devez effectuer un examen sanguin spécifique (Chromogranine A).

#### Prise du médicament

- Vous pouvez prendre INexium avec ou sans manger.
- Vous pouvez prendre INexium avec ou sans boire.
- Avalez vos comprimés entiers, sans les broyer, ni mâcher ni écraser, parce que les comprimés contiennent des granules qui empêchent que ce médicament soit détruit par l'acidité de l'estomac.

#### Que faire si vous avez des problèmes pour avaler vos comprimés

- Si vous avez des problèmes pour avaler vos comprimés :
  - Mettez-les dans un verre d'eau plate (non gazeuse).
  - Remuez jusqu'à ce que le comprimé soit dissous.
  - Pour être sûr que vous avez pris toute la dose, buvez le liquide immédiatement ou diluez-le dans un bol d'eau et buvez ce liquide. Les particules solides doivent être ni mâchées, ni écrasées.
- En cas d'impossibilité à avaler, le comprimé pourra être introduit dans une seringue. Il pourra alors être directement dans votre estomac (sonde gastrique).

#### Utilisation chez les enfants de moins de 12 ans

INexium, comprimés gastro-résistants, n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 12 ans. L'information sur le dosage pour des enfants âgés de 12 ans et plus est indiquée sur le produit INexium sachet (Consultez votre médecin ou pharmacien pour plus d'informations).

#### Personnes âgées

Aucun ajustement de dose n'est nécessaire chez les personnes âgées.

#### Si vous avez pris plus de INexium que vous n'auriez dû

Si vous prenez plus de INexium que la dose prescrite par votre médecin ou à votre pharmacien.

#### Si vous oubliez de prendre INexium

- Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez-en une dès que vous le réalisez, mais c'est bientôt le moment de prendre la dose suivante.
- Ne prenez pas de dose double (deux doses en même temps) si vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, consultez votre médecin ou à votre pharmacien.

#### 4. Quels sont les effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables qui ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

#### Si vous remarquez un des effets indésirables sévères ou graves avec INexium et contactez immédiatement un médecin :

- Difficulté à respirer, gonflement des lèvres et/ou éruption cutanée, perte de connaissance ou difficultés à respirer.
- Rougeurs de la peau accompagnées de la formation de cloques importantes, surtout sur les lèvres, les yeux, la bouche, le nez et la tête. Peuvent également apparaître des cloques importantes sur les lèvres, les yeux, la bouche, le nez et la tête.
- Syndrome de Stevens-Johnson « ou « une nécrolyse épidermique et mucosale » (NEM) ». Peut également apparaître des cloques importantes sur les lèvres, les yeux, la bouche, le nez et la tête.
- Peau jaune, urine foncée et fatigue qui peuvent être associées à une augmentation du niveau du foie.

Ces effets sont rares et peuvent affecter jusqu'à une personne sur 1000.

Les autres effets indésirables comprennent :

#### Fréquent (peut affecter jusqu'à une personne sur 10)

- Maux de tête.
- Effets sur l'estomac ou l'intestin : diarrhée, douleurs abdominales, nausées ou vomissements.
- Problèmes de vision, taches noires ou floues.

# Trimedat® Sachets

## Trimébutine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable, non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

### PRÉSENTATION

TRIMEDAT® 150 mg sachets, boîte de 20.

TRIMEDAT® SANS SUCRE 150 mg sachets, boîte de 20.

### COMPOSITION

Substance active : Trimébutine base

#### TRIMEDAT 150 mg sachets

Trimébutine base.....150 mg

Excipients q.s.p.....1 sachet

#### TRIMEDAT SANS SUCRE 150 mg sachets

Trimébutine base.....150 mg

Excipients q.s.p.....1 sachet

### CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antispasmodique musculotrope.

### INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Ce médicament est indiqué chez l'adulte dans le traitement symptomatique des douleurs, des troubles du transit et de l'inconfort intestinal liés aux troubles fonctionnels intestinaux.

### CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament est contre-indiqué chez l'enfant de moins de 2 ans.

Ne prenez jamais TRIMEDAT® 150 mg sachets ou TRIMEDAT® SANS SUCRE 150 mg sachets, en cas d'hypersensibilité à la trimébutine.

Ne prenez jamais TRIMEDAT® SANS SUCRE 150 mg sachets en cas de phénylcétonurie héréditaire (maladie dépistée à la naissance), à cause de la présence de l'aspartam.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

#### TRIMEDAT® 150 mg sachets :

Chaque sachet de TRIMEDAT® 150 mg contient 2,6 g de saccharose, dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### INTERACTIONS AVEC LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

Sans objet.

### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

#### Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger

de la nécessité de la poursuivre.

### Allaitement

Il est préférable de ne pas prendre ce médicament si vous allaitez. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### SPORTIFS

Sans objet.

### EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DES MACHINES

Sans objet.

### LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NUTRITIVE

TRIMEDAT® 150 mg sachets contient du saccharose.

TRIMEDAT® SANS SUCRE 150 mg sachets, contient de l'aspartam.

### POSOLOGIE, MODE ET/OU VOIE(S) D'ADMINISTRATION

#### Posologie :

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Chez l'adulte, la posologie usuelle est de 1 sachet, 3 fois par jour.

Le traitement doit être de courte durée.

#### Mode et voie d'administration :

Voie orale.

Le contenu des sachets doit être dissous dans un verre d'eau.

### SURDOSAGE

Si vous avez pris plus de TRIMEDAT® 150 mg sachets ou TRIMEDAT® SANS SUCRE 150 mg sachets, que vous n'auriez dû: consultez votre médecin.

### INSTRUCTIONS EN CAS D'OMISSION D'UNE OU DE PLUSIEURS DOSES

Sans objet.

### RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE

Sans objet.

### EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, TRIMEDAT® sachets est susceptible d'avoir des effets indésirables bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Rares réactions cutanées.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### DECLARATION DES EFFETS INDESIRABLES

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement ou via le centre national de pharmacovigilance. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

### CONSERVATION

Ne pas laisser à la portée des enfants.

### CONDITIONS DE DELIVRANCE

Liste II

### PÉREMPTION

Ne pas utiliser TRIMEDAT® sachets après la date de péremption figurant sur le conditionnement extérieur.

### DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Mars 2018

LOT : 7199

UT. AV : 02-27

P.P.V : 45 DH 90

**PHARMA5**

Laboratoires Pharma 5

21 Rue des Asphodèles - Casablanca - Maroc

Site de fabrication: Zone Industrielle Ouled Saleh - Bouskoura - Maroc

Yasmine LAHLOU FILALI - Pharmacien Responsable



# smecta® orange-vanille

Diosmectite

SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE, poudre pour suspension buvable en sachet

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE, poudre pour suspension buvable en sachet et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE, poudre pour suspension buvable en sachet ?
3. Comment prendre SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE, poudre pour suspension buvable en sachet ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE, poudre pour suspension buvable en sachet ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE, poudre pour suspension buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : AUTRES ADSORBANTS INTESTINAUX - code ATC : A07BC05.

Ce médicament contient une substance active : la diosmectite.

La diosmectite est une argile naturelle purifiée qui couvre la muqueuse digestive.

Ce médicament est indiqué dans le traitement :

- De la diarrhée aiguë chez l'enfant de plus de 2 ans en complément de la réhydratation orale, et chez l'adulte ;
- De la diarrhée chronique (de longue durée) chez l'adulte ;
- Des douleurs liées à des maladies fonctionnelles de l'intestin chez l'adulte.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE, poudre pour suspension buvable en sachet ?

Ne prenez jamais SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE, poudre pour suspension buvable en sachet :

- Si vous êtes allergique à la diosmectite ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

## Avertissements et précautions

Chez le nourrisson et l'enfant de moins de 2 ans : SMECTA ne doit pas être utilisé.

Chez l'enfant de plus de 2 ans : SMECTA doit être utilisé uniquement dans le traitement de la diarrhée aiguë (7 jours maximum), en association avec l'administration précoce d'un bolus de réhydratation orale (SRO). Toute utilisation chronique de SMECTA doit être évitée.

Chez l'adulte : L'utilisation prolongée ou répétée de SMECTA n'est pas recommandée sans avis médical.

Adressez-vous à votre

3 g ORANGE-VANILLE

• Si votre médecin vous

Ce médicament con-

utilisation est décon-

au fructose, un sync-

ou un déficit en suc-

• Si vous avez des an-

Consultez votre médecin :

• En cas de diarrhée aiguë, si vos symptômes ne s'améliorent pas ou s'aggravent après 3 jours de traitement.

• Si vos douleurs digestives sont associées à une fièvre ou à des vomissements.

Ce médicament contient de petites quantités d'éthanol (alcool) inférieures à 100 mg par dose journalière.

Enfants

SMECTA est réservé à l'enfant de plus de 2 ans, pour le traitement de la diarrhée aiguë. Il doit être administré en association avec l'administration précoce d'un bolus de réhydratation orale (SRO) afin d'éviter la déshydratation. La durée de traitement ne doit pas dépasser 7 jours.

## Mesures diététiques supplémentaires

Ce traitement est un complément des règles diététiques :

- Se réhydrater par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquide dues à la diarrhée (la ration quotidienne moyenne en eau de l'adulte est de 2 litres).
- Continuer de s'alimenter pendant la diarrhée, en excluant certains aliments, particulièrement les légumes et fruits crus, les légumes verts, les plats épices, ainsi que les aliments ou boissons glacés.
- En privilégiant les viandes grillées, le riz.

Autres médicaments et SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE, poudre pour suspension buvable en sachet

La prise de ce médicament peut diminuer l'absorption des autres médicaments ingérés simultanément. Aucun médicament ne doit être pris au même moment que SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE.

Vous devez espacer la prise de SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE de celle d'un autre médicament de plus de 2 heures, si possible. Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

## Grossesse et allaitement

SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE n'est pas recommandé pendant la grossesse et l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

## Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune étude sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'a été réalisée. Toutefois, l'effet attendu est nul ou négligeable.

01.12.2025  
PER...14.2025

SMECTA ORANGE VANILLE  
36 SACHET B30

P.P.V : 52DH40

6 118000 011460



# PRODEFEN

Complément alimentaire

## I- Qu'est-ce que PRODEFEN ?

Prodefen est un complément alimentaire qui contient un mélange soluble de 7 souches de bactéries bénéfiques (aussi connues comme probiotiques) et de fructooligosaccharides.

Prodefen apporte sept souches de bactéries, y compris la souche spécifique des enfants, appelée *Bifidobacterium infantis*, qui se trouvent naturellement dans le système digestif.

Prodefen aide à rétablir l'équilibre de la flore intestinale, puisque les bactéries bénéfiques de l'organisme peuvent être affectées par des changements environnementaux et de régime alimentaire.

## II- Composition :

**Ingédients :** Fructooligosaccharides 958.2 mg/sachet, Souches Probiotiques\* 1×10<sup>9</sup> UFC/sachet (voir la liste ci-dessous) :

### Souches probiotiques

*Lactobacillus casei* PXN® 37™  
*Lactobacillus rhamnosus* PXN® 54™  
*Streptococcus thermophilus* PXN® 66™  
*Lactobacillus acidophilus* PXN® 35™  
*Bifidobacterium breve* PXN® 25™  
*Bifidobacterium infantis* PXN® 27™  
*Lactobacillus bulgaricus* PXN® 39™

\* Il contient du soja, du lait et ses dérivés utilisés dans le processus de fermentation. La teneur en lait n'affecte pas les personnes intolérantes au lactose.

Sans gluten.

PXN est une marque déposée d'ADM (Protexin). Tous droits réservés.

**PRODEFEN**  
Complément alimentaire

Lot :

Date de Fab :

Date de Pér :

PPC : 99 Dhs

123724

02.2022

01.2024

III- INGÉRIE

Dose journalière :  
sachet par jour pendant  
Dissoudre le contenu du sachet dans  
lait ou du jus.

• Prodefen peut être utilisé chez les enfants puisqu'il contient des probiotiques spécifiques pour les enfants.

## VI- Avertissement :

- Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.
- Ne doit pas être utilisé comme substitut d'une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
- Si vous prenez des antibiotiques, il est recommandé de séparer la prise de PRODEFEN d'au moins deux heures
- Conserver dans un endroit frais et sec, loin de la lumière directe du soleil. Ne nécessite pas de réfrigération.
- Maintenir le produit hors de la portée des enfants.

Boîte de 10 sachets

### FABRICANT

ADM Protexin Limited  
Lopen Head,  
Somerset, TA13 5JH,  
Royaume Uni.

### DISTRIBUTEUR

 **Versalya**  
La femme et son enfant

Zone industrielle du Sahel, lot 149 Had soualem.  
Province Berrechid, Maroc.