

MANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- O Réclamation : contact@mupras.com
- O Prise en charge : pec@mupras.com
- O Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique *A*

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : **1952** Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : **SAYOUTI DRIS**

Date de naissance : **1948**

Adresse : **RUE 29 n° 187 DULFA**

Tél. **0675777335** Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : **01/03/2003**

Nom et prénom du malade : **SAYOUTI DRIS** Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : **PROSTATE**

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) : *[Signature]*



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
01/03/2023	Visite	1	300Dhs	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE BOUKHARI Dr . BELKZIZ BAHIA Av.Oued Draa Rue 33 N°43 El Oulfa Tel :0522 90 52 23 Casa	1.3.23	816,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ORL.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	C
00000000	00000000
35533411	11433553

(Création, remont, adjonction)

The diagram illustrates a dental arch, likely a maxillary (upper) arch, viewed from a front-on perspective. The teeth are arranged in two rows: upper and lower. Each tooth is assigned a number from 1 to 8. The upper row starts with tooth 1 at the midline and continues clockwise through teeth 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. The lower row starts with tooth 8 at the midline and continues clockwise through teeth 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. The teeth are represented by small circles with a stylized 'V' or 'H' inside, indicating their orientation.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Khalid TOUABI

CHIRURGIEN UROLOGUE

Maladie du Rein et de l'Appareil Urinaire
Maladie Sexuellement Transmissibles
Stérilité Masculine - Impuissance Sexuelle
Lithoratriptie extra-corporelle
Membre de l'Association Française d'Urologie
Diplômé de l'université de Nice
Sophia-Antipolis (France)



الدكتور خالد توابي

اختصاصي في أمراض الكلى
والمسالك البولية - العقم الجنسي
الأمراض التناسلية - تفتيت الحصى
عضو الجمعية الفرنسية
لأمراض الكلى والمسالك البولية
خريج كلية الطب ببنيس (فرنسا)

Casablanca, Le:

01. 103.12023

2

S A you h.

Dinner

* CONFJLJ, cf. CONFJLJ CONFJLJ CONFJLJ

163,20 X 5 1 CP le m.
④ ④ D u i h e ep 1 mm
AS
1 CP 1
PHARMACIE BOUKHARI
Dr BELKAZ BAHIA
Oued Draa Rue 33 N° 43.
Tel : 0522 90 52 23 Casa

CP 1
PHARMACIE BOUKHARI
Dr BELKIZZ BAHIA
Av. Qued Dras Rue 33 N° 43.
El Ouita Tel : 0522 90 52 23 Casa

زنقة الأمير مولاي عبد الله (فوق إيق روشي) - الدار البيضاء

11, Rue Prince My Abdelleah (au dessus de Yves Rocher) - Casablanca

البريد الإلكتروني : urotk@yahoo.fr - الهاتف : 05 22.27.19.30 / 05 22.27.22.41

الفاكس : 05 22.27.59.43



DUSTA® 0,5 Mg
Dutasteride
30 capsules molles

4, 30 et 90 capsules molles
Dutasteride

PROMOPHARMA S.A.
0,5 mg

6 116001 260935



Veuillez lire
important
• Gardez
• Si voi
• Ce
le
•

ce médicament. Elle contient des informations

médecin ou votre pharmacien.
autres personnes. Il pourrait

le non mentionné

163 Dhs 20

LF278588
08/2024

PPV :
N° de LOT :
Date d'EXP.

Dust...
prostate),
production tru...
L'augmentation du v...
pour commencer à uriner...
puissant. Si elle n'est pas tra...
(réention aiguë d'urine). Ceci ne...

chirurgie est nécessaire pour enlever ou...
de Dihydrotestostérone, ce qui permet de réduire la taille de la prostate et d'améliorer les symptômes. Ceux-ci...
réduisent le risque de réention aiguë d'urine et le recours à la chirurgie.

Dusta peut également être utilisé avec un autre médicament appelé Tamsulosine (utilisé dans le traitement des...
symptômes de l'hypertrophie de la prostate).

- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DUSTA® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Sans objet

Contre-indications :

Ne prenez jamais Dusta :

- Si vous êtes allergique au Dutasteride, aux autres inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, au soja, à la cacahuète ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- Si vous avez une maladie hépatique sévère (maladie du foie).
- Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne, ne prenez pas ce médicament tant que vous n'avez pas vérifié auprès de votre médecin.

Ce médicament est indiqué uniquement chez l'homme adulte. Il ne doit pas être pris par les femmes, les enfants ou les adolescents.

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'arachide ou au soja, en raison de la présence d'huile de soja.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Dusta.

- Dans certaines études cliniques, les patients prenant du Dutasteride avec un autre médicament appelé alpha-bloquant (comme la Tamsulosine) ont été plus nombreux à avoir une insuffisance cardiaque que les patients prenant uniquement du Dutasteride ou un alpha-bloquant. L'insuffisance cardiaque signifie que votre cœur ne pompe pas le sang aussi bien qu'il le devrait.
- Assurez-vous que votre médecin soit informé de vos troubles hépatiques (maladie du foie). Si vous avez eu des maladies ayant affecté votre foie, vous devrez éventuellement vous soumettre à des examens



...aments appelée inhibiteurs de la

prostate (augmentation du volume de la...
x de la glande prostatique, provoqué par la...
stérone.

problèmes urinaires, tels que des difficultés...
jet d'urine peut également être ralenti et moins...
écoulement urinaire soit complètement bloqué...
édical immédiat. Dans certains cas, le recours à la...
de la glande prostatique. Dusta diminue la production...
réduisent le risque de réention aiguë d'urine et le recours à la chirurgie.

Dusta peut également être utilisé avec un autre médicament appelé Tamsulosine (utilisé dans le traitement des...
symptômes de l'hypertrophie de la prostate).

- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DUSTA® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Sans objet

Contre-indications :

Ne prenez jamais Dusta :

- Si vous êtes allergique au Dutasteride, aux autres inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, au soja, à la cacahuète ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

- Si vous avez une maladie hépatique sévère (maladie du foie).

- Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne, ne prenez pas ce médicament tant que vous n'avez pas vérifié auprès de votre médecin.

Ce médicament est indiqué uniquement chez l'homme adulte. Il ne doit pas être pris par les femmes, les enfants ou les adolescents.

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'arachide ou au soja, en raison de la présence d'huile de soja.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Dusta.

- Dans certaines études cliniques, les patients prenant du Dutasteride avec un autre médicament appelé alpha-bloquant (comme la Tamsulosine) ont été plus nombreux à avoir une insuffisance cardiaque que les patients prenant uniquement du Dutasteride ou un alpha-bloquant. L'insuffisance cardiaque signifie que votre cœur ne pompe pas le sang aussi bien qu'il le devrait.
- Assurez-vous que votre médecin soit informé de vos troubles hépatiques (maladie du foie). Si vous avez eu des maladies ayant affecté votre foie, vous devrez éventuellement vous soumettre à des examens



DUSTA® 0,5 Mg
Dutasteride
30 capsules molles

4, 30 et 90 capsules molles
Dutasteride

PROMOPHARMA S.A.
0,5 mg

6 116001 260935



Veuillez lire
important
• Gardez
• Si voi
• Ce
le
•

ce médicament. Elle contient des informations

médecin ou votre pharmacien.
autres personnes. Il pourrait

le non mentionné

163 Dhs 20

LF278588
08/2024

PPV :
N° de LOT :
Date d'EXP.

Dust...
prostate),
production tru...
L'augmentation du v...
pour commencer à uriner...
puissant. Si elle n'est pas tra...
(réention aiguë d'urine). Ceci ne...

chirurgie est nécessaire pour enlever ou...
de Dihydrotestostérone, ce qui permet de réduire la taille de la prostate et d'améliorer les symptômes. Ceux-ci...
réduisent le risque de réention aiguë d'urine et le recours à la chirurgie.

Dusta peut également être utilisé avec un autre médicament appelé Tamsulosine (utilisé dans le traitement des...
symptômes de l'hypertrophie de la prostate).

- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DUSTA® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Sans objet

Contre-indications :

Ne prenez jamais Dusta :

- Si vous êtes allergique au Dutasteride, aux autres inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, au soja, à la cacahuète ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- Si vous avez une maladie hépatique sévère (maladie du foie).
- Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne, ne prenez pas ce médicament tant que vous n'avez pas vérifié auprès de votre médecin.

Ce médicament est indiqué uniquement chez l'homme adulte. Il ne doit pas être pris par les femmes, les enfants ou les adolescents.

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'arachide ou au soja, en raison de la présence d'huile de soja.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Dusta.

- Dans certaines études cliniques, les patients prenant du Dutasteride avec un autre médicament appelé alpha-bloquant (comme la Tamsulosine) ont été plus nombreux à avoir une insuffisance cardiaque que les patients prenant uniquement du Dutasteride ou un alpha-bloquant. L'insuffisance cardiaque signifie que votre cœur ne pompe pas le sang aussi bien qu'il le devrait.
- Assurez-vous que votre médecin soit informé de vos troubles hépatiques (maladie du foie). Si vous avez eu des maladies ayant affecté votre foie, vous devrez éventuellement vous soumettre à des examens



éments appelée inhibiteurs de la

prostate (augmentation du volume de la...
x de la glande prostatique, provoqué par la...
stérone.

problèmes urinaires, tels que des difficultés...
jet d'urine peut également être ralenti et moins...
écoulement urinaire soit complètement bloqué...
édical immédiat. Dans certains cas, le recours à la...
de la glande prostatique. Dusta diminue la production...
réduisent le risque de réention aiguë d'urine et le recours à la chirurgie.

Dusta peut également être utilisé avec un autre médicament appelé Tamsulosine (utilisé dans le traitement des...
symptômes de l'hypertrophie de la prostate).

- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DUSTA® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Sans objet

Contre-indications :

Ne prenez jamais Dusta :

- Si vous êtes allergique au Dutasteride, aux autres inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, au soja, à la cacahuète ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- Si vous avez une maladie hépatique sévère (maladie du foie).
- Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne, ne prenez pas ce médicament tant que vous n'avez pas vérifié auprès de votre médecin.

Ce médicament est indiqué uniquement chez l'homme adulte. Il ne doit pas être pris par les femmes, les enfants ou les adolescents.

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'arachide ou au soja, en raison de la présence d'huile de soja.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Dusta.

- Dans certaines études cliniques, les patients prenant du Dutasteride avec un autre médicament appelé alpha-bloquant (comme la Tamsulosine) ont été plus nombreux à avoir une insuffisance cardiaque que les patients prenant uniquement du Dutasteride ou un alpha-bloquant. L'insuffisance cardiaque signifie que votre cœur ne pompe pas le sang aussi bien qu'il le devrait.
- Assurez-vous que votre médecin soit informé de vos troubles hépatiques (maladie du foie). Si vous avez eu des maladies ayant affecté votre foie, vous devrez éventuellement vous soumettre à des examens



DUSTA® 0.5 Mg

DUSTA® 0.5 Mg
30 et 90 capsules molles
Dutasteride

DOSTA 0.5 Mg

Finasteride

Veuillez lire

- important**

 - Gardez
 - Si voi
 - Ce
 - le
 -

A standard linear barcode representing the product code 6118001260935.



-e médicament. Elle contient des informations

→édecin ou votre pharmacien

tres personnes. il pourrait

Le non mentionné

163 Dhs

LF278588
08/2024

lments appelée inhibiteurs de la

Dus...
prostate...
production tru...
L'augmentation du v...
pour commencer à uriner
puissant. Si elle n'est pas tran...

(rétention aiguë d'urine). Ceci nécessite une chirurgie est nécessaire pour enlever ou de Dihydrotestostérone, ce qui permet de réduire le risque de rétention aiguë d'urine.

Dusta peut également être utilisé avec un autre médicament appelé Tamsulosine (utilisé dans le traitement des symptômes de l'hypertrophie de la prostate).

- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DUSTA® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Sans objet

Contre-indications :

Ne prenez jamais Dusta :

- Si vous êtes allergique au Dutastéride, aux autres inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, au soja, à la cacahuète ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
 - Si vous avez une maladie hépatique sévère (maladie du foie).
 - Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne, ne prenez pas ce médicament tant que vous n'avez pas vérifié auprès de votre médecin.

Ce médicament est indiqué uniquement chez l'homme adulte. Il ne doit pas être pris par les femmes, les enfants ou les adolescents.

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'arachide ou au soja, en raison de la présence d'huile de soja.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Dista.

- Dans certaines études cliniques, les patients prenant du Dutastéride avec un autre médicament appelé alpha-bloquant (comme la Tamsulosine) ont été plus nombreux à avoir une insuffisance cardiaque que les patients prenant uniquement du Dutastéride ou un alpha-bloquant. L'insuffisance cardiaque signifie que votre cœur ne pompe pas le sang aussi bien qu'il le devrait.
 - Assurez-vous que votre médecin soit informé de vos troubles hépatiques (maladie du foie). Si vous avez eu des maladies ayant affecté votre foie, vous devrez éventuellement vous soumettre à des examens supplémentaires.



DUSTA® 0,5 Mg
Dutasteride
30 capsules molles

4, 30 et 90 capsules molles

Dutasteride

PROMOPHARMA S.A.
0,5 mg



6 116001 260935

Veuillez lire
important
• Gardez
• Si voi
• Ce
le
•

ce médicament. Elle contient des informations

meilleur pour votre

docteur ou votre pharmacien.

autres personnes. Il pourrait

le non mentionné

163 Dhs 20

LF278588
08/2024

éments appelée inhibiteurs de la

Dust...
prostate),
production tru...
L'augmentation du v...
pour commencer à uriner
puissant. Si elle n'est pas traitée
(réention aiguë d'urine). Ceci nécessite une

PPV :
N° de LOT :
Date d'EXP :

prostate (augmentation du volume de la glande prostatique, provoqué par la production d'Histostérone). Les symptômes urinaires, tels que des difficultés de miction, un jet d'urine peut également être ralenti et moins puissant. Si elle n'est pas traitée, le débit d'écoulement urinaire soit complètement bloqué par l'histostérone. Dans certains cas, le recours à la chirurgie est nécessaire pour enlever ou réduire la taille de la prostate et d'améliorer les symptômes. Cela réduit le risque de rétention aiguë d'urine et le recours à la chirurgie.

Dusta peut également être utilisé avec un autre médicament appelé Tamsulosine (utilisé dans le traitement des symptômes de l'hypertrophie de la prostate).

- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DUSTA® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Sans objet

Contre-indications :

Ne prenez jamais Dusta :

- Si vous êtes allergique au Dutasteride, aux autres inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, au soja, à la cacahuète ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- Si vous avez une maladie hépatique sévère (maladie du foie).
- Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne, ne prenez pas ce médicament tant que vous n'avez pas vérifié auprès de votre médecin.

Ce médicament est indiqué uniquement chez l'homme adulte. Il ne doit pas être pris par les femmes, les enfants ou les adolescents.

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'arachide ou au soja, en raison de la présence d'huile de soja.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Dusta.

- Dans certaines études cliniques, les patients prenant du Dutasteride avec un autre médicament appelé alpha-bloquant (comme la Tamsulosine) ont été plus nombreux à avoir une insuffisance cardiaque que les patients prenant uniquement du Dutasteride ou un alpha-bloquant. L'insuffisance cardiaque signifie que votre cœur ne pompe pas le sang aussi bien qu'il le devrait.
- Assurez-vous que votre médecin soit informé de vos troubles hépatiques (maladie du foie). Si vous avez eu des maladies ayant affecté votre foie, vous devrez éventuellement vous soumettre à des examens



DUSTA® 0,5 Mg
Dutasteride
30 capsules molles

4, 30 et 90 capsules molles
Dutasteride

PROMOPHARMA S.A.
0,5 mg

6 116001 260935



Veuillez lire
important
• Gardez
• Si voi
• Ce
le
•

ce médicament. Elle contient des informations

médecin ou votre pharmacien.
autres personnes. Il pourrait

le non mentionné

163 Dhs 20

LF278588
08/2024

PPV :
N° de LOT :
Date d'EXP.

Dust...
prostate),
production tru...
L'augmentation du v...
pour commencer à uriner...
puissant. Si elle n'est pas tra...
(réention aiguë d'urine). Ceci ne...

chirurgie est nécessaire pour enlever ou...
de Dihydrotestostérone, ce qui permet de réduire la taille de la prostate et d'améliorer les symptômes. Ceux-ci...
réduisent le risque de réention aiguë d'urine et le recours à la chirurgie.

Dusta peut également être utilisé avec un autre médicament appelé Tamsulosine (utilisé dans le traitement des...
symptômes de l'hypertrophie de la prostate).

- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DUSTA® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Sans objet

Contre-indications :

Ne prenez jamais Dusta :

- Si vous êtes allergique au Dutasteride, aux autres inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, au soja, à la cacahuète ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- Si vous avez une maladie hépatique sévère (maladie du foie).
- Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne, ne prenez pas ce médicament tant que vous n'avez pas vérifié auprès de votre médecin.

Ce médicament est indiqué uniquement chez l'homme adulte. Il ne doit pas être pris par les femmes, les enfants ou les adolescents.

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'arachide ou au soja, en raison de la présence d'huile de soja.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Dusta.

- Dans certaines études cliniques, les patients prenant du Dutasteride avec un autre médicament appelé alpha-bloquant (comme la Tamsulosine) ont été plus nombreux à avoir une insuffisance cardiaque que les patients prenant uniquement du Dutasteride ou un alpha-bloquant. L'insuffisance cardiaque signifie que votre cœur ne pompe pas le sang aussi bien qu'il le devrait.
- Assurez-vous que votre médecin soit informé de vos troubles hépatiques (maladie du foie). Si vous avez eu des maladies ayant affecté votre foie, vous devrez éventuellement vous soumettre à des examens



éments appelée inhibiteurs de la

prostate (augmentation du volume de la...
x de la glande prostatique, provoqué par la...
stérone.

problèmes urinaires, tels que des difficultés...
jet d'urine peut également être ralenti et moins...
écoulement urinaire soit complètement bloqué...
édical immédiat. Dans certains cas, le recours à la...
de la glande prostatique. Dusta diminue la production...
réduisent le risque de réention aiguë d'urine et le recours à la chirurgie.

Dusta peut également être utilisé avec un autre médicament appelé Tamsulosine (utilisé dans le traitement des...
symptômes de l'hypertrophie de la prostate).

- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DUSTA® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Sans objet

Contre-indications :

Ne prenez jamais Dusta :

- Si vous êtes allergique au Dutasteride, aux autres inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, au soja, à la cacahuète ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- Si vous avez une maladie hépatique sévère (maladie du foie).
- Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne, ne prenez pas ce médicament tant que vous n'avez pas vérifié auprès de votre médecin.

Ce médicament est indiqué uniquement chez l'homme adulte. Il ne doit pas être pris par les femmes, les enfants ou les adolescents.

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'arachide ou au soja, en raison de la présence d'huile de soja.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Dusta.

- Dans certaines études cliniques, les patients prenant du Dutasteride avec un autre médicament appelé alpha-bloquant (comme la Tamsulosine) ont été plus nombreux à avoir une insuffisance cardiaque que les patients prenant uniquement du Dutasteride ou un alpha-bloquant. L'insuffisance cardiaque signifie que votre cœur ne pompe pas le sang aussi bien qu'il le devrait.
- Assurez-vous que votre médecin soit informé de vos troubles hépatiques (maladie du foie). Si vous avez eu des maladies ayant affecté votre foie, vous devrez éventuellement vous soumettre à des examens