

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|--|-----------------------|
| <input type="radio"/> Réclamation | : contact@mupras.com |
| <input type="radio"/> Prise en charge | : pec@mupras.com |
| <input type="radio"/> Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Matricule :	8055	Société :
<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :
Nom & Prénom :		Reali Chahed Abdellah
Date de naissance :		11/11/45
Adresse :		
Tél. :		06 61 38 30 25
		Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Comp U

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : BEN Souda Amira Age:

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 13/03/2023

Signature de l'adhérent(e) : CUSA

Le : 13/03/2023

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



AtlantaSanad
ASSURANCE

N° règlement : 2023038557

Contrat n° : 004.2021.00000076-10

Adhésion n° : 00000565

Malade : Lui même

Numéro RIB :

DECOMpte DES PRESTATIONS MALADIE

Ste contractante : BRICOMA AGADIR "RETRAITE"

Adhérent(e) : BENSOUDA AMINA

Soin du : 20/02/2023

Déclaré le : 02/03/2023

Sinistre n° : 040.2023.00085243

Date décision : 02/03/2023

Reçu le : 27/02/2023

Nature Prestation	Frais Engagés (Dhs)	Remboursement			
		Mnt.Retenu (Dhs)	Base Remb.(Dhs)	Tx(%)/Val.	Mnt.Remboursé (Dhs)
CONSULTATION DE CARDIOLOGUE + ECG	300.00	0.00	300.00	85.00	255.00
(*) Pharmacie	1 427.70	109.00	1 318.70	85.00	1 120.89
Totaux	1 727.70	109.00	1 618.70		1 375.89

Dossier n° :

Règlement compagnie (Dhs)

1 375.89

Observation(s) :

(*) ANTIGAS.....: NON REMBOUSABLE

Signature Adhérent(e)



AtlantaSanad
ASSURANCE

AS0000293706/20

INVENTION GROUPE

DECLARATION DE MALADIE

(à utiliser par maladie et par personne)

A remplir par la contractante

Numéro d'adhésion 585

AtlantaSanad

Date de

Dépôt du dossier

Numéro de bordereau

Matricule de l'assuré

N° de police / N° de filiale 04.2021.48.

Numéro de Sinistre

si ouverture par système)

Cachet Contractante

A remplir par l'assuré

Nom et prénom de l'assuré (en lettres capitales)

BENSOUDA AMINA

N° CIN

Nom et prénom du malade

BENSOUDA AMINA

Lien de parenté

m m

Date des soins

Signature de l'assuré

Montant des frais exposés

1727,70

Cadre réservé à Atlantasanal

Cachet de la Cellule Accueil

A Casablanca, le :

Volet détachable à présenter en cas de réclamation

DECLARATION

n de l'assuré : Matricule : CIN :

de police / N° de filiale : Numéro d'adhésion :

is exposés : dh Date de dépôt : / /

de sinistre : Numéro de bordereau : Date des soins :

ouverture par système)



AS0000293706/20

A. REMPLIR PAR LE MEDECIN

NOM et Prénom du malade : BENGUEUDA AMINA Age : Ans :

Nature de la maladie : ~~FIM + diarrhoe~~

En cas d'Accident (Causes et Circonstances).....

DETAIL DES SOINS



Casablanca, le :20/02/2023.....

Nom et Prénom :

BENSOUDA Amina

10.30

16 TAREG 160

1 comprimé le matin, pendant 6 mois

1100 DSTRESS

1 comprimé, matin et soir

1100 SORBHÉPATIC

1 comprimé, matin et soir

19100 ANTIGAS

1 sachet, matin et soir

11800 VITANEVRIL FORT

1 comprimé, 3 fois par jour


2.10 INEXIUM 20

1 comprimé le matin le matin à jeun

SYNTHMEDIC
22 rue zoubair bneu al souam roches
noires casablanca
INEXIUM
20 mg
Boîte 14
640150MP/21NRO PP.V:82,10 DH
6 118001 020591

زنقة 2، رقم 61 - الطاقي الأول - مدار الشهدية - الأنفأة - الدار البيضاء - الهاتف : 0604.72.39.14 - 0522.91.07.62 - البريد الإلكتروني : drmehdibenjelloun@gmail.com

2, N° 61 - 1er Etage - Rp chhdia - EL Oulfa - Casablanca - Tél : 0522.91.07.62 - 0604.72.39.14 E-mail : drmehdibenjelloun@gmail.com



D-Stress®

Complément alimentaire destiné aux adultes et adolescents

فيتافيريل قوي 100 ملخ بنفوتيامين

1. التشكيل والتقديم:
علبة تحتوي على 30 قرصاً ملمسياً.

الرجاء قراءة هذه المنشورة بدقة قبل البدء بالاستعمال هذا الدواء
إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية أو أي شكوك، استشر الطبيب أو الصيدلي المقيم في المعلومات
لقد وصف هذا الدواء لك أنت شخصياً لا يجرد بك إعطائه للأخرين فقد يؤديهم حتى لو كانت عوارضهم مثل عوارضك

2. التركيب النوعي والكمي:

بنفوتيامين 100 ملخ
السواق ما يكتفى لقرص واحد
قائمة السواق الذي من الواجب معرفته لاستعمال بدون خطر عند بعض المرضى اللاكتوز والسكروز

3. تصنيف الصيدلي والعلاجي:

ينتسب بنفوتيامين إلى مجموعة الأدوية ذات التأثير على

الجهاز الهضمي والمثبّط الغذائي.

4. الوصف:

- علاج البري بري،
- الرقاية من نقص الفيتامين B1 الناتج عن انخفاض في

الممية الغذائية الغنية بالبروتينات، التغذية بالحقن، وبالاشتراك مع غيرها من الفيتامينات.

- ينصح به الأشخاص الذين يشكون من التهاب الأعصاب

و يتغوطون للمشروبات الكحولية.

- ينصح به في حالة التهاب الأعصاب.

5. المقدار/طريقة الاستعمال:

2 إلى 4 أقراص خلال 24 ساعة.

في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

Les nutriments apportés par D-stress permettent d'adopter rapidement l'organisme à une situation de stress et d'en diminuer les conséquences comme par exemple la fatigue.

D-Stress® Contient du magnésium, de la taurine, de l'arginine et des vitaminesB.

Le magnésium et les vitamines B1, B2, B3, B6, B8 participent au fonctionnement normal du système nerveux.

Le magnésium et les vitamines B2, B3, B5, B6, contribuent au métabolisme énergétique et réduisent la fatigue.

D-stress est généralement utilisé pour :
 - Fatigue intense (psychique et physique)
 - Stress aigu ou chronique.
 - Hyper-émotivité, anxiété.
 - Spasmophilie.
 - Surmenage.
 - Aide au sevrage tabagique.
 - Situations de régime.

La taurine améliore la fixation du magnésium et le préserve pendant les phases de stress, elle possède également une activité antioxydante.

L'arginine est un acide aminé régulateur du cortisol, médiateur du stress. Il permet également de diminuer l'absorption des graisses.

Conseils d'utilisation :
Pour adultes et adolescents :

2 comprimés par jour à répartir aux repas et à moduler selon vos besoins. Les doses peuvent être augmentées sur avis médical, pour répondre à une situation particulière.

Durée recommandée :

En cure régulière ou de manière ponctuelle pour répondre à une situation de stress ou de fatigue.

Présentation :
Boîte de 20 comprimés
Boîte de 40 comprimés

D-stress est généralement utilisé pour :

- Fatigue intense (psychique et physique)
 - Stress aigu ou chronique.
 - Hyper-émotivité, anxiété.
 - Spasmophilie.
 - Surmenage.
 - Aide au sevrage tabagique.
 - Situations de régime.

Laboratoires SYNERGIA
43 BEAUNE sur ARZON – France

Distribué au Maroc par :
HYPHADIE
9, Rue Rahal Meskini – V.N- Fès
www.hyphadiet.com

6. مواعيذ الاستعمال:
لا يجب استعمال هذا الدواء في الحالات التالية:
- الأطفال أقل من 8 سنوات.
-أشخاص ذوي الحساسية لبنفوتيامين.

على العموم لا يجب استعمال هذا الدواء حال الرضاعة
باستثناء إذا لوأى طبيبك غير ذلك في حالة الشك من
الضروري استشارة طبيبك أو صيدليكم

عليه تحظى على 30 قرصاً ملمسياً.
الرجاء قراءة هذه المنشورة بدقة قبل البدء بالاستعمال هذا الدواء

- إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية أو أي شكوك، استشر الطبيب أو الصيدلي المقيم في المعلومات
لقد وصف هذا الدواء لك أنت شخصياً لا يجرد بك إعطائه للأخرين فقد يؤديهم حتى لو كانت عوارضهم مثل عوارضك

7. الآثار الجانبية:
أنت غير مرغوب فيه
أثر انتشار طبيبك أو صيدليكم والإشارة إلى أي
هذه النشرة.

8. احتياطات خاصة:
يسبب تواجد لكتوز والسكروز لا ينصح بأخذ هذا الدواء في
حالة حساسية اللاكتوز وتواجد اللاكتوز بكثرة في الدم
نتائج عن مرض حلقي أو اعراض عدم امتصاص اللاكتوز
واللاكتوز أو نفس في لكتاز (أمراض آيضية نادرة).
قامنة السواع التي من الواجب معرفتها لاستعمال بدون خطر
اللاكتوز والسكروز.

9. احتياطات الاستعمال:
في حالة الشلل، لا تتردّد في استشارة طبيبك أو صيدليكم
لعرض تفاعلي تفاعلات بين الأدوية يتعين إبطال طبيبك أو
صيدليكم على أي علاج آخر تأخذونه

10. العمل-الرضاعة:
ينصح بعدم تناول فيتافيريل® قوعي عند المرأة المرضعة و
الحامل، في حالة اكتشاف الحمل أثناء العلاج بفيتافيريل®
فهي أط lucrها طبيبك على العموم يتعين خالص الحمل أو
الرضاعة استشارة طبيبك أو صيدليكم قبل استعمال أي دواء.

11. الساقون ومستعملو الألات:
يتعين بنفوتيامين إلى مجموعة الأدوية ذات التأثير على
الجهاز الهضمي والمتثيل الغذائي.

12. ما يجب القيام به في حالة الإفراط في الجرعة:
13. ما يجب القيام به في حالة نسيان أو الإفراط في الجرعة:
14. الحفظ:
لا تتجاوزوا التاريخ المبين على الغلاف الخارجي
ليترك في متداول الأطفال
تاريخ المراجعة: مارس 2015

15. طرق الاستعمال:
عن طريق الفم
مدة العلاج:
تقديراً بوصفة طبيبك

16. المقدار:
2 إلى 4 أقراص خلال 24 ساعة.

في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

17. التخزين:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

18. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

19. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

20. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

21. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

22. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

23. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

24. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

25. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

26. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

27. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

28. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

29. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

30. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

31. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

32. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

33. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

34. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

35. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

36. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

37. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

38. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

39. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

40. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

41. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

42. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

43. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

44. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

45. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

46. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

47. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

48. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

49. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

50. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

51. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

52. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

53. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

54. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

55. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

56. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

57. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

58. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

59. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

60. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

61. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

62. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

63. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

عن طريق الفم
مدة العلاج:

تقديراً بوصفة طبيبك

64. تحذيرات:
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريق الاستعمال:

Notice: information du patient

INexium 20 mg, comprimés gastro-résistants

INexium 40 mg, comprimés gastro-résistants

ésoméprazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

- Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium
- Comment prendre INexium
- Quels sont les effets indésirables éventuels
- Comment conserver INexium
- Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé

INexium contient un médicament appelé ésoméprazole. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelé "inhibiteurs de la pompe à protons". Ceux-ci agissent en diminuant la quantité d'acide produite par l'estomac.

INexium est utilisé dans le traitement des affections suivantes :

Adultes

- «La maladie du reflux gastro-oesophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.
- Ulcères gastriques dus à des médicaments appelés AINS (médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens). INexium est également indiqué dans la prévention des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS.
- Acidité gastrique accrue due à une tumeur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger- Ellison).
- Poursuite du traitement après la prévention d'une récidive hémorragique d'ulcères avec INexium par voie intraveineuse.

Adolescents âgés de 12 ans et plus

- «La maladie du reflux gastro-œsophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.

Adolescents âgés de 12 ans et plus

«La maladie du reflux gastro-œsophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.

Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.

Traitement des ulcères dus à des infections par *Helicobacter pylori* et prévention de leur récidive :

- La dose recommandée est d'un comprimé gastro-résistant de INexium 20 mg deux fois par jour pendant une semaine.
- Votre médecin vous prescrira également des antibiotiques, par exemple amoxycilline et clarithromycine.

Prise du médicament

- Vous pouvez prendre vos comprimés à n'importe quel moment de la journée.
- Vous pouvez prendre vos comprimés avec de la nourriture ou quand votre estomac est vide.
- Avez vos comprimés en entier avec un verre d'eau. Les comprimés ne peuvent être ni mordus ni écrasés, parce que les comprimés contiennent des granules enrobés qui empêchent que ce médicament soit altéré par l'acide dans votre estomac. Il est important de ne pas endommager les granules.

Que faire si vous avez des problèmes pour avaler vos comprimés

- Si vous avez des problèmes pour avaler vos comprimés :
 - Mettez-les dans un verre d'eau plate (non gazeuse). N'utilisez pas d'autres liquides.
 - Remuez jusqu'à ce que le comprimé soit décomposé (le liquide n'est pas limpide). Vous pouvez boire le liquide immédiatement ou dans les 30 minutes. Remuez toujours le mélange avant de le boire.
 - Pour être sûr que vous avez pris toute la dose, rincez bien le verre avec un demi-verre d'eau et buvez ce liquide. Les particules solides contiennent le médicament. Elles ne doivent être ni mordues, ni écrasées.
 - En cas d'impossibilité à avaler, le comprimé pourra être dispersé dans un peu d'eau et introduit dans une seringue. Il pourra alors être administré à l'aide d'un tube allant directement dans votre estomac (sonde gastrique).

Utilisation chez les enfants de moins de 12 ans

INexium, comprimés gastro-résistants, n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 12 ans. L'information sur le dosage pour des enfants âgés de 1 à 11 ans est fournie dans l'information du produit INexium sachet (Consultez votre médecin ou pharmacien si vous désirez plus d'informations).

Personnes âgées

Aucun ajustement de dose n'est nécessaire chez les personnes âgées.

Si vous avez pris plus de INexium que vous n'auriez dû

Si vous prenez plus de INexium que la dose prescrite par votre médecin, parlez-en immédiatement à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre INexium

- Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez-la dès que vous y pensez. Cependant, si c'est bientôt le moment de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose oubliée.
- Ne prenez pas de dose double (deux doses en même temps) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils



6140

Oral Granules

20 single-use sachets

Relieves the gastrointestinal system from
✓ Pressure ✓ Bloating ✓ Discomfort**INDICATIONS**

Anti Gas® Adults is a medical device that relieves in a natural way the abdominal pain caused by flatulence. The movement of trapped air along the gastrointestinal track is a common cause of abdominal pain. Gases like this are presented either during simple processes such as air swallowing and natural treatment of certain food in the stomach and small intestine (eg. food with fiber) or by consuming carbonated, digestive drinks such as refreshments. Thus, a foam is created and accumulated (a condition called flatulence) in the narrow intestinal tract and its movement causes bloating, pain and discomfort.

Anti Gas® Adults contains simethicone, an antifoaming ingredient that disrupts the surface of the foam, releasing the trapped air and naturally relieving the user from bloating, abdominal pain and discomfort due to flatulence. It treats the feeling of contentment as well as the premature sense of satiety. It can be used supplementary for the preparation of the intestinal tract for diagnostic tests (eg. endoscopy, X-rays and ultrasound).

Each sachet contains: 125 mg Simethicone

Excipients: Isomalt, Talc, Aroma, Maltodextrin

INSTRUCTIONS**Consume without water.**

- Place the content of 1 sachet/stick in the back of the tongue and allow it to dissolve.
- The use by children should be supervised by an adult.
- Use after meals and before bedtime.

DOSAGE

Children (over 6 years old) & Adults: 1-4 sachets/sticks per day.
Infants and children (till 6 years old): **Anti Gas® Adults** should not be used on children under 6 years old. For treating abdominal discomfort at these ages try **Anti Gas® Oral Solution Drops**, a solution in drops easily mixable with liquid preparations, suitable for infants.

PRECAUTIONS

- Store in a cool (<25°C) and dry place, keep out of children's reach.
- Do not use on children under 6 years old.
- Do not use in case of sensitivity to any of the ingredients.
- Absorption of levothyroxine may be decreased if **Anti Gas®** is given concurrently to individual treated for thyroid disorders.
- Do not exceed the recommended dosage.
- The product is contained in single-use sachets/sticks. Any granule quantity remaining after opening must be disposed.

PACKAGING

Anti Gas® Adults 20 sachets of 1.25 g



IOULIA AND IRENE SETI Pharmaceutical Laboratories S.A., «INTERMED S.A.»
27 Kalyftaki str, 145 64 Kifissia - GREECE Tel.: +30 210-62 53.905, Fax: +30 210-62 53.906,
e-mail: intermed@intermed.com.gr, www.intermed.com.gr





Dénomination du médicament :

Tareg® 40 mg

Tareg® 80 mg

Tareg® 160 mg

DCI : Valsartan

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

Qu'est-ce que tareg et dans quel cas est-il utilisé ?

Quelles sont les informations à connaître avant <de prendre> <d'utiliser> tareg ?

Comment <prendre> <utiliser> tareg ?

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comment conserver tareg ?

Qu'est-ce que Tareg et dans quel cas est-il utilisé ?

Tareg contient une substance active qui influence le système régulant la pression artérielle de l'organisme. Il produit une dilatation des vaisseaux sanguins et fait baisser ainsi la tension artérielle. Votre médecin peut contrôler l'effet du médicament en prenant votre tension.

Tareg est utilisé dans le traitement de l'hypertension légère modérée chez les adultes ainsi que chez les enfants et les adolescents de 6 à 18 ans.

Votre médecin peut aussi vous prescrire Tareg en cas

de combinaison avec d'autres médicaments lorsque vous ne tolérez pas certains médicaments à cause de leurs effets secondaires.

Votre médecin peut aussi prescrire Tareg pour traiter les patients après un infarctus du myocarde. Tareg ne doit être pris que sur prescription médicale.

2. Quelles sont les informations à connaître avant <de prendre> <d'utiliser> Tareg ?

Une hypertension artérielle non traitée peut entraîner des lésions au niveau des organes vitaux comme le cœur, les reins et le cerveau. Vous pouvez vous sentir en parfaite santé et ne ressentir aucune manifestation de maladie mais une hypertension non traitée peut entraîner des séquelles tardives telles qu'une attaque cérébrale, un infarctus du myocarde, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale ou la cécité. Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à la conduite et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines. Prévenez votre médecin avant de prendre Tareg si vous

- souffrez d'une maladie grave des reins ou du foie,
- souffrez de vomissements ou de diarrhée ou si vous prenez de fortes doses de diurétiques (qui servent à éliminer l'eau en excès dans votre organisme),
- Si vous présentez des réactions telles qu'un gonflement du visage, des bras et des jambes, des yeux, des lèvres ou de la langue (signes d'un angio-oedème) après la prise de Tareg. Dans ces cas, vous devez être surveillé et recevoir éventuellement un traitement approprié.

Il est important qu'un manque de sel et/ou qu'une hydratation insuffisante de votre organisme soient corrigés avant le début du traitement. Ceci peut se produire en cas de forts vomissements, de diarrhées ou si vous prenez des diurétiques. La prudence est recommandée si vous êtes traité par un inhibiteur de l'ECA ou l'aliskirène (médicaments contre l'hypertension artérielle).

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez un autre médicament en plus de Tareg car il faudra peut-être modifier les doses, prendre certaines précautions ou, dans certains cas, cesser de prendre l'un des médicaments. Ceci concerne les médicaments sur ordonnance ainsi que ceux en vente libre et tout particulièrement

- les médicaments utilisés pour le traitement de l'hypertension, en particulier les diurétiques, les inhibiteurs de l'ECA ou l'aliskirène,



Dénomination du médicament :

Tareg® 40 mg

Tareg® 80 mg

Tareg® 160 mg

DCI : Valsartan

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice ?

2. Qu'est-ce que tareg et dans quel cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant <de prendre> <d'utiliser> tareg ?

4. Comment <prendre> <utiliser> tareg ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver tareg ?

1. Qu'est-ce que Tareg et dans quel cas est-il utilisé ?

Tareg contient une substance active qui influence le système régulant la pression artérielle de l'organisme. Il produit une dilatation des vaisseaux sanguins et fait baisser ainsi la tension artérielle. Votre médecin peut contrôler l'effet du médicament en prenant votre tension.

Tareg est utilisé dans le traitement de l'hypertension légère à modérée chez les adultes ainsi que chez les enfants et les adolescents de 6 à 18 ans.

Votre médecin peut aussi vous prescrire Tareg en cas d'insuffisance cardiaque légère à modérée (faiblesse du

coeur) ou d'insuffisance rénale modérée à modérée. Votre médecin peut aussi prescrire Tareg pour traiter les patients après un infarctus du myocarde.

Tareg ne doit être pris que sur prescription médicale.

2. Quelles sont les informations à connaître avant <de prendre> <d'utiliser> Tareg ?

Une hypertension artérielle non traitée peut entraîner des lésions au niveau des organes vitaux comme le cœur, les reins et le cerveau. Vous pouvez vous sentir en parfaite santé et ne ressentir aucune manifestation de maladie mais une hypertension non traitée peut entraîner des séquelles tardives telles qu'une attaque cérébrale, un infarctus du myocarde, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale ou la cécité. Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à la conduite et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines. Prévenez votre médecin avant de prendre Tareg si vous

- souffrez d'une maladie grave des reins ou du foie,
- souffrez de vomissements ou de diarrhée ou si vous prenez de fortes doses de diurétiques (qui servent à éliminer l'eau en excès dans votre organisme).
- Si vous présentez des réactions telles qu'un gonflement du visage, des bras et des jambes, des yeux, des lèvres ou de la langue (signes d'un angio-oedème) après la prise de Tareg. Dans ces cas, vous devez être surveillé et recevoir éventuellement un traitement approprié.

Il est important qu'un manque de sel et/ou qu'une hydratation insuffisante de votre organisme soient corrigés avant le début du traitement. Ceci peut se produire en cas de forts vomissements, de diarrhées ou si vous prenez des diurétiques. La prudence est recommandée si vous êtes traité par un inhibiteur de l'ECA ou l'aliskirène (médicaments contre l'hypertension artérielle).

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez un autre médicament en plus de Tareg car il faudra peut-être modifier les doses, prendre certaines précautions ou, dans certains cas, cesser de prendre l'un des médicaments. Ceci concerne les médicaments sur ordonnance ainsi que ceux en vente libre et tout particulièrement

- les médicaments utilisés pour le traitement de l'hypertension, en particulier les diurétiques, les inhibiteurs de l'ECA ou l'aliskirène,
- les médicaments d'épargne potassique, les produits



Dénomination du médicament :

Tareg® 40 mg

Tareg® 80 mg

Tareg® 160 mg

DCI : Valsartan

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que tareg et dans quel cas est-il utilisé ?
3. Quelles sont les informations à connaître avant <de prendre> <d'utiliser> tareg ?
4. Comment <prendre> <utiliser> tareg ?
5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
6. Comment conserver tareg ?

1. Qu'est-ce que Tareg et dans quel cas est-il utilisé ?

Tareg contient une substance active qui influence le système régulant la pression artérielle de l'organisme. Il produit une dilatation des vaisseaux sanguins et fait baisser ainsi la pression artérielle. Votre médecin peut contrôler l'effet du médicament en prenant votre pression.

Tareg est utilisé dans le traitement de l'hypertension légère à modérée chez les adultes ainsi que chez les enfants et les adolescents de 6 à 18 ans.

Votre médecin peut aussi vous prescrire Tareg en cas d'insuffisance cardiaque légère à modérée (faiblesse du muscle cardiaque, rendement insuffisant du cœur) en

combinaison avec d'autres médicaments lorsqu'ils ne tolèrent pas certains médicaments à cause d'effets secondaires.

Votre médecin peut aussi prescrire Tareg pour les patients après un infarctus du myocarde. Tareg ne doit être pris que sur prescription médicale.

2. Quelles sont les informations à connaître avant <de prendre> <d'utiliser> Tareg?

Une hypertension artérielle non traitée peut entraîner des lésions au niveau des organes vitaux comme les reins et le cerveau. Vous pouvez vous sentir fatigué et ne ressentir aucune manifestation de maladie. Une hypertension non traitée peut entraîner des situations telles qu'une attaque cérébrale, un infarctus, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale. Ce médicament peut affecter les réactions, l'activité et l'aptitude à utiliser des outils ou à conduire. Prévenez votre médecin avant de prendre Tareg.

- souffrez d'une maladie grave des reins ou d'une insuffisance rénale;
- souffrez de vomissements ou de diarrhées de forte doses de diurétiques (qui servent à éliminer l'eau et les déchets dans l'organisme);
- Si vous présentez des réactions telles qu'un gonflement du visage, des bras et des jambes, des yeux, de la langue (signes d'un œdème) à Tareg. Dans ces cas, vous devez être surveillés et peut-être recevoir un traitement approprié.

Il est important qu'un manque de sel et/ou une insuffisance rénale de votre organisme soient corrigés au début du traitement. Ceci peut se produire en cas de vomissements, de diarrhées ou si vous prenez des diurétiques. La prudence est recommandée si vous êtes traité pour une maladie qui inhibe l'ECA ou l'aliskirène (médicament contre l'hypertension artérielle).

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez un autre médicament en plus de Tareg car il faut modifier les doses, prendre certaines précautions. Dans certains cas, cesser de prendre l'un des médicaments concernés. Les médicaments sur ordonnance doivent être pris avec précaution et tout particulièrement :

- les médicaments utilisés pour le traitement de l'hypertension, en particulier les diurétiques de l'ECA ou l'aliskirène;
- les médicaments d'épargne potassique, les médicaments destinés à compenser un manque de potassium.



Dénomination du médicament :

Tareg® 40 mg

Tareg® 80 mg

Tareg® 160 mg

DCI : Valsartan

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que tareg et dans quel cas est-il utilisé ?
3. Quelles sont les informations à connaître avant <de prendre> <d'utiliser> tareg ?
4. Comment <prendre> <utiliser> tareg ?
5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
6. Comment conserver tareg ?

1. Qu'est-ce que Tareg et dans quel cas est-il utilisé ?

Tareg contient une substance active qui influence le système régulant la pression artérielle de l'organisme. Il produit une dilatation des vaisseaux sanguins et fait baisser ainsi la pression artérielle. Votre médecin peut contrôler l'effet du médicament en prenant votre pression.

Tareg est utilisé dans le traitement de l'hypertension légère à modérée chez les adultes ainsi que chez les enfants et les adolescents de 6 à 18 ans.

Votre médecin peut aussi vous prescrire Tareg en cas d'insuffisance cardiaque légère à modérée (faiblesse du muscle cardiaque, rendement insuffisant du cœur) en