

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 0 Réclamation | contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | adhésion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS



Déclaration de Maladie

N° W21-777119

A 59881

Maladie Dentaire Optique Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 8689

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom : MOUZOUNE HICHAM

Date de naissance : 06.10.1966

Adresse : CITE KARIA BLOC 2 N° 54 CASA 04

SAIDI MOUZOUNE

Tel: 0661066263

Total des frais engagés : 4522,90 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. Roudad Ben
Pédiatre
Ed. Al Qods, Lot. Al Maïd
Imm. A 1er Etage, N° 3
Inara, Ain Chock - Tél: 022524472

Cachet du médecin :

Date de consultation : 09.12.22

Nom et prénom du malade : SAAD MOUZOUNE

Lien de parenté : Lui-même Parent

Nature de la maladie : Blombeekars

En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :


Signature de l'adhérent(e) :

Le : 29/12/2022

El

Autorisation CNDP N° : AA-215/2019

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	19/12/22	272.90

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES															
Le praticien est prié de préciser le dent traité, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins.															
Important : Il faut joindre les radiographies en cas de prothèses et de traitement par appareil, ainsi que le bilan de l.O.F.															
SOINS DENTAIRES 		Dents Traitées	Nature des Soins												
			Coefficient												
			INP : <input type="text"/>												
			COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>												
			MONTANT DES SOINS <input type="text"/>												
			DEBIT D'EXECUTION <input type="text"/>												
			HN D'EXECUTION <input type="text"/>												
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES 		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <table border="1"> <tr> <td>H</td> <td>55534412</td> <td>01432530</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>50000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>55534411</td> <td>01432531</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>55534410</td> <td>01432532</td> </tr> </table> <p>(Création, remont, adjonction) Prise en charge thérapeutique dans une prothèse.</p>		H	55534412	01432530	D	50000000	00000000	B	55534411	01432531	G	55534410	01432532
H	55534412	01432530													
D	50000000	00000000													
B	55534411	01432531													
G	55534410	01432532													
		COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>													
		MONTANT DES SOINS <input type="text"/>													
		DATE DU DEVIS <input type="text"/>													
		DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>													
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS															
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION															

Docteur Rochd Benmerzouk

Pédiatre

Néonatalogie - Puériculture
Pédiatrie générale - Asthme - Allergologie



الدكتور رشيد بن مرزوق

اختصاصي في طب الأطفال والرضع
والحساسية

Tél.: 05 22 52 44 68

Casablanca, le 19.12.22

- DN 3-1-16

- Pds: 22

- Temp.: 38°1

Prénom :

Saad

Nom :

Benmerzouk

118^o Diphthong 200 suff
buff 204/1. a 2558°r
of 399b exomuc 200 bled
1 adue 8 02f a or bars
7060x 2 Anfmen 8 02f
22 w a 03 / o
29,00 14 Verner 200 p 200
1 com a 03 / o
27290 a 05 for



Dr. Rochd BENMERZOUK
Pédiatre
Ed. Al Qods, App. N° 4
Bd. Al Qods, Lottissement Al Majd
Immeuble A, App. N° 4 - Hay Inara - Ain Chock - Casablanca

شارع القدس، حي الإنارة، الشقة 4، عمارة A، الطابق الأول، حي الإنارة، عين الشق - الدار البيضاء

Bd. Al Qods, Lottissement Al Majd, Immeuble A, App. N° 4 - Hay Inara - Ain chock - Casab.

DOLIPRANE®

100 mg suppositoire sécable (de 3 à 8 kg)

150 mg suppositoire (de 8 à 12 kg)

200 mg suppositoire (de 12 à 16 kg)

300 mg suppositoire (de 15 à 24 kg)

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Doliprane 100mg : paracétamol

Doliprane 150mg : paracétamol

Doliprane 200mg : paracétamol

Doliprane 300mg : paracétamol

Excipients : glycérides hémi-synthétiques solides

Pc

12/80

FORME PHARMACEUTIQUE

Doliprane 100 mg suppositoire sécable Boîte de 10 suppositoires

Doliprane 150 mg suppositoire Boîte de 10 suppositoires

Doliprane 200 mg suppositoire Boîte de 10 suppositoires

Doliprane 300 mg suppositoire Boîte de 10 suppositoires

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTALGIQUE – ANTIPYRETIQUE

(N : Système nerveux central)

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué en cas de douleurs et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures.

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Allergie connue au paracétamol
- Maladie grave du foie
- Inflammation récente anale ou rectale ou saignement récent du rectum
- En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

MISES EN GARDE SPECIALES

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre « posologie »)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Signaler la prise de Doliprane à votre médecin en cas de prescription de dosage de l'acide urique sanguin ou de la glycémie.

EXOMUC® 200 mg, granulés sans sucre pour solution buvable en sachet

Acétylcystéine

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement et votre maladie. Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre pharmacien. Gardez cette notice pour la relire.

1. IDENTIFICATION

Dénomination :

EXOMUC® 200
sachet

Composition :

Acétylcystéine(1)

Excipients : Arabinose (160), sorbitol.

Composition de l'excipient obtenu par dépolymérisation.

Forme pharmaceutique :

Ce médicament se présente sous forme de granulés pour solution buvable en sachet. Boîte de 30 sachets.

2. QU'EST-CE QUE EXOMUC® 200 mg, granulés pour solution buvable en sachet ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE?

Classe pharmaco thérapeutique :

MUCOLYTIQUE.

(R. Système Respiratoire).

Indications

Ce médicament est un fluidifiant des sécrétions bronchiques, il facilite ainsi leur évacuation par la toux.

Ce médicament est préconisé dans les états d'encombrement des bronches en particulier lors des épisodes aigus de bronchites.

3. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE QUE EXOMUC® 200 mg, granulés pour solution buvable en sachet ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

الأثر الجويقية قليلة الشوغ

يمكن أن تظهر لدى أقل من شخص واحد من أصل 100:

- ملطف جيدي، حكة،

- ملطف جيدي يار مع حكة (شرقي)

غير مقصورة

زيادة الرأس

ارتفاع ضغط الدم

الأثر الجويقية قليلة الشوغ التي يمكن أن تظهر عند إبراء تحفظ الدم:

- ارتفاع معدل بعض المواد (الألزيمات) التي يتضمنها الكبد.

الأثر الجويقية المفرطة

يمكن أن تظهر لدى أقل من شخص واحد من أصل 1000:

- ملطف جيدي، يمكن أن تكون هذه تجاهات تثبيت بقدر معنوية (نقط سوداء مركزية تحيط بها منطقة عدية الأشكال).

← إذا ظهرت على طفلك هذه الأعراض، فاتصل بالطبيب على وجه الاستعجل.

الأثر الجويقية قليلة الشوغ التي يمكن أن تظهر عند إبراء تحفظ الدم:

- انخفاض عدد خلايا الدم الشامي في تحفظ الدم (المصادر)،

انخفاض عدد الكريات البيضاء

أثر جويقية ذات تردّي غير معروفة

لا يمكن تعيين التردد من خلال البيانات المتوفرة:

- رغوة قفل تحسنة (أضرر أعلاه)

- التهاب الأمعاء الفطية (أضرر أعلى)

- التهاب القناة الهضمية كلي يحيط بالبطن (التهاب السجña العقيم).

ارتفاع ضغط الجلد الحادة

ملطف متعدد يصاحبه تجاهات وتوسُّط الجلد، إضافةً إلى الألف والعنين وفي المناطق اللسان

اللسان أكثر شدة تسبّب في اضطرابات المذاق أكثر من 30 دقيقة من الصلح الجدي: متلازمة من

ارتفاع ضغط جيدي أحمر متضمن تجاهات غفرة متوفّي على فتح (التهاب الجلد الفاغامي أو التهاب

جراحي شفهي أحمر تصاحب كل تعتّج الجلد وتجاهات (پثار نفسي).

← متلازمة الأعراض الشديدة المترافق مع ملطف جيدي ومحمّ وتصف في الحد المبكرية وأختبار

الماء اليسامي (الإعصار) (المصادر) والتي تتضمن حفاظاً على الماء من الأدوية.

← إذا ظهرت على طفلك أحد هذه الأعراض، فاتصل بالطبيب على الفور.

التهاب الكبد

الورقل، الذي يفتح عن ارتفاع معدل الليپيروبين في الدم (وهي مادة ينتجه الكبد)، وتؤدي إلى توسيع

الarteries (arteries) الدهنية.

← انتفاخات لدى الأشخاص الذين يتلقّون حفارات مرتفعة من أو صنفان أو يعلون من مشكل في

الarteries (arteries) الأصلية، وبطيء عموماً عند فرش الأسلان.

الأثر الجويقية التي يمكن أن تظهر عند إبراء تحفظ الدم أو البول:

- انخفاضاته في عدد الكريات البيضاء،

- انخفاض عدد الكريات العصارة (أضرر الماء الأحلاقي)،

- بولات في البول.

التصرّف بالآثار الجويقية

إن شعر طفلك بأثر غير مقصورة، المرجو ادخال الطبيب أو الصيدلي.

يُنصح بذلك على أيّ أثر غير مقصورة لم يزد تذكر بهذه النشرة.

يمكنك البحث عن الآثار الجويقية الأخرى المنسوبة إلى مرض التهاب المعدة والقولون:

GlaxoSmithKline Maroc 42-44

دار المصانع 20000 أو البريد الإلكتروني:

pharmacovigilance-na@gsk.com

5. كيف يمكن مكافحة أو تخفيف؟

يعطى بعدم استعمال هذه الدواء بعد تراجع انتهاء الصلاحية المدرج على العبوة يرجح تراجع انتهاء الصلاحية المدرجة.

شرط العقبة:

أ - لو صنفان 100 ميلigram لكل 12.50 ميلigram ملء ملحوظ ملطف قليل للشرب في قيبة

قبل التناول 62.5 ميلigram ملطف مخلوط العروق في حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية وبعدها عن الرطوبة.

ـ لو صنفان 500 ميلigram / 12.5 ميلigram ملطف ملطف ملطف المصنف 7 أيام كحد أقصى في طفولة الماء في الكيس ذات جزء

يعطى في حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية وبعدها عن الرطوبة.

ـ لا يعطي رمي الأدوية في مكان التخلص الصحي أو مع النفايات المنزلية، اطلب المشورة من الصيدلي.

ـ 6. معلومات اضافية

ـ ما يتعين عليه أو صنفان 100 ميلigram كل مل ملطف ملطف قليل للشر

ـ العود الشفهي هي:

ـ * موكتسيلين 100,00 ميلigram

ـ على شكل موكتسيلين ثلاثي البيرورجين

ـ * مخص كافالاتيك 12.50 ميلigram

ـ على شكل كافالاتيك البيرورجين

ـ لكل مل من المصنف المصنف

ـ المكونات الأخرى هي:

ـ كرسوسوفورون، كاربوليوز الصوديوم، صمغ الزنان، السيليكا العروية اللامانية، سترات المغليس

ـ (تحتوي بشكل خاص على ماتوكسيكترين)، هلام السيليك، الأسترات

AUGMENTIN 100mg/12.5mg par ml Nourrisson, poudre pour suspension buvable
AUGMENTIN 1/1 suspension buvable
AUGMENTIN buvable en sachet
Amoxicilline/Ac

Veuillez lire attentivement les informations

- Gardez ce flacon dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

- Ce médicament ne doit pas être donné à un enfant de moins de 6 mois.

- Si vous avez des questions, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Si vous avez des réactions indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

