

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être sûrement renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| ○ Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| ○ Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| ○ Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W21-777119

152882

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e)			
Matricule : <u>8680</u>	Société : <u>RAM</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	<u>MONZOUNE MICHAM</u>
Nom & Prénom : <u>MONZOUNE MICHAM</u>			
Date de naissance : <u>06.10.1966</u>			
Adresse : <u>CITE EL KAAJA Bloc 2 N° 54 CIASAOY</u>			
Télé : <u>0661066263</u>	Total des frais engagés <u>HS3410</u> Dhs		

Autorisation N°ALD : A-A-Z15/2019	Cadre réservé au Médecin
Cachet du médecin :	
Date de consultation : <u>23-12-22</u>	
Nom et prénom du malade : <u>Fayçal Ahmed</u> Age : <u>12</u>	
Lien de parenté :	<input type="checkbox"/> Lui-même <input checked="" type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie : <u>Alte</u> <u>Bronchite</u>	
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :	
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.	

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.  
Fait à : CASABLANCA Le : 23/12/2022  
Signature de l'adhérent(e) : M/

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
23/12/22	G2		210,00	INP : ERNEST JAY Signature

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	23/12/22	284,10

### ANALYSES - RADIGRAPHIES


Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



### O.D.F PROTHESES DENTAIRES



### DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
	00000000	00000000
D	00000000	00000000
	35533411	11433553
B		

(Création, remont, adjonction)  
Fonctionnel, Therapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

MONTANTS DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

# Docteur Rochd Benmerzouk

Pédiatre

Néonatalogie - Puériculture  
Pédiatrie générale - Asthme - Allergologie



الدكتور رشيد بن مرزوق

اختصاصي في طب الأطفال والرضع  
والحساسية

Tél.: 05 22 52 44 68

Casablanca, le 23.12.12

- DN 10-6-11  
- Pds: 81  
- Temp.: 38.3

Prénom :

Ahmed Nom : Assoume



les premiers cp 10/12/2012  
plus forte 10/12/2012  
flexion des jambes 10/12/2012  
plus forte 10/12/2012  
information patient  
Marche 10/12/2012



شارع القدس، جزءة المجد، عمارة A، الطابق الأول، الشقة 4، حي الإنارة، عين الشق - الدار البيضاء

Bd. Al Qods, Lotissement Al Majd, Immeuble A, App. N° 4 - Hay Inara - Ain chock - Casablanca

**Veuillez lire attentivement pour vous.**

- Gardez cette notice.
- Si vous avez d'autre Ce médicament vous même si les signes d Si vous ressentez un aussi à tout effet in

**Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que FLIXONASE 50 microgrammes/dose, suspendus dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser flacon pulvérisateur avec pompe doseuse ?
3. Comment utiliser FLIXONASE 50 microgrammes/dose, suspendus ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver FLIXONASE 50 microgrammes/dose, suspendus ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

**1. QU'EST-CE QUE FLIXONASE 50 microgrammes/dose, suspendus ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique : Glucocorticoïde par voie nasale. Ce médicament contient un corticoïde (*dérivé de cortisone*). C'est un traitement anti-inflammatoire qui s'administre par :

- chez l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans, pour traiter la rhinitis allergique et les symptômes liés à la présence de muqueuses) dans le nez.
- chez l'enfant de 4 à 12 ans, pour traiter uniquement la rhinitis allergique et les symptômes liés à la présence de muqueuses) dans le nez.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE FAIRE UNE THERAPIE AVEC FLIXONASE 50 microgrammes/dose, suspendus ?**

- N'utilisez jamais FLIXONASE 50 microgrammes/dose, suspendus si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des ingrédients dans la rubrique 6,
- si vous présentez des troubles de la coagulation sanguine,
  - si vous avez de l'herpès au niveau des muqueuses du nez,
  - si votre enfant est âgé de moins de 4 ans.

En cas de doute vous devez demander l'avis de votre médecin.

**Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser le flacon pulvérisateur avec pompe doseuse.

**Mises en garde spéciales**

- Si vous présentez une surinfection (mouchage puruleux) votre médecin.

- Si vous avez subi récemment une intervention chirurgicale n'est pas complète, n'utilisez pas ce produit.
- Prendre des corticoïdes par voie nasale (comme Flxonase) o ralentir la croissance chez l'enfant. Votre médecin m que celui-ci prend la dose efficace la plus faible.
- "traîner des troubles oculaires comme un glaucome"

GlaxoSmithKline Maroc  
Aïn El Aouda  
Région de Rabat  
PPV: 69,20 DH  
  
118001 141678

la r éd e it. N aux par tior

**الأثر الجلدية الشائعة جداً:**

- يمكن أن تظهر على أكثر من شخص واحد من أصل 10.
- الاستهت (عدم التهاب).

**الأثر الجلدية الشائعة:**

- كل أن تظهر لدى أقل من شخص واحد من أصل 10.

التشنج (عسر تنفس) على طفلك من المرض التي تسمى الميسيات، وظهور على سطح

العين، انسياحة عد تللوں جرحت مزمنة.

ـ إذا ظهرت على طفلك هذه الآثار الجلدية، فافعل على اعطاء أو غسلنن التام

**الثاني:**

ـ الأسهال (دى الأضطراب).

**الأثر الجلدية قليلة الشدة:**

- يمكن أن تظهر لدى أقل من شخص واحد من أصل 100.

ـ نفخ جنبي، حكة.

ـ نفخ جنبي يزور مع حكة (شرى).

ـ عسر التنفس.

ـ توارث.

ـ انسداد الرأس.

**الأثر الجلدية قليلة الشدة التي يمكن أن تظهر عند إجراء تحاليل الدم:**

- ارتفاع معدل بعض المواد (الأنزيمات) التي يتوجهها الكبد.

**الأثر الجلدية المفرغ:**

- يمكن أن تظهر لدى أقل من شخص واحد من أصل 1000.

ـ نفخ جنبي، يمكن أن تكون منه تجاعيد تشبه بقلاع صغيرة (نقضسوناء مركبة).

ـ حكة دائمة، حسامي، حبة الأشكال).

ـ إذا ظهرت على طفلك هذه الاعراض، فاتصل بالطبيب على وجه الاستعجل.

**الأثر الجلدية المفرغة التي يمكن أن تظهر عند إجراء تحاليل الدم:**

- انخفاض عدد الخلايا التي تساهم في تفتر الدم (الصفائح).

ـ انخفاض عدد الكريات البيضاء.

**أثر جلدية ذات تردد غير معروفة:**

ـ لا يمكن تأثير التردد من خلال البيانات المتوفرة.

ـ رندة فعل تحسية (انظر أعلاه).

ـ التهاب الأمعاء الحادة (انظر أعلاه).

ـ التهاب المثانة الحاد الذي يحيط بالباماغ (التهاب المثانة العوي).

ـ رندة الفعل الجلدية الحادة.

ـ نفخ متغير يصاحبه تجاعيد وتوسيع الجلد، انسياحة حول الفم والأنف والعينين (نقضسون)، وكل من النفخ تذكر هذه تشخيص في الفصل جندي جداً (أكثر من 30 يوم).

ـ نفخ جنبي أحمر متغير يصاحبه تجاعيد صغيرة تختفي مع عرق (التهاب العرق).

ـ متذكرة الأعراض الشبيهة بالآفول مع نفخ جنبي، وحمى، وضمص في الخد.

ـ في تلك زيارة خالباً الدم الصعب (فرط الحمضيات والازيمات الكبد) فرط التهاب.

ـ إذا ظهر على طفلك أحد هذه الأعراض، فاتصل بالطبيب على الفور.

ـ التهاب الكبد.

ـ البروغراف، الذي يفتح عن ارتفاع معدل البلياروبين في الدم (وهى مادة ينفعها

ـ المسقطة البيضاء، من العين).

ـ التهاب الكلية.

ـ استضطردة تفتر الدم.

ـ غرفه الشائعة.

ـ احتجاجات (دى الأشخاص الذين يتناولون جرعتان متزمعة من لو عفنان أو

ـ السن الاصغر) (اعتراض النساء).

ـ شوك الأسلن (العنق للأطفال)، وبخيت عموماً عند فرش الأسنان.

**الأثر الجلدية التي يمكن أن تظهر عند إجراء تحاليل الدم أو البول:**

- انخفاض مهم في عدد الكريات البيضاء.

- انخفاض عدد الكريات الحمراء (فرط الدم الانحلالي).

- تلوّرات في البول.

**التصریع بالآثار الجلدية:**

ـ ان شعر طفلك يابي آخر غير مستحب، المرجو إخبار الطبيب أو الصيادي.

ـ ينبع ذلك على أي آثر غير منتحب لم يربه ذكره بهذه الشترة.

ـ يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار الجلدية مبشرة عن نظام الإبلاغ الوطني أو على

ـ GlaxoSmithKline Maroc 42-44

ـ العربي 20000 رقم الدار البيضاء.

ـ 5. كيف يمكن حلقة أو خستان؟

ـ ينبعها عن متلوّر و مرتادي الأطفال.

ـ تاريخ النهاية الصالحة:

ـ يرجى في تلك شهر.

ـ شروط الحفظ:

ـ لاستثناء 100 ميلigram / 12.50 ميلigram لكل مل ، منحقو لستنلوك قابل

ـ قل التصدير: ينبع في حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية ويعدها عن الرطوبة.

ـ بعد التصدير: ينبع المستنقع المحصر 7 أيام كحد أقصى في درجة حرارة ما يعادل

ـ 62.5 ميلigram محرقاً مسحوق معلم اللثولون عن طريق

ـ ينبع في حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية وبعدها عن الرطوبة.

ـ لا ينبع رمي الأدوية في مسلك الصرف الصحي أو مع النفايات المنزلية أفال.

ـ التخلص من الأدوية غير المستخدمة، قد تساعد هذه التأثير في حماية البيئة.

AUGMENTIN 100mg/12.50mg par ml Nourrisson, poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml  
AUGMENTIN 100mg/12.50mg par ml Enfant, poudre pour suspension buvable en flacon de 60 ml  
AUGMENTIN 500mg/62.5mg Enfant, poudre pour suspension buvable en sachet-dose, boîte de 12 sachets.  
Amoxicilline/Al

Uniquement sur ordonance

RESPECTER LES DOSES PRÉCISEES

PPU: 79,90 DH

LOT: 649458

PER: 03/24

Veuillez consulter le médicament.

- G
- Si
- ph
- Cé
- Ne
- de
- Si
- nor

Que contient AUGMENTIN?

1. QU'EST-CE QU'EST AUGMENTIN ?  
AUGMENTIN est un antibiotique bêta-lactam qui contient l'amoxicilline et l'acide clavulanique. Ces deux substances sont efficaces (être inactivées). L'autre constitutut empêche cette inactivation.

AUGMENTIN est utilisé chez l'adulte et chez l'enfant pour traiter les infections de l'oreille moyenne et des sinus, les infections des voies respiratoires, les infections des voies urinaires, les infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections des os et des articulations.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE SUR AUGMENTIN ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains médicaments, il vous faut en parler au pharmacien.

Ne donnez jamais AUGMENTIN à votre enfant:

s'il est allergique à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, ou à d'autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés ci-dessous ; s'il a déjà présenté une réaction allergique grave (d'antibiotique). Ceci peut inclure une éruption cutanée ou une gêne respiratoire.

→ Ne donnez pas AUGMENTIN à votre enfant s'il est mentionné ci-dessous.

En cas de doute, demandez conseil à son médecin ou au pharmacien.

Avertissements et précautions:

Demandez conseil au médecin de votre enfant ou au pharmacien si :

- souffre de mononucléose infectieuse,

- est traité(e) pour des problèmes au foie ou aux reins,

- n'urine pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil au médecin de votre enfant ou lui administrer AUGMENTIN.

Dans certains cas, le médecin de votre enfant pourra recommander l'infection.

Selon les résultats, il pourra prescrire à votre enfant un dos ou un autre médicament.

Réactions nécessitant une attention particulière:

AUGMENTIN peut aggraver certaines maladies ou engendrer des symptômes graves, notamment des réactions allergiques, des convulsions, gros intestin. Lorsque votre enfant prend AUGMENTIN, voici les symptômes afin de réduire les risques. Voir « Réactions particulières », à la rubrique 4.

Tests sanguins et urinaires:

Si votre enfant effectue des analyses de sang (nombre de globules blancs, fonctionnelles hépatiques) ou des analyses d'urine (dosage de l'urine), informez le médecin ou l'infirmière(e) qu'il prend AUGMENTIN et influer sur les résultats de ces types de tests.

Autres médicaments et AUGMENTIN :

Si votre enfant prend ou a récemment pris un autre médicament ou au pharmacien.

Si votre enfant prend de l'allopurinol (en traitement de la goutte), le risque de réaction cutanée allergique est plus élevé.

Si votre enfant prend du probénécide (en traitement de la goutte), décider d'ajuster la dose d'AUGMENTIN.

Si des médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang sont pris avec AUGMENTIN, des analyses sanguines sont requises.

AUGMENTIN peut influer sur l'action du méthotrexate (un médicament contre le cancer ou les maladies rhumatismales).

AUGMENTIN peut influer sur l'action du mycophénolate pour le rejet de greffe d'organes).

N200875-01

**الأثر الجلدية الشائعة جداً:**

- يمكن أن تظهر على أكثر من شخص واحد من أصل 10.
- الاستهت (عدم التهاب).

**الأثر الجلدية الشائعة:**

- كل أن تظهر لدى أقل من شخص واحد من أصل 10.

التشنج (عدم تهاب المجرى الهوائي في المريض)، لا يسمح بدخول جرثومة منتهمة.

ـ إذا ظهرت على طفل هذه الآثار الجلدية، فافعل على اعطاء أو غسلن الماء.

**التأثيرات الجلدية قليلة الشدة:**

- يمكن أن تظهر لدى أقل من شخص واحد من أصل 100.

ـ نفخ جنبي، حكة.

ـ نفخ جنبي يزداد مع حركة (شري).

**غير المنسنة:**

ـ توارث.

ـ نساع الرأس.

**الأثار الجلدية قليلة الشدة التي يمكن أن تظهر عند إجراء تحاليل الدم:**

- ارتفاع معدل بعض المواد (الأنزيمات) التي يتوجهها الكبد.

**الأثار الجلدية النادرة:**

- نفخ جنبي، يمكن أن تكون منه تهدبات تشبه بما معرفة (لخدوده مركبة).

ـ حكة دائمة، حسامي (جذوة الأشكال).

ـ إذا ظهرت على طفل هذه الأعراض، فاتصل بالطبيب على وجه الاستعجل.

**الأثار الجلدية النادرة التي يمكن أن تظهر عند إجراء تحاليل الدم:**

- انخفاض عدد الخلايا التي تساهم في تفتر الدم (الصفائح).

ـ انخفاض عدد الكريات البيضاء.

**أثار جلدية ذات تردد غير معروفة:**

ـ لا يمكن تأثير التردد من خلال البيانات المتوفرة.

ـ رندة فعل تحسسيّة (انظر أعلاه).

ـ التهاب الأمعاء الحادة (انظر أعلاه).

ـ التهاب العصاء الداخلي الذي يحيط بالباماغ (التهاب السحايا العقدي).

ـ رندة الفعل الجلدية الحادة.

ـ نفخ متتر بصاصية تهدبات وتوسيف الجلد، لا سيما حول الفم والأنف والعينين (جوسون)، وكذلك من النفخ أكثر من تشبيب في القصبات جندي حد (أكثر من 30).

ـ نفخ جنبي أحمر متتر تصاصية تهدبات شبيهة بتغير (التهاب).

ـ نفخ حرشفي أحمر تصاصية كل تحدث الجلد وتحدهات (نار عصري).

ـ متذكرة الأعراض الشبيهة بالآفات مع نفخ جنبي، وهي وتضم في الغالب.

ـ في تلك زيارة خاليا الدم الصعب (فرط الحمضيات والزيوت الكبد) فرط التهاب.

ـ إذا ظهر على طفل أحد هذه الأعراض، فاتصل بالطبيب على الفور.

ـ التهاب الكبد.

ـ البروفان، الذي يفتح عن ارتفاع معدل البيلوبورين في الدم (وهي مادة ينفعها).

ـ المسقطة البيضاء، من العين.

ـ التهاب الكلية.

ـ استقطالية متدة تفتر الدم.

ـ غرغط الشاشة.

ـ احتلاجات (الذي الأشخاص الذين يتناولون جرعتات مرتفعة من أو لعفنان أو).

ـ التسل الأسود (اعتراض النسل).

ـ تشرُّن الأنسجة (الذى الأطفال)، وبخته عموماً عند فرش الأسنان.

**الأثار الجلدية التي يمكن أن تظهر عند إجراء تحاليل الدم أو البول:**

- انخفاض مهم في عدد الكريات البيضاء.

- انخفاض عدد الكريات الحمراء (فرط الدم الانحلالي).

ـ تلوّن في البول.

**التصرّيف بالآثار الجلدية:**

ـ ان شعر طفل بأثر غير مسبوق، المرمم (عمره) الطبيب أو الصيادي.

ـ يتحقق ذلك على أي آثر غير متخصص لم يدرك بهذه الشترة.

ـ يمكن أيضاً الإبلاغ عن الآثار الجلدية مثلاً عن نظام الإبلاغ الوطني أو على

ـ GlaxoSmithKline Maroc 42-44.

ـ العربي 20000 رقم النار الصعب.

ـ 5. كيف يمكن حفظ أو ضغط؟

ـ يحفظ بعيداً عن متوازن و مراكز الأطفال.

ـ تاريخ التهاب الصالحة:

ـ يرجى في تلك شهر.

ـ شروط الحفظ:

ـ لاستثناء 100 ميلigram / 12.50 ميلigram لكل مل ، مسحوق مستخلص قابل

ـ قل التصدير: يحفظ في حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية ويعدا عن الرطوبة.

ـ بعد التصدير: يحفظ المستخلص المحسن مسحوق مغلق للتخلص عن طريق

ـ 62.5 ميلigram / 500 ميلigram مسحوق مسحوق مغلق للتخلص عن طريق

ـ بخطف في حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية ويعدا عن الرطوبة.

ـ لا ينبع رمي الأدوية في مسلك الصرف الصحي أو مع النفايات المنزلية أفال.

ـ التخلص من الأدوية غير المستخدمة، قد تساعد هذه التأثير في حماية البيئة.

**AUGMENTIN 100mg/12.50mg par ml Nourrisson, poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml**

**AUGMENTIN 100mg/12.50mg par ml Enfant, poudre pour suspension buvable en flacon de 60 ml**

**AUGMENTIN 500mg/62.5mg Enfant, poudre pour suspension buvable en sachet-dose, boîte de 12 sachets.**

**Amoxicilline/Acide clavulanique**

**Uniquement sur ordonance**

**RESPECTER LES DOSES PRÉCISEES**

**Veuillez**  
medîc.

- G  
- Si  
ph  
- Cé  
Ne  
de  
- Si l  
nor

**Que cor**

1. Qu'el

2. Quell

3. Comr

4. Quels

5. Comm

6. Conte

1. QU'ES

Classe ph

béta-lactai

AUGMENT

Il contient

L'amoxicil

Le clavulan

Les acides clavulaniques sont appelés

parfois ar

ceux inactives (être inactives). L'autre constitue

empêche cette inactivation.

AUGMENTIN est utilisé chez l'adulte et chez l'enfant pour traite

infections de l'oreille moyenne et des sinus,

infections des voies respiratoires,

infections des voies urinaires,

infections de la peau et des tissus mous, incluant les infec

infections des os et des articulations.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE SUR AUGMENTIN ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains

de prendre ce médicament.

Ne donnez jamais AUGMENTIN à votre enfant:

s'il est allergique à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique,

autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés

s'il a déjà présenté une réaction allergique grave (d'

antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un

la gorge,

s'il a déjà eu des problèmes au foie ou développé un ictère

lors de la prise d'un antibiotique.

→ Ne donnez pas AUGMENTIN à votre enfant s'il est

mentionnées ci-dessus.

En cas de doute, demandez conseil à son médecin ou au pharmacien AUGMENTIN.

Avertissements et précautions

Demandez conseil au médecin de votre enfant ou au pharmacien AUGMENTIN si:

souffre de mononucléose infectieuse,

est traité(e) pour des problèmes au foie ou aux reins,

n'urine pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil au médecin de votre enfant ou lui administrer AUGMENTIN.

Dans certains cas, le médecin de votre enfant pourra être

responsable de l'infection.

Selon les résultats, il pourra prescrire à votre enfant un dos

ou un autre médicament.

Réactions nécessitant une attention particulière

AUGMENTIN peut aggraver certaines maladies ou engendrer

graves, notamment des réactions allergiques, des convulsions

gros intestin. Lorsque votre enfant prend AUGMENTIN, vo

symptômes afin de réduire les risques. Voir « Réactions

particulières », à la rubrique 4.

Tests sanguins et urinaires

Si votre enfant effectue des analyses de sang (nombre de glo-

fonctionnelles hépatiques) ou des analyses d'urine (dosage

informez le médecin ou l'infirmière(e) qu'il prend AUGMENTIN

influer sur les résultats de ces types de tests.

Autres médicaments et AUGMENTIN :

Si votre enfant prend ou a récemment pris un autre médicament

ou au pharmacien.

Si votre enfant prend de l'allopurinol (en traitement de la g

risque de réaction cutanée allergique est plus élevé.

Si votre enfant prend du probénécide (en traitement de la

décider d'ajuster la dose d'AUGMENTIN.

Si des médicaments destinés à empêcher la coagulation du

sont pris avec AUGMENTIN, des analyses sanguines su

requises.

AUGMENTIN peut influer sur l'action du méthotrexate (un mé

cancer ou les maladies rhumatismales).

AUGMENTIN peut influer sur l'action du mycophénolate mot

le rejet de greffe d'organes).

PPU: 79,90 DH

LOT: 649458

PER: 03/24

N200875-01