

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie

M22- 0013837

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 747 Société : RAM
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : M. Khou Abdessamad
Date de naissance : 8 MAI 1945
Adresse : Rce KAOUTAR Avenue BEN ATHIR
FES M.N.
Tél. : 0663045835 Total des frais engagés : 5.455,80 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Khaoula HBID
CARDIOLOGUE

Espace Rihab Fes Av. Allal Ben Abdellah
Tél. 05 35 93 26 42

Date de consultation : 09 / 03 / 2023
Nom et prénom du malade : M. Khou Abdessamad Age : 77
Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : Cardiopathie ischémique
Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : FES
Signature de l'adhérent(e) :

Le : 15 / 03 / 2023

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
09/03/23	CSC		300,00	 CARDIOLOGUE Espace Rihou Fes Av. Allal Ibn Abdellah FES - Tél. 05 35 93 24 42

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE AIN LAHNACH Dr K. REDA AIN LAHNACH ANNEX DE TIZGUA PROVINCE IPRAH TEL : 06 67 74 98 01	13/12/23	5015,80

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Facteur et signature du Laboratoire ou du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	10/3/2013	INPE 143001543	14000

[illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES					
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.					
Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.					
SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient		
				Coefficient DES TRAVAUX	
				MONTANTS DES SOINS	
				DEBUT D'EXECUTION	
				FIN D'EXECUTION	
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE				
	H 25533412 21433552 00000000 00000000 D G 00000000 00000000 35533411 11433553 B			Coefficient DES TRAVAUX	
	(Création, remont, adjonction)				
	Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				
				MONTANTS DES SOINS	
				DATE DU DEVIS	
				DATE DE L'EXECUTION	
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS	VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION				

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

الهاتف : 05.35.93.26.42 / المحمول : 06.63.70.23.21 / البريد الإلكتروني : hbid.kholla12@gmail.com

Dr. Khaoula HBID

CARDIOLOGUE

Ex. Chef de service de cardiologie

Hôpital El Ghassani, FES

Diplôme d'échocardiographie Bordeaux, France

Diplôme d'épreuve d'effort et de réadaptation Cardiaque
Bordeaux, France



الدكتورة خولة حبيض

اختصاصية في أمراض القلب والشرابين

رئيسة قسم أمراض القلب بمستشفى الغساني سابقا

دبلوم فحص القلب بالصدى من جامعة بوردو بفرنسا

دبلوم اختبار الجهد وإعادة تأهيل القلب من جامعة

بوردو بفرنسا



Fès, le 09/03/2023

Mr MIKOU ABDESSAMAD 77 ans

ORDONNANCE

REGIME SANS SEL STRICT

- 4
34,60 LASILIX 40 MG
1 cp le matin avant repas
- 6
405,00 UPERIO 100MG
1 cp matin et soir après le repas
- 58,10 CARDENSIEL 5 MG
1/2cp matin après repas
- 3
370,00 REXABAN 20 MG
1 cp le matin au milieu du repas
- 3
147,00 ROZAT 10 MG
1 cp le soir après le repas
- 2
419,00 FORXIGA 10 MG
1 cp le matin après le repas
- 5015,80

PHARMACIE AIN LAHNACH
F. KALINEIDA
AIN LAHNACH ANNEX D'AVIGNON
PERMANCE IFRAN
TEL: 06 67 74 98 01

S.V.
Dr. Khaoula HBID
CARDIOLOGUE
Ain Aitell Ibn Abdellah
Espace Rihab Fes
Fes - Tel: 05 35 93 26 42

رجاب فاس، شارع علال بن عبد الله، عمارة C الطابق الأول (بجانب مقهى أسوان) - فاس

الهاتف: 05.35.93.26.42 / المحمول: 06.63.70.23.21 / البريد الإلكتروني: hbid.kholla12@gmail.com

LABORATOIRE GUESSOUS D'ANALYSES MEDICALES



Dr. Mohammed GUESSOUS
Pharmacien Biologiste
Diplômé de la faculté de Médecine
& de Pharmacie de Marseille
CES : Hématologie - Immunologie
Bactériologie et Virologie



Laboratoire certifié ISO 9001 en Juillet 2021

N° 2021/02-216.1

Prescripteur : Dr HBID KHAOULA

Mr MIKOU Abdessamad

Dossier N° 2303100019 du 10-03-2023 08:54

Résultats édités le : 10-03-2023

Page : 1 / 1

Résultat **Unité** **V.Normales** **Antécédent**

BIOCHIMIE SANGUINE

(Integra 400 Roche, Architect Abbott)

UREE:

(U.V., Architect Abbott)

0.64 g/l
10.67 mmol/l

(0.15-0.40)
(2.50-6.67)

09-12-2022
0.77

CREATININE:

(Cinétique enzymatique à 37°, Architect Abbott)

13 mg/l
115 µmol/l

(7-13)
(62-115)

09-12-2022
14

SODIUM:

(ISE indirect, Architect Abbott)

137 mEq/l

(135-145)

09-12-2022
135

POTASSIUM :

(ISE indirect, Architect Abbott)

4.80 mEq/l

(3.50-5.00)

09-12-2022
5.10

Demande validée biologiquement par : Dr. Mohammed GUESSOUS



LABORATOIRE GUESSOUS D'ANALYSES MEDICALES

PATENTE : 13606231 - CNSS : 2120830 - IF : 16409010 - ICE : 000721226000036

Dr. Mohamed GUESSOUS
Pharmacien Biologiste
Diplômé de la faculté de
médecine
& de pharmacie de Marseille
CES : Hématologie -
Immunologie
Bactériologie et Virologie

FACTURE : 230300432

Fès le : 10-03-2023

Médecin **Dr HBID KHAOULA**
Nom du patient **Mr Abdessamad MIKOU**

Demande N° 2303100019
Date de l'examen : 10-03-2023

Analyses :

Récapitulatif des analyses		
CN	Analyse	Clé
MAJ	Majoration	B0
9105	Prélèvement sanguin	E10
0111	Créatinine	B30
0131	Potassium	B30
0133	Sodium	B30
0135	Urée	B30

Total des B : 120

TOTAL DOSSIER : 140 DHS

Arrêtée la présente note d'honoraires à la somme de : cent quarante dirhams .



Lasilix® 40
Lasilix® 20

LOT : 22E13
PER : 07 2026

LASILIX 40MG
20CP SEC

P.P.V : 34DH60



Lasilix® 40mg
Furosemide
Voie orale
20 Comprimés sécables



pouvant
que chez

nide

SANC

entièrement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

ent des informations importantes sur votre traitement.

avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informati
decin ou votre pharmacien.

amment vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quel
même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

ette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire à nouveau.

ATION DU MEDICAMENT

on
mg comprimés :

e 40 mg/comprimé.

: amidon de maïs, lactose, silice colloïdale, talc, stéarate de magnésium.

mg/2ml :

e 20 mg/2 ml.

: chlorure de sodium, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.

armaceutiques et présentations

mg : comprimés sécables dosés à 40 mg ; boîte de 20.

mg/2 ml : solution injectable,

le 2 ml ; boîte de 1.

EL CAS UTILISER CE MEDICAMENT

e :

ment est indiqué dans le traitement :

mes d'origine cardiaque ou rénale,

mes d'origine hépatique, le plus souvent en association avec un diurétique épargneur de

rtension artérielle.

table :

e est indiquée dans les cas suivants :

cardiologiques : œdème aigu du poumon, arrêt cardiaque,

hypertensives sévères (*élévation importante de la tension artérielle*),

s sodées sévères d'origine cardiaque, rénale, cirrhotique (*rétenion de sel*),

e du bas appareil urinaire et test de lavage « wash out » au LASILIX,

utilisé en réanimation pédiatrique.

N !

s cas ne pas utiliser ce médicament

ment NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

en cas d'altération de la

ne est de 1 à 2 mg/kg de

mpoules par jour par voie

LES CAS.

asilix
asilix

LOT : 22E013
PER: 07 2026

LASILIX 40MG
20CP SEC

P.P.V : 3401160



Lasilix 40mg
Furosemide
Voie orale
20 Comprimés sécables



principe actif pouvant
e.
sans risque chez

ive ment l'intégralité de cette notice avant de prendre ce m
des informations importantes sur votre traitement.

z d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plu
ou votre pharmacien.

ment vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un
me en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
e notice, vous pourriez avoir besoin de la relire à nouveau.

ION DU MEDICAMENT

ng comprimés :

..... 40 mg/comprimé.
midon de maïs, lactose, silice colloïdale, talc, stéarate de magnésium.

ng/2ml : 20 mg/2 ml.
chlorure de sodium, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.

rmaceutiques et présentations

ng : comprimés sécables dosés à 40 mg ; boîte de 20.
ng/2 ml : solution injectable,
2 ml ; boîte de 1.

CAS UTILISER CE MEDICAMENT

ient est indiqué dans le traitement :
es d'origine cardiaque ou rénale,
es d'origine hépatique, le plus souvent en association avec un diurétique épargneur de

tension artérielle.

able :

est indiquée dans les cas suivants :
cardiologiques : œdème aigu du poumon, arrêt cardiaque,
hypertensives sévères (élévation importante de la tension artérielle),
sodées sévères d'origine cardiaque, rénale, cirrhotique (rétention de sel),
du bas appareil urinaire et test de lavage « wash out » au LASILIX,
utilisé en réanimation pédiatrique.

N !
s cas ne pas utiliser ce médicament

ment NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

r (le matin).

en cas d'altération de la

enne est de 1 à 2 mg/kg de

mpoules par jour par voie

LES CAS.

é :

Lasilix® 40 mg
Lasilix® 20 mg

LOT : 22E013
PER: 07/2026

LASILIX 40 MG
20CP SEC

P.P.V : 34DH60



S 118000 060468

SANOFI

Lasilix® 40mg
Furosemide
Voie orale
20 Comprimés sécables



avant
chez

Préparement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
Des informations importantes sur votre traitement.
En cas de questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations
à votre médecin ou votre pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un
même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
Après avoir lu cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire à nouveau.

COMPOSITION DU MEDICAMENT

Comprimés :
40 mg/comprimé.
amidon de maïs, lactose, silice colloïdale, talc, stéarate de magnésium.
Solution injectable :
20 mg/2 ml.
chlorure de sodium, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.

Formes pharmaceutiques et présentations

40 mg : comprimés sécables dosés à 40 mg ; boîte de 20.
20 mg/2 ml : solution injectable,
boîte de 2 ml ; boîte de 1.

INDICATIONS - CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est indiqué dans le traitement :
des insuffisances d'origine cardiaque ou rénale,
des insuffisances d'origine hépatique, le plus souvent en association avec un diurétique épargneur de
potassium.

Contre-indications :
Ce médicament est indiquée dans les cas suivants :
cardiologiques : œdème aigu du poumon, arrêt cardiaque,
hypertensives sévères (élévation importante de la tension artérielle),
insuffisances sodées sévères d'origine cardiaque, rénale, cirrhotique (rétention de sel),
du bas appareil urinaire et test de lavage « wash out » au LASILIX,
utilisé en réanimation pédiatrique.

CONTRAINDICATIONS - CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

(le matin).
en cas d'altération de la
fonction rénale.
La dose journalière est de 1 à 2 mg/kg de
poids corporel.
1 à 2 ampoules par jour par voie
intraveineuse.
LES CAS.

Lasilix® 40 mg
Lasilix® 20 mg

ide

LOT : 22E013
PER: 07/2026

LASILIX 40mg
20CP SEC

P.P.V : 34DH60



SAT



ctif pouvant

risque chez

ntivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament
nt des informations importantes sur votre traitement.
vez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informa
ecin ou votre pharmacien.
ament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un
ême en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
te notice, vous pourriez avoir besoin de la relire à nouveau.

ATION DU MEDICAMENT

mg comprimés :

amidon de maïs, lactose, silice colloïdale, talc, stéarate de magnésium.

mg/2ml :
chlorure de sodium, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.

armaceutiques et présentations

mg : comprimés sécables dosés à 40 mg ; boîte de 20.
mg/2 ml : solution injectable,
e 2 ml ; boîte de 1.

L CAS UTILISER CE MEDICAMENT

ment est indiqué dans le traitement :
es d'origine cardiaque ou rénale,
es d'origine hépatique, le plus souvent en association avec un diurétique épargneur de

tension artérielle.

table :
e est indiquée dans les cas suivants :
cardiologiques : œdème aigu du poumon, arrêt cardiaque,
hypertensives sévères (*élévation importante de la tension artérielle*),
sodées sévères d'origine cardiaque, rénale, cirrhotique (*rétenion de sel*),
du bas appareil urinaire et test de lavage « wash out » au LASILIX,
utilisé en réanimation pédiatrique.

N !

s cas ne pas utiliser ce médicament

ment NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

r (le matin).


en cas d'altération de la

enne est de 1 à 2 mg/kg de

mpoules par jour par voie

LES CAS.

é :



ما هي الحالات التي يجب فيها استعمال دواء أوبريو؟

سيقوم الطبيب بتحديد الجرعة الملائمة للأدوية التي أخذتها مسبقاً. وبعدئذ، سيقوم بضبط الجرعة حسب استجابتك للعلاج وذلك حتى تلائم الجرعة التي سيجدها لك. عموماً، ستبدأ بجرعة 50 ملغ أو 100 ملغ مرتين يومياً (قرص واحد

الصباح وقرص آخر في المساء).

تصل الجرعة التي يُوصى بها عادة إلى 200 ملغ مر
في الصباح وقرص آخر في المساء).

إذا كنت تتابع من قبل علاجاً بمثبطات ECA، يجب ألا
ولا يجب أخذ دواء أوبريو إلا بعد مرور 36 ساعة على
من مثبطات ECA. إذا أوقفت العلاج بدواء أوبريو، و
مثبطات ECA، ابدأ في أخذ هذا الدواء بعد مرور 36
جرعة من دواء أوبريو.

فَمِ بَيْعِ أَقْرَاصٍ أَوْ بَرِيٍّ كَامِلَةٍ، لَا يَجِبُ كَسْرُ الْأَقْرَاصِ أَوْ تَقْدِيرُ
يُمْكِنُ اخْتِارَ أَقْرَاصٍ أَوْ بَرِيٍّ وَسُطٍّ وَجِبَاتِ الْأَكْلِ أَوْ خَارِجِهَا.
إِذَا اخْتَذَ الْكَثِيرُ مِنْ أَقْرَاصٍ أَوْ بَرِيٍّ عَنْ طَرِيقِ الْخَطَأِ، أَخْبَرَ الدَّ
الْفُورَ.

إذا نسيت أخذ جرعة، خذها حالما تتذكر ذلك. ثم خذ الق
المعتاد. إذا تصادف وقت تتذكر مع الوقت المعتاد لأ
تأخذ الجرعة المنسية، وتابع جرعاتك كالعادة. إذا
تأخذ جرعة مضاعفة.

لا تَقْمُ بتعديل الجرعة الموصوفة لك من تلقاء نفسك
الدواء قوية أو ضعيفة جداً، أخبر الطبيب أو الصيد
يوم طالما لم يطلب منك الطبيب عكس ذلك. يُمكن
أن يتسبب في تفاقم المرض.

الأطفال والشباب (أقل من 18 سنة)

لم يتم التحقق حتى الآن من سلامة استخدام دواء الشباب.

2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل استـ

• لا يجب أخذ دواء أوبريو:

- إذا كنت تعاني من فرط الحساسية من الساكوبتريل
آخر لهذا الدواء.

إذا كنت تأخذ أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو قم
ECA (انظر: ما هي الاحتياطات اللازمة عند أخذ
أوبريو؟) لا تبدأ بأخذ دواء أوبريو إلا بعد مرور 36

نشرة معلومات للمريض

أوبريو® 50 ملغ، 100 ملغ، 200 ملغ

أقراص مغلفة

ساکویتریل / فالسارتان

يرجى قراءة النشرة بعناية قبل استعمال هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك.

- حافظ على هذه النشرة لأنك قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- استشر الطبيب أو الصيدلي إذا كان لديك المزيد من الأسئلة.
- وُصف لك هذا الدواء شخصياً فلا تصفوه لأشخاص آخرين حتى وإن كانت أعراض مرضهم تشبه أعراض مرضكم لأنهم لا يمكن أن يكون مضا لهم.
- استشر الطبيب أو الصيدلي إذا أحسست بأي أعراض جانبية كبقعاً كان نوعها.
- وخلقنا هذا أيضاً على الأعراض الجانبية في المذكورة في هذه النشرة.

على ماذا تحتوي هذه النشرة؟

1. ما هو أوبريو وفي أية حالة يتم استعماله؟
2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل استعمال أوبريو؟
3. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
4. كيفية حفظ دواء أوبريو؟
5. محتوى العبوة ومعلومات أخرى

1. ما هو أوبريو وفي أية حالة يتم استعماله؟

ما هو أوبريو؟

يستخدم دواء أوبريو لعلاج مرض قصور القلب لدى البالغين. يوصف دواء أوبريو للمرضى بضعف القلب من خطر الموت المرتبط بمرض قصور القلب. يعدّ استخدام أوبريو ضروريًا التي يتطلبها بعض قصور القلب. يعطى دواء أوبريو إلى جانب مجموعة ملائمة من أدوية قصور القلب. في حالة قصور القلب، لا يبقى ضخ عضلة القلب قويا بما يكفي لتوفير ما يكفي من الدم في جميع أعضاء الجسم. تتمثل أعراض قصور القلب الأكثر شيوعا في ضيق التنفس وتورم في القدمين والساقين بسبب تراكم السوائل. يجب استعارة هذا الدواء بوصفة طبية.

ما هي آلية عمل أوبريو؟

بجعل أوبريو كمثبط لمادة نيبريليزين ومستقبلات الأنجيوتنسين فهو يحتوي على الساكوبتريل والفالسارتان. باستخدام دواء أوبريو، تتوسع الأوعية الدموية وتتراكم كميات أقل من المياه في الجسم وهو ما يكون له تأثير


1234597 MA T

UPERIO® 100 mg
Comprimé pelliculé

178001 031726

28 Comprimés pelliculésUperio®
100 mg

Sacubitril/ Valsartan



ما هي الحالات التي يجب فيها استعمال دواء أوبريو؟

سيقوم الطبيب بتحديد الجرعة الملائمة للأدوية التي أخذتها مسبقاً.
وبعدئذ، سيقوم بضبط الجرعة حسب استجابتك للعلاج وذلك حتى تلائمك
الجرعة التي تسببها لك.
عُموماً، ستبدأ بجرعة 50 ملغ أو 100 ملغ مرتين يومياً (قرص واحد

الصباح وقرص آخر في المساء).

تصل الجرعة التي يُوصى بها عادة إلى 200 ملغ مر
في الصباح وقرص آخر في المساء).

إذا كنت تتبع من قبل علاجاً بمثبطات ECA، يجب ألا
تأخذ دواء أوبريو إلا بعد مرور 36 ساعة على
آخر جرعة من مثبطات ECA. إذا أوقفت العلاج بدواء أوبريو، و
تأخذ مثبطات ECA، ابدأ في أخذ هذا الدواء بعد مرور 36
ساعة من دواء أوبريو.

فَمِ بِلَعِ أَقْرَاصِ أُوْبِرِيوِ كَامِلَةِ، لَا يَجِبُ كِسْرِ الْأَقْرَاصِ أَوْ تَقْدِيرُ
يُمْكِنُ اخْذَ أَقْرَاصِ أُوْبِرِيوِ وَسَطِ وَجِبَاتِ الْأَكْلِ أَوْ خَارِجِهَا.
إِذَا اخْذْتَ الْكَثِيرَ مِنْ أَقْرَاصِ أُوْبِرِيوِ عَنْ طَرِيقِ الْخَطَأِ، اخْبِرِ الدَّ
الْفُورِ.

إذا نسيت أخذ جرعة، خذها حالما تتذكر ذلك. ثم خذ الق
المعتاد. إذا تصادف وقت تذكرك مع الوقت المعتاد لأ
تأخذ الجرعة المنسية، وتابع جرعاتك كالعادة. إذا
تأخذ جرعة مضاعفة.

لا تَقُمْ بتعديل الجرعة الموصوفة لك من تلقاء نفسك
الدواء قوية أو ضعيفة جداً، أخبر الطبيب أو الصيد
يوم طالما لم يطلب منك الطبيب عكس ذلك. يُمكن
أن يتسبب في تفاقم المرض.

الأطفال والشباب (أقل من 18 سنة)

لم يتم التحقق حتى الآن من سلامة استخدام دواء الشباب.

2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل استـ

• لا يجب أخذ دواء أوبريو:

إذا كنت تعاني من فرط الحساسية من الساكوبتريل
آخر لهذا الدواء.

إذا كنت تأخذ أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو قسط
ECA (انظر: ما هي الاحتياطات اللازمة عند أخذ
أوبريو؟) لا تبدأ بأخذ دواء أوبريو إلا بعد مرور 36

نشرة معلومات للمريض

أوبريو® 50 ملغ، 100 ملغ، 200 ملغ

أقراص مغلفة

ساکو پتریل / فالسار تان

يرجى قراءة النشرة بعناية قبل استعمال هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك.

- حافظ على هذه النشرة لأنك قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- استشر الطبيب أو الصيدلي إذا كان لديك المزيد من الأسئلة.
- وُصف لكم هذا الدواء شخصياً فلا تصفوه لأشخاص آخرين حتى وإن كانت أعراض مرضهم تشبه أعراض مرضكم لأنهم لا يمكن أن يكون مضرًا لهم.
- استشر الطبيب أو الصيدلي إذا أحسست بأي أعراض جانبية كيما كان نوعها وينطبق على أيضاً على الأعراض الجانبية في المذكورة في هذه النشرة.

على ماذا تحتوي هذه النشرة؟

1. ما هو أوبريو وفي أية حالة يتم استعماله؟
2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل استعمال أوبريو؟
3. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
4. كيفية حفظ دواء أوبريو ؟
5. محتوى العبوة ومعلومات أخرى

1. ما هو أوبريو وفي أية حالة يتم استعماله؟

ما هو أوبريو؟

يُستخدم دواء أوبريو لعلاج مرض قصور القلب لدى البالغين. يُوصف دواء أوبريو للمرضى بغرض التقليل من خطر الموت المرتبط بمرض قصور القلب. وبعد الاستشفاءات الضرورية التي يتطلّها مرضى قصور القلب، يُعطى دواء أوبريو إلى جانب مجموعة ملائمة من أدوية قصور القلب. في حالة قصور القلب، لا يبقى ضخ عضلة القلب قويا بما يكفي لتوفير ما يكفي من الدم في جميع أعضاء الجسم. تتساقط أعراض قصور القلب الأكثر شيوعاً في ضيق التنفس وتورم في القدمين والساقين بسبب تراكم السوائل. يجب استكمال هذا الدواء بوصفة طبية.

ما هي آلية عمل أوبريو؟

يعمل أوبريو كمثبط لمادة نيريليزين ومستقبلات الأنجيوتنسين فهو يحتوي على الساكوبتريل والفالسارتان. باستخدام دواء أوبريو، تتوسع الأوعية الدموية وتتراكم كميات أقل من المياه في الجسم وهو ما يكون له تأثير

1234597 MA TA


UPERIO® 100 mg
Comprimé pelliculé.
Boîte de 20.
PV : 4,50 €

178001 031726

28 Comprimés pelliculés

Uprio® 100 mg

Sacubitril/ Valsartan



ما هي الحالات التي يجب فيها استعمال دواء وبريوس؟
 سيقوم الطبيب بتحديد الجرعة اللائمة للأدوية التي أخذتها مسبقاً.
 وبعندئذ، سيقوم بضغط الجرعة حسب استجابتك للعلاج وذلك حتى تلائمك
 الجرعة التي سيحددها لك.
 عموماً، ستبدأ بجرعة 50 ملغ أو 100 ملغ مرتين يومياً (قرص واحد

UPERIO® 100 mg
Comprimé pelliculé.
Boîte de 30.
Ppv : 405 DH

178001 031726

إذا كنت تتبع من قبل علاجاً بمثبطات **ECA**، يجب ألا
ولا يجب أخذ دواء أوبريو إلا بعد مرور 36 ساعة على
من مثبطات **ECA**. إذا أوقفت العلاج بدواء أوبريو،
مثبطات **ECA**، ابدأ في أخذ هذا الدواء بعد مرور 36
جرعة من دواء أوبريو.

إذا نسيت أخذ جرعة، خذها حالما تتذكر ذلك. ثم خذ المعتاد. إذا تصادف وقت تذكرك مع الوقت المعتاد لا تأخذ الجرعة المنسية، وتابع جرعاتك كالعادة. إذا تأخذ جرعة مضاعفة.

الأطفال والشباب (أقل من 18 سنة)
لم يتم التحقق حتى الآن من سلامة استخدام دواء الشباب.

• لا يجب أخذ دواء أوبريو:

إذا كنت تأخذ أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو قس
ECA (انظر: ما هي الاحتياطات اللازمة عند أخذ
أوبريو؟ لا تبدأ بأخذ دواء أوبريو إلا بعد مرور 36

أوبريو® 50 ملغ، 100 ملغ، 200 ملغ

أقراص مغلفة
ساكوبتريل / فالسارتان

- حافظ على هذه النشرة لأنك قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- استشر الطبيب أو الصيدلي إذا كان لديك المزيد من الأسئلة.
- وُصف لك هذا الدواء خصيصاً فلا تصفوه لأشخاص آخرين حتى وإن كانت أعراض مرضهم تشبه أعراض مرضكم لأنهم لن يكون مضراً لهم.
- استشر الطبيب أو الصيدلي إذا أحسست بأي أعراض جانبية كيتمالك نوعها.
- وتخطئ إذا أضعا على الأعراض الجانبية في المذكرة في هذه النشرة.

1. ما هو أوبريو وفي أية حالة يتم استعماله؟
2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل استعمال أوبريو؟
3. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
4. كيفية حفظ دواء أوبريو؟
5. محتوى العبوة ومعلومات أخرى

1. ما هو أوبريو وفي أية حالة يتم استعماله؟


ما هو أوبريو؟

يستخدم دواء أوبريو لعلاج مرض قصور القلب لدى البالغين. يُوصف دواء أوبريو للمرضى بغرض التقليل من خطر الموت المرتبط بمرض قصور القلب. يُعد الاستشفاءات الضرورية التي يتطلبها مرضى قصور القلب. يُعطى دواء أوبريو إلى جانب مجموعة ملائمة من الأدوية قصور القلب. في حالة قصور القلب، لا يبقى ضخ عضلة القلب قويا بما يكفي لتوفير ما يكفي من الدم في جميع أعضاء الجسم. تتمثل أعراض قصور القلب الأكثر شيوعا في ضيق التنفس وتورم في القدمين والساقين بسبب تراكم السوائل. يجب استعمال هذا الدواء بوصفة طبية.

ما هي آلية عمل أوبريو؟

يعمل أوبريو كمثبط لمادة نيريليزين ومستقبلات الأفيونين فهو يحتوي على الساكوبتريل والفالسارتان، باستخدام دواء أوبريو، تتوسع الأوعية الدموية وتتراكم كميات أقل من المياه في الجسم وهو ما يكون له تأثير

Uperio® 100 mg
Sacubitril/ Valsartan
28 Comprimés pelliculés



ما هي الحالات التي يجب فيها استعمال دواء ويريو؟
 سيقوم الطبيب بتحديد الجرعة اللازمة للأدوية التي أخذتها مسبقاً.
 وبعندئذ، سيقوم بضغط الجرعة حسب استجابتك للعلاج وذلك حتى تلائمك
 الجرعة التي سيحددها لك.
 عموماً، ستبدأ بجرعة 50 ملغ أو 100 ملغ مرتين يومياً (قرص واحد

UPERIO® 100 mg
Comprimé pelliculé.
Boîte de 30.
PpV : 405 DH

178001 031726

إذا كنت تتابع من قبل علاجاً بمثبطات **ECA**، يجب أن
ولا يجب أخذ دواء أوبريو إلا بعد مرور 36 ساعة على
من مثبطات **ECA**. إذا أوقفت العلاج بدواء أوبريو، و
مثبطات **ECA**، أبداً في أخذ هذا الدواء بعد مرور 36
جرعة من دواء أوبريو.

إذا نسيت أخذ جرعة، خذها حالما تتذكر ذلك. ثم خذ الق
المعتاد. إذا تصادف وقت تتذكر مع الوقت المعتاد
تأخذ الجرعة المنسية، وتابع جرعاتك كالعادة. إذا
تأخذ جرعة مضاعفة.

لا تَقُمْ بتعديل الجرعة الموصوفة لك من تلقاء نفسك
الدواء قوية أو ضعيفة جداً، أخبر الطبيب أو الصيد
يوم طالما لم يطلب منك الطبيب عكس ذلك. يُمكن
أن يتسبب في تفاقم المرض.

الأطفال والشباب (أقل من 18 سنة)

لم يتم التحقق حتى الآن من سلامة استخدام دواء الشباب.

2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل استـ

• لا يجب أخذ دواء أوبريو:

- إذا كنت تعاني من فرط الحساسية من الساكوبتريل
آخر لهذا الدواء.

إذا كنت تأخذ أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو قسط
ECA (انظر: ما هي الاحتياطات اللازمة عند أخذ
أوبريو؟) لا تبدأ بأخذ دواء أوبريو إلا بعد مرور 36

نشرة معلومات للمريض

أوبريو® 50 ملغ، 100 ملغ، 200 ملغ

أقراص مغلفة

ساکو پتریل / فالسارتان

يرجى قراءة النشرة بعناية قبل استعمال هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك.

- حافظ على هذه النشرة لأنك قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- استشر الطبيب أو الصيدلي إذا كان لديك المزيد من الأسئلة.
- وُصف لك هذا الدواء شخصياً فلا تصفوه لأشخاص آخرين حتى وإن كانت أعراض مرضهم تشبه أعراض مرضكم لأنهم لا يمكن أن يكون مضرًا لهم.
- استشر الطبيب أو الصيدلي إذا أحسست بأي أعراض جانبية كيما كان نوعها وينطبق على أيضاً على الأعراض الجانبية في المذكورة في هذه النشرة.

على ماذا تحتوي هذه الفشرة؟

1. ما هو أوبريو وفي أية حالة يتم استعماله؟
2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل استعمال أوبريو؟
3. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
4. كيفية حفظ دواء أوبريو ؟
5. محتوى العبوة ومعلومات أخرى

1. ما هو أوبريو وفي أية حالة يتم استعماله؟


ما هو أوبريو؟

يُستخدم دواء أوبريو لعلاج مرض قصور القلب لدى البالغين. يُوصف دواء أوبريو للمرضى بغرض التقليل من خطر الموت المرتبط بمرض قصور القلب. ويعد الاستشفاءات الجراحية التي يتطلبها مرض قصور القلب. يُعطى دواء أوبريو إلى جانب مجموعة ملائمة من أدوية قصور القلب. في حالة قصور القلب، لا يبقى ضخ عضلة القلب قويا بما يكفي لتوفير ما يكفي من الدم في جميع أعضاء الجسم. تتساقط أعراض قصور القلب الأكثر شيوعاً في ضيق التنفس وتورم في القدمين والساقين بسبب تراكم السوائل. يجب استئصال هذا الدواء بوصفة طبية.

ما هي آلية عمل أوبريو؟

يعمل أوبريو كمثبط لمادة نيريليزين ومستقبلات الأنجيوتنسين فهو يحتوي على الساكوبتريل والفالسارتان. باستخدام دواء أوبريو، تتوسع الأوعية الدموية وتتراكم كميات أقل من المياه في الجسم وهو ما يكون له تأثير


Uperio®
 100 mg
 Sacubitril/ Valsartan
 28 Comprimés pelliculés



ما هي الحالات التي يجب فيها استعمال دواء أوبريو؟

سيقوم الطبيب بتحديد الجرعة الملائمة للأدوية التي أخذتها مسبقاً. وبعدئذ، سيقوم بضبط الجرعة حسب استجابتك للعلاج وذلك حتى تلائم الجرعة التي سيجدها لك. عموماً، ستبدأ بجرعة 50 ملغ أو 100 ملغ مرتين يومياً (قرص واحد

الصباح وقرص آخر في المساء).

تصل الجرعة التي يُوصى بها عادة إلى 200 ملغ مر
في الصباح وقرص آخر في المساء).

إذا كنت تتابع من قبل علاجاً بمثبطات ECA، يجب ألا
ولا يجب أخذ دواء أوبريو إلا بعد مرور 36 ساعة على
من مثبطات ECA. إذا أوقفت العلاج بدواء أوبريو، و
مثبطات ECA، ابدأ في أخذ هذا الدواء بعد مرور 36
جرعة من دواء أوبريو.

فَمِ بَيْعِ أَقْرَاصٍ أَوْ بَرِيٍّ كَامِلَةٍ، لَا يَجِبُ كَسْرُ الْأَقْرَاصِ أَوْ تَقْدِيرُ
يُمْكِنُ اخْتِارَ أَقْرَاصٍ أَوْ بَرِيٍّ وَسُطٍّ وَجِبَاتِ الْأَكْلِ أَوْ خَارِجِهَا.
إِذَا اخْتَذَ الْكَثِيرُ مِنْ أَقْرَاصٍ أَوْ بَرِيٍّ عَنْ طَرِيقِ الْخَطَأِ، أَخْبَرَ الدَّ
الْفُورَ.

إذا نسيت أخذ جرعة، خذها حالما تتذكر ذلك. ثم خذ الق
المعتاد. إذا تصادف وقت تتذكر مع الوقت المعتاد لأ
تأخذ الجرعة المنسية، وتابع جرعاتك كالعادة. إذا
تأخذ جرعة مضاعفة.

لا تَقُمْ بتعديل الجرعة الموصوفة لك من تلقاء نفسك
الدواء قوية أو ضعيفة جداً، أخبر الطبيب أو الصيد
يوم طالما لم يطلب منك الطبيب عكس ذلك. يُمكن
أن يتسبب في تفاقم المرض.

الأطفال والشباب (أقل من 18 سنة)

لم يتم التحقق حتى الآن من سلامة استخدام دواء الشباب.

2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل استـ

• لا يجب أخذ دواء أوبريو:

- إذا كنت تعاني من فرط الحساسية من الساكوبتريل
آخر لهذا الدواء.

إذا كنت تأخذ أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو قم
ECA (انظر: ما هي الاحتياطات اللازمة عند أخذ
أوبريو؟) لا تبدأ بأخذ دواء أوبريو إلا بعد مرور 36

نشرة معلومات للمريض

أوبريو® 50 ملغ، 100 ملغ، 200 ملغ

أقراص مغلفة

ساکویتریل / فالسارتان

يرجى قراءة النشرة بعناية قبل استعمال هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك.

- حافظ على هذه النشرة لأنك قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- استشر الطبيب أو الصيدلي إذا كان لديك المزيد من الأسئلة.
- وُصف لك هذا الدواء شخصياً فلا تصفوه لأشخاص آخرين حتى وإن كانت أعراض مرضهم تشبه أعراض مرضك لأنك يمكن أن يكون مضرًا لهم.
- استشر الطبيب أو الصيدلي إذا أحسست بأي أعراض جانبية كبقعاً كان نوعها.
- وخلقنا هذا أيضاً على الأعراض الجانبية في المذكورة في هذه النشرة.

على ماذا تحتوي هذه النشرة؟

1. ما هو أوبريو وفي أية حالة يتم استعماله؟
2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل استعمال أوبريو؟
3. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
4. كيفية حفظ دواء أوبريو؟
5. محتوى العبوة ومعلومات أخرى

1. ما هو أوبريو وفي أية حالة يتم استعماله؟

ما هو أوبريو؟

يستخدم دواء أوبريو لعلاج مرض قصور القلب لدى البالغين. يوصف دواء أوبريو للمرضى بضعف القلب من خطر الموت المرتبط بمرض قصور القلب. يعدّ الاستشفاءات الضرورية التي يتطلبها بعض قصور القلب. يعطى دواء أوبريو إلى جانب مجموعة ملائمة من أدوية قصور القلب. في حالة قصور القلب، لا يبقى ضخ عضلة القلب قويا بما يكفي لتوفير ما يكفي من الدم في جميع أعضاء الجسم. تتمثل أعراض قصور القلب الأكثر شيوعا في ضيق التنفس وتورم في القدمين والساقين بسبب تراكم السوائل. يجب استعمال هذا الدواء بوصفة طبية.

ما هي آلية عمل أوبريو؟

بجعل أوبريو كمثبط لمادة نيبريليزين ومستقبلات الأنجيوتنسين فهو يحتوي على الساكوبتريل والفالسارتان. باستخدام دواء أوبريو، تتوسع الأوعية الدموية وتتراكم كميات أقل من المياه في الجسم وهو ما يكون له تأثير

1234597 MA T


UPERIO® 100 mg
Comprimé pelliculé

178001 031726

28 Comprimés pelliculés

Uprio® 100 mg

Sacubitril/ Valsartan



ما هي الحالات التي يجب فيها استعمال دواء وبريوس؟
 سيقوم الطبيب بتحديد الجرعة اللائمة للأدوية التي أخذتها مسبقاً.
 وبعندئذ، سيقوم بضغط الجرعة حسب استجابتك للعلاج وذلك حتى تلائمك
 الجرعة التي سيحددها لك.
 عموماً، ستبدأ بجرعة 50 ملغ أو 100 ملغ مرتين يومياً (قرص واحد

UPERIO® 100 mg
Comprimé pelliculé.
Boîte de 30.
Ppv : 405 DH

178001 031726

إذا كنت تتابع من قبل علاجاً بمثبطات **ECA**، يجب
ولا يجب أخذ دواء أوبريو إلا بعد مرور 36 ساعة على
من مثبطات **ECA**. إذا أوقفت العلاج بدواء أوبريو،
مثبطات **ECA**، ابدأ في أخذ هذا الدواء بعد مرور 36
جرعة من دواء أوبريو.

إذا نسيت أخذ جرعة، خذها حالما تتذكر ذلك. ثم خذ المعتاد. إذا تصادف وقت تذكرك مع الوقت المعتاد لا تأخذ الجرعة المنسية، وتابع جرعائك كالعادة. إذا تأخذ جرعة مضاعفة.

الأطفال والشباب (أقل من 18 سنة)
لم يتم التحقق حتى الآن من سلامة استخدام دواء الشباب.

• لا يجب أخذ دواء أوبريو:

آخر لهذا الدواء.

إذا كنت تأخذ أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو قه
ECA (انظر: ما هي الاحتياطات اللازمة عند أخذ
 أوبريو؟ لا تبدأ بأخذ دواء أوبريو إلا بعد مرور 36

أوبريو® 50 ملغ، 100 ملغ، 200 ملغ

أقراص مغلفة
ساكوبتريل / فالسارتان

- حافظ على هذه النشرة لأنك قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- استشر الطبيب أو الصيدلي إذا كان لديك المزيد من الأسئلة.
- وُصف لك هذا الدواء خصيصاً فلا تصفوه لأشخاص آخرين حتى وإن كانت أعراض مرضهم تشبه أعراض مرضك لأنه يمكن أن يكون ضراً لهم.
- استشر الطبيب أو الصيدلي إذا أصبحت بأي أعراض جانبية كيتمكن من نوعها.
- وينطبق هذا أيضاً على الأعراض الجانبية غير المذكورة في هذه النشرة.

على ماذا تحتوي هذه الفشرة؟

1. ما هو أوبريو وفي أية حالة يتم استعماله؟
2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل استعمال أوبريو؟
3. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
4. كيفية حفظ دواء أوبريو؟
5. محتوى العبوة ومعلومات أخرى

1. ما هو أوبريو وفي أية حالة يتم استعماله؟

ما هو أوبريو؟

يستخدم دواء أوبريو لعلاج مرض قصور القلب لدى البالغين. يُؤصف دواء أوبريو للمرضى بغرض التقليل من خطر الموت المرتبط بمرض قصور القلب. ويعد الاستشفاءات الضرورية التي يتطلبها مريض قصور القلب.

يُوصف دواء أوبريو إلى جانب مجموعة ملائمة من أدوية قصور القلب. في حالة قصور القلب، لا يبقى ضخ عضلة القلب قويا بما يكفي لتوفير ما يكفي من الدم في جميع أعضاء الجسم. تتمثل أعراض قصور القلب الأكثر شيوعا في ضيق التنفس وتورم في القدمين والساقين بسبب تراكم السوائل.

يجب استعمال هذا الدواء بوصفة طبية.

ما هي آلية عمل أوبريو؟

يعمل أوبريو كمثبت لمادة نيريليزين ومستقبلات الأنجيوتنسين فهو يحتوي على الساكوبتريل والفالسارتان. باستخدام دواء أوبريو، تتوسع الأوعية الدموية وتتراكم كميات أقل من المياه في الجسم وهو ما يكون له تأثير


Upério®
 100 mg
 Sacubitril/ Valsartan
 28 Comprimés pelliculés

REXABAN® 15 mg et 20 mg **Comprimés pelliculaires** Boîte de 14, 28 et 56 (15 mg) Rivaroxaban

Le médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observez. Voir en fin de rubrique 4 comment déclarer les effets indésirables.

Consultez le feuillet d'information. L'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes.

Si le médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les symptômes paraissent identiques.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Ne prenez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin.

32700

quel cas est-il utilisé ?
 À prendre REXABAN® 15 mg et 20 mg ?

Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN® 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

NS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
 À prendre REXABAN® 15 mg et 20 mg ?

Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN® 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

LISTE DES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT LA PRISE DU MÉDICAMENT
 Contre-indications :
 Ne prenez jamais REXABAN 15 mg et 20 mg ;
 Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

NE PAS CE MÉDICAMENT ET PRÉVENIR VOTRE MÉDECIN
 Avant de prendre ce médicament

Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

POUR ENLEVER LE CALLOÏD SANGUIN DE VOS POUVOIRS EST DÉVU
 Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

POUR ENLEVER LE CALLOÏD SANGUIN DE VOS POUVOIRS EST DÉVU
 Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

SYMPTÔMES ET CONDUITE À SUIVRE EN CAS D'EFFETS INDÉSIRABLES
 Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4 - QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
 Description des effets indésirables

Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS POUVAIENT ÊTRE LE SIGNE DE DANGERS ALLÉRIQUES SÉVÈRES
 Effets indésirables éventuels pouvant être le signe d'une réaction allergique sévère

Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS POUVAIENT ÊTRE LE SIGNE DE DANGERS ALLÉRIQUES SÉVÈRES
 Effets indésirables éventuels pouvant être le signe d'une réaction allergique sévère

Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS POUVAIENT ÊTRE LE SIGNE DE DANGERS ALLÉRIQUES SÉVÈRES
 Effets indésirables éventuels pouvant être le signe d'une réaction allergique sévère

Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS POUVAIENT ÊTRE LE SIGNE DE DANGERS ALLÉRIQUES SÉVÈRES
 Effets indésirables éventuels pouvant être le signe d'une réaction allergique sévère

Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS POUVAIENT ÊTRE LE SIGNE DE DANGERS ALLÉRIQUES SÉVÈRES
 Effets indésirables éventuels pouvant être le signe d'une réaction allergique sévère

Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

REXABAN® 15 mg et 20 mg **Comprimés pelliculaires** Boîte de 14, 28 et 56 (15 mg) Rivaroxaban

Le médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observez. Voir en fin de rubrique 4 comment déclarer les effets indésirables.

Consultez le feuillet d'information. L'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes.

Si le médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les symptômes paraissent identiques.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Ne prenez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin.

32700

quel cas est-il utilisé ?
 À prendre REXABAN® 15 mg et 20 mg ?

Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN® 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

NS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
 À prendre REXABAN® 15 mg et 20 mg ?

Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN® 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

LISTE DES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT LA PRISE DU MÉDICAMENT
 Contre-indications :
 Ne prenez jamais REXABAN 15 mg et 20 mg ;
 Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

NE PAS CE MÉDICAMENT ET PRÉVENIR VOTRE MÉDECIN
 Avant de prendre ce médicament

Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

POUR ENLEVER LE CALLOÏD SANGUIN DE VOS POUVOIRS EST DÉVU
 Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

POUR ENLEVER LE CALLOÏD SANGUIN DE VOS POUVOIRS EST DÉVU
 Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

SYMPTÔMES ET CONDUITE À SUIVRE EN CAS D'EFFETS INDÉSIRABLES
 Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4 - QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
 Description des effets indésirables

Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS POUVAIENT ÊTRE LE SIGNE DE DANGERS ALLÉRIQUES SÉVÈRES
 Effets indésirables éventuels pouvant être le signe d'une réaction allergique sévère

Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS POUVAIENT ÊTRE LE SIGNE DE DANGERS ALLÉRIQUES SÉVÈRES
 Effets indésirables éventuels pouvant être le signe d'une réaction allergique sévère

Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS POUVAIENT ÊTRE LE SIGNE DE DANGERS ALLÉRIQUES SÉVÈRES
 Effets indésirables éventuels pouvant être le signe d'une réaction allergique sévère

Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS POUVAIENT ÊTRE LE SIGNE DE DANGERS ALLÉRIQUES SÉVÈRES
 Effets indésirables éventuels pouvant être le signe d'une réaction allergique sévère

Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS POUVAIENT ÊTRE LE SIGNE DE DANGERS ALLÉRIQUES SÉVÈRES
 Effets indésirables éventuels pouvant être le signe d'une réaction allergique sévère

Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

REXABAN® 15 mg et 20 mg **Comprimés pelliculaires** Boîte de 14, 28 et 56 (15 mg) Rivaroxaban

Le médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observez. Voir en fin de rubrique 4 comment déclarer les effets indésirables.

Consultez le feuillet d'information. L'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes.

Si le médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les symptômes paraissent identiques.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Ne prenez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin.

32700

quel cas est-il utilisé ?
 À prendre REXABAN® 15 mg et 20 mg ?

Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN® 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

NS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
 À prendre REXABAN® 15 mg et 20 mg ?

Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN® 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

LISTE DES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT LA PRISE DU MÉDICAMENT
 Contre-indications :
 Ne prenez jamais REXABAN 15 mg et 20 mg ;
 Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

NE PAS CE MÉDICAMENT ET PRÉVENIR VOTRE MÉDECIN
 Avant de prendre ce médicament

Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

POUR ENLEVER LE CALLOÏD SANGUIN DE VOS POUVOIRS EST DÉVU
 Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

POUR ENLEVER LE CALLOÏD SANGUIN DE VOS POUVOIRS EST DÉVU
 Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

SYMPTÔMES ET CONDUITE À SUIVRE EN CAS D'EFFETS INDÉSIRABLES
 Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4 - QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
 Description des effets indésirables

Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

PRÉVENIR IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN
 Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS POUVAIENT ÊTRE LE SIGNE DE DANGERS ALLÉRIQUES SÉVÈRES
 Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

LISTE GLOBALE DES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS
 Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

PRÉVENIR IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN
 Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

PRÉVENIR IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN
 Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vous pouvez prendre REXABAN 15 mg et 20 mg.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

b bottu_{ra}
82, Allée des Casuarinas - Ahl Sebda - Casablanca
S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

b bottu_{ra}
82, Allée des Casuarinas - Ahl Sebda - Casablanca
S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

عن طريق الفم

28 قرص ملين

10 ملع

فوركسيغا®
دبا غليفلوزين



Maphar
Bo Alkimia N° 6, Ol.
Sidi Berroussi, Casablanca
Forxiga 10 mg pel b28
P.P.V. : 418 96 06 DH
6 116001 185023

P101325

٥ قرص
فوركسيغا®
١٠ قرص
فوركسيغا®

Forxiga® 5mg
Forxiga® 10mg
Comprimés
pelliculés
dapagliflozine

P101325

عن طريق الفم

28 قرص ملين

10 ملع

فوركسيغا®
دبا غليفلوزين



Maphar
Bo Alkimia N° 6, Ol.
Sidi Berroussi, Casablanca
Forxiga 10 mg pel b28
P.P.V. : 418 96 06 DH
6 116001 185023

P101325

٥ قرص
فوركسيغا®
١٠ قرص
فوركسيغا®

Forxiga® 5mg
Forxiga® 10mg
Comprimés
pelliculés
dapagliflozine

P101325