

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
9/03/2023	S	4	200	INP : 09270000 INPE : 09270000 Asmaia F.S. Kadi Médecine Générale Centre Médical Al-Sabah Cas 106

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fourisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie ALI Smaïd - TLE GHALL QUEDAHL LTD - Pharmacie Hassan	09/03/2023	T. 332,00 317,70

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION

~~338100~~

ORDONNANCE

Age :

Nom :

CAS# Le :

9/03/83

Date de prochaine visite:
Cacheet
Kelli Benhouna

SV

~~73,00 x 3 = 219,00~~

~~SHESS~~

HARMACIE EL KADRI
Ame. EL KADRI A SIDI BEL ABDELLAH
Docteur en Pharmacie
21, Rue Jabel Ansarine
Dorb Gh. 6252051
Tél : 05 87335233



Medan: H.H.B.

SV

SV

SV

SV

SV

SV

SV

SV

SV

D-Stress®

Complément alimentaire destiné aux adultes et adolescents

Les nutriments apportés par D-stress permettent d'adopter rapidement l'organisme à une situation de stress et d'en diminuer les conséquences comme par ex-

D-Stress® Contient de la taurine, des vitaminesB.

Le magnésium et B2, B3, B6, contribue au fonctionnement nerveux.

Le magnésium et B5, B6, contribue à l'énergie et au fonctionnement énergétique et

L'acide pantothénique contribue à améliorer les performances intellectuelles.

La taurine et le magnésium et le préserve pendant les phases de stress, elle possède également une activité antioxydante.

L'arginine est un acide aminé régulateur du cortisol, médiateur du stress. Il permet également de diminuer l'absorption des graisses.

Conseils d'utilisation :

Pour adultes et adolescents :

2 comprimés par jour à répartir aux repas et à moduler selon vos besoins. Les doses peuvent être augmentées pour répondre à une

D-Stress®

DS10/22
10/2025
PPC : 119 DH

Lot: DLC:

Laboratoires SYNERGIA
43 BEAUNE sur ARZON – France

Distribué au Maroc par :

HYPHADIET

9, Rue Rahal Meskini – V.N- Fès
www.hyphadiet.com

الدواء للأكل 28

أليپراز
أليپرازولام 0,5 mg

28 comprimés sécables



Alprazolam


التركيبة:
أليپرازولام 0,5 ملخ
سواغات كمية كافية لمرض واحد
سواخ ذو تأثير معروف: لاكتوز
الكمية، طريقة الاستعمال، والتحذيرات الخاصة:
اقرأ النشرة الداخلية بدقة قبل الاستعمال.
عن طريق الفم.
شروط الحفظ:
يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25°C.

أليپراز
أليپرازولام



0,5 ملخ

28 قرصاً قابلاً للانكسار
عن طريق الفم



Alpraz® 0,5 mg
28 comprimés sécables

6 1118000 020530

سوطاما
Sothema

COMPOSITION :

Alprazolam 0,5 mg
Excipients q.s.p. 1 comprimé

EXCIPIENT A EFFET NOTOIRE : lactose.

POSOLOGIE, MODE D'ADMINISTRATION ET MISES EN GARDE SPECIALES :

Lire attentivement la notice avant utilisation.

VOIE ORALE.

CONDITIONS DE CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

E13510B00

LOT
EXP
PPV
2238391
172025
35070

Alpraz® Alprazolam



0,5 mg



28 Comprimés sécables
Voie orale

DURÉE MATIN MIDI SOIR AVANT APRÈS



Tenir hors de la portée et de la vue des enfants
بحفظ هذا الدواء بعيداً عن متناول ومرأى الأطفال

RESPECTER LES DOSES PRESCRIPTIONS

يجب احترام الجرعات الموصدة

Uniquement sur ordonnance - Tableau A (Liste I)
بصرف بموجب وصفة طبية - لائحة أ (قائمة I)

Durée de prescription limitée à 12 semaines
وصفة طبية محدودة إلى 12 أسبوعاً

115x70x22



Fabriqué par
Laboratoires **SOTHEMA**
B.P. N° 1, 27182 Bouskoura - Maroc
Sous licence des Laboratoires



Yodocefol®

200/400/2 microgrammes, Boîte de 28 comprimés
Iode, Acide folique, Vitamine B₁₂

Lire attentivement l'intégral

- Garder cette notice. Vous y trouverez des informations importantes sur ce médicament.
- Si vous avez un doute, contactez votre pharmacien.
- Ce médicament vous a-t-il causé des effets indésirables ?
- Si l'un des effets indésirables décrits dans cette notice vous concerne, contactez votre pharmacien.

SOMMAIRE DE LA NOTICE

1. Quelle classe pharmaco-thérapeutique est YODOCEFOL® ?
2. Qu'est ce que YODOCEFOL® et dans quel cas l'utilise-t-on ?
3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre YODOCEFOL® ?
4. Comment prendre YODOCEFOL® ?
5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
6. Comment conserver YODOCEFOL® ?
7. Informations supplémentaires.

1. QUELLE CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE DE YODOCEFOL® ?

Classe pharmaco-thérapeutique : Thérapie d'iode

Code ATC : H03CA

2. QU'EST CE QUE YODOCEFOL®, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

YODOCEFOL® comprimés est indiqué pour la prévention des troubles dûs à la carence en iode (TCI), acide folique et vitamine B₁₂ chez les femmes enceintes pendant le premier trimestre de grossesse et durant 1 mois avant la conception à titre de prévention des altérations dans le développement du système nerveux central du fœtus (défauts du tube neural et troubles neurologiques).

3. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE YODOCEFOL® ?

Ne pas prendre YODOCEFOL®, comprimé dans les cas suivants :

Si vous êtes allégié(e) à l'iode ou au potassium, acide folique, vitamine B₁₂ ou à l'un des



avant de prendre ce

au

en

z j

un

cela pourrait lui être nocif.

u à votre pharmacien.

dû :

le que vous devez prendre elle, appelez le centre Anti-Intoxication 37 68 64 64.

ment est très peu probable.

Poison et de

l'intoxication intentionnelle

La prise de doses très supérieures à celles recommandées par ce prospectus ou durant de longues périodes de temps peut provoquer une saveur métallique, démangeaison de la bouche et la gorge, sensibilité douloureuse aux dents et gencives, hypersalivation, irritation de la muqueuse nasale, éternuements et irritation oculaire avec gonflement des paupières (symptômes connus sous le nom de « iodisme »).

Il peut également provoquer de fortes migraines, toux, œdème pulmonaire (accumulation du liquide), ainsi que le gonflement et la sensibilisation des glandes parotides et submaxillaires peuvent également se produire.

L'inflammation du pharynx, du larynx, et des amygdales peut également se produire.

Des éruptions modérées peuvent se développer dans les zones séborrhéiques ; les éruptions graves sont rares.

L'irritation gastrique est fréquente avec des doses extrêmement élevées. Une diarrhée - parfois une diarrhée sanguinolente - peut se produire.

Les signes et les symptômes de l'iodisme normalement diminuent spontanément quelques jours après l'arrêt du traitement.

Les grandes doses d'iode de potassium pendant une longue période peuvent causer l'hyperplasie de la glande thyroïde (agrandissement), le goitre, et l'hypothyroïdisme grave.

Si vous avez oublié de prendre une dose de YODOCEFOL®,

Yodocefol®

200/400/2 microgrammes, Boîte de 28 comprimés
Iode, Acide folique, Vitamine B₁₂

Lire attentivement l'intégral

- Garder cette notice. Vous y trouverez des informations importantes sur ce médicament.
- Si vous avez un doute, contactez votre pharmacien.
- Ce médicament vous a-t-il causé des effets indésirables ?
- Si l'un des effets indésirables décrits dans cette notice vous concerne, contactez votre pharmacien.

SOMMAIRE DE LA NOTICE

1. Quelle classe pharmaco-thérapeutique est YODOCEFOL® ?
2. Qu'est ce que YODOCEFOL® et dans quel cas l'utilise-t-on ?
3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre YODOCEFOL® ?
4. Comment prendre YODOCEFOL® ?
5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
6. Comment conserver YODOCEFOL® ?
7. Informations supplémentaires.

1. QUELLE CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE DE YODOCEFOL® ?

Classe pharmaco-thérapeutique : Thérapie d'iode

Code ATC : H03CA

2. QU'EST CE QUE YODOCEFOL®, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

YODOCEFOL® comprimés est indiqué pour la prévention des troubles dûs à la carence en iode (TCI), acide folique et vitamine B₁₂ chez les femmes enceintes pendant le premier trimestre de grossesse et durant 1 mois avant la conception à titre de prévention des altérations dans le développement du système nerveux central du fœtus (défauts du tube neural et troubles neurologiques).

3. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE YODOCEFOL® ?

Ne pas prendre YODOCEFOL®, comprimé dans les cas suivants :

Si vous êtes allégié(e) à l'iode ou au potassium, acide folique, vitamine B₁₂ ou à l'un des



avant de prendre ce

au

en

z j

un

cela pourrait lui être nocif.

u à votre pharmacien.

dû :

le que vous devez prendre elle, appelez le centre Anti-Intoxication 37 68 64 64.

ment est très peu probable.

Poison et de

l'intoxication intentionnelle

La prise de doses très supérieures à celles recommandées par ce prospectus ou durant de longues périodes de temps peut provoquer une saveur métallique, démangeaison de la bouche et la gorge, sensibilité douloureuse aux dents et gencives, hypersalivation, irritation de la muqueuse nasale, éternuements et irritation oculaire avec gonflement des paupières (symptômes connus sous le nom de « iodisme »).

Il peut également provoquer de fortes migraines, toux, œdème pulmonaire (accumulation du liquide), ainsi que le gonflement et la sensibilisation des glandes parotides et submaxillaires peuvent également se produire.

L'inflammation du pharynx, du larynx, et des amygdales peut également se produire.

Des éruptions modérées peuvent se développer dans les zones séborrhéiques ; les éruptions graves sont rares.

L'irritation gastrique est fréquente avec des doses extrêmement élevées. Une diarrhée - parfois une diarrhée sanguinolente - peut se produire.

Les signes et les symptômes de l'iodisme normalement diminuent spontanément quelques jours après l'arrêt du traitement.

Les grandes doses d'iode de potassium pendant une longue période peuvent causer l'hyperplasie de la glande thyroïde (agrandissement), le goitre, et l'hypothyroïdisme grave.

Si vous avez oublié de prendre une dose de YODOCEFOL®,

Yodocefol®

200/400/2 microgrammes, Boîte de 28 comprimés
Iode, Acide folique, Vitamine B₁₂

Lire attentivement l'intégral

- Garder cette notice. Vous y trouverez des informations importantes sur ce médicament.
- Si vous avez un doute, contactez votre pharmacien.
- Ce médicament vous a-t-il causé des effets indésirables ? Contactez votre pharmacien.
- Si l'un des effets indésirables décrits dans ce prospectus vous concerne, contactez votre pharmacien.

SOMMAIRE DE LA NOTICE

1. Quelle classe pharmaco-thérapeutique est YODOCEFOL® ?
2. Qu'est ce que YODOCEFOL® et dans quel cas l'utilise-t-on ?
3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre YODOCEFOL® ?
4. Comment prendre YODOCEFOL® ?
5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
6. Comment conserver YODOCEFOL® ?
7. Informations supplémentaires.

1. QUELLE CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE DE YODOCEFOL® ?

Classe pharmaco-thérapeutique : Thérapie d'iode

Code ATC : H03CA

2. QU'EST CE QUE YODOCEFOL®, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

YODOCEFOL® comprimés est indiqué pour la prévention des troubles dûs à la carence en iode (TCI), acide folique et vitamine B₁₂ chez les femmes enceintes pendant le premier trimestre de grossesse et durant 1 mois avant la conception à titre de prévention des altérations dans le développement du système nerveux central du fœtus (défauts du tube neural et troubles neurologiques).

3. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE YODOCEFOL® ?

Ne pas prendre YODOCEFOL®, comprimé dans les cas suivants :

Si vous êtes allégié(e) à l'iode ou au potassium, acide folique, vitamine B₁₂ ou à l'un des



avant de prendre ce

au

en

z j

un

cela pourrait lui être nocif.

u à votre pharmacien.

dû :

le que vous devez prendre elle, appelez le centre Anti-Intoxication 37 68 64 64.

ment est très peu probable.

Poison et de

l'intoxication intentionnelle

La prise de doses très supérieures à celles recommandées par ce prospectus ou durant de longues périodes de temps peut provoquer une saveur métallique, démangeaison de la bouche et la gorge, sensibilité douloureuse aux dents et gencives, hypersalivation, irritation de la muqueuse nasale, éternuements et irritation oculaire avec gonflement des paupières (symptômes connus sous le nom de « iodisme »).

Il peut également provoquer de fortes migraines, toux, œdème pulmonaire (accumulation du liquide), ainsi que le gonflement et la sensibilisation des glandes parotides et submaxillaires peuvent également se produire.

L'inflammation du pharynx, du larynx, et des amygdales peut également se produire.

Des éruptions modérées peuvent se développer dans les zones séborrhéiques ; les éruptions graves sont rares.

L'irritation gastrique est fréquente avec des doses extrêmement élevées. Une diarrhée - parfois une diarrhée sanguinolente - peut se produire.

Les signes et les symptômes de l'iodisme normalement diminuent spontanément quelques jours après l'arrêt du traitement.

Les grandes doses d'iode de potassium pendant une longue période peuvent causer l'hyperplasie de la glande thyroïde (agrandissement), le goitre, et l'hypothyroïdisme grave.

Si vous avez oublié de prendre une dose de YODOCEFOL®,