

Signature de l'adhérent(e) :

Clinique Pédiatrique Ajial

Casablanca Le: 12/01/2023

Pré-Facture N° 117205

Etablie par CHAIMAA RECEPTION Page 1/1

Identification

N° Dossier : X3A12903

MUPRAS1

N° Identifiant : 1608556/16

Nom & Prénom : MOUTAOUAKIL YANISS

C.I.N. : BK68035

Date Début : 12/01/2023

Date Fin : 12/01/2023

Adresse : LOT EL MANAR RUE 1 NR 82 AIN CHOK

Traitement : Consultation

Médecin : GAAD KELTOUM

Prestations	Qté	Prix U.	L.C.	Coef	Montant
MEDICAL					
Frais clinique	1	100,00			100,00
Total Rubrique :					100,00
PARTIE CLINIQUE :					100,00
HONORAIRES MEDICAUX					
Dr. GAAD KELTOUM (PEDIATRE)	1	250,00			250,00
Total Rubrique :					250,00
PARTIE HONORAIRES ET ACTES EXTERNES:					250,00
TOTAL FACTURE					350,00

Arrêtée la présente Pré-Facture à la somme de :

Trois cent cinquante Dirhams

Cachet et signature



BMCI AGENCE 2 MARS MECHOUAR COMPTE 013780010930003340017148 INPE 090062324

TEL 0522-87-81-81 FAX : 0522-87-25-00 PATENTE 34082175 IF 15243373 ICE 001695598000041

أجبال AJIAL



مصحة الطفل و الرضيع
CLINIQUE PEDIATRIQUE

Casablanca, le : 12-01-2023

Moutasnakil yamiss

1) Clavonlin sachets 500
ou Augmentin sachets 800
2x75,90 15 x 3/5 x 6 jours

2) Doliprane 300mg
22,50 15 x 4/5
3) Bimfen shop
182,30 1. Cas x 3/5 à alterner
avec Doli toutes les 4h
38,50

347, Boulevard Panoramique, Casablanca - Maroc
Tél. : +212 522 87 81 81 / +212 522 21 00 21 / Fax : +212 522 87 25 00
direction@clinique-ajial.ma / www.clinique-ajial.ma

PPV (DH) :

Lot N° :

UT. AV :

BRUFEN®

100 mg/5 ml Ibuprofène

Suspension pédiatrique

يرتبي في مزاجي و متناول الأطفال

من 12-8 سنة De 8 à 12 ans	من 3-7 سنوات De 3 à 7 ans	من 1-2 سنة** de 1 à 2 ans
		 نصف ملعقة صغيرة 1/2 petite cuillère
من 3 إلى 4 مرات في اليوم De 3 à 4 fois par jour		

* petite cuillère = 5 ml
** N'est pas recommandé pour les
enfants dont le poids est inférieur à 7Kg

* ملعقة صغيرة = 5 ملل
** لا ينصح به للأطفال الذين
يقل وزنهم عن 7 كغ

 COOPER
PHARMA

مصنوع من طرف كوير فارما بنزديس
41، شارع محمد الديوري 20110، الدار البيضاء
صيدلي مسؤول : أمينة الداوي

BRUFEN^{100 mg/5 ml Ibuprofène}
Suspension pédiatrique
150 ml



6 118000 080039

enfant

..... sachet(s) fois
par jour à prendre de
préférence au début des
repas, pendant
jours.

... كيس ... مرات في اليوم، من الأفضل قبل الأكل، مدة ... يوم

Uniquement sur ordonnance

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

PPU: 79,90 DH
LOT: 651117
PER: 06/24



- الشان الأسود (شعر أو السان)
- ثوان الأسنان (نوى الأسنان)، ويقتضي عموماً تدفيس الأسنان.
- الآثار الجلدية التي يمكن أن تظهر عند إجراء تشخيص الدم أو البول:
- انخفاض مهم في عدد الكريات البيضاء
- انخفاض عدد الكريات الحمراء (فقر الدم الانحلالي)
- بلورات في البول
- التصريح بالآثار الجلدية:
- إن شعر ظفرك باي أثر غير مستحب، المرجو إخبار الطبيب أو الصيدلي.
- يتحقق ذلك على أي أثر غير مستحب لم يرد ذكره بهذه التسمية
- يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار الجلدية مباشرة عن نظام الإبلاغ الوطني أو بطي العون:
- GlaxoSmithKline Maroc 42-44
- تقاطع بوليفارد الرشيد وشارع أبو حنيفة الغزالي
- دار البيضاء 20000 أو على البريد الإلكتروني: pharmacovigilance.ma@gsk.com
- 5. كيف يمكن حفظ أوغمنتين؟
- يحفظ بعيداً عن متناول ومراعي الأمان.
- يرجى عدم استعمال هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدرج على العلوة. يرجع تاريخ انتهاء شروط الحفظ:
- أوغمنتين 100 ملغرام / 12,50 ملغرام لكل مل، مسحوق لمستحق قبل الشرب في قبينة:
- قبل التحضير: يحفظ داخل العلوة في حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية بعيداً عن الرطوبة
- بعد التحضير: يحفظ المسحوق المحضر 7 أيام كحد أقصى في درجة حرارة ما بين 2+ و 8+ مئوية
- أوغمنتين 500 ملغرام / 62,5 ملغرام مسحوق معلق للتحليل أو طريقة الفموي لكيس ذات
- يحفظ في حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية بعيداً عن الرطوبة.
- لا ينبغي رمي الأدوية في مسالك الصرف الصحي أو مع النفايات المنزلية. اطلب المشورة من الصيدلي المستعمل.
- قد تساعد هذه التناوب في حماية البيئة.
- 6. معلومات إضافية
- ما الذي ينبغي عليه أوغمنتين 100 ملغرام / 12,5 ملغرام لكل مل، مسحوق لمستحق قبل الشرب
- العوارض الشبيهة هي:
- أموكسيسيلين
- 100,00 ملغرام
- جميع أشكال أموكسيسيلين ثلاثي الهيدروكلوريد
- 12,50 ملغرام
- على شكل كاتالونات الوناسيوم
- لكل 1 مل من المسحوق المحضر.
- المكونات الخدمية:
- كريسوفينون، كارمينور، صمغ الزاثن، السيليكات الغروية اللاصقة، ستيرات المغنيسيوم
- (تتميز بشكل خاص على مالتوكسيلين)، هلام السيليك، الأسبارتام



N200883-01

AUGMENTIN 100mg/12.50mg par ml Nourrison, **بودرة** pour suspension buvable en flacon de 30 ml
AUGMENTIN 100mg/12.50mg par ml Enfant, **بودرة** pour suspension buvable en flacon de 60 ml
AUGMENTIN 500mg/62.5mg Enfant, **بودرة** pour suspension buvable en sachet-dose, boîte de 12 sachets.
Amoxicilline/Acide clavulanique

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin.
- Ce médicament est généralement prescrit pour un bébé ou un enfant. Ne le donnez pas à un adulte. Si votre enfant présente un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin.
- Si votre enfant présente un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin.

2. Qu'est-ce que AUGMENTIN et dans quels cas est-il utilisé ?
3. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser AUGMENTIN ?
4. Comment utiliser AUGMENTIN ?
5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
6. Comment conserver AUGMENTIN ?
7. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. **QU'EST-CE QUE AUGMENTIN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**
Classe pharmacothérapeutique : Associations de pénicillines, inhibiteurs de béta-lactamase.
AUGMENTIN est un antibiotique qui tue les bactéries responsables des infections. Il contient amoxicilline et acide clavulanique. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés pénicillines. L'acide clavulanique appartient à un groupe de médicaments appelés inhibiteurs de béta-lactamase. L'autre constituant actif (l'acide clavulanique) agit en synergie avec l'amoxicilline pour traiter les infections suivantes :

- infections de l'oreille moyenne et des sinus.
- infections des voies respiratoires,
- infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections dentaires.
- infections des os et des articulations.

2. **QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER AUGMENTIN ?**
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le. Ne donnez jamais AUGMENTIN à votre enfant :
- s'il est allergique à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un de ses composants.

- s'il a déjà présenté une réaction allergique grave à un autre antibiotique. Ceci peut être dû à la présence d'un autre antibiotique dans le médicament.
- s'il a déjà eu des problèmes au foie ou développé un ictère (jaunissement de la peau et des yeux).
En cas de doute, demandez conseil à son médecin, au pharmacien ou à l'infirmière.

Avertissements et précautions
Demandez conseil au médecin de votre enfant, au pharmacien ou à l'infirmière avant d'utiliser AUGMENTIN si votre enfant :
- souffre de mononucléose infectieuse,
- est traité(e) pour des problèmes au foie ou aux reins,
- n'urine pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser AUGMENTIN. Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le type de bactérie responsable de l'infection. Selon les résultats, il pourra prescrire à votre enfant un dosage différent d'AUGMENTIN. Réactions nécessitant une attention particulière : AUGMENTIN peut aggraver certaines maladies ou engendrer des effets secondaires graves, des convulsions et une inflammation du gros intestin. Lorsque votre enfant est traité(e) avec AUGMENTIN, surveillez certains symptômes afin de réduire les risques. Voir « Réactions nécessitant une attention particulière ».

Tests sanguins et urinaires
Si votre enfant effectue des analyses de sang (nombre de globules rouges ou exploration de l'urine (dosage du glucose), vous devez informer le médecin ou l'infirmière avant d'utiliser AUGMENTIN peut influencer sur les résultats de ces types de tests.

Autres médicaments et AUGMENTIN :
Informez votre médecin ou votre pharmacien si votre enfant prend ou a récemment pris un médicament. Si votre enfant prend de l'allopurinol (en traitement de la goutte) avec AUGMENTIN, le traitement de la goutte peut être plus efficace. Si votre enfant prend du probénécide (en traitement de la goutte) avec AUGMENTIN, les analyses sanguines destinées à empêcher la coagulation du sang (tels que la warfarine) peuvent être affectées. Les analyses sanguines supplémentaires peuvent être requises. AUGMENTIN peut influencer sur l'action du méthotrexate (un médicament utilisé pour traiter les rhumatismes).

AUGMENTIN peut influencer sur l'action du mycophénolate mofétil (traitement pour prévenir le rejet d'un organe transplanté). Si votre enfant, avant de recevoir ce médicament, est traité(e) avec AUGMENTIN, il est possible qu'il ait besoin d'un traitement supplémentaire. **Grossesse, allaitement et fertilité**
Si votre enfant, avant de recevoir ce médicament, est traité(e) avec AUGMENTIN, il est possible qu'il ait besoin d'un traitement supplémentaire. **AUGMENTIN contient :**
AUGMENTIN 100mg/12.5mg Nourrison, **بودرة** pour suspension buvable en flacon de 30 ml
AUGMENTIN 100mg/12.5mg Enfant, **بودرة** pour suspension buvable en flacon de 60 ml
Ce médicament contient 3.2 mg d'aspartame par ml. L'aspartame contient une source d'acide aminé (l'acide aspartique) qui peut être éliminée correctement. Ce médicament contient 1.7 mg de benzoate de sodium par ml. Le benzoate de sodium peut provoquer une réaction allergique chez les nouveau-nés (jusqu'à 4 semaines).

enfant

..... sachet(s) fois
par jour à prendre de
préférence au début des
repas, pendant
jours.

... كيس ... مرات في اليوم، من الأفضل قبل الأكل، مدة ... يوم

Uniquement sur ordonnance

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

PPU: 79,90 DH
LOT: 651116
PER: 06/24



من مشاكل

- للآثار الجانبية (القيء، الغثاس، والطفح)، ويطبق عموماً عند فترات الأسبوع.
- الآثار الجانبية التي تحدث في بعض الأحيان بعد تناول الدواء أو بعد تناول الدواء.
- انخفاض معدل الكريات البيضاء.
- انخفاض معدل الكريات الحمراء (فقر الدم الانحلالي).
- تورم في البول.
- التورم في الجذبة.
- إن شعر منك شيء آخر غير مستحب، المرجو إخبار الطبيب أو الصيدلي.
- ينطبق ذلك على أي أثر غير مستحب لم يرد ذكره، بهذه الطريقة.
- يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني أو على الهاتف: 42-44 GlaxoSmithKline Maroc.
- الدار البيضاء 20000 أو على البريد الإلكتروني: pharmacovigilance.na@gsk.com
- 5. يجب ملئ ملف أو غلاف.
- بعض دواء غير متوافق مع دواء آخر.
- يرجى عدم استعمال هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدرج على العلوة. يرجى تاريخ انتهاء الصلاحية.
- أو استعمال 100 ملغرام / 12,50 ملغرام لكل مل، مسحوق لستيفيل قبل الشرب في كمية.
- بعد التحضير، يضاف المسحوق في حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية وبعدنا عن الرطوبة.
- أو استعمال 500 ملغرام / 62,50 ملغرام مسحوق معقون لتناول عن طريق الفم أو كغذاء.
- يحفظ في حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية وبعدنا عن الرطوبة.
- لا ينبغي رمي الدواء في مياه الصرف الصحي أو مع النفايات المنزلية. تلك المشورة من الد.
- المستعملة، قد تساعد هذه التعليمات في حماية البيئة.
- 6. معلومات إضافية:
- ما الذي يحتوي عليه أو غلاف 100 ملغرام / 12,50 ملغرام لكل مل، مسحوق لستيفيل.
- أو كاستيفيل.
- على شكل مسحوق لستيفيل ثلاثي الهيدرات.
- 100,00 ملغرام.
- محض كافو لاثان الواتسون.
- على شكل كافو لاثان الواتسون.
- لكل 1 مل من المسحوق المحضر.
- المكونات الأخرى هي:
- كروموفون، كارمو، الصوديوم، صمغ الزايت، السيليكا الغروية اللاصقة، ستيرات المغنيسيوم، غلام السيليكا، الأيسونتر.



AUGMENTIN 100mg/12,50mg par ml Nourrison, poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml
AUGMENTIN 100mg/12,50mg par ml enfant, poudre pour suspension buvable en flacon de 60 ml
AUGMENTIN 500mg/62,50mg enfant, poudre pour suspension buvable en sachet-dose, boîte de 12 sachets.
moxicilline/Acide clavulanique

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.
Informations importantes pour vous:
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser AUGMENTIN ?
- Comment utiliser AUGMENTIN ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver AUGMENTIN ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

1. **QUEST-CE QUE AUGMENTIN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**
Classe pharmacothérapeutique : Associations de pénicillines, inhibiteurs de béta-lactamase.
AUGMENTIN est un antibiotique qui tue les bactéries responsables des infections. Il contient amoxicilline et acide clavulanique. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés pénicillines. L'acide clavulanique appartient à un groupe de médicaments appelés inhibiteurs de béta-lactamase. L'autre constituant actif (l'acide clavulanique) agit en synergie avec l'amoxicilline pour empêcher les bactéries de développer une résistance à l'action de l'antibiotique.
AUGMENTIN est utilisé chez l'adulte et chez l'enfant pour traiter les infections suivantes :
- infections de l'oreille moyenne et des sinus,
- infections des voies respiratoires,
- infections des voies urinaires,
- infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections dentaires,
- infections des os et des articulations.

2. **QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER AUGMENTIN ?**
Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de commencer le traitement.
Ne donnez jamais AUGMENTIN à votre enfant :
- s'il est allergique à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un des autres composants du médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- s'il a déjà présenté une réaction allergique grave à un autre antibiotique. Ceci peut entraîner le gonflement du visage ou de la gorge.
- s'il a déjà eu des problèmes au foie ou développé un icterus (jaunissement de la peau).

→ Ne donnez pas AUGMENTIN à votre enfant s'il est dans l'une des situations suivantes :
- en cas de doute, demandez conseil à son médecin, au pharmacien ou à l'infirmière avant de commencer le traitement.
- souffre de mononucléose infectieuse,
- est traité(e) pour des problèmes au foie ou aux reins,
- n'a pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant d'administrer le médicament.
Selon les résultats, il pourra prescrire à votre enfant un dosage différent d'AUGMENTIN.
AUGMENTIN peut aggraver certaines maladies ou engendrer des effets secondaires. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien ou à l'infirmière avant de commencer le traitement.
AUGMENTIN peut influencer sur les résultats de ces types de tests :
- tests sanguins et urinaires.

Autres médicaments et AUGMENTIN
Informez votre médecin ou votre pharmacien si votre enfant prend ou a récemment pris un autre médicament.
Si votre enfant prend de l'allopurinol (en traitement de la goutte) avec AUGMENTIN, le risque de réaction allergique est plus élevé.
Si votre enfant prend du probénécide (en traitement de la goutte), son médecin peut lui prescrire un dosage différent d'AUGMENTIN.
Si vous prenez des médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tel que la warfarine), demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de commencer le traitement.

Grossesse, allaitement et fertilité
Si votre enfant est enceinte ou allaité, ou si elle envisage de devenir enceinte, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de commencer le traitement.
AUGMENTIN peut influencer sur l'action du méthotrexate (un médicament utilisé pour traiter les rhumatismes).

AUGMENTIN 100mg/12,50mg Nourrison, poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml
Enfant, poudre pour suspension buvable en flacon de 60 ml
- Le médicament contient 3,2 mg d'aspartame par ml.
- Le médicament contient 3,2 mg d'aspartame par ml.
- Le médicament contient 1,7 mg de benzocaïne de sodium par ml. La benzocaïne de sodium peut provoquer une irritation de la peau et des yeux chez les nouveau-nés (jusqu'à 4 semaines).