

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS.

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M22- 0035138

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 4828 Société : 153382

☐ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : CHAKIB

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 064453433 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 04/03/2023

Nom et prénom du malade : HALIME Faouzia Age :

Lien de parenté :

☐ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie :

Mylome Multiple

Pathologie :

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC

Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA

Le : 04/03/2023

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
04/03/23			Contrôle	
06/03/23			400,00	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie KASSADI 20, Réjane, Casablanca Tél: 05 22 77 52 54	06/03/23	975,30

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Labo d'Analyses Médicales EL KHAFI Amal Boulevard Ben Boukhal Hamidi N° 52-54 El Qods Sidi Bernoussi Casablanca 05 22 75 86 77 - Fax: 05 22 77 52 54	04/03/23	8,3/0	366,50

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
				Coefficient DES TRAVAUX <input type="text"/>														
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>														
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>														
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>														
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>		H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		Coefficient DES TRAVAUX <input type="text"/>	
	H																	
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D	G																
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>															
			DATE DU DEVIS <input type="text"/>															
		DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>																

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



مختبر يافا للتحليلات الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES Yafa

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE - HORMONOLOGIE

Dr. Amal El Khafif Ramdani

د. أمال الخفيف رمضان

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

Prélèvement du : 04-03-2023

Edition : 04-03-2023

Mme HALIME Faouzia

Code Patient 1705020160 Référence : 2303040050

Prescripteur : Pr ZAFAD SAADIA

Page : 3/3

Bilirubine libre (indirecte)

3.03 mg/L
5.15 $\mu\text{mol/L}$

(<7.00)

(<11.90)

04-02-2023

1.30

Laboratoire d'Analyses Médicales Yafa
Dr EL KHAFIF Amal
P. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52 - 54
Hay El Qods Sidi El Bernoussi Casablanca
Tél : 05 22 75 86 77 - Fax : 05 22 76 84 39

Horaire continu : du Lundi au Vendredi : 7h30 - 17h00 / Samedi : 7h30 - 13h Prélèvement par Dr Amal EL KHAFIF

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54, Moubaraka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca

Tél.: 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboyafa@hotmail.com



مختبر يافا للتحليلات الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YAF A

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE - HORMONOLOGIE

Dr. Amal El Khafif Ramdani

د. أمال الخفيف رمضاني

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

Prélèvement du : 04-03-2023

Edition : 04-03-2023

Mme HALIME Faouzia

Code Patient 1705020160 Référence : 2303040050

Prescripteur : Pr ZAFAD SAADIA

Page : 2/3

BIOCHIMIE SANGUINE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Urée

(Enzymatique Cobas C311)

0.18 g/l
3.00 mmol/l

(0.20-0.50)
(3.33-8.33)

04-02-2023

0.11

Créatinine


(Cinétique Cobas C311)

3.8 mg/L
33.6 μmol/L

(5.0-11.0)
(44.3-97.4)

04-02-2023

3.8



Transaminases GPT (ALAT)

(Cinétique Cobas C311)

7.3 UI/L

(7.0-35.0)

04-02-2023

20.4

Transaminases GOT (ASAT)

(Cinétique Cobas C311)

14.5 UI/L

(10.0-35.0)

04-02-2023

27.2

Bilirubine totale

(Diazoréaction Cobas C311)

4.90 mg/l
8.33 μmol/l

(<8.80)
(<14.96)

04-02-2023

10.19

Bilirubine conjuguée (directe)

(Diazoréaction Cobas C311)

1.87 mg/l
3.18 μmol/l

(<3.00)
(<5.10)

04-02-2023

8.89

Horaire continu : du Lundi au Vendredi : 7h30 - 17h00 / Samedi : 7h30 - 13h

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54, Moubaraka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca

Tél.: 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboyafa@hotmail.com

Laboratoire d'Analyses Médicales YAF A
Dr. EL KHAFIF Amal
Ed. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54
Hay Al Qods Sidi Bernoussi Casablanca
Tél : 05 22 75 86 77 - Fax : 05 22 76 84 39



مختبر يافا للتحليلات الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YAF A

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE - HORMONOLOGIE

Dr. Amal El Khafif Ramdani

د. أمال الخفيف رمضاني

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

Prélèvement du : 04-03-2023

Edition : 04-03-2023

Mme HALIME Faouzia

Code Patient 1705020160 Référence : 2303040050

Prescripteur : Pr ZAFAD SAADIA

Page : 1/3

HEMATOCYTOLOGIE

Hemogramme

			04-02-2023
Hématies :	4.41 M/mm3	(4.00-5.30)	4.34
Hémoglobine :	12.9 g/dL	(12.5-15.5)	13.0
Hématocrite :	40.8 %	(37.0-46.0)	39.4
-VGM :	92.5 fL	(80.0-95.0)	90.8
-TCMH :	29.3 pg	(28.0-32.0)	30.0
-CCMH :	31.6 g/dL	(30.0-35.0)	33.0
Leucocytes :	6 940 /mm3	(4 000-10 000)	14 340
Polynucléaires Neutrophiles :	52.5 %	(40.0-75.0)	85.5
Soit:	3 644 /mm3	(2 000-7 500)	12 261
Polynucléaires Eosinophiles :	4.3 %	(1.0-4.0)	1.4
Soit:	298 /mm3	(100-400)	201
Polynucléaires Basophiles :	1.3 %	(0.0-1.0)	0.2
Soit:	90 /mm3	(0-100)	29
Lymphocytes :	29.7 %	(20.0-45.0)	7.5
Soit:	2 061 /mm3	(1 500-4 000)	1 076
Monocytes :	12.2 %	(2.0-8.0)	5.4
Soit:	847 /mm3	(200-800)	774
Plaquettes :	198 000 /mm3	(160 000-350 000)	470 000
(Cytometrie en flux XT2000Sysmex)			
IDP	19.9 fL	(9.0-14.0)	14.4
VPM	13.3 fL	(8.0-12.0)	11.2
P-RGC	47.8 %	(12.0-35.0)	34.8

Laboratoire d'Analyses Médicales YAF A
Dr EL KHAFIF Amal
Bd Mbarek Ben Boudjemadi N° 52-54
Max El Qods Sidi Bernoussi Casablanca
Tél : 05 22 76 84 39 Fax : 05 22 76 84 39

Horaire continu : du Lundi au Vendredi : 7h30 - 17h00 / Samedi : 7h30 - 13h Prélèvement par Docteur Amal EL KHAFIF

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54, Moubaraka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca

Tél.: 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboyafa@hotmail.com



مختبر يافا للتحليلات الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YAFA

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE - HORMONOLOGIE

Dr. Amal El Khafif

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

د. أمال الخفيف

Patente : 31606078 - IF : 53000550 - CNSS : 2064872 - ICE : 001540529000093

FACTURE N° : 230300315

Casablanca le 04-03-2023

Mme HALIME Faouzia

Demande N° : 2303040050

Date de l'examen : 04-03-2023

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
PS	Prélèvement	E10	E
B103	Bilirubine (Totale Directe et Indirecte)	B70	B
B111	Créatinine	B30	B
B135	Urée	B30	B
B146	Transaminases O (TGO)	B50	B
B147	Transaminases P (TGP)	B50	B
B216	Numération Formule (Globules rouges/Blancs/plaquettes)	B80	B

Total des B : 310

Total dossier: 366.50 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :

trois cent soixante-six dirhams cinquante centimes

INPE
093003440

Laboratoire d'Analyses Médicales
Dr. El Khafif
Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54,
Moubaraka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca
Tél : 05 22 75 86 77 - Fax : 05 22 76 84 39


تاريخ إجراء التحاليل
غير قابل للتغيير

أوقات العمل : من الإثنين إلى الجمعة : 7h30 - 18h30 / السبت 7h30 - 14h أخذ العينات في المنزل بالميعاد

Horaire continu : du Lundi au Vendredi : 7h30 - 18h30 / Samedi : 7h30 - 14h Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54, Moubaraka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca

Tél.: 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboyafa@hotmail.com



F A C T U R E

N° : 3489 / 2023 du 06/03/2023

Nom patient **HALIME FAOUZIA**
PAYANT

Entrée 06/03/2023

Sortie 06/03/2023

CONSULTATION PR ZAFAD S

Désignation des prestations	Nombre	Lettre Clé	Prix Unitaire	Montant
CONSULTATION PR ZAFAD S	1,00	CSZS	400,00	400,00
			Sous-Total	400,00
Total Clinique				400,00

Arrêtée la présente facture à la somme de :

QUATRE CENTS DIRHAMS

Total 400,00

Compte bancaire : AWB 007780000330300000022736 , AGENCE MÈCQUE- CASA

Dr. S. Agnès Agnès
Professeur Agrégé
Hématologie - Oncologie
CLINIQUE AL MADINA
Tél: 05 22 77 77 40 à 49

Docteur Saadia ZAFAD

Professeur Agrégée
Hématologie Clinique
Adultes-Enfants
Oncologie pédiatrique
Greffe de Moelle

الدكتورة السعدية زفاد

أستاذة مبرزة
أمراض الدم
البالغين و الأطفال
سرطان الطفل
زراعة النخاع

Casablanca, le.....

06 mars 2023

Mme HALIME Faouzia

432,00 x 2
83,60

1/ VALEX 500 MG COMPRIME ENROBE

27,70 1 cp/j x 3 mois

2/ CARDIOASPIRINE 100 MG COMPRIME GASTRO-RESISTANT

1 cp/j x 1 mois

T = 975,30



Mme Halime faizig

NFS + R
Mme Creat
~~BAT~~ - AUT - BT

Dr. SADDI
Hematologie - Oncologie
Clinique Al Madina
Tél: 05 22 75 86 77 - Fax: 05 22 76 84 39

Laboratoire d'Analyse Médicale: YAFI
Dr EL KHALIL Amal
Bd Mbarek Ben Boudiaf n° 52-54
Hay El Qods Sidi Berni - Casablanca
Tél: 05 22 75 86 77 - Fax: 05 22 76 84 39

RDV &

0613123

Consultation + HDS

Valex® 500 mg

Boîtes de 7, 14 et 42 Comprimés enrobés

Valaciclovir

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacie.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Valex et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Valex 500 mg comprimé enrobé ?
3. Comment prendre Valex 500 mg comprimé enrobé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Valex 500 mg comprimé enrobé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Valex et dans quels cas est-il utilisé ?

Classe Pharmacothérapeutique :

Antiviral à usage systémique.

Classe pharmacothérapeutique : Nucléosides et nucléotides, inhibiteurs de la transcriptase inverse exclus, Code ATC : J05AB11.

Valex appartient à la famille des médicaments appelés antiviraux.

Son mécanisme d'action consiste à détruire ou arrêter la croissance des virus appelés *Herpes simplex* (HSV), Varicelle-Zona (VZV) et Cytomégalovirus (CMV).

Valex peut être utilisé pour :

- Traiter le zona (chez l'adulte),
- Traiter les infections cutanées à HSV et l'herpès génital (chez l'adulte et l'adolescent de plus de 12 ans). Il est également utilisé pour aider à prévenir toute récurrence de ces infections.
- Traiter les boutons de 12 ans),
- Prévenir toute infection l'adulte et l'adolescent
- Traiter et prévenir les récurrences.

2. Quelles sont les informations

500 mg, comprimé en

Ne prenez jamais Valex

- Si vous êtes allergique à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez déjà développé une fièvre, un gonflement

augmentation des taux d'enzymes (réaction médicamenteuse systémiques) après avoir pris ce médicament.

Ne prenez pas Valex si vous avez déjà pris un autre médicament avec Valex. Parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin si :

- Vous souffrez de problèmes de vision.
- Vous souffrez de problèmes de circulation.
- Vous avez plus de 65 ans.
- Vous êtes immunodéprimé(e).

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Faites très attention avec Valex.

Des réactions médicamenteuses systémiques (DRESS) ont été observées avec Valex.

valaciclovir. Ces réactions se manifestent par des symptômes grippaux et d'éruption cutanée.

qui s'étend par la suite en s'accompagnant d'une augmentation des taux d'enzymes (transaminases) et d'un gonflement des ganglions.

Si vous développez une éruption cutanée, un gonflement des ganglions ou d'autres symptômes, contactez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous développez une éruption cutanée, un gonflement des ganglions ou d'autres symptômes, contactez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

par valaciclovir et contactez votre médecin ou votre pharmacien.

professionnel de santé.

Enfants :

Sans objet.

Prévenir la transmission de l'infection

Si Valex vous a été prescrit pour traiter une infection à virus de l'herpès, vous devez prendre des mesures pour éviter la transmission de l'infection à d'autres personnes.

Si vous avez des antécédents de rapports sexuels protégés, notez-les dans votre dossier médical. Ces mesures sont importantes pour protéger vous-même et d'autres personnes.

Ces mesures sont importantes pour protéger vous-même et d'autres personnes. Vous devez éviter tout contact avec les personnes atteintes de boutons ou de lésions cutanées.

Autres médicaments et Valex

Si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

LOT 22011
F E R 07/25
F F V 432DH00

Valex® 500 mg

Boîtes de 7, 14 et 42 Comprimés enrobés
Valaciclovir

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacie.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Valex et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Valex 500 mg comprimé enrobé ?
3. Comment prendre Valex 500 mg comprimé enrobé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Valex 500 mg comprimé enrobé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Valex et dans quels cas est-il utilisé ?

Classe Pharmaco thérapeutique :

Antiviral à usage systémique.

Classe pharmacothérapeutique : Nucléosides et nucléotides, inhibiteurs de la transcriptase inverse exclus, Code ATC : J05AB11.

Valex appartient à la famille des médicaments appelés antiviraux.

Son mécanisme d'action consiste à détruire ou arrêter la croissance des virus appelés *Herpes simplex* (HSV), Varicelle-Zona (VZV) et Cytomégalovirus (CMV).

Valex peut être utilisé pour :

- Traiter le zona (chez l'adulte),
- Traiter les infections cutanées à HSV et l'herpès génital (chez l'adulte et l'adolescent de plus de 12 ans). Il est également utilisé pour aider à prévenir toute récurrence de ces infections.

augmentation des taux d'enzymes (réaction médicamenteuse à des symptômes systémiques) après avoir pris Valex.
Ne prenez pas Valex si vous êtes enceinte ou si vous envisagez de le faire. Parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de commencer votre traitement avec Valex.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien pour plus d'informations :

- Vous souffrez de problèmes rénaux ou hépatiques.
- Vous souffrez de problèmes cardiaques.
- Vous avez plus de 65 ans.
- Vous êtes immunodéprimé(e).

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Faites très attention avec Valex.

Des réactions médicamenteuses graves (DRESS) ont été observées avec Valex.

Les symptômes de DRESS sont des symptômes grippaux et d'éruption cutanée qui s'étend par la suite en s'aggravant.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Si vous développez une éruption cutanée, une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température corporelle et d'un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez de prendre Valex et contactez immédiatement votre professionnel de santé.

LOT 22011
PER 07/25
IFV 432DH00

Valex® 500 mg

Boîtes de 7, 14 et 42 Comprimés enrobés
Valaciclovir

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacie.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Valex et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Valex 500 mg comprimé enrobé ?
3. Comment prendre Valex 500 mg comprimé enrobé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Valex 500 mg comprimé enrobé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Valex et dans quels cas est-il utilisé ?

Classe Pharmaco thérapeutique :

Antiviral à usage systémique.

Classe pharmacothérapeutique : Nucléosides et nucléotides, inhibiteurs de la transcriptase inverse exclus, Code ATC : J05AB11.

Valex appartient à la famille des médicaments appelés antiviraux. Son mécanisme d'action consiste à détruire ou arrêter la croissance des virus appelés *Herpes simplex* (HSV), *Varicelle-Zona* (VZV) et *Cytomégalo virus* (CMV).

Valex peut être utilisé pour :

- Traiter le zona (chez l'adulte),
- Traiter les infections cutanées à HSV et l'herpès génital (chez l'adulte et l'adolescent de plus de 12 ans). Il est également utilisé pour aider à prévenir toute récurrence de ces infections.
- Traiter les boutons de fièvre (chez l'adulte et l'adolescent de plus de 12 ans).
- Prévenir toute infection à CMV après une greffe d'organe (chez l'adulte et l'adolescent de plus de 12 ans).
- Traiter et prévenir les infections à CMV.

2. Quelles sont les informations importantes à connaître avant de prendre Valex 500 mg, comprimé enrobé ?

Ne prenez jamais Valex

- Si vous êtes allergique à l'un des composants contenus dans ce médicament (voir rubrique 6).
- Si vous avez déjà développé une réaction allergique à une fièvre, un gonflement

augmentation des taux d'enzymes (réaction médicamenteuse systémiques) après avoir pris Valex. Ne prenez pas Valex si vous êtes allergique à l'un des composants contenus dans ce médicament (voir rubrique 6). Parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de commencer votre traitement avec Valex.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin

- si :
 - Vous souffrez de problèmes rénaux.
 - Vous souffrez de problèmes hépatiques.
 - Vous avez plus de 65 ans.
 - Vous êtes immunodéprimé(e).

En cas de doute, parlez-en à votre médecin. Ne commencez pas votre traitement avec Valex sans l'avis de votre médecin. Faites très attention avec Valex. Des réactions médicamenteuses systémiques (DRESS) ont été rapportées avec Valex. Ces réactions se manifestent par des symptômes grippaux et d'éruption cutanée qui s'étend par la suite en s'accompagnant d'une augmentation des taux d'enzymes sanguines, d'une augmentation de la température et d'un gonflement des ganglions lymphatiques. Si vous développez une éruption cutanée ou un gonflement des ganglions lymphatiques, arrêtez immédiatement Valex et contactez votre médecin ou un professionnel de santé.

Enfants :

Sans objet.

Prévenir la transmission de l'herpès

Si Valex vous a été prescrit pour traiter l'herpès, vous devez prendre des mesures pour prévenir la transmission de l'herpès à d'autres personnes. Vous devez éviter les rapports sexuels protégés, notamment l'usage du préservatif. Ces mesures sont importantes pour éviter la transmission de l'herpès à d'autres personnes. Vous devez également éviter de partager vos objets personnels (couverts, verre, etc.) avec d'autres personnes. Vous devez également éviter de partager vos vêtements (sous-vêtements, etc.) avec d'autres personnes. Vous devez également éviter de partager vos produits de toilette (savon, etc.) avec d'autres personnes.

Autres médicaments et Valex

Si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, informez-en votre médecin ou à votre pharmacien. Valex peut interagir avec d'autres médicaments. Vous devez également éviter de prendre d'autres médicaments à base d'antibiotiques pendant que vous prenez Valex. Vous devez également éviter de prendre d'autres médicaments à base de corticoïdes pendant que vous prenez Valex. Vous devez également éviter de prendre d'autres médicaments à base de produits naturels pendant que vous prenez Valex.

L 0 1 2 2 3 0 4
P E P 0 5 / 2 5
P P 7 8 3 D H 6 0



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.



CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le comprimé ne se dissout que dans l'intestin grêle. C'est pour cette raison que CardioAspirine

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique
P.P.V. : 27,70 DH
Bayer S.A.



du médecin.