

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'H
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W21-698525

153896

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☒ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule :

342

Société :

RAF

☐ Actif

☐ Pensionné(e)

☒ Autre :

Régime

Nom & Prénom :

SELHOUM

HAMID

Date de naissance :

01/01/43

Adresse :

60 Bd

2 EL

NAH

COS

Tél. :

064 1997 013

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Asmaa YACOUBI
RHUMATOLOGUE
Angle Bd. Stijlmassi (bd du Phare) et Av. de Nica.
Résidence Normandie 2, 2ème étage N3 - Casablanca
Tél. : 05 22 22 78 18 - SM : 06 62 37 80 50

Date de consultation :

28/12/2022

Nom et prénom du malade :

SELHOUM HAMID

Age :

Lien de parenté :

☒ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie :

RHUMATOLOGIQUE

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le :

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du praticien attestant le Paiement des
-----------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	--

28/12/2022		C	500,44	INP : 0911023366
------------	--	---	--------	------------------

Dr. Asmaa YACOUB
RHUMATOLOGUE

Angle Bd. Stielmansi (bd du Phare) et Av. ...
Résidence Normandie 2, 2^{ème} étage, N3 - Cas...
06 62 37 80 50 - GSM : 06 62 37 80 50

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien
ou du Fournisseur

Date

Montant de la Facture

092063304

28.12.22

11
1347,60

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du
Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des
Coefficients

Montant
des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature
du Particien


Date des
Soins

Nombre
A M P C I M I V


Montant détaillé
des Honoraires

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F.
PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU COEFFICIENT
MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
B	
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DATE DU
DEVIS

DATE DE
L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Dr. Asmaa YACOUBI
الدكتورة أسماء يعقوبي


Casablanca, le : 28 DEC. 2022

TIR - SAITOM HAMID -

37,00

X (1) DUOXAL 500 -

1cp x 2/3 pour 20 Jours.



146,90

X (2) HONARTE FORTE

1gel x 3/3 au milieu des repas
x deux Jours.



28,80

X (3) Vitaminé fort -

2cp x 2/3 au milieu
des repas x deux Jours.



49,60

X (4) D-CURE FORTE

1ampoule 1seu x 3 Jours -



⇒

99,00

(5) Relaxine B6375

Agel au Cocher & leurs



267,00

(6) Xatral



1cp de soir

& leurs

153,30

(7) PERUTON

1cp de matin



T = 1347,60

Dr. Asmaa YACOUBI
RHUMATOLOGUE
MÉDECINE FONCTIONNELLE - NATUROPATHIE
MICRONUTRITION - MÉDECINE DU SPORT
Angle Bd. Sijelmassi (à du Phare) et Av. de Nice,
Résidence Normandie 2, 2ème étage, N° Casablanca
Tél.: 05 22 36 36 86 - GSM: 06 62 37 80 50

BUOXOL 500mg/2mg
Bulle de 20 comprimés
ديوكسول 500مغ/2مغ
عذبة من 20 قرصا

BUOXOL 500mg/2mg
Bulle de 20 comprimés
ديوكسول 500مغ/2مغ
عذبة من 20 قرصا

153,30
G07 51A 20/4



Honart®
Curcumine
Exsudat de Bambou
FORTE

LOT : CA235
EXP : 07/25
PPC : 146,90 DH

Honart®
Curcumine
Exsudat de Bambou
FORTE

LOT : CA235
EXP : 07/25
PPC : 146,90 DH

Honart®
Curcumine
Exsudat de Bambou
FORTE

LOT : CA235
EXP : 07/25
PPC : 146,90 DH

TI

PPV: 49,60 DH
LOT: 22H22
EXP: 08/2025

SI

PPV: 49,60 DH
LOT: 22H22
EXP: 08/2025

TI

PPV: 49,60 DH
LOT: 22H22
EXP: 08/2025

ملغ



PPV

LOT

PER

100 ملغ

لغني لقرص واحد
تعمل بدون خطر

رقة ذات التأثير على

28,80

4. الوصف:

- علاج البري بري،
- الوقاية من نقص الفيتامين B1 الناتج عن انخفاض في الاستهلاك الغذائي على سبيل المثال: سوء الامتصاص، الحمية الغذائية الغنية بالبروتينات، التغذية بالحقن. و بالاشتراك مع غيرها من الفيتامينات،
- ينصح به الأشخاص الذين يشكون من التهاب الأعصاب ويتعاطون للمشروبات الكحولية،
- ينصح به في حالة التهاب الأعصاب،
- يستخدم بتركيزات عالية في بعض متلازمات الألم.

5. المقدار/طريقة الاستعمال:

المقدار:

2 إلى 4 أقراص خلال 24 ساعة.

في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك

طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم

مدة العلاج:

تقيدا بوصفة طبيبك

6. موانع الاستعمال:

لا يجب استعمال هذا الدواء في الحالات التالية:

- الأطفال أقل من 8 سنوات.

- أشخاص ذوي الحساسية لينفوثيامين.

على العموم لا يجب استعمال هذا الدواء خلال الرضاعة باستثناء إذا ارتأى طبيبك غير ذلك في حالة الشك من الضروري استشارة طبيبك أو صيدليكم

7. الآثار الغير مرغوب فيها:

لا تترددوا في استشارة طبيبك أو صيدليكم والإشارة إلى أي أثر غير مرغوب فيه خاصة الآثار التي لا تتضمنها هذه النشرة.

8. احتياطات خاصة:

بسبب تواجد لكتوز و السكروز لا ينصح بأخذ هذا الدواء في حالة حساسية للفركتوز و تواجد الغالكتوز بكثرة في الدم ناتج عن مرض خلقي أو أعراض عدم امتصاص الغلكتوز والغالكتوز أو نقص في لكتاز (أمراض أيضية نادرة). قائمة السواغ الذي من الواجب معرفته لاستعمال بدون خطر عند بعض المرضى: اللاكتوز و السكروز

. احتياطات الاستعمال:

في حالة الشك، لا تترددوا في استشارة طبيبك أو صيدليكم

9. التفاعلات الدوائية:

لغرض تفادي تفاعلات بين الأدوية يتعين إطلاع طبيبك أو صيدليكم على أي علاج آخر تأخذونه

10. الحمل-الرضاعة:

ينصح بعدم أخذ فيتانفريل * قوي عند المرأة المرضعة و الحامل ، في حالة اكتشاف الحمل أثناء العلاج بفيتانفريل قوي أطلعوا طبيبك على العموم يتعين خلال الحمل أو الرضاعة استشارة طبيبك أو صيدليكم قبل استعمال أي دواء.

11. السائقون ومستعملو الآلات:

12. ما يجب القيام به في حالة الإفراط في الجرعة:

13. مايجب القيام به في حالة نسيان أو الإفراط في الجرعة:

14. الحفظ:

لا تتجاوزوا التاريخ المبين على الغلاف الخارجي

لا يترك في متناول الأطفال

تاريخ المراجعة: مارس 2015

مخابر سانميديك

20-22، زقة الزير بن العوام

الصخور السوداء، الدار البيضاء

ملغ



PPV

LOT

PER

100 ملغ

لغني لقرص واحد
تعمل بدون خطر

رقة ذات التأثير على

28,80

4. الوصف:

- علاج البري بري،
- الوقاية من نقص الفيتامين B1 الناتج عن انخفاض في الاستهلاك الغذائي على سبيل المثال: سوء الامتصاص، الحمية الغذائية الغنية بالبروتينات، التغذية بالحقن. و بالاشتراك مع غيرها من الفيتامينات،
- ينصح به الأشخاص الذين يشكون من التهاب الأعصاب ويتعاطون للمشروبات الكحولية،
- ينصح به في حالة التهاب الأعصاب،
- يستخدم بتركيزات عالية في بعض متلازمات الألم.

5. المقدار/طريقة الاستعمال:

المقدار:

2 إلى 4 أقراص خلال 24 ساعة.

في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك

طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم

مدة العلاج:

تقيدا بوصفة طبيبك

6. موانع الاستعمال:

لا يجب استعمال هذا الدواء في الحالات التالية:

- الأطفال أقل من 8 سنوات.

- أشخاص ذوي الحساسية لينفوثيامين.

على العموم لا يجب استعمال هذا الدواء خلال الرضاعة باستثناء إذا ارتأى طبيبك غير ذلك في حالة الشك من الضروري استشارة طبيبك أو صيدليكم

7. الآثار الغير مرغوب فيها:

لا تترددوا في استشارة طبيبك أو صيدليكم والإشارة إلى أي أثر غير مرغوب فيه خاصة الآثار التي لا تتضمنها هذه النشرة.

8. احتياطات خاصة:

بسبب تواجد لكتوز و السكروز لا ينصح بأخذ هذا الدواء في حالة حساسية للفركتوز و تواجد الغالكتوز بكثرة في الدم ناتج عن مرض خلقي أو أعراض عدم امتصاص الغلكتوز والغالكتوز أو نقص في لكتاز (أمراض أيضية نادرة). قائمة السواغ الذي من الواجب معرفته لاستعمال بدون خطر عند بعض المرضى: اللاكتوز و السكروز

. احتياطات الاستعمال:

في حالة الشك، لا تترددوا في استشارة طبيبك أو صيدليكم

9. التفاعلات الدوائية:

لغرض تفادي تفاعلات بين الأدوية يتعين إطلاع طبيبك أو صيدليكم على أي علاج آخر تأخذونه

10. الحمل-الرضاعة:

ينصح بعدم أخذ فيتانفريل * قوي عند المرأة المرضعة و الحامل ، في حالة اكتشاف الحمل أثناء العلاج بفيتانفريل قوي أطلعوا طبيبك على العموم يتعين خلال الحمل أو الرضاعة استشارة طبيبك أو صيدليكم قبل استعمال أي دواء.

11. السائقون ومستعملو الآلات:

12. ما يجب القيام به في حالة الإفراط في الجرعة:

13. مايجب القيام به في حالة نسيان أو الإفراط في الجرعة:

14. الحفظ:

لا تتجاوزوا التاريخ المبين على الغلاف الخارجي

لا يترك في متناول الأطفال

تاريخ المراجعة: مارس 2015

مخابر سانميديك

20-22، زقة الزير بن العوام

الصخور السوداء، الدار البيضاء

ملغ



PPV

LOT

PER

100 ملغ

لغني لقرص واحد
تعمل بدون خطر

رقة ذات التأثير على

28,80

4. الوصف:

- علاج البري بري،
- الوقاية من نقص الفيتامين B1 الناتج عن انخفاض في الاستهلاك الغذائي على سبيل المثال: سوء الامتصاص، الحمية الغذائية الغنية بالبروتينات، التغذية بالحقن. و بالاشتراك مع غيرها من الفيتامينات،
- ينصح به الأشخاص الذين يشكون من التهاب الأعصاب ويتعاطون للمشروبات الكحولية،
- ينصح به في حالة التهاب الأعصاب،
- يستخدم بتركيزات عالية في بعض متلازمات الألم.

5. المقدار/طريقة الاستعمال:

المقدار:

2 إلى 4 أقراص خلال 24 ساعة.

في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك

طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم

مدة العلاج:

تقيدا بوصفة طبيبك

6. موانع الاستعمال:

لا يجب استعمال هذا الدواء في الحالات التالية:

- الأطفال أقل من 8 سنوات.

- أشخاص ذوي الحساسية لينفوثيامين.

على العموم لا يجب استعمال هذا الدواء خلال الرضاعة باستثناء إذا ارتأى طبيبك غير ذلك في حالة الشك من الضروري استشارة طبيبك أو صيدليكم

7. الآثار الغير مرغوب فيها:

لا تترددوا في استشارة طبيبك أو صيدليكم والإشارة إلى أي أثر غير مرغوب فيه خاصة الآثار التي لا تتضمنها هذه النشرة.

8. احتياطات خاصة:

بسبب تواجد لكتوز و السكروز لا ينصح بأخذ هذا الدواء في حالة حساسية للفركتوز و تواجد الغالكتوز بكثرة في الدم ناتج عن مرض خلقي أو أعراض عدم امتصاص الغلكتوز والغالكتوز أو نقص في لكتاز (أمراض أيضية نادرة). قائمة السواغ الذي من الواجب معرفته لاستعمال بدون خطر عند بعض المرضى: اللاكتوز و السكروز

. احتياطات الاستعمال:

في حالة الشك، لا تترددوا في استشارة طبيبك أو صيدليكم

9. التفاعلات الدوائية:

لغرض تفادي تفاعلات بين الأدوية يتعين إطلاع طبيبك أو صيدليكم على أي علاج آخر تأخذونه

10. الحمل-الرضاعة:

ينصح بعدم أخذ فيتانفريل * قوي عند المرأة المرضعة و الحامل ، في حالة اكتشاف الحمل أثناء العلاج بفيتانفريل قوي أطلعوا طبيبك على العموم يتعين خلال الحمل أو الرضاعة استشارة طبيبك أو صيدليكم قبل استعمال أي دواء.

11. السائقون ومستعملو الآلات:

12. ما يجب القيام به في حالة الإفراط في الجرعة:

13. مايجب القيام به في حالة نسيان أو الإفراط في الجرعة:

14. الحفظ:

لا تتجاوزوا التاريخ المبين على الغلاف الخارجي

لا يترك في متناول الأطفال

تاريخ المراجعة: مارس 2015

مخابر سانميديك

20-22، زقة الزير بن العوام

الصخور السوداء، الدار البيضاء

ملغ



PPV

LOT

PER



28,80

يتمتع بآثاره
تأثيره مديد
أي شكوك. استشر
لايجدر بك إعطاؤه
بهم مثل عوارضك
100 ملغ
لفي لقرص واحد
تعمل بدون خطر
رقة ذات التأثير على
الجهاز
4. الوصف:
- علاج البري بري،
- الوقاية من نقص الفيتامين B1 الناتج عن انخفاض في
الاستهلاك الغذائي على سبيل المثال: سوء الامتصاص،
الحمية الغذائية الغنية بالبروتينات، التغذية بالحقن. و
بالاشتراك مع غيرها من الفيتامينات،
- ينصح به الأشخاص الذين يشكون من التهاب الأعصاب
و يتعاطون للمشروبات الكحولية،
- ينصح به في حالة التهاب الأعصاب،
- يستخدم بتركيزات عالية في بعض متلازمات الألم.
5. المقدار/طريقة الاستعمال:
القدار:
2 إلى 4 أقراص خلال 24 ساعة.
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريقة الاستعمال:
عن طريق الفم
مدة العلاج:
تقيدا بوصفة طبيبك

6. موانع الاستعمال:

لا يجب استعمال هذا الدواء في الحالات التالية:

- الأطفال أقل من 8 سنوات.

- أشخاص ذوي الحساسية لينفوثيامين.

على العموم لا يجب استعمال هذا الدواء خلال الرضاعة باستثناء إذا ارتأى طبيبك غير ذلك في حالة الشك من الضروري استشارة طبيبك أو صيدليكم

7. الآثار الغير مرغوب فيها:

لا تترددوا في استشارة طبيبك أو صيدليكم والإشارة إلى أي أثر غير مرغوب فيه خاصة الآثار التي لا تتضمنها هذه النشرة.

8. احتياطات خاصة:

بسبب تواجد لكتوز و السكروز لا ينصح بأخذ هذا الدواء في حالة حساسية للفركتوز و تواجد الغالكتوز بكثرة في الدم ناتج عن مرض خلقي أو أعراض عدم امتصاص الغلكتوز والغالكتوز أو نقص في لكتاز (أمراض أيضية نادرة). قائمة السواغ الذي من الواجب معرفته لاستعمال بدون خطر عند بعض المرضى: اللاكتوز و السكروز

9. احتياطات الاستعمال:

في حالة الشك، لا تترددوا في استشارة طبيبك أو صيدليكم

10. التفاعلات الدوائية:

لغرض تفادي تفاعلات بين الأدوية يتعين إطلاع طبيبك أو صيدليكم على أي علاج آخر تأخذونه

11. الحمل-الرضاعة:

ينصح بعدم أخذ فيتانفريل * قوي عند المرأة المرضعة و الحامل، في حالة اكتشاف الحمل أثناء العلاج بفيتانفريل قوي أطلعوا طبيبك على العموم يتعين خلال الحمل أو الرضاعة استشارة طبيبك أو صيدليكم قبل استعمال أي دواء.

12. السائقون ومستعملو الآلات:

12. ما يجب القيام به في حالة الإفراط في الجرعة:

13. مايجب القيام به في حالة نسيان أو الإفراط في الجرعة:

14. الحفظ:

لا تتجاوزوا التاريخ المبين على الغلاف الخارجي

لا يترك في متناول الأطفال

تاريخ المراجعة: مارس 2015

مخابر سانميديك

20-22، زقة الزبير بن العوام

الصخور السوداء، الدار البيضاء



Gélule
Voie orale

Relaxium

LAXANT

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Relaxium B6 150

Oxyde de magnésium marin.....260 mg

équivalent en Magnésium150 mg

Vitamine B61 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

Relaxium B6 300

Oxyde de magnésium marin.....520 mg

équivalent en Magnésium300 mg

Vitamine B62 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

Relaxium B6 375

Oxyde de magnésium marin.....650 mg

équivalent en Magnésium375 mg

Vitamine B62 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

FORME ET PRESENTATIONS

Relaxium B6 150 : Gélule. Boite de 60

Relaxium B6 300 : Gélule. Boite de 15 et 30

Relaxium B6 375 : Gélule. Boite de 30 et 60

PROPRIETES

Relaxium B6 contient du magnésium et de la vitamine B6.

Le magnésium intervient dans le fonctionnement neuromusculaire. Son déficit peut causer nervosité, irritabilité, fatigabilité, crampes musculaires ainsi que les difficultés d'endormissement et de concentration, notamment en cas de surmenage.

La vitamine B6 complète l'activité relaxante et équilibrante du magnésium.

VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

Relaxium B6 150

Prendre 2 gélules par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 300

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 375

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec et frais.

Relaxium B6 150 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805321DMP/20UCAV1

Relaxium B6 300 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805322DMP/20UCAV1

Relaxium B6 375 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20191812093DMP/20UCAV1

Deva
Pharmaceutiques

540 047 - Zone Industrielle 18 94001 - Cayenne

Code : AC2 - 00068

LOT: 220482
DLUO: 06/2025
99,00 DH

Laboratoires Deva Phar
J. OUAJDI Pharmacien Re

القلب) أو إذا أصبت بهبوط حاد في ضغط الدم مع دواء آخر من مجموعة الأدوية ذاتها التي يفتني كزاترال إل بي 10 ملغ أقراص مطوّلة الإطلاق إليها (حاصرات ألفا).

في خلال العلاج

يمكن أن يحصل نقص الضغط الشرياني القياسي (هبوط في ضغط الدم عند الوقوف) في خلال الساعات القليلة الأولى بعد أن تأخذ الدواء وقد يرافقه دوّار أو تعب أو تعرق. في هذه الحالة، تمدّد إلى أن تختفي تماماً العوارض التي هي مؤقتة وتصل بطبيبك.

تمت ملاحظة هذا التأثير لدى المرضى المسنين بصورة خاصة ولدى المرضى الذين يأخذون أيضاً دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو مشتقات النترات (أدوية لعلاج الذبحة الصدرية).

يجب تقادي استعمال هذا الدواء بالتزامن مع بعض الأدوية المستعملة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (أدوية تخفيض ضغط الدم مثل دوكسازوسين وبارازوسين وبيروبيديل). (راجع أيضاً فقرة "الأدوية الأخرى و كزاترال إل بي 10 ملغ، أقراص مطوّلة الإطلاق").

إذا كنت ستخضع لجراحة في العين (بسبب إعتام عدسة العين) أعلم طبيب العيون قبل العملية إذا عولجت في الفترة الأخيرة أو كنت تعالج حالياً بكزاترال إل بي 10 ملغ، أقراص مطوّلة الإطلاق. إذ إن هذا الدواء قد يؤثر على بؤبؤ العين (قشاذ القرنية الزهلة خلال الجراحة) مما قد يسبب مضاعفات خلال العملية.

ولكن في حال تمّ إعلام الجراح مسبقاً، فسوف يتخذ الاحتياطات اللازمة. يحتوي هذا الدواء على زيت الخروع الذي يمكن أن يسبب اضطرابات هضمية (تأثير ملين خفيف، إسهال).

تحذيرات خاصة

الأدوية الأخرى و كزاترال إل بي 10 ملغ، أقراص مطوّلة الإطلاق

لا ينبغي بك أخذ كزاترال إل بي بالتزامن مع

بعض الأدوية المستعملة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية (مثلاً مثبط بروتياز بالتزامن مع ريتونافير أو كوبيسيستات)، أو التهاب الكبد ج (مثلاً تيلابريفير أو بوسيفيريفير) أو بعض التهابات الفطرية (مثلاً كيتوكونازول، إتراكونازول، بوزاكونازول)، أو بعض التهابات البكتيرية (مثلاً كلاريثروميسين، إريثروميسين، تيليثروميسين). (راجع فقرة "لا تأخذ كزاترال إل بي 10 ملغ، أقراص مطوّلة الإطلاق").

Xatral® LP

نشرة دوائية: معلومات للمستخدم

كزاترال® إل بي 10 ملغ، أقراص مطوّلة الإطلاق

ألفوزوسين

لنشرة بدقة قبل أخذ هذا الدواء.

حتاج إلى قراءتها مجدداً.
نية أو شكوك، إسأل الطبيب أو الصيدلي للحصول على المزيد من المعلومات. شخصياً. لا تعطه أبداً لشخص آخر حتى إذا كانت عوارضه معاملة

جانبية أو إذا لاحظت أي تأثيرات جانبية غير مذكورة في هذه النشرة.

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P. 1,

Ain sebaa Casablanca

XATRAL LP 10MG CPR B30

PPV : 267,00 DH



في هذه النشرة،

1. ما هو كزاترال إل بي 10 ملغ وما هي دواعي استعماله
2. المعلومات الواجب معرفتها قبل أخذ كزاترال إل بي 10 ملغ
3. كيف يؤخذ كزاترال إل بي 10 ملغ
4. التأثيرات الجانبية المحتملة
5. كيف يحفظ كزاترال إل بي 10 ملغ
6. محتويات العلبة ومعلومات أخرى

1. ما هو كزاترال إل بي 10 ملغ وما هي دواعي استعماله

الفئة الدوائية العلاجية

يحتوي كزاترال إل بي 10 ملغ على ألفوزوسين. ينتمي هذا الدواء إلى فئة الأدوية المسماة حاصرات ألفا.

له مفعول على المثانة والإحليل (الأنبوب الذي يخرج عبره البول من الجسم) والبروستات.

دواعي الوصف العلاجية

دواعي الاستعمال العلاجية

يُستعمل كزاترال إل بي 10 ملغ لعلاج زيادة حجم البروستات (تضخم البروستات)