

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Déclaration de Maladie

N° W21-698521

MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 342

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : SETOUR H. m. d

Date de naissance : 01/01/43

Adresse : 60 ps 8^e EL ATTAR

Tél. : 064 1997 813

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. Asmae YACOUBI
MÉDECINE Fonctionnelle NATUROPATHIE
MICRONUTRITION MÉDECINE DU SPORT
Angle Bd. Siidnessi (bd du Phare) et Av. de Nice.
Résidence Normandie 2, 2^{me} étage, N° Casablanca
Tél. : 05 22 36 36 86 GSM : 06 62 77 80 50

Cachet du médecin :

Date de consultation : 02 MARS 2023

Nom et prénom du malade : SETOUR HANID

Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : RTU NA TOLO CHOLE

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.


J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare

avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles

Fait à :

Le : 09/03/23

Signature de l'adhérent(e) :





RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
02 MARS 2023			500 DH	<p>DR A. COUBI</p> <p>MEDECINE FONCTIONNELLE ET THERAPIQUE</p> <p>MEDECINE FONCTIONNELLE ET THERAPIQUE</p> <p>INSTITUT NATIONAL DE PHARMACOLOGIE</p> <p>Angs. Bd. Sidi El Hassna 2ème étage. N° 62 - 18050</p>

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<p>SM PHARMACIE LOUBILAS</p> <p>Dr. A. Benhadj</p> <p>10, Rue Hassan II</p> <p>INPE</p> <p>092063304</p>	02/03/23	18 (68) 12

ANALYSES - RADIographies


Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F PROTHÈSES DENTAIRES



DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	35533411	11433553
G		

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

Coefficient des travaux	
Montants des soins	
Début d'exécution	
Fin d'exécution	
Coefficient des travaux	
Montants des soins	
Date du devis	
Date de l'exécution	

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION

Dr. Asmaa YACOUBI
الدكتورة أسماء يعقوبي

Casablanca, le : 02 MARS 2023

MR - SELHOUN

HARIO -

89, 13

MAXIFLORE

4 Acp à Jeen 2

କବିତା

7910

х (2) nyobit

4 2 2 not

see dinner

98.80

1 (3) titanium fat

2 ~~2~~ 24p 2 245

des repas

S 16 PHARMACIE LOUBILA
Dr G. Benyamin Alami
18, Rue 15 Loubila
Tél. 05 22 28 05 11

4 HONART FORTE

NART FORTE a 31/2 a 2005
Agel a 31/2 a 2005
des repas

⑤ D-CURE FORTE Jaempalle sem
220g

⑥ DAFCON 4000 mg.

201,00 1cp/j pendant 02 mois



⑦ ANDROUSTICA

239,00 1cp x 21j pour 02 mois

3 une miellee des repas →

19,60

⑧ FAST ITENO

(24h bes)



Sté PHARMACIE LOUBILA
15, Quartier Loubila
BP 14 Casablanca
Tél. 05 22 30 26 26

18/08/20



Sté PHARMACIE LOUBILA
15, Quartier Loubila
BP 14 Casablanca

Hemofast®

Pommade et Suppositoires

ION

de :

Chlorhydrate de cinchocaine

Hydrocortisone

Excipient

Suppositoires : Acétate d'hydrocortisone

Esculoside

Benzocaïne

Excipient

PROPRIETES

Pommade et suppositoires anti-hémorroïdaires.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Ce médicament est une association d'un corticoïde (pommade et suppositoires) et d'un veinotonique (suppositoires).

Ce médicament est préconisé dans certaines pathologies anales s'accompagnant de douleurs ou de démangeaisons, en particulier dans la crise hémorroïdaire.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament NE DOIT ETRE UTILISE dans les cas suivants :

Allergies aux anesthésiques locaux.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISE EN GARDE

- Ce médicament n'étant pas indiqué en cas d'infections anales dues à des bactéries, des virus, des parasites et des champignons, il ne doit être utilisé qu'après avis médical.

Pour les suppositoires : l'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopages.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le traitement doit être de courte durée (maximum 7 jours). Si la douleur ne cède pas rapidement, consultez votre médecin.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN, ET EN PARTICULIER POUR L'UTILISATION DES SUPPOSITOIRES : certains

Hemofast®
Pommade

18,60

فيتافيريل قوي 100 ملغ بنفوتيامين

PPV

LOT

PER

28,80

VITANEVRIL® FORT 100 mg
30 comprimés pelliculés



يحتسب بنفوتيامين في
الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي.

4. الوصف:

- علاج البري بري،

- الوقاية من نقص الفيتامين B1 الناتج عن انخفاض في الاستهلاك الغذائي على سبيل المثال : سوء الامتصاص،

الحمية الغذائية الغنية بالبروتينات، التغذية بالحقن، وبالاشتراك مع نقصها من الفيتامينات،

- ينصح به لأشخاص الذين يشكون من التهاب الأعصاب و يعانون من المشروبات الكحولية،

- ينصح به في حالة التهاب الأعصاب،

- يستخدم بتركيزات عالية في بعض متلازمة الألم.

5. المقدار/طريقة الاستعمال:

المقدار:

2 إلى 4 أقراص خلال 24 ساعة.

في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك

طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم

مدة العلاج:

تقيدوا بوصفة طبيبك

6. موانع الاستعمال:
لا يجب استعمال هذا الدواء في الحالات التالية:
- الأطفال أقل من 8 سنوات.
- أشخاص دوسي الحساسية لبنفوتيامين.

على العموم لا يجب استعمال هذا الدواء خلال الرضاعة باستثناء إذا ارتأى طبيبك غير ذلك في حالة الشك من الضروري استشارة طبيبك أو صيدليكم

7. الآثار الجانبية المرغوب فيها:
لا تترددا في استشارة طبيبك أو صيدليكم والإشارة إلى أي آثر غير مرغوب فيه خاصة الآثار التي لا تتضمنها هذه النشرة.

8. الاحتياطات خاصة:
يسبب تواجد لكتوز والسكروز لا ينصح بأخذ هذا الدواء في حالة حساسية للكتوز وتواجد الغالاكتوز بكثرة في الدم ناتج عن مرض خلقي أو أعراض عدم امتصاص الغالاكتوز والغالاكتوز أو نقص في لكتاز (أمراض أيضية نادرة). قائمة السواغ الذي من الواجب معرفته لاستعمال بدون خطر عند بعض المرضى:
اللاكتوز والسكروز

9. الاحتياطات الاستعمال:

في حالة الشك، لا تترددا في استشارة طبيبك أو صيدليكم
9. التفاعلات الدوائية:

لفرض تناول تفاعلات بين الأدوية يتعين إطلاع طبيبك أو صيدليكم على أي علاج آخر تأخذونه

10. الحمل-الرضاعة:

ينصح بعدم أخذ فيتافيريل "قوى عند المرأة المرضعة و الحامل ، في حالة اكتئاف الحمل أثناء العلاج بفيتافيريل قوي أطلاعه طبيبك على العموم يتعين خلال الحمل أو الرضاعة استشارة طبيبك أو صيدليكم قبل استعمال أي دواء.

11. السائقون و المستعملون للآلات:

12. ما يجب القيام به في حالة الإفراط في الجرعة:
13. ما يجب القيام به في حالة نسيان أو الإفراط في الجرعة:

14. الحفظ:

لا تتجاوزوا التاريخ المبين على الغلاف الخارجي
لا يترك في متناول الأطفال
تاريخ المراجعة: مارس 2015

مخابر سانتميريك
20-22، زنقة الزبير بن العوام
الصخور السوداء، الدار البيضاء

فيتافيريل قوي 100 ملغ بنفوتيامين

PPV

LOT

PER

28,80

VITANEVRIL® FORT 100 mg
30 comprimés pelliculés



يحتسب بنفوتيامين في
الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي.

4. الوصف:

- علاج البري بري،

- الوقاية من نقص الفيتامين B1 الناتج عن انخفاض في الاستهلاك الغذائي على سبيل المثال : سوء الامتصاص،

الحمية الغذائية الغنية بالبروتينات، التغذية بالحقن، وبالاشتراك مع نقصها من الفيتامينات،

- ينصح به لأشخاص الذين يشكون من التهاب الأعصاب و يعانون من المشروبات الكحولية،

- ينصح به في حالة التهاب الأعصاب،

- يستخدم بتركيزات عالية في بعض متلازمة الألم.

5. المقدار/طريقة الاستعمال:

المقدار:

2 إلى 4 أقراص خلال 24 ساعة.

في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك

طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم

مدة العلاج:

تقيدوا بوصفة طبيبك

6. موانع الاستعمال:
لا يجب استعمال هذا الدواء في الحالات التالية:
- الأطفال أقل من 8 سنوات.
- أشخاص دوبي الحساسية لبنفوتيامين.

على العموم لا يجب استعمال هذا الدواء خلال الرضاعة باستثناء إذا لرثى طبيبك غير ذلك في حالة الشك من الضروري استشارة طبيبك أو صيدليكم

7. الآثار الجانبية المرغوب فيها:
لا تترددا في استشارة طبيبك أو صيدليكم والإشارة إلى أي آثر غير مرغوب فيه خاصة الآثار التي لا تتضمنها هذه النشرة.

8. الاحتياطات خاصة:
يسبب تواجد لكتوز والسكروز لا ينصح بأخذ هذا الدواء في حالة حساسية للكتوز وتواجد الغالاكتوز بكثرة في الدم ناتج عن مرض خلقي أو أعراض عدم امتصاص الغالاكتوز والغالاكتوز أو نقص في لكتاز (أمراض أيضية نادرة). قائمة السواغ الذي من الواجب معرفته لاستعمال بدون خطر عند بعض المرضى:
اللاكتوز والسكروز

9. الاحتياطات الاستعمال:

في حالة الشك، لا تترددا في استشارة طبيبك أو صيدليكم
9. التفاعلات الدوائية:

لفرض تناول تفاعلات بين الأدوية يتعين إطلاع طبيبك أو صيدليكم على أي علاج آخر تأخذونه

10. الحمل-الرضاعة:

ينصح بعدم أخذ فيتافيريل "قوى" عند المرأة المرضعة و الحامل ، في حالة اكتئاف الحمل أثناء العلاج بفيتافيريل قوي أطلاعوا طبيبك على العموم يتعين خلال الحمل أو الرضاعة استشارة طبيبك أو صيدليكم قبل استعمال أي دواء.

11. السائقون و المستعملون للآلات:

12. ما يجب القيام به في حالة الإفراط في الجرعة:

13. ما يجب القيام به في حالة نسيان أو الإفراط في الجرعة:

14. الحفظ:

لا تتجاوزوا التاريخ المبين على الغلاف الخارجي
لا يترك في متناول الأطفال

تاريخ المراجعة: مارس 2015

15. مخابر سانتميريك

20-22، زنقة الزبير بن العوام

الصخور السوداء، الدار البيضاء

Maxi-Flore

Equilibre de la flore

synergia
Laboratoire de médecine nutritionnelle
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

Lot : F08/21
Diuo : 08/24
PPC : 89 DH

ORIG

Les comprimés de Maxi-Flore sont composés de microbilles protégées par une capsule. Ces microbilles sont gastro-réistantes et sont agglomérées entre elles par une substance de liaison.

Ce procédé breveté, protège les constituants de Maxi-Flore de l'acidité de l'estomac. Il est donc possible de croquer ou d'écraser les comprimés de Maxi-Flore pour les personnes qui ont de la difficulté à avaler, ou pour les enfants.

QUAND UTILISER MAXI-FLORE ?

Dans les troubles du transit intestinal.
En voyage pour éviter la "tourista".
A la suite d'un traitement avec des antibiotiques.
Pour aider les défenses immunitaires.
Pour les personnes fragiles sur le plan intestinal.

COMMENT UTILISER MAXI-FLORE ?

Pour une cure d'entretien, prendre un comprimé ou un sachet par jour.
Dans les suites de prise d'antibiotiques prendre 1 comprimé ou un sachet avant chaque repas.
Pour les voyages à risque, prendre un comprimé ou un sachet par jour et passer à 2 ou 4 comprimés ou sachets si des problèmes apparaissent.

AVERTISSEMENT

La prise de Maxi-Flore ne dispense pas de prendre toutes les précautions d'usage et de bon sens lors de voyages à risques.

MAXI-FLORE EST UN SYMBIOTIQUE

Un symbiotique est l'association de pré-biotiques et de pro-biotiques.

Un pro-biotique est un complément alimentaire microbien vivant, qui améliore l'équilibre de la flore intestinale, renforçant ainsi les défenses immunitaires de l'organisme.

Un pré-biotique est un complément alimentaire, non digéré dans la partie supérieure du tube digestif, qui sert au développement des probiotiques.

Pourquoi est-il très important pour notre santé de posséder une bonne flore intestinale ?

Notre colon contient plus de bactéries que l'organisme ne comporte de cellules.

Nous avons dans notre intestin, des germes pouvant nous rendre malade, dit "pathogènes", et des germes bénéfiques pour notre santé, dit "saprophytes".

A la naissance, l'intestin du nouveau né est stérile, et, en quelques heures il se trouve colonisé par des milliers de germes.

Les pro-biotiques font partie de ces germes saprophytes.

Ils agissent de plusieurs façons :

- Ils régulent la prolifération des germes pathogènes en occupant le terrain.
- Ils régulent la perméabilité intestinale en empêchant le passage de particules trop grosses, insuffisamment digérées, surtout pour les protéines, ainsi que le passage des antigènes bactériens.

Distribué au Maroc par :

HYPHADIET - 9 Rue Rahal Meskini - FES
www.hyphadiet.com

Maxi-Flore

Equilibre de la flore

synergia
Laboratoire de médecine nutritionnelle
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

Lot : F08/21
Diuo : 08/24
PPC : 89 DH

ORIG

Les comprimés de Maxi-Flore sont composés de microbilles protégées par une capsule. Ces microbilles sont gastro-réistantes et sont agglomérées entre elles par une substance de liaison.

Ce procédé breveté, protège les constituants de Maxi-Flore de l'acidité de l'estomac. Il est donc possible de croquer ou d'écraser les comprimés de Maxi-Flore pour les personnes qui ont de la difficulté à avaler, ou pour les enfants.

QUAND UTILISER MAXI-FLORE ?

Dans les troubles du transit intestinal.
En voyage pour éviter la "tourista".
A la suite d'un traitement avec des antibiotiques.
Pour aider les défenses immunitaires.
Pour les personnes fragiles sur le plan intestinal.

COMMENT UTILISER MAXI-FLORE ?

Pour une cure d'entretien, prendre un comprimé ou un sachet par jour.
Dans les suites de prise d'antibiotiques prendre 1 comprimé ou un sachet avant chaque repas.
Pour les voyages à risque, prendre un comprimé ou un sachet par jour et passer à 2 ou 4 comprimés ou sachets si des problèmes apparaissent.

AVERTISSEMENT

La prise de Maxi-Flore ne dispense pas de prendre toutes les précautions d'usage et de bon sens lors de voyages à risques.

MAXI-FLORE EST UN SYMBIOTIQUE

Un symbiotique est l'association de pré-biotiques et de pro-biotiques.

Un pro-biotique est un complément alimentaire microbien vivant, qui améliore l'équilibre de la flore intestinale, renforçant ainsi les défenses immunitaires de l'organisme.

Un pré-biotique est un complément alimentaire, non digéré dans la partie supérieure du tube digestif, qui sert au développement des probiotiques.

Pourquoi est-il très important pour notre santé de posséder une bonne flore intestinale ?

Notre colon contient plus de bactéries que l'organisme ne comporte de cellules.

Nous avons dans notre intestin, des germes pouvant nous rendre malade, dit "pathogènes", et des germes bénéfiques pour notre santé, dit "saprophytes".

A la naissance, l'intestin du nouveau né est stérile, et, en quelques heures il se trouve colonisé par des milliers de germes.

Les pro-biotiques font partie de ces germes saprophytes.

Ils agissent de plusieurs façons :

- Ils régulent la prolifération des germes pathogènes en occupant le terrain.
- Ils régulent la perméabilité intestinale en empêchant le passage de particules trop grosses, insuffisamment digérées, surtout pour les protéines, ainsi que le passage des antigènes bactériens.

Distribué au Maroc par :

HYPHADIET - 9 Rue Rahal Meskini - FES
www.hyphadiet.com

Maxi-Flore

Equilibre de la flore

synergia
Laboratoire de médecine nutritionnelle
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

Lot : F08/21
Diuo : 08/24
PPC : 89 DH

ORIG

Les comprimés de Maxi-Flore sont composés de microbilles protégées par une capsule. Ces microbilles sont gastro-réistantes et sont agglomérées entre elles par une substance de liaison.

Ce procédé breveté, protège les constituants de Maxi-Flore de l'acidité de l'estomac. Il est donc possible de croquer ou d'écraser les comprimés de Maxi-Flore pour les personnes qui ont de la difficulté à avaler, ou pour les enfants.

QUAND UTILISER MAXI-FLORE ?

Dans les troubles du transit intestinal.
En voyage pour éviter la "tourista".
A la suite d'un traitement avec des antibiotiques.
Pour aider les défenses immunitaires.
Pour les personnes fragiles sur le plan intestinal.

COMMENT UTILISER MAXI-FLORE ?

Pour une cure d'entretien, prendre un comprimé ou un sachet par jour.
Dans les suites de prise d'antibiotiques prendre 1 comprimé ou un sachet avant chaque repas.
Pour les voyages à risque, prendre un comprimé ou un sachet par jour et passer à 2 ou 4 comprimés ou sachets si des problèmes apparaissent.

AVERTISSEMENT

La prise de Maxi-Flore ne dispense pas de prendre toutes les précautions d'usage et de bon sens lors de voyages à risques.

MAXI-FLORE EST UN SYMBIOTIQUE

Un symbiotique est l'association de pré-biotiques et de pro-biotiques.

Un pro-biotique est un complément alimentaire microbien vivant, qui améliore l'équilibre de la flore intestinale, renforçant ainsi les défenses immunitaires de l'organisme.

Un pré-biotique est un complément alimentaire, non digéré dans la partie supérieure du tube digestif, qui sert au développement des probiotiques.

Pourquoi est-il très important pour notre santé de posséder une bonne flore intestinale ?

Notre colon contient plus de bactéries que l'organisme ne comporte de cellules.

Nous avons dans notre intestin, des germes pouvant nous rendre malade, dit "pathogènes", et des germes bénéfiques pour notre santé, dit "saprophytes".

A la naissance, l'intestin du nouveau né est stérile, et, en quelques heures il se trouve colonisé par des milliers de germes.

Les pro-biotiques font partie de ces germes saprophytes.

Ils agissent de plusieurs façons :

- Ils régulent la prolifération des germes pathogènes en occupant le terrain.
- Ils régulent la perméabilité intestinale en empêchant le passage de particules trop grosses, insuffisamment digérées, surtout pour les protéines, ainsi que le passage des antigènes bactériens.

Distribué au Maroc par :

HYPHADIET - 9 Rue Rahal Meskini - FES
www.hyphadiet.com

Une bonne

Lot: F08/21
Dluo: 08/24
PPC: 89 DH
ORIG

Les comprimés de **microbilles protégées** sont agglomérées entre elles par **com** sion.

Ce procédé breveté, protège les constituants de Maxi-Flore de l'acidité de l'estomac. Il est donc possible de croquer ou d'écraser les comprimés de Maxi-Flore pour les personnes qui ont de la difficulté à avaler, ou pour les enfants.

MAXI-FLORE EST UN SYMBIOTIQUE

Un symbiotique est l'association de pré-biotiques et de pro-biotiques.

Un pro-biotique est un complément alimentaire microbien vivant, qui améliore l'équilibre de la flore intestinale, renforçant ainsi les défenses immunitaires de l'organisme.

Un pré-biotique est un complément alimentaire, non digéré dans la partie supérieure du tube digestif, qui sert au développement des probiotiques.

Pourquoi est-il très important pour notre santé de posséder une bonne flore intestinale ?
Notre côlon contient plus de bactéries que l'organisme ne comporte de cellules.

Nous avons dans notre intestin, des germes pouvant nous rendre malade, dit "pathogènes", et des germes bénéfiques pour notre santé, dit "saprophytes".

A la naissance, l'intestin du nouveau né est stérile, et, en quelques heures il se trouve colonisé par des milliers de germes.

Les pro-biotiques font parti de ces germes saprophytes.

Ils agissent de plusieurs façons :

- Ils régulent la prolifération des germes pathogènes en occupant le terrain.
 - Ils régulent la perméabilité intestinale en empêchant le passage de particules trop grosses, insuffisamment digérées, surtout pour les protéines, ainsi que le passage des antigènes bactériens.

QUAND UTILISER MAXI-FLORE ?

Dans les troubles du transit intestinal.
En voyage pour éviter la "tourista".
A la suite d'un traitement avec des antibiotiques.
Pour aider les défenses immunitaires.
Pour les personnes fragiles sur le plan intestinal.

COMMENT UTILISER MAXI-FLORE ?

Pour une cure d'entretien, prendre un comprimé ou un sachet par jour.

Dans les suites de prise d'antibiotiques prendre 1 comprimé ou un sachet avant chaque repas. Pour les voyages à risque, prendre un comprimé ou un sachet par jour et passer à 2 ou 4 comprimés ou sachets si des problèmes apparaissent.

AVERTISSEMENT

La prise de Maxi-Flore ne dispense pas de prendre toutes les précautions d'usage et de bon sens lors de voyages à risques.

Distribué au Maroc par :
HYPHADIET - 9 Rue Rahal Meskini - FES
www.hyphadiet.com

Myobil®

TABLETS

Soothes, relaxes and improves muscle mobility.

A consommer de préférence avant fin / Best before
Lot n° / Batch n°

يفضل أن يستهلك قبل :

PPC: 79,00 DH

V004/ETMYOB30CPMC



6 111250 430289

INGREDIENTS:

Bitter orange tree
croscarmelose sod
extract; white wil
agents: silica [nano]

Bitter Orange tree extract	7,500 mg
Skullcap extract	200 mg
Marjoram extract	120 mg
White willow extract	100 mg
Curcumin	55 mg
Piperine	5,5 mg
Taurine	50 mg
Calcium	125 mg
Potassium	80 mg
Magnesium	57 mg

INDICATIONS:

- Muscle contractions.
- Soothing and relaxing.
- Improves mobility.

CONTRAINDICATIONS:

Not recommended for pregnant or breastfeeding women, to children and in case of antihypertensive treatment (orange tree) and people allergic to salicylate derivatives (white willow).

PRECAUTIONS OF USE:

- To be used as part of a diversified diet and a healthy lifestyle.
- Keep out of the reach of children.
- Store in a cool, dry place protected from light.

PRESENTATIONS :

MYOBIL comes in tablet form to be swallowed. Boxes of 15 and 30 tablets of 1 000 mg.

PRÉS
MYOB
1 000

ING
Extra
cro
pot
curc

Myobil®

TABLETS

Soothes, relaxes and improves muscle mobility.

A consommer de préférence avant fin / Best before
Lot n° / Batch n°

يفضل أن يستهلك قبل :

PPC: 79,00 DH

V004/ETMYOB30CPMC



6 111250 430289

INGREDIENTS:

Bitter orange tree
croscarmelose sod
extract; white wil
agents: silica [nano]

Bitter Orange tree extract	7,500 mg
Skullcap extract	200 mg
Marjoram extract	120 mg
White willow extract	100 mg
Curcumin	55 mg
Piperine	5,5 mg
Taurine	50 mg
Calcium	125 mg
Potassium	80 mg
Magnesium	57 mg

INDICATIONS:

- Muscle contractions.
- Soothing and relaxing.
- Improves mobility.

CONTRAINDICATIONS:

Not recommended for pregnant or breastfeeding women, to children and in case of antihypertensive treatment (orange tree) and people allergic to salicylate derivatives (white willow).

PRECAUTIONS OF USE:

- To be used as part of a diversified diet and a healthy lifestyle.
- Keep out of the reach of children.
- Store in a cool, dry place protected from light.

PRESENTATIONS :

MYOBIL comes in tablet form to be swallowed. Boxes of 15 and 30 tablets of 1 000 mg.

PRE
MYOB
1 000

Myobil®

TABLETS

Soothes, relaxes and improves muscle mobility.

A consommer de préférence avant fin / Best before
Lot n° / Batch n°

يفضل أن يستهلك قبل :

PPC : 79,00 DH

V004/ETMYOB30CPMC



6 111250 430289

INGREDIENTS:

Bitter orange tree
croscarmelose sod
extract; white wil
agents: silica [nano]

Bitter Orange tree extract	7,500 mg
Skullcap extract	200 mg
Marjoram extract	120 mg
White willow extract	100 mg
Curcumin	55 mg
Piperine	5,5 mg
Taurine	50 mg
Calcium	125 mg
Potassium	80 mg
Magnesium	57 mg

INDICATIONS:

- Muscle contractions.
- Soothing and relaxing.
- Improves mobility.

CONTRAINDICATIONS:

Not recommended for pregnant or breastfeeding women, to children and in case of antihypertensive treatment (orange tree) and people allergic to salicylate derivatives (white willow).

PRECAUTIONS OF USE:

- To be used as part of a diversified diet and a healthy lifestyle.
- Keep out of the reach of children.
- Store in a cool, dry place protected from light.

PRESENTATIONS :

MYOBIL comes in tablet form to be swallowed. Boxes of 15 and 30 tablets of 1 000 mg.

MYOBIL
1 000 mg

Myobil®

TABLETS

Soothes, relaxes and improves muscle mobility.

A consommer de préférence avant fin / Best before
Lot n° / Batch n°

يفضل أن يستهلك قبل :

PPC : 79,00 DH

V004/ETMYOB30CPMC



6 111250 430289

INGREDIENTS:

Bitter orange tree
croscarmelose sod
extract; white wil
agents: silica [nano]

Bitter Orange tree extract	7,500 mg
Skullcap extract	200 mg
Marjoram extract	120 mg
White willow extract	100 mg
Curcumin	55 mg
Piperine	5,5 mg
Taurine	50 mg
Calcium	125 mg
Potassium	80 mg
Magnesium	57 mg

INDICATIONS:

- Muscle contractions.
- Soothing and relaxing.
- Improves mobility.

CONTRAINDICATIONS:

Not recommended for pregnant or breastfeeding women, to children and in case of antihypertensive treatment (orange tree) and people allergic to salicylate derivatives (white willow).

PRECAUTIONS OF USE:

- To be used as part of a diversified diet and a healthy lifestyle.
- Keep out of the reach of children.
- Store in a cool, dry place protected from light.

PRESENTATIONS :

MYOBIL comes in tablet form to be swallowed. Boxes of 15 and 30 tablets of 1 000 mg.

MYOBIL
1 000 mg

daflon® 1000 mg

Comprimé pelliculé

Fraction flavonoïque purifiée micronisée

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations suivantes :

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez pire.

201/00
FR 1/14/2018
EPV 2010 H01

QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?

1. Qu'est-ce que DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé?
3. Comment prendre DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : VASCULOPROTECTEURS/MÉDICAMENTS AGISSANT SUR LES CAPIL

LAIRÉS/BIOFLAVONOÏDES - code ATC : C05CA3

Ce médicament est un veineotonique (il augmente le tonus des veines) et un vasculoprotecteur (il augmente la résistance des petits vaisseaux sanguins).

Ce médicament est préconisé dans le traitement des signes fonctionnels liés à la crise hémorroïdaire.

Si les troubles hémorroïdaires ne cèdent pas en 15 jours, il est indispensable de consulter votre médecin.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Ne prenez jamais DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé :

Si vous êtes allergique à la fraction flavonoïque purifiée micronisée ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Daflon 1000 mg, comprimé pelliculé.

Enfants

Sans objet

AUTRES MÉDICAMENTS ET DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ AVEC DES ALIMENTS ET BOISSONS

Sans objet

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse :

Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation de Daflon pendant la grossesse.

Allaitement :

En l'absence de données sur le passage du médicament dans le lait maternel, l'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement.

CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES

Sans objet

DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ CONTIENT

Sans objet

3. COMMENT PRENDRE DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Veuillez toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Insuffisance veineuse : 1 comprimé par jour au moment du repas.

Dans la crise hémorroïdaire, la posologie est de 3 comprimés par jour pendant 4 jours, puis 2 comprimés par jour pendant les 3 jours suivants au moment des repas.

Si vous avez pris plus de DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Les données concernant le surdosage avec Daflon sont limitées mais les symptômes rapportés incluent diarrhée, nausée, douleur abdominale, prurit et rash.

Si vous oubliez de prendre DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé :

Sans objet.

Si vous arrêtez de prendre DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé :

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

La fréquence des effets indésirables possibles listés ci-dessous est définie en utilisant le système suivant :

- très fréquent (affecte plus de 1 utilisateur sur 10)

daflon® 1000 mg
30 comprimés pelliculés

6118000100393

res. Ex-
nacien-
s pou-
ion.
sécurité

- fréquent (affecte 1 à 10 utilisateurs sur 100)
- peu fréquent (affecte 1 à 10 utilisateurs sur 1 000)
- rare (affecte 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)
- très rare (affecte moins de 1 utilisateur sur 10 000)
- fréquence inconnue (les effets indésirables ne peuvent être estimés avec certitude)
- Peu fréquent : diarrhée, dyspepsie
- Rare : sensations vertigineuses
- Fréquence inconnue : déceptionnement, céderme, déshydratation

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin.

Ceci s'applique aussi à toute réaction indésirable que vous n'avez pas signalée. Vous pouvez également déclarer le tout à l'Agence nationale de sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

CE QUE CONTIENT DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

- Les substances actives sont : Fraction flavonoïque purifiée micronisée 1000,000 mg

Correspondant à : Diosmine 90 pour cent 900,000 mg

Flavonoïdes exprimés en hesperidéine 10 pour cent 100,000 mg

Humidité moyenne 40,000 mg

Pour un comprimé pelliculé

- Les autres composants sont : Carboxyméthylamidon sodique, cellulose microcristalline, gélatine, stéarate de magnésium, talc, Pelliculage : dioxyde de titane (E171), glycérol, laurylsulfate de sodium, macrogol 6000, hydronium, oxyde de fer jaune (E172), oxyde de fer rouge (E172), stéarate de magnésium.

QU'EST-CE QUE DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET CONTENU DE L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé. Boîtes de 15 et 30 comprimés pelliculés.

Conseil d'éducation sanitaire :

Problèmes de la circulation

Evitez de rester assis ou debout trop longtemps, surélevez légèrement les pieds de votre lit.

Evitez l'exposition au soleil et à la chaleur.

Veillez à avoir une alimentation saine et équilibrée et à pratiquer une activité physique régulière (marche à pied, vélo ...), évitez l'excès de poids.

Evitez les vêtements trop serrés, le port de chaussettes ou de bas de contention ainsi que doucher ses jambes avec de l'eau favorisant la circulation sanguine.

Hémorroïdes : Buvez 1, 5 à 2L d'eau par jour, consommez des aliments

A forte teneur en fibres afin d'éviter la constipation (Fruits, légumes verts, céréales complètes)

Evitez les graisses, le café, l'alcool et les aliments épicés.

Faites de l'exercice régulièrement pour stimuler le flux sanguin, évitez de porter des objets trop lourds.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : janvier 2019



SERVIER MAROC

Imr. ZEVACO, Lot FATH 4
Bd Abdellahi BOUTALEB
20180 Casablanca

daflon® 1000 mg

Comprimé pelliculé

Fraction flavonoïque purifiée micronisée

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations suivantes :

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez pire.

201/00
FR 1/14/2018
EPV 2010 H01

QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?

1. Qu'est-ce que DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé?
3. Comment prendre DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : VASCULOPROTECTEURS/MÉDICAMENTS AGISSANT SUR LES CAPILLAIRÉS/BIOFLAVONOÏDES - code ATC : C05CA3

Ce médicament est un veineotonique (il augmente le tonus des veines) et un vasculoprotecteur (il augmente la résistance des petits vaisseaux sanguins).

Ce médicament est préconisé dans le traitement des signes fonctionnels liés à la crise hémorroïdaire.

Si les troubles hémorroïdaires ne cèdent pas en 15 jours, il est indispensable de consulter votre médecin.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Ne prenez jamais DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé :

Si vous êtes allergique à la fraction flavonoïque purifiée micronisée ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Daflon 1000 mg, comprimé pelliculé.

Enfants

Sans objet

AUTRES MÉDICAMENTS ET DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ AVEC DES ALIMENTS ET BOISSONS

Sans objet

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse :

Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation de Daflon pendant la grossesse.

Allaitement :

En l'absence de données sur le passage du médicament dans le lait maternel, l'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement.

CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES

Sans objet

DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ CONTIENT

Sans objet

3. COMMENT PRENDRE DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Veuillez toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Insuffisance veineuse : 1 comprimé par jour au moment du repas.

Dans la crise hémorroïdaire, la posologie est de 3 comprimés par jour pendant 4 jours, puis 2 comprimés par jour pendant les 3 jours suivants au moment des repas.

Si vous avez pris plus de DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Les données concernant le surdosage avec Daflon sont limitées mais les symptômes rapportés incluent diarrhée, nausée, douleur abdominale, prurit et rash.

Si vous oubliez de prendre DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé :

Sans objet.

Si vous arrêtez de prendre DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé :

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

La fréquence des effets indésirables possibles listés ci-dessous est définie en utilisant le système suivant :

- très fréquent (affecte plus de 1 utilisateur sur 10)

- fréquent (affecte 1 à 10 utilisateurs sur 100)
- peu fréquent (affecte 1 à 10 utilisateurs sur 1 000)
- rare (affecte 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)
- très rare (affecte moins de 1 utilisateur sur 10 000)
- fréquence inconnue (les effets indésirables ne peuvent être estimés avec certitude)
- Peu fréquent : diarrhée, dyspepsie
- Fréquent : sensations vertigineuses
- Fréquence inconnue : déceptionnement, céderme, éruption cutanée

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

Ceci s'applique aussi à toute réaction indésirable que vous n'avez pas signalée. Vous pouvez également déclarer le tout à l'Agence nationale de sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

CE QUE CONTIENT DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

- Les substances actives sont : Fraction flavonoïque purifiée micronisée 1000,000 mg

Correspondant à : Diosmine 90 pour cent 900,000 mg

Flavonoïdes exprimés en hesperidéine 10 pour cent 100,000 mg

Humidité moyenne 40,000 mg

Pour un comprimé pelliculé

- Les autres composants sont : Carboxyméthylamidon sodique, cellulose microcristalline, gélatine, stéarate de magnésium, talc, Pelliculage : dioxyde de titane (E171), glycérol, laurylsulfate de sodium, macrogol 6000, hydronium, oxyde de fer jaune (E172), oxyde de fer rouge (E172), stéarate de magnésium.

QU'EST-CE QUE DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET CONTENU DE L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé. Boîtes de 15 et 30 comprimés pelliculés.

Conseil d'éducation sanitaire :

Problèmes de la circulation

Evitez de rester assis ou debout trop longtemps, surélevez légèrement les pieds de votre lit.

Evitez l'exposition au soleil et à la chaleur.

Veillez à avoir une alimentation saine et équilibrée et à pratiquer une activité physique régulière (marche à pied, vélo ...), évitez l'excès de poids.

Evitez les vêtements trop serrés, le port de chaussettes ou de bas de contention ainsi que doucher ses jambes avec de l'eau favorisant la circulation sanguine.

Hémorragies :

Buvez 1, 5 à 2L d'eau par jour, consommez des aliments à forte teneur en fibres afin d'éviter la constipation.

(Fruits, légumes verts, céréales complètes)

Evitez les graisses, le café, l'alcool et les aliments épicés.

Faites de l'exercice régulièrement pour stimuler le flux sanguin, évitez de porter des objets trop lourds.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : janvier 2019

daflon® 1000 mg
30 comprimés pelliculés

6118000100393



SERVIER MAROC

Imr. ZEVACO, Lot FATH 4
Bd Abdellahi BOUTALEB
20180 Casablanca