

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W21-778047

15063

Contraire

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

32.95

Société :

R.A.M

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

AATAR Med.

Date de naissance :

07/07/1951

Adresse :

Tchagant N°53 Rue Ray Taacine sahara Maroc.

Tél. :

06-58-13-19-26

Total des frais engagés :

1357.00

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. Jawaad BEN MAHFoud
OPHTALMOLOGISTE
Bd. Cheikh Saadi N° 133 Talbiyyt Agadir
Tel: 05 28 38 38 04 05 26 82 75 04

Dr. Jawaad BEN MAHFoud
INP: 041023979

Date de consultation :

14 MARS 2023

Nom et prénom du malade :

Mr AATAR MOHAMED

Age :

72 ans

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

glaucone 23

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.


J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
14 MARS 2023	g		250 dh	 Dr. Jawad BEN MAFToud INP: 041023979 OPHTALMO 33 Talbot Agadir Dr. Jawad Ben Maftoud Dr. Cheikh Saadi 10-04-05 28 82 75 04 Tel: 05 28 38 33 04

► EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 <i>Pharmacie NOURI</i> <i>Dr. J. M. B. Hassan II</i> <i>Route de Tiziout - Tel. 05 28 24 36 11</i> <i>MELLOUL</i> INPE : 042045427	14/03/23	1107,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



جراحة الجلاة بالدبدبات الصوتية
Chirurgie par Phacoémulsification

جراحة قصر البصر
Chirurgie Réfractive

الفحص بالدبدبات الصوتية
Echographie

تصوير شرايين الشبكية
Angiographie rétinienne

التصوير المقطعي البصري
OCT

الليزر
Laser

طوبوغرافية القرنية
Topographie de la cornée

علاج القرنية المخروطية
Traitement du Kératocône

العدسات اللاصقة
Contactologie

تشخيص وعلاج جفاف العين
بالضوء النابض
Diagnostic de la sécheresse oculaire
et traitement à la lumière pulsée

Dr. Jawad BEN MAHFOUD

**Spécialiste des Maladies
et Chirurgie des yeux**

الدكتور جواد بن محفوظ

**أخصائي في طب
وجراحة العيون**

Agadir, le

14/03/2023

NOTE D'HONORAIRES

ICE: 001651926000053

INPE: 041023979

Reçu du patient: Mr AATAR Mohamed la somme de 250 DH pour consultation spécialisée.

Arrêté la présente note d'honoraires à la somme de deux cent cinquante dirhams.

Dr. Jawad BEN MAHFOUD
OPHTALMOLOGISTE
Bd. Cheikh Saadi N°133 Talborjt Agadir
Tel: 05 28 38 38 04 - 05 28 82 75 04

شارع الشيخ السعدي رقم 133 - تمديد -X- تالبورجت أكادير (مصحة تيفاوت)
Bd. Cheikh Saadi N° 133 - Extension -X- Talborjt - Agadir (Clinique Tifaoute)
Tél.: 05 28 38 38 04 - 05 28 82 75 04 - 05 28 84 25 24 - الهاتف : Fax: 05 28 84 71 84
الفاكس :

الدكتور جواد بن محفوظ

أخصائي في طب
 وجراحة العيون



جراحة الجلالة بالدبدبات الصوتية
Chirurgie par Phacoémulsification

جراحة قصر البصر
Chirurgie Réfractive

الفحص بالدبدبات الصوتية
Echographie

تصوير شرايين الشبكية
Angiographie rétinienne

التصوير المقطعي البصري
OCT

الليزر
Laser

طوبوغرافية القرنية
Topographie de la cornée

علاج القرنية المخروطية
Traitement du Kératocône

العدسات اللاصقة
Contactologie

تشخيص وعلاج جفاف العين
بالضوء النابض
Diagnostic de la sécheresse oculaire
et traitement à la lumière pulsée

Dr. Jawad BEN MAHFOUD

Spécialiste des Maladies
et Chirurgie des yeux

Agadir, le

14 mars 2023

Mr AATAR Mohamed
صيدلية نوري
1107100
Pharmacie NOURI
Route de Tiznit - Bd Hassan II
AIT MELLOUL - Tel : 05 28 24 36 36

1/ XOLAMOL COLLYRE

1 goutte 2 fois / jour; 8h & 20h, dans les deux yeux, pendant 6 Mois

1107100

S. V

Dr. Jawad BEN MAHFOUD
OPHTALMOLOGISTE
Bd. Cheikh Saadi N°133 Talborjt - Agadir
Tél: 05 28 38 38 04 - 05 28 82 75 04

صيدلية نوري
Pharmacie NOURI
Bd. Cheikh Saadi N°133
Route de Tiznit - Bd Hassan II
AIT MELLOUL - Tel : 05 28 24 36 36

شارع الشيخ السعدي رقم 133 - تمديد -X- تالبورjt أكادير (مصحة تيفاوت)
Bd. Cheikh Saadi N° 133 - Extension -X- Talborjt - Agadir (Clinique Tifaoute)
Tél.: 05 28 38 38 04 - 05 28 82 75 04 - 05 28 84 25 24 - الهاتف : Fax: 05 28 84 71 84
الفاكس :

g/ml, Collyre en solution e + Timolol

Si vous oubliez d'utiliser Xolamol® collyre

Il est important d'utiliser Xolamol® collyre tel que votre médecin vous l'a prescrit.

Si vous manquez une dose, appliquez-la dès que possible. Cependant, s'il est presque temps pour votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et reprenez votre programme de dosage régulier.

Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose oubliée.

Si vous arrêtez d'utiliser Xolamol® collyre

Si vous voulez arrêter d'utiliser Xolamol® collyre, consultez d'abord votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets secondaires

Comme tous les médicaments, Xolamol® collyre peut provoquer des effets secondaires. Ces effets secondaires peuvent survenir dans le monde entier.

Vous pouvez également ressentir des effets secondaires, sauf si vous êtes allergique à ce médicament.

N'arrêtez pas d'utiliser Xolamol® sans en parler à votre médecin.

Si vous ressentez un des effets indésirables graves suivants, arrêtez d'utiliser ce médicament et prévenez immédiatement votre médecin ou rendez-vous au service d'urgence le plus proche.

• Réactions allergiques graves, comme l'anaphylaxie (gonflement sous la peau, éruption cutanée, difficultés à respirer).

• Gonflement sous la peau, éruption cutanée, urticaire ou éruption hives.

• Réaction allergique grave, comme l'anaphylaxie (gonflement sous la peau, éruption cutanée, difficultés à respirer).

• Maladie grave avec gonflement de la peau, de la bouche, des yeux et de la tête. Une éruption rose-rouge en particulier.

• Maladie grave avec gonflement de la peau, de la bouche, des yeux et de la tête. Une éruption rose-rouge en particu-

• Maladie grave avec gonflement de la peau, de la bouche, des yeux et de la tête. Une éruption rose-rouge en particu-

• Maladie grave avec gonflement de la peau, de la bouche, des yeux et de la tête. Une éruption rose-rouge en particu-

• Maladie grave avec gonflement de la peau, de la bouche, des yeux et de la tête. Une éruption rose-rouge en particu-

• Maladie grave avec gonflement de la peau, de la bouche, des yeux et de la tête. Une éruption rose-rouge en particu-

• Maladie grave avec gonflement de la peau, de la bouche, des yeux et de la tête. Une éruption rose-rouge en particu-

• Maladie grave avec gonflement de la peau, de la bouche, des yeux et de la tête. Une éruption rose-rouge en particu-

• Maladie grave avec gonflement de la peau, de la bouche, des yeux et de la tête. Une éruption rose-rouge en particu-

• Maladie grave avec gonflement de la peau, de la bouche, des yeux et de la tête. Une éruption rose-rouge en particu-



12502657-02S

نولامول®
Xolamol®

Lot:

7001251

Fab:

07 22

Exp:

07 24

P.P.V : 110 DH 70



g/ml, Collyre en solution e + Timolol

Si vous oubliez d'utiliser Xolamol® collyre

Il est important d'utiliser Xolamol® collyre tel que votre médecin vous l'a prescrit.

Si vous manquez une dose, appliquez-la dès que possible. Cependant, s'il est presque temps pour votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et reprenez votre programme de dosage régulier.

Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose oubliée.

Si vous arrêtez d'utiliser Xolamol® collyre

Si vous voulez arrêter d'utiliser Xolamol® collyre, consultez d'abord votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets secondaires

Comme tous les médicaments, Xolamol® collyre peut provoquer des effets secondaires. Ces effets peuvent survenir dans le monde entier.

Vous pouvez également ressentir des effets secondaires, sauf si vous êtes allergique à ce médicament.

N'arrêtez pas d'utiliser Xolamol® sans en parler à votre médecin.

Si vous ressentez un des effets indésirables graves suivants, arrêtez d'utiliser ce médicament et prévenez immédiatement votre médecin ou rendez-vous au service d'urgence le plus proche.

• Réactions allergiques graves

gongnement sous la peau ou dans les tissus

zones tels que le visage, la tête et le cou

entraver les voies respiratoires

une difficulté à avaler

urticaire ou éruption cutanée

éruption localisée et importante

réaction allergique sévère

• Maladie grave avec

gongnement de la peau ou des tissus

la bouche, les yeux et les voies respiratoires

fièvre. Une éruption cutanée rose-rouge en particu

lante des pieds qui peut être rouge

Comme d'autres médicaments, Xolamol® collyre peut entraîner des effets secondaires

comme on le voit avec des médicaments

voie intraveineuse et/ou « orale ». L'incidence des

effets indésirables après l'administration ophtalmique

ophtalmique est plus faible que lorsque les médicaments sont, par exemple, pris par voie orale ou par injection.

Les effets indésirables suivants ont été observés avec Xolamol® collyre ou

très fréquent (affection(s) :



12502657-02S

نولامول®
Xolamol®

Lot:

7001251

Fab:

07 22

Exp:

07 24

P.P.V : 110 DH 70



g/ml, Collyre en solution e + Timolol

Si vous oubliez d'utiliser Xolamol® collyre

Il est important d'utiliser Xolamol® collyre tel que votre médecin vous l'a prescrit.

Si vous manquez une dose, appliquez-la dès que possible. Cependant, s'il est presque temps pour votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et reprenez votre programme de dosage régulier.

Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose oubliée.

Si vous arrêtez d'utiliser Xolamol® collyre

Si vous voulez arrêter d'utiliser Xolamol® collyre, consultez d'abord votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets secondaires

Comme tous les médicaments, Xolamol® collyre peut provoquer des effets secondaires qui peuvent survenir dans le monde entier.

Vous pouvez avoir des effets secondaires, sauf si vous êtes allergique à ce médicament. Si vous êtes inquiet, parlez à votre pharmacien.

N'arrêtez pas d'utiliser Xolamol® sans en parler à votre médecin.

Si vous ressentez un des effets indésirables graves suivants, arrêtez d'utiliser ce médicament et prévenez immédiatement votre médecin ou rendez-vous au service d'urgence le plus proche.

• Réactions allergiques graves

gongnement sous la peau

zones tels que le visage, le cou et le tronc

entraver les voies respiratoires

une difficulté à avaler

urticaire ou éruption cutanée

éruption localisée et importante

réaction allergique sévère

• Maladie grave avec

gongnement de la peau

la bouche, les yeux et les oreilles

fièvre. Une éruption cutanée rose-rouge en particu-

lante des pieds qui peut être

comme d'autres médicaments

ceux, Xolamol® collyre peut entraîner des effets

comme on le voit avec des

voie intraveineuse et/ou « orale ». L'incidence des

effets indésirables après l'administration ophtalmique

ophtalmique est plus faible que lorsque les médicaments sont, par exemple, pris par voie orale ou par injection..

ces effets indésirables suivent généralement l'utilisation de Xolamol® collyre ou

peut être très fréquent (affection de 10% à 20%) :



12502657-02S

نولامول®
Xolamol®

Lot:

7001251

Fab:

07 22

Exp:

07 24

P.P.V : 110 DH 70



g/ml, Collyre en solution e + Timolol

Si vous oubliez d'utiliser Xolamol® collyre

Il est important d'utiliser Xolamol® collyre tel que votre médecin vous l'a prescrit.

Si vous manquez une dose, appliquez-la dès que possible. Cependant, s'il est presque temps pour votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et reprenez votre programme de dosage régulier.

Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose oubliée.

Si vous arrêtez d'utiliser Xolamol® collyre

Si vous voulez arrêter d'utiliser Xolamol® collyre, consultez d'abord votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets secondaires

Comme tous les médicaments, Xolamol® collyre peut provoquer des effets secondaires qui peuvent survenir dans le monde entier.

Vous pouvez avoir des effets secondaires, sauf si vous êtes allergique à ce médicament. Si vous êtes inquiet, parlez à votre pharmacien.

N'arrêtez pas d'utiliser Xolamol® sans en parler à votre médecin.

Si vous ressentez un des effets indésirables graves suivants, arrêtez d'utiliser ce médicament et prévenez immédiatement votre médecin ou rendez-vous au service d'urgence le plus proche.

• Réactions allergiques graves, comme l'anaphylaxie (gonflement sous la peau, éruption cutanée, difficultés à respirer).

• Gonflement sous la peau, éruption cutanée, urticaire ou éruption hives.

• Réaction allergique sévère, comme l'urticaire ou l'éruption hives.

• Maladie grave avec gonflement de la peau, de la bouche, des yeux et de la tête. Une éruption rose-rouge en particulier.

• Gonflement des pieds qui disparaît lorsque l'on se lève.

• Comme d'autres médicaments à base de timolol, Xolamol® collyre peut entraîner des effets secondaires, comme on le voit avec des médicaments pris par voie intraveineuse et/ou « orale ». L'incidence des effets indésirables après l'administration ophtalmique est plus faible que lorsque les médicaments sont, par exemple, pris par voie orale ou par injection.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec Xolamol® collyre ou d'autres médicaments à base de timolol.

• Rétrogration (effet secondaire très fréquent) :



12502657-02S

نولامول®
Xolamol®

Lot:

7001251

Fab:

07 22

Exp:

07 24

P.P.V : 110 DH 70



g/ml, Collyre en solution e + Timolol

Si vous oubliez d'utiliser Xolamol® collyre

Il est important d'utiliser Xolamol® collyre tel que votre médecin vous l'a prescrit.

Si vous manquez une dose, appliquez-la dès que possible. Cependant, s'il est presque temps pour votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et reprenez votre programme de dosage régulier.

Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose oubliée.

Si vous arrêtez d'utiliser Xolamol® collyre

Si vous voulez arrêter d'utiliser Xolamol® collyre, consultez d'abord votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets secondaires

Comme tous les médicaments, Xolamol® collyre peut provoquer des effets secondaires. Ces effets secondaires peuvent survenir dans le monde entier.

Vous pouvez également ressentir des effets secondaires, sauf si vous êtes allergique à ce médicament.

N'arrêtez pas d'utiliser Xolamol® sans en parler à votre médecin.

Si vous ressentez un des effets indésirables graves suivants, arrêtez d'utiliser ce médicament et prévenez immédiatement votre médecin ou rendez-vous au service d'urgence le plus proche.

• Réactions allergiques graves, comme l'anaphylaxie (gonflement sous la peau, éruption cutanée, difficultés respiratoires).

• Gonflement sous la peau, éruption cutanée, urticaire ou éruption hives.

• Réaction allergique sévère, comme l'urticaire ou l'éruption hives.

• Maladie grave avec gonflement de la peau, de la bouche, des yeux et de la tête. Une éruption rose-rouge en particulier.

• Gonflement des pieds qui disparaît lorsque l'on se lève.

• Comme d'autres médicaments à base de timolol, Xolamol® collyre peut entraîner des effets secondaires, comme on le voit avec des médicaments pris par voie intraveineuse et/ou « orale ». L'incidence des effets indésirables après l'administration ophtalmique est plus faible que lorsque les médicaments sont, par exemple, pris par voie orale ou par injection.

Les effets indésirables suivants ont été observés avec Xolamol® collyre ou d'autres médicaments à base de timolol.

• Rétrogration (effet secondaire très fréquent) :



12502657-02S

نولامول®
Xolamol®

Lot:

7001251

Fab:

07 22

Exp:

07 24

P.P.V : 110 DH 70



g/ml, Collyre en solution e + Timolol

Si vous oubliez d'utiliser Xolamol® collyre

Il est important d'utiliser Xolamol® collyre tel que votre médecin vous l'a prescrit.

Si vous manquez une dose, appliquez-la dès que possible. Cependant, s'il est presque temps pour votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et reprenez votre programme de dosage régulier.

Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose oubliée.

Si vous arrêtez d'utiliser Xolamol® collyre

Si vous voulez arrêter d'utiliser Xolamol® collyre, consultez d'abord votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets secondaires

Comme tous les médicaments, Xolamol® collyre peut provoquer des effets secondaires. Ces effets secondaires peuvent survenir dans le monde entier.

Vous pouvez également ressentir des effets secondaires, sauf si vous êtes allergique à ce médicament.

N'arrêtez pas d'utiliser Xolamol® sans en parler à votre médecin.

Si vous ressentez un des effets indésirables graves suivants, arrêtez d'utiliser ce médicament et prévenez immédiatement votre médecin ou rendez-vous au service d'urgence le plus proche.

• Réactions allergiques graves, comme l'anaphylaxie (gonflement sous la peau, éruption cutanée, difficultés respiratoires).

• Gonflement sous la peau, éruption cutanée, urticaire ou éruption hives.

• Réaction allergique sévère, comme l'urticaire ou l'éruption hives.

• Maladie grave avec gonflement de la peau, de la bouche, des yeux et de la tête. Une éruption rose-rouge en particulier.

• Gonflement des pieds qui disparaît lorsque l'on se lève.

• Comme d'autres médicaments à base de timolol, Xolamol® collyre peut entraîner des effets secondaires, comme on le voit avec des médicaments pris par voie intraveineuse et/ou « orale ». L'incidence des effets indésirables après l'administration ophtalmique est plus faible que lorsque les médicaments sont, par exemple, pris par voie orale ou par injection.

Les effets indésirables suivants ont été observés avec Xolamol® collyre ou d'autres médicaments à base de timolol.

• Rétrogration (effet secondaire très fréquent) :



12502657-02S

نولامول®
Xolamol®

Lot:

7001251

Fab:

07 22

Exp:

07 24

P.P.V : 110 DH 70



g/ml, Collyre en solution e + Timolol

Si vous oubliez d'utiliser Xolamol® collyre

Il est important d'utiliser Xolamol® collyre tel que votre médecin vous l'a prescrit.

Si vous manquez une dose, appliquez-la dès que possible. Cependant, s'il est presque temps pour votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et reprenez votre programme de dosage régulier.

Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose oubliée.

Si vous arrêtez d'utiliser Xolamol® collyre

Si vous voulez arrêter d'utiliser Xolamol® collyre, consultez d'abord votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets secondaires

Comme tous les médicaments, Xolamol® collyre peut provoquer des effets secondaires. Ces effets secondaires peuvent survenir dans le monde entier.

Vous pouvez également ressentir des effets secondaires, sauf si vous êtes allergique à ce médicament.

N'arrêtez pas d'utiliser Xolamol® sans en parler à votre médecin.

Si vous ressentez un des effets indésirables graves suivants, arrêtez d'utiliser ce médicament et prévenez immédiatement votre médecin ou rendez-vous au service d'urgence le plus proche.

• Réactions allergiques graves

gongnement sous la peau

zones tels que le visage, le cou et le dos

entraver les voies respiratoires

une difficulté à avaler

urticaire ou éruption cutanée

éruption localisée et importante

réaction allergique sévère

• Maladie grave avec

gongnement de la peau

la bouche, les yeux et les oreilles

fièvre. Une éruption cutanée rose-rouge en particu-

lante des pieds qui peut être

comme d'autres médicaments

ceux, Xolamol® collyre

peut entraîner des effets

comme on le voit avec des

voie intraveineuse et/ou « orale ». L'incidence des

effets indésirables après l'administration ophtalmique

ophtalmique est plus faible que lorsque les médicaments

sont, par exemple, pris par voie orale ou par injection..

ces effets indésirables suivent généralement l'utilisation de Xolamol® collyre ou

très fréquent (affection de 10% ou plus):



12502657-02S

نولامول®
Xolamol®

Lot:

7001251

Fab:

07 22

Exp:

07 24

P.P.V : 110 DH 70



g/ml, Collyre en solution e + Timolol

Si vous oubliez d'utiliser Xolamol® collyre

Il est important d'utiliser Xolamol® collyre tel que votre médecin vous l'a prescrit.

Si vous manquez une dose, appliquez-la dès que possible. Cependant, s'il est presque temps pour votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et reprenez votre programme de dosage régulier.

Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose oubliée.

Si vous arrêtez d'utiliser Xolamol® collyre

Si vous voulez arrêter d'utiliser Xolamol® collyre, consultez d'abord votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets secondaires

Comme tous les médicaments, Xolamol® collyre peut provoquer des effets secondaires qui peuvent survenir dans le monde entier.

Vous pouvez avoir des effets secondaires, sauf si vous êtes allergique à ce médicament.

N'arrêtez pas d'utiliser Xolamol® sans en parler à votre médecin.

Si vous ressentez un des effets indésirables graves suivants, arrêtez d'utiliser ce médicament et prévenez immédiatement votre médecin ou rendez-vous au service d'urgence le plus proche.

• Réactions allergiques graves

gongnement sous la peau

zones tels que le visage, le cou et le dos

entraver les voies respiratoires

une difficulté à avaler

urticaire ou éruption cutanée

éruption localisée et importante

réaction allergique sévère

• Maladie grave avec

gongnement de la peau

la bouche, les yeux et les oreilles

fièvre. Une éruption cutanée rose-rouge en particu

lante des pieds qui peut être rouge

Comme d'autres médicaments, Xolamol® collyre peut entraîner des effets secondaires

comme on le voit avec des médicaments

voie intraveineuse et/ou « orale ». L'incidence des effets indésirables après l'administration ophtalmique

ophtalmique est plus faible que lorsque les médicaments sont, par exemple, pris par voie orale ou par injection..

ces effets indésirables suivent généralement l'utilisation de Xolamol® collyre ou

très fréquent (affection)

0):



12502657-02S

نولامول®
Xolamol®

Lot:

7001251

Fab:

07 22

Exp:

07 24

P.P.V : 110 DH 70



g/ml, Collyre en solution e + Timolol

Si vous oubliez d'utiliser Xolamol® collyre

Il est important d'utiliser Xolamol® collyre tel que votre médecin vous l'a prescrit.

Si vous manquez une dose, appliquez-la dès que possible. Cependant, s'il est presque temps pour votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et reprenez votre programme de dosage régulier.

Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose oubliée.

Si vous arrêtez d'utiliser Xolamol® collyre

Si vous voulez arrêter d'utiliser Xolamol® collyre, consultez d'abord votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets secondaires

Comme tous les médicaments, Xolamol® collyre peut provoquer des effets secondaires qui peuvent survenir dans le monde entier.

Vous pouvez avoir des effets secondaires, sauf si vous êtes allergique à ce médicament.

N'arrêtez pas d'utiliser Xolamol® sans en parler à votre médecin.

Si vous ressentez un des effets indésirables graves suivants, arrêtez d'utiliser ce médicament et prévenez immédiatement votre médecin ou rendez-vous au service d'urgence le plus proche.

• Réactions allergiques graves

gongnement sous la peau

zones tels que le visage

entraver les voies respiratoires

une difficulté à avaler

urticaire ou éruption cutanée

éruption localisée et importante

réaction allergique sévère

• Maladie grave avec

gongnement de la peau

la bouche, les yeux et la tête

fièvre. Une éruption cutanée

rose-rouge en particulier

plaante des pieds qui pique

Comme d'autres médicaments, Xolamol® collyre

peut entraîner des effets secondaires

comme on le voit avec des

voie intraveineuse et/ou « orale ». L'incidence des

effets indésirables après l'administration ophtalmique

ophtalmique est plus faible que lorsque les médicaments sont, par exemple, pris par voie orale ou par injection..

ces effets indésirables suivent généralement l'utilisation de Xolamol® collyre ou

peut être très fréquent (affection de la peau)



12502657-02S

نولامول®
Xolamol®

Lot:

7001251

Fab:

07 22

Exp:

07 24

P.P.V : 110 DH 70



g/ml, Collyre en solution e + Timolol

Si vous oubliez d'utiliser Xolamol® collyre

Il est important d'utiliser Xolamol® collyre tel que votre médecin vous l'a prescrit.

Si vous manquez une dose, appliquez-la dès que possible. Cependant, s'il est presque temps pour votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et reprenez votre programme de dosage régulier.

Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose oubliée.

Si vous arrêtez d'utiliser Xolamol® collyre

Si vous voulez arrêter d'utiliser Xolamol® collyre, consultez d'abord votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets secondaires

Comme tous les médicaments, Xolamol® collyre peut provoquer des effets secondaires. Ces effets secondaires peuvent survenir dans le monde entier.

Vous pouvez également ressentir des effets secondaires, sauf si vous êtes allergique à ce médicament.

N'arrêtez pas d'utiliser Xolamol® sans en parler à votre médecin.

Si vous ressentez un des effets indésirables graves suivants, arrêtez d'utiliser ce médicament et prévenez immédiatement votre médecin ou rendez-vous au service d'urgence le plus proche.

• Réactions allergiques graves

gongnement sous la peau

zones tels que le visage, le cou et le dos

entraver les voies respiratoires

une difficulté à avaler

urticaire ou éruption cutanée

éruption localisée et importante

réaction allergique sévère

• Maladie grave avec

gongnement de la peau

la bouche, les yeux et les oreilles

fièvre. Une éruption cutanée rose-rouge en particu

lante des pieds qui peut être

comme d'autres médicaments

ceux, Xolamol® collyre

peut entraîner des effets

comme on le voit avec des

voie intraveineuse et/ou « orale ». L'incidence des

effets indésirables après l'administration ophtalmique

ophtalmique est plus faible que lorsque les médicaments

sont, par exemple, pris par voie orale ou par injection..

ces effets indésirables suivent généralement l'utilisation de Xolamol® collyre ou

très fréquent (affection de 10% ou plus)



12502657-02S

نولامول®
Xolamol®

Lot:

7001251

Fab:

07 22

Exp:

07 24

P.P.V : 110 DH 70

