

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19-0049400

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 8286 Société : 154329
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre : Depant
Nom & Prénom : EL KHALIL Fatima
Date de naissance : 22/07/1967
Adresse : 41, Residence Enna BIL Bd. ALA Ben Abdellah
Nora media
Tél. : 066 4770374 Total des frais engagés : 395,60 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 17/02/2023
Nom et prénom du malade : EL KHALIL Fatima Age: 56
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : B. Anémie
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Nora media Le : 17/02/2023
Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10/01/23	C1		9	Dr. LAMMAM MEDECINE GENERALE Résidence Nasudini Apt 2 Ain Harrouda - Tel : 05 22 33 22 64 ICE : 00198117000035

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE DE L'AVENUE SARL angle Boul. du Mohamed V et Rue Rf. Mohamed V Tel : 05 25 52 05 02	19/02/2023	395,60

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE H 25533412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 00000000 G 35533411 11433553 B		COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>	
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>	
			DATE DU DEVIS <input type="text"/>	
			DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>	

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Latifa CHATRAOUI

MEDECINE GENERALE

Expert Assermenté auprès des Tribunaux

Résidence Nasadihi - Appt. 2

Aïn Harrouda

Tél.: 05 22 33 22 64

الدكتورة لطيفة الشطراوي

الطب العام

خبيرة محلفة لدى المحاكم

إقامة نساذحي - عين حرودة

الهاتف : 05 22 33 22 64

Aïn Harrouda, le 12/02/2023 في عين حرودة،

EL KHALIL Fatma

6300

1) MACHOMA 400 mg

22.50 mg

2) Rinomucil

3) Aspirine 100 mg

4) Solupred 10 mg

5) Solupred 10 mg

6) Enrova 40 mg

6) Enrova 40 mg

7) Enrova 40 mg

8) Enrova 40 mg

LA PHARMACIE DE L'AVENUE
SARL
Angle Boulevard Mohammed V
et Rue Rif - Mohammedia
Tél : 05 23 32 05 02

395,60

Docteur Latifa CHATRAOUI
MEDECINE GENERALE
Résidence Nasadihi Appt 2
Ain Harrouda - Tél : 05 22 33 22 64
ICE 001981177000035
0900664

SOLUPRED 20 mg comprimé effervescent

Prednisolone

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
SOLUPRED 20 mg 20 cp
P.P.V : 48,70



**entivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle
ormations importantes pour vous.**

notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

autres questions, interrogez votre médecin, ou votre pharmacien.

t vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes.

être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

tez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre
ci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans
rubrique 4.

QUELQUES SOLUPRED 20 mg, comprimé effervescent ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : GLUCOCORTICOIDES - USAGE SYSTEMIQUE.

Code ATC : H02AB06 (H. Hormones non sexuelles).

Ce médicament est un corticoïde (également appelé anti-inflammatoire stéroïdien).

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 10 kg.

Ce médicament est utilisé dans certaines maladies, où il est utilisé pour son effet
antiinflammatoire.

Son action est utile dans le traitement de nombreuses affections inflammatoires ou allergiques.

À fortes doses, ce médicament diminue les réactions immunitaires et est donc également utilisé
pour prévenir ou traiter le rejet des greffes d'organes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SOLUPRED 20 mg, comprimé effervescent ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de
prendre ce médicament.

Ne prenez jamais SOLUPRED 20 mg, comprimé effervescent :

- Si vous êtes allergique à la substance active (prednisolone) ou à l'un des autres composants
contenus dans SOLUPRED 20 mg, comprimé effervescent, mentionnés dans la rubrique 6.

Macromax®

Azithromycine

POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE - POUDRE POUR SA

COMPOSITION ET PRESENTATION :

Azithromycine (DCI) dihydrate

Comprimés 500 mg, boîte de 3 comprimés

Poudre pour sachet à 100 mg par voie orale, boîte de 3

Poudre pour sachet à 200 mg par voie orale, boîte de 3

Poudre pour sachet à 300 mg par voie orale, boîte de 3

Poudre pour sachet à 400 mg par voie orale, boîte de 3

Poudre pour suspension buvable 200 mg/5 ml, flacon

Poudre pour suspension buvable 200 mg/5 ml, flacon

Liste des excipients à effet notoire : saccharose, sodium

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Elles sont limitées aux infections dues aux germes dé

- Angines : en alternative au traitement de référence ne peut être utilisé.

- Surinfections des bronchites aiguës.

- Exacerbations des bronchites chroniques.

Il convient de tenir compte des recommandations off appropriée des antibactériens.

CONTRE-INDICATIONS :

Absolues :

- Antécédents de réaction allergique à l'azithromycine ou à tout autre macrolide.

- Alcaloïdes de l'ergot de seigle (dihydroergotamine, ergotamine), cisapride.

Relatives :

Agonistes dopaminergiques (bromocriptine, cabergoline, pergolide)

MISES EN GARDE :

Toute manifestation allergique (éruption cutanée, démangeaison..) en cours de traitement doit être signalée immédiatement à votre médecin.

Signaler au médecin traitant toute allergie ou manifestations allergiques survenues lors de traitements par les antibiotiques de la famille des macrolides.

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une maladie hépatique

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Prévenir le médecin traitant en cas de :

- Insuffisance hépatique,

- prise concomitante d'autres médicaments,

- antécédents allergiques,

- manifestations cutanées à l'origine allergique.

مکرومکس

آزیترومیسین

اد حیوی

LOT : 9872

PER : 06-24

P.P.V : 63 DH 00

3 أقراص

500 مغ

IXOR®

(Oméprazole)

IXOR® 20 mg 28 comprimés effervescents

DENOMINATION DU MEDICAMENT

- IXOR® Comprimés effervescents
- IXOR® Comprimés effervescents

Veillez lire attentivement de prendre ce médicament importantes pour vous

- Gardez cette notice, à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous donne pas à d'autres effets même si les signes de l'infection sont présents.
- Si l'un des effets remarquez un effet indésirable, parlez-en à votre médecin.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que IXOR® et à quoi sert-il ?
2. Quelles sont les informations importantes à connaître sur IXOR® ?
3. Comment prendre IXOR® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver IXOR® ?
6. Informations supplémentaires.

PPV 118DH50

EXP 04/2024
LOT 24029 1

1- QU'EST-CE QUE IXOR® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

Code ATC : A02BC01

IXOR® comprimé effervescent contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

- Indications thérapeutiques

IXOR® comprimé effervescent est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Chez les adultes :

• Le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

• Les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).

• Les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

• Les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). IXOR® comprimé effervescent peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.

• Un excès d'acide dans l'estomac dû à une grosseur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison).

Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel ≥ 10 kg

• Le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

• Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents

• Les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE IXOR® ?

- Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament
Sans objet.

- Ne prenez jamais IXOR® (Contre-indications)

• Si vous êtes allergique à l'oméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

• Si vous êtes allergique à un autre médicament (par exemple pantoprazole, ésomeprazole).

• Si vous prenez un médicament pour traiter l'infection par le VIH).

• Si vous êtes dans une des situations mentionnées ci-dessus, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre IXOR®.

- Effets indésirables

• Si vous avez des problèmes hépatiques (taux élevés d'enzymes hépatiques), votre médecin de façon régulière. Vous devez surveiller les symptômes et événements nouveaux.

• Si vous avez déjà eu des problèmes de reflux, vous devez surveiller les symptômes et événements nouveaux.

• Si vous avez des problèmes de reflux, vous devez surveiller les symptômes et événements nouveaux.

• Si vous avez des problèmes de reflux, vous devez surveiller les symptômes et événements nouveaux.

• Si vous avez des problèmes de reflux, vous devez surveiller les symptômes et événements nouveaux.

• Si vous avez des problèmes de reflux, vous devez surveiller les symptômes et événements nouveaux.

• Si vous avez des problèmes de reflux, vous devez surveiller les symptômes et événements nouveaux.

• Si vous avez des problèmes de reflux, vous devez surveiller les symptômes et événements nouveaux.

• Si vous avez des problèmes de reflux, vous devez surveiller les symptômes et événements nouveaux.

• Si vous avez des problèmes de reflux, vous devez surveiller les symptômes et événements nouveaux.

• Si vous avez des problèmes de reflux, vous devez surveiller les symptômes et événements nouveaux.

• Si vous avez des problèmes de reflux, vous devez surveiller les symptômes et événements nouveaux.

• Si vous avez des problèmes de reflux, vous devez surveiller les symptômes et événements nouveaux.

• Si vous avez des problèmes de reflux, vous devez surveiller les symptômes et événements nouveaux.

• Si vous avez des problèmes de reflux, vous devez surveiller les symptômes et événements nouveaux.

• Si vous avez des problèmes de reflux, vous devez surveiller les symptômes et événements nouveaux.

• Si vous avez des problèmes de reflux, vous devez surveiller les symptômes et événements nouveaux.

• Si vous avez des problèmes de reflux, vous devez surveiller les symptômes et événements nouveaux.

• Si vous avez des problèmes de reflux, vous devez surveiller les symptômes et événements nouveaux.

• Si vous avez des problèmes de reflux, vous devez surveiller les symptômes et événements nouveaux.

• Si vous avez des problèmes de reflux, vous devez surveiller les symptômes et événements nouveaux.

• Si vous avez des problèmes de reflux, vous devez surveiller les symptômes et événements nouveaux.

• Si vous avez des problèmes de reflux, vous devez surveiller les symptômes et événements nouveaux.

• Si vous avez des problèmes de reflux, vous devez surveiller les symptômes et événements nouveaux.

• Si vous avez des problèmes de reflux, vous devez surveiller les symptômes et événements nouveaux.

• Si vous avez des problèmes de reflux, vous devez surveiller les symptômes et événements nouveaux.

أنرويكس® أقراص للمص

ENROUEX®

Propolis - Vitamine C

Eucalyptus - Echinacea - Gingembre

LOT 20344/FC14

Propriétés : 12/2023 PFC 42 60

ENROUEX est composé de plantes dont les propriétés sont bénéfiques pour la gorge et les voies respiratoires.

بلغ أي 100% من الاحتياجات اليومية الموصى بها)، مستخلص من مادة قنفذية (50 ملغ-إيشينيسيا بوربورية، مالتوديكسترين).

منغنيسيوم وسيلين
لهة الليغون، منتول

سنة بها

مطهر مقاوم للالام ومضاد للأكسدة

منعش الطاق ومضاد للأكسدة

فيتامين الأسكوربيك (فيتامين س)

أنرويكس أقراص يشكل مجموعة متكاملة من مستخلصات النباتات الطبية المعترف لها بمفعولها المفيد للمقاومة الذاتية والتهابات الحنجرة والمسالك التنفسية.

المقادير : قرص واحد يمتص ثلاث مرات في اليوم.

تحذيرات الاستعمال : يحتوي على مصدر الفينيلالانين.

تم صنعه من طرف سترافارم - ويوزع من طرف "راموفارم".

/ هذا مكمل غذائي وليس بدواء.

ENROUEX® tablettes

Forme & présentation :

Tube de 10 comprimés à sucer.

Composition :

Propolis (80 mg - caroube), acide ascorbique (60 mg soit 100% des AJR), extrait d'eucalyptus (50 mg - Eucalyptus globulus, maltodextrine), extrait sec d'échinacée (50 mg - Echinacea purpurea, maltodextrine), extrait de gingembre (12 mg - Zinziger officinalis, maltodextrine), agent de charge : sorbitol, poudre au miel, agent agglomérant : stéarate de magnésium et silice colloïdale, édulcorant : thaumatine, sucralose, acésulfame K et aspartame, arôme citron menthol.

INGREDIENTS	PROPRIETES
Extrait de Propolis	Antiseptique
Extrait d'Eucalyptus	Décongestionnant
Extrait d'Echinacée	Stimulant des défenses de l'organisme
Extrait de Gingembre	Antiseptique, analgésique et expectorant
Acide ascorbique	Stimulant énergétique et antioxydant

ENROUEX® tablettes est une association synergique d'extraits de plantes médicinales, reconnues pour leurs actions bénéfiques sur les défenses de l'organisme, les irritations de la gorge et des voies respiratoires.

Posologie :

1 comprimé à sucer 3 fois par jour.

Précautions d'utilisation :

Contient une source de phénylalanine.

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.

Ne dispense pas une alimentation équilibrée.

أنرويكس® شراب بدون سكر

الشكل والتقديم :

شراب. قارورة من 125 مل، قارورة من 200 مل

من سائل من الخشخاش المنتور 10% ماء مطهر 7,6% ،
5% ، مستخلص سائل من الفجل الأسود 2-5% ، مستخلص
10% حامض ليونيك 0,2% ، سوريات البوتاسيوم 0,1% ،
ريحان شامي الأساسي 0,07% .

المميزات الخاصة
مضاد للحرثيم مطهر
مطهر
يهدئ وملين
سكن
بلين
شارد للبلغم
يزيل للاحتقان
يزيل للاحتقان

ENROUEX®
Propolis - Vitamine C
Eucalyptus - Echinacea - Gingembre

LOT 22.040/FC24

Propriétés : 02/2025 PPC 45.60
ENROUEX est composé de plantes dont
les propriétés sont bénéfiques pour
la gorge et les voies respiratoires.

لأنرويكس خصائص منخمة ومزيلة للاحتقان وملينة ومناعة للعدوى ومطهرة.

أنرويكس يشكل مجموعة متكاملة من مستخلصات النباتات الطبية والزيوت الأساسية المفيدة لالتهاب الحنجرة والمساك التنفسية.
أنرويكس منتج مكتمل لعلاج اضطرابات الإفرازات القصبية.

نصائح الاستعمال :

للبالغ والطفل ابتداء من 5 سنوات.

يحرك قبل الاستعمال.

ملعقة صغيرة واحدة إلى ملعقتين صغيرتين ثلاث مرات في اليوم.

مدة الاستعمال : إذا ما تم فتح القارورة يجب استعمالها في الشهر الموالي لفتحها.

تم صنعه من طرف فيتيو
ويوزع من طرف "راموفارم".
هذا مكمل غذائي وليس بدواء.

ENROUEX® sirop sans sucre

Forme et présentation :

Sirop, Flacon de 125 ml, Flacon de 200 ml.

Composition :

Glycérine 52,21%, Extrait liquide de Propolis 13%, Extrait liquide de coquelicot 10%, Eau purifiée 7,6%, Extrait liquide de Tilleul 6,25%, Extrait liquide d'Eucalyptus 5%, Extrait liquide de Radis noir 2,5%, Extrait liquide de Mauve 2,5%, Gomme xanthane 0,2%, Arôme orange 0,2%, Acide citrique 0,2%, Sorbate de potassium 0,1%, Benzoate de sodium 0,1%, Huile essentielle d'Eucalyptus 0,07%, Huile essentielle de Myrte 0,07%.

INGREDIENTS	PROPRIETES
Extrait de Propolis	Purifiant désinfectant
Extrait d'Eucalyptus	Purifiant
Extrait de Coquelicot	Emollient, sédatif
Extrait de Tilleul	Calmant
Extrait de Mauve	Emollient
Extrait de Radis noir	Expectorant
Huile essentielle d'Eucalyptus	Décongestionnant
Huile essentielle de Myrte	Décongestionnant

ENROUEX® possède des propriétés expectorantes, décongestionnantes, émoullientes, antiseptiques et désinfectantes.

ENROUEX® est une association synergique d'extraits de plantes médicinales et d'huiles essentielles bénéfiques pour les irritations de la gorge et des voies respiratoires.

ENROUEX® est un produit d'appoint pour les troubles de la sécrétion bronchique.

Conseils d'utilisation :

Adulte et enfant à partir de 5 ans.

Agiter avant utilisation.

1 à 2 cuillères à café à prendre 3 fois par jour.

Durée d'utilisation :

Une fois le flacon entamé, il doit être utilisé dans le mois suivant son ouverture.

Fabriqué par PHYTEO
Distribué par Ramo-Pharm
Complément alimentaire n'est pas un médicament

ICINE®

PHARMAS
LOT : 4947
UT AV : 11-25
PPV : 22DH70

EFFETS SECONDAIRES :

Peu fréquent : sensation légère

Rarement : éruptions cutanées,

SIGNALER A VOTRE MEDECIN

SOUHAITE ET GENANT QUI NE PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Réservé uniquement à l'adulte.

Pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence du paracétamol et du salicylamide dans la composition d'autres médicaments.

Chez l'adulte de plus de 50 Kg : la dose totale de paracétamol ne doit pas excéder 4 g par jour.

En cas d'ulcère gastroduodénal, d'hémorragie digestive, de traitement anticoagulant associé, de traitement prolongé ou à forte dose, d'asthme, de diabète, d'insuffisance rénale, une surveillance médicale régulière est nécessaire.

Pendant la durée de traitement l'absorption d'alcool est déconseillée.

Ce médicament contient du saccharose, son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase isomaltase.

Tenir compte dans la ration journalière de la teneur en saccharose (8 g par sachet).

Il est inutile et potentiellement dangereux d'associer entre eux deux médicaments contenant des vasoconstructeurs.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Rinomicine® est déconseillé chez la femme enceinte et allaitante. Toutefois en cas de nécessité, son administration pendant la grossesse et l'allaitement sera possible sous surveillance du médecin traitant ou du pharmacien.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

Voie orale.

Réservé uniquement à l'adulte.

Débuter le traitement par un sachet toutes les 6 heures puis continuer par 1 sachet toutes les 8 heures.

ICINE®

PHARMAS

LOT : 4947
UT AV : 11-25
PPV : 22DH70

EFFETS SECONDAIRES :

Peu fréquent : sensation légère

Rarement : éruptions cutanées,

SIGNALER A VOTRE MEDECIN

SOUHAITE ET GENANT QUI NE PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Réservé uniquement à l'adulte.

Pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence du paracétamol et du salicylamide dans la composition d'autres médicaments.

Chez l'adulte de plus de 50 Kg : la dose totale de paracétamol ne doit pas excéder 4 g par jour.

En cas d'ulcère gastroduodénal, d'hémorragie digestive, de traitement anticoagulant associé, de traitement prolongé ou à forte dose, d'asthme, de diabète, d'insuffisance rénale, une surveillance médicale régulière est nécessaire.

Pendant la durée de traitement l'absorption d'alcool est déconseillée.

Ce médicament contient du saccharose, son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase isomaltase.

Tenir compte dans la ration journalière de la teneur en saccharose (8 g par sachet).

Il est inutile et potentiellement dangereux d'associer entre eux deux médicaments contenant des vasoconstructeurs.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Rinomicine® est déconseillé chez la femme enceinte et allaitante. Toutefois en cas de nécessité, son administration pendant la grossesse et l'allaitement sera possible sous surveillance du médecin traitant ou du pharmacien.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

Voie orale.

Réservé uniquement à l'adulte.

Débuter le traitement par un sachet toutes les 6 heures puis continuer par 1 sachet toutes les 8 heures.

طوبليكسيل

LOT : 22E050
PER : 11 2024

TOPEXIL
SIROP FL 150 ML

P.P.V : 15DH70



مرة يكملها قبل تناول

عن علاجك.

يك شك، اطلب المزيد من

المعلومات من الطبيب أو الصيدلي.

احتفظ بهذه النشرة، قد تكون بحاجة لإعادة قراءتها.

إذا احتجت إلى المزيد من المعلومات والتفاصيل، اتصل بالصيدلي.

إذا تفاقمت الأعراض أو استمرت، استشر الطبيب.

في هذه النشرة:

1. ما هو طوبليكسيل شراب وما هي الحالات التي يجب استعماله

فيها؟

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول طوبليكسيل شراب؟

3. كيف يجب استعمال طوبليكسيل شراب؟

4. ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة؟

5. كيف يجب حفظ طوبليكسيل شراب؟

6. معلومات إضافية

1. ما هو طوبليكسيل شراب وما هي الحالات التي يجب

استعماله فيها؟

مضاد الهيستامين ذو استعمال شامل.

(الجهاز التنفسي).

يحتوي هذا الدواء على مضاد الهيستامين، أوكسوميمازين.

و يوصف للتخفيف من السعال الجاف والسعال التهيجي لدى البالغين

والأطفال ما فوق سنتين، وخاصة عندما يحدث في المساء أو خلال

الليل.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول طوبليكسيل

شراب؟

إذا أخبرك الطبيب عن عدم تحملك لبعض أنواع السكريات، اتصل به قبل

تناول هذا الدواء.

لا تستعمل أبدا طوبليكسيل شراب في الحالات التالية:

• الرضيع (أقل من سنتين)،

• حساسية معروفة للمكونات وخاصة مضادات الهيستامين،

• شوايق في ندرة الكريات البيضاء

في الدم).

• صعوبة في التبول ذات مصدر

• بعض أشكال زرق العين (ارتفاع)

• باشتراك مع بعض الأدوية (كابيب

استعمال أدوية أخرى).

في حالة الشك، من الضروري اس

انتبه عند استعمال طوبليكسيل شر

تحذيرات خاصة

السعال من أحد الأعراض الذي قبل

التهاب القصبات الهوائية، نزلة

التهيج، الخ.

كما أن التدخين يؤدي إلى تفاقم

في حالة ظهور أو استمرار

التعفن (التهاب اللوزتين ...).

عليك إبلاغ الطبيب المعالج.

لا يجب استعمال هذا الدواء لعلاج

السعال وسيلة للدفاع الطبيعي

إذا أصبح السعال نهمايا، مقترنا

الطبيب.

في حالة مرض مزمن (طويل الأمد)

مرافق بسعال مع البصاق، من الخ

لا يجب الجمع مع دواء ملين للإفر

منيب المخاط).

احتياطات الاستعمال

في حالة مرض طويل الأمد للكبد

الجرعة المناسبة.

يتطلب تناول هذا الدواء استشارة

• لدى الأشخاص المسنين:

• المعرضون للإسك، أو الدوار،

• المعانين من اضطرابات البروست

• لدى الأطفال في حالة الربو أو

• في حالة أمراض قلبية خطيرة

أخبر الطبيب قبل تناول مضاد الهي

لا ينصح بتناول هذا الدواء مع الم

على الكحول (انظر "تناول أو استق

لا يجب التعرض للشمس أو للأشع

يجب استعمال هذا الدواء بكل حيطة

مشاركته مع أدوية أخرى مسكنة

طوبليكسيل

LOT : 22E050
PER : 11 2024

TOPEXIL
SIROP FL 150 ML

P.P.V : 15DH70



مرة يكملها قبل تناول

عن علاجك.

يك شك، اطلب المزيد من

المعلومات من الطبيب أو الصيدلي.

احتفظ بهذه النشرة، قد تكون بحاجة لإعادة قراءتها.

إذا احتجت إلى المزيد من المعلومات والتفاصيل، اتصل بالصيدلي.

إذا تفاقمت الأعراض أو استمرت، استشر الطبيب.

في هذه النشرة:

1. ما هو طوبليكسيل شراب وما هي الحالات التي يجب استعماله

فيها؟

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول طوبليكسيل شراب؟

3. كيف يجب استعمال طوبليكسيل شراب؟

4. ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة؟

5. كيف يجب حفظ طوبليكسيل شراب؟

6. معلومات إضافية

1. ما هو طوبليكسيل شراب وما هي الحالات التي يجب

استعماله فيها؟

مضاد الهيستامين ذو استعمال شامل.

(الجهاز التنفسي).

يحتوي هذا الدواء على مضاد الهيستامين، أوكسوميمازين.

و يوصف للتخفيف من السعال الجاف والسعال التهيجي لدى البالغين

والأطفال ما فوق سنتين، وخاصة عندما يحدث في المساء أو خلال

الليل.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول طوبليكسيل

شراب؟

إذا أخبرك الطبيب عن عدم تحملك لبعض أنواع السكريات، اتصل به قبل

تناول هذا الدواء.

لا تستعمل أبدا طوبليكسيل شراب في الحالات التالية:

• الرضيع (أقل من سنتين)،

• حساسية معروفة للمكونات وخاصة مضادات الهيستامين،

• شوايق في ندرة الكريات البيضاء

في الدم).

• صعوبة في التبول ذات مصدر

• بعض أشكال زرق العين (ارتفاع)

• باشتراك مع بعض الأدوية (كابيب

استعمال أدوية أخرى).

في حالة الشك، من الضروري اس

انتبه عند استعمال طوبليكسيل شراب

تحذيرات خاصة

السعال من أحد الأعراض الذي قبل

التهاب القصبات الهوائية، نزلة

التهيج، الخ.

كما أن التدخين يؤدي إلى تفاقم

في حالة ظهور أو استمرار

التعفن (التهاب اللوزتين ...).

عليك إبلاغ الطبيب المعالج.

لا يجب استعمال هذا الدواء لعلاج

السعال وسيلة للدفاع الطبيعي

إذا أصبح السعال نهمايا، مقترنا

الطبيب.

في حالة مرض مزمن (طويل الأمد)

مرافق بسعال مع البصاق، من الخ

لا يجب الجمع مع دواء ملين للإفرا

منيب المخاط).

احتياطات الاستعمال

في حالة مرض طويل الأمد للكبد

الجرعة المناسبة.

يتطلب تناول هذا الدواء استشارة

• لدى الأشخاص المسنين:

• المعرضون للإسك، أو الدوار،

• المعانين من اضطرابات البروست

• لدى الأطفال في حالة الربو أو

• في حالة أمراض قلبية خطيرة

أخبر الطبيب قبل تناول مضاد الهي

لا ينصح بتناول هذا الدواء مع الم

على الكحول (انظر "تناول أو استق

لا يجب التعرض للشمس أو للأشع

يجب استعمال هذا الدواء بكل حيطة

مشاركته مع أدوية أخرى مسكنة