

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



54814

Déclaration de Maladie : N° S19-0005751

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : ~~ATPRA001~~ 10821 Société :

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : MINRAOUI mohamad Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 0663790621 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : 

Date de consultation :/...../.....

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant


Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 15/05/2023

Signature de l'adhérent(e) : 



RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	15/03/23	1119,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D H 21433552 00000000 G 00000000 00000000 35533411 11433553 B (Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		COEFFICIENT DES TRAVAUX	
			MONTANTS DES SOINS	
			DATE DU DEVIS	
			DATE DE L'EXECUTION	

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

DECLARATION DE MALADIE LONGUE DUREE : VALABLE 6 MOIS

Partie réservée à l'adhérent (e) ou ayant droit	
Nom et prénom :	Mimmasi Mohamed
Matricule :	10221
Adresse :	
Bénéficiaire de soins :	☐ Adhérent ☒ Conjoint ☐ Enfant
Partie réservée au médecin traitant	
Je soussigne :	Spécialité : Cardiologie
N° ICE :	N° INPE :
Certifie que Mlle, Mme, M. :	EL Hajri Najat
Nécessitant un traitement d'une durée :	☐ < 3 mois ☐ Entre 3 et 6 mois ☒ A vie
Arguments cliniques et résultats des examens complémentaires récents justifiant le diagnostic et traitement :	
HTA, diabète	
Dont ci-joint ordonnance :	
Traitement prescrit : Prevaltal 10/2.5 14j + Cardix 6.25	
Je déclare les informations ci-dessus sincères et véritables	
Fait à : Casablanca le 27/02/2023	
Cachet et signature du médecin traitant :	
	

* Cette déclaration est renouvelable une fois

En application de la loi 08-09 relative à la protection des données à caractère personnel, MUPRAS garantit la confidentialité des informations communiquées

Pharmaceutical Institute
R.S. 203 OUM AZZA Région Rabat

LOT : 200

PER : JUL 2025

PPV : 41 DH 90

COMPL

Chaque

CARDIX

CARDIX

Excipients : lactose

FORMES PHARM

Comprimés dosés

Comprimés dosés à 25 mg

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : à la prescription du médecin

CARDIX 6,25 et 25 mg

- Traitement de l'insuffisance cardiaque (fraction d'éjection $\leq 35\%$) en association avec le traitement conventionnel comportant inhibiteurs de l'enzyme de conversion, diurétiques, bêta-bloquants, etc.

CARDIX 25 mg

- Traitement de l'hypertension
- Traitement de l'angine de poitrine

EFFETS INDÉSIRABLES :

Les effets indésirables les plus fréquemment observés sont :

Système nerveux central : étourdissements ;

Cardiovasculaires :

- bradycardie, hypotension orthostatique, lipothymie ;
- oedème (périphérique, génital, postural, de la face) ;
- possibilité de survenue d'un bloc auriculoventriculaire ;
- possibilité de décompensation de l'insuffisance cardiaque.

Gastro-intestinaux : nausées, diarrhée et vomissements ;

Hématologiques : thrombocytopénie, nécessitant l'arrêt du traitement ;

Métaboliques : hyperglycémie, prise de poids ;

Autres : • anomalies de la vision, • possibilité d'insuffisance rénale ;

diffuse et/ou une altération de la fonction rénale.

La fréquence des effets indésirables ne dépend pas de la dose.

IL EST CONSEILLÉ DE MENTIONNER TOUT EFFET INDÉSIRABLE.

CONTRE-INDICATIONS :

Absolues :

- Patients ayant une insuffisance cardiaque sévère décompensée ;
- Signes cliniques de dysfonctionnement hépatique ;
- Hypersensibilité au carvédilol ou à l'un des excipients ;
- Antécédent de réaction anaphylactique ;
- Asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives ;
- Blocs auriculoventriculaires des 2^e et 3^e degrés ;
- Bradycardie sévère (< 50 contractions/min) ;
- Choc cardiogénique ;
- Maladie du sinus cardiaque (y compris bloc sino-auriculaire) ;
- Hypotension sévère (pression systolique < 85 mm Hg) ;
- Phénomènes de Raynaud et troubles circulatoires périphériques ;
- Association avec : Flucétafénil, sultopride ou cimétidine ;
- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du

CARDIX®

Carvédilol

6,25 mg

25 mg

Excipients : lactose, amidon de maïs, oxyde de fer jaune, silice colloïdale dioxyde, talc, Stéarate de magnésium.

إس. ٢٠٣ أوم أززا

9 111 000 050566



CARDIX® 6,25mg
28 Comprimés

F209013/05

LOT: 193
PER: FEB 2025
PPV: 44 DH 00

PHARMACEUTICAL INSTITUTE

ET POSOLOGIE

r à la prescription du médecin

D'EMPLOI

ntérieur

E CONSERVATION

ne $t^{\circ} \leq 30^{\circ}\text{C}$ et à l'abri de l'humidité

la portée des enfants.

دواعي الإستعمال و المقادير

إلزاموا بوصفة طبيكم إلزاما دقيقا

شروط الإستعمال

أنظر النشرة بداخله

عن طريق الفم

المحافظة

يجب الاحتفاظ بهذا الدواء في درجة حرارية تقل أو تساوي 30°C مئوية

لا تتركوا هذا الدواء في متناول الأطفال

يستمع



صق 28

9 118000 050568



28 Comprimés

CARDIX® 6,25mg

Pharmaceutical Institute
R.S. 203 OUM AZZA Région Rabat

LOT : 200

PER : JUL 2025

PPV : 41 DH 90

COMPL

Chaque

CARDIX

CARDIX

Excipients : lactose

FORMES PHARM

Comprimés dosés

Comprimés dosés à 25 mg

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : à la prescription du médecin

CARDIX 6,25 et 25 mg

- Traitement de l'insuffisance cardiaque (fraction d'éjection $\leq 35\%$) en association avec le traitement conventionnel comportant inhibiteurs de l'enzyme de conversion, diurétiques, bêta-bloquants, etc.

CARDIX 25 mg

- Traitement de l'hypertension
- Traitement de l'angine de poitrine

EFFETS INDÉSIRABLES :

Les effets indésirables les plus fréquemment observés sont :

Système nerveux central : étourdissements ;

Cardiovasculaires :

- bradycardie, hypotension orthostatique, lipothymie ;
- oedème (périphérique, génital, postural, de la face) ;
- possibilité de survenue d'un bloc auriculoventriculaire ;
- possibilité de décompensation de l'insuffisance cardiaque.

Gastro-intestinaux : nausées, diarrhée et vomissements ;

Hématologiques : thrombocytopénie, nécessitant l'arrêt du traitement ;

Métaboliques : hyperglycémie, prise de poids ;

Autres : • anomalies de la vision, • possibilité d'insuffisance rénale ;

diffuse et/ou une altération de la fonction rénale.

La fréquence des effets indésirables ne dépend pas de la dose.

IL EST CONSEILLÉ DE MENTIONNER TOUT EFFET INDÉSIRABLE.

CONTRE-INDICATIONS :

Absolues :

- Patients ayant une insuffisance cardiaque sévère décompensée ;
- Signes cliniques de dysfonctionnement hépatique ;
- Hypersensibilité au carvédilol ou à l'un des excipients ;
- Antécédent de réaction anaphylactique ;
- Asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives ;
- Blocs auriculoventriculaires des 2^e et 3^e degrés ;
- Bradycardie sévère (< 50 contractions/min) ;
- Choc cardiogénique ;
- Maladie du sinus cardiaque (y compris bloc sino-auriculaire) ;
- Hypotension sévère (pression systolique < 85 mm Hg) ;
- Phénomènes de Raynaud et troubles circulatoires périphériques ;
- Association avec : Fluctaféline, sultopride ou cimétidine ;
- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du

CARDIX®

Carvédilol

6,25 mg

25 mg

Excipients : lactose, amidon de maïs, oxyde de fer jaune, silice colloïdale dioxyde, talc, Stéarate de magnésium.

إس. ٢٠٣ أوم أززا

9 111 000 050566



CARDIX® 6,25mg
28 Comprimés

F209013/05

LOT: 193
PER: FEB 2025
PPV: 44 DH 00

PHARMACEUTICAL INSTITUTE

ET POSOLOGIE

r à la prescription du médecin

D'EMPLOI

ntérieur

E CONSERVATION

ne $t^{\circ} \leq 30^{\circ}\text{C}$ et à l'abri de l'humidité

la portée des enfants.

دواعي الإستعمال و المقادير

إلزاموا بوصفة طبيكم إلزاما دقيقا

شروط الإستعمال

أنظر النشرة بداخله

عن طريق الفم

المحافظة

يجب الاحتفاظ بهذا الدواء في درجة حرارية تقل أو تساوي 30°C مئوية

لا تتركوا هذا الدواء في متناول الأطفال

يحتفظ بـ



9 118000 050568



28 Comprimés

CARDIX[®] 6,25mg

صق 28

جربري 10 ملغ / 2,5 ملغ

جراندوبريل / إنديناميد

Prelectal® 10 mg / 2,5 mg

30 Comprimés pelliculés



pharma

30

6 118000 280712

LOT N°:

EXP:

PPV:

152190

3 - كيف تستخدم بريكتال

الجرعة وطريقة الاستعمال:
يجب التنبيه بأن الجرعة التي
إن الجرعة الاعتيادية عبارة عن
في الصباح وقبل وجبة الإفطار.

الأعراض والتعليقات في حال الجرعة الزائدة

إن طرا وأخذت عدة حبات. يُصل فوراً بطبيب
فاكر ما يُحدث وقوعه في حال الإفراط بالجرعة.
مكافحة ذلك بتعديد لمصاب مع رفع السائل لتأخذ.

الإرشادات في حالة التلّصّ واحد أو أكثر من الجرعات

في الهام جداً أخذ الدواء يومياً بصورة منتظمة. فإن جودة العلاج
بريكتال. عليك بأخذ الجرعة الاعتيادية في اليوم التالي ولا يجوز

محاذير الاستخدام

حيث إن المخاوف ضد إرتفاع الضغط الشرياني علاج طويل المدى. عليك بالتشاور مع طبيبك بأمر التوقف عن العلاج.
إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية تتعلق باستعمال هذا الدواء، فالرجاء طلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلي.

4 - ما هي الآثار الجانبية للمختمنة

كما هو الحال مع كل دواء قد تظهر عند استعمال بريكتال. بعض الأمراض المزمنة/المرتبطة بها لها نصص كافة المتناوين.
إذا لاحظت حدوث أي من التأثيرات الجانبية المذكورة فيما يلي، عليك أن تتوقف مباشرة عن تناول بريكتال. وأن
تستلم طبيبك على الفور:

- تضخم أو تورم في القدمين، في البطن، في الساقين أو في العيون، شحوب في التنفس.
- دوخة شديدة، أو غيب أو الوهم.
- نزاع غير عادي أو اضطرابات في ضربات القلب.

وقد تشمل الآثار الجانبية بالمتبرع التفاعلي كالتالي:

غالباً (حدث لدى أقل من واحد بالعشرة وأكثر من واحد بالمائة): صداع، دخول، دوخة، تشنجات (اضطرابات في النظر،
عطين في الأذن، دخول ناتج عن انخفاض الضغط الشرياني، شحوب، تشنجات، اضطرابات معدنية معوية (غثبان في،
أي اضطراب (اضطرابات في التنوّق) لتجلب في القدم (اضطرابات معدنية أو عسر عظم، إسهال، إمساك)، تفاقم حساسية
(طلع جلدي، حكة، تشنج عضلي، الحساسية للأدوية).

نادراً (حدث لدى أقل من واحد بالمائة وأكثر من واحد بالالف): تشنجات مزاجية، آرق في النوم، تشنج
قصبي (أي الحساسية بضيق في الصدر، نفس ضاح وقصير)، دوخة وعامة (غثاس يأتي على شكل صغر في التنفس، أو
تضخم في البشرة أو في الساقين، حرق فرفرية purpura (أي ظهور بقع حمراء على سطح الجلد، اضطرابات كبدية،
عسر جنسي، ترقق.

نادراً جداً (حدثت لدى أقل من واحد بالعشرة آلاف): حيرة، اضطرابات قلبية وعائية (ضربات غير
منتظمة، دجمة صدرية، إمساك قلبية)، داء البرية البوريتية (شكل نادر من داء البرية)، زكام (إسداد أو سيلان الأنف،
ظهور طلع جلدي، حاد الحساسية المتعددة الأشكال، فإن كنت تشكو من الذئب الشمسي (الحساسية)، داء (الجلوبيني)
غير يزداد الوضع سوءاً وقد لوحظت تحسّس من الغدق (تبدلات تظهر على سطح الجلد)، داء التورن (تشنجات تشنّج
الغصن أو لفتحة إصبعاً فوق الترسّية.

الغصن معروفة (عدم توفر أية معطيات نشر إلى نسبة تلك الاضطرابات)، وكذلك ضربات القلب غير منتظمة تؤثر على
المؤشرات الحيوية، مخطط القلب البياني الكهربائي غير طبيعي، إرتفاع نسبة الأنزيمات الكبدية.

كما قد تطرأ اضطرابات كبدية أو كبدية أو على مستوى المختمنة / البكترياس، وتشنجات و مقاييس الدم.
فيمكن طبيبك أن يطلب منك القيام بالتحاليل اللازمة لمتابعة منك من مراقبة وضعت. في حال الصدور الكبدية
قد تحدث ولعل إمساك الإسهال الدماغي الكبدية (اضطرابات معدنية قوتية تظهر وتلفر على الإصابات السمية في الكبد).

إذا أصبت بأي آثار جانبية تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي، هذا يشمل أي آثار جانبية ممكنة حتى وإن لم يرد
ذكراً في هذه النشرة.

5 - كيف يتم تعزيز بريكتال

يزك بعيدا عن متناول وبصر الأطفال.

لا تستخدم بريكتال

بعد الموعد المشار إليها على العبوة الخارجية وعلى العلبة على تاريخ انتهاء الصلاحية
إلى اليوم الأخير من الشهر.

أعلى العبوة يتنكم واحتفظ بها بعيدا عن الرطوبة.

لا ينبغي التخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو التفتات المنزلية، أسأل الصيدلي عن كيفية التخلص
من الأدوية التي لم تعد مطلوبة، سوف تساعد هذه التناوين لعمامة البيئة.

6 - معلومات إضافية

على ماذا يحتوي بريكتال؟ وما على ماذا يحتوي؟
للمزيد من المعلومات، راجع بروشور دواء جربري، أو جربري، أو إنديناميد.

مبين /
ت ملّسة

قبل اتخاذ
ج لقراتها مرة

إذا كان لديك أسئلة
فلا تعطيها للآخرين

صديدي إذا أحسست بأثار جانبية. وهذا ينطبق أيضا على أي آثار جانبية مح

استخدمه؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

1 بريكتال؟

جربري 10 ملغ / 2,5 ملغ

جراندوبريل / إنديناميد

Prelectal® 10 mg / 2,5 mg

30 Comprimés pelliculés



pharma

30

6 118000 280712

LOT N°:

EXP:

PPV:

152190

3- كيف تستخدم بريكتال

الجرعة وطريقة الاستعمال:
يجب التنبيه بأن الجرعة التي
إن الجرعة الاعتيادية عبارة عن
في الصباح وقبل وجبة الإفطار.

الأعراض والتعليقات في حال الجرعة الزائدة

إن طرأ وأخذت عدة حبات، أو تناولت
فأكثر مما يُحتمل وقوعه في حال الإفراط بالجرعة،
مكافحة ذلك بتعديد لمساب مع دفع السائل لتأخذ.

الإرشادات في حالة التفاعل واحد أو أكثر من الجرعات

في الهام جداً أخذ الدواء يومياً بصورة منتظمة. فإن جودة
بريكتال، عليك بأخذ الجرعة الاعتيادية في اليوم التالي، ولا يجوز

محاذير الاستخدام

حيث إن المخاوف ضد إرتفاع الضغط الشرياني علاج طويل المدى، عليك بالتشاور مع طبيبك بأمر التوقف عن العلاج.
إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية تتعلق باستعمال هذا الدواء، فالرجاء طلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلي.

4- ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

كما هو الحال مع كل دواء قد تظهر عند استعمال بريكتال، بعض الأمراض المزمنة قد لها نصيب كقلة التوترين.
إذا لاحظت حدوث أي من التأثيرات الجانبية المذكورة فيما يلي، عليك أن تتوقف مباشرة عن تناول بريكتال، وأن
تستلم طبيبك على الفور:
• صداع شديداً، أو في البطن، في الشفتين، في اللسان أو في اللعوم، شيق في التنفس.
• نزاع غير عادي أو اضطرابات في ضربات القلب.

وقد تشمل الآثار الجانبية بالنتيجة التفاعلية كالتالي:

غالباً (حدثت لدى أقل من واحد بالعشرة وأكثر من واحد بالمائة): صداع، دخول، دوخة، تشنجات، اضطرابات في النظر،
عطش في الأذن، دخول ناتج عن انخفاض الضغط الشرياني، شحار، تشنجات، اضطرابات معدية معوية (غثبان، قيء،
ألم بطني، اضطرابات في التنوُّق، جفاف في الفم، اضطرابات معدية أو عسر هضم، إسهال، إمساك)، نفاغات حساسية
(طفح جلدي، حكة، تشنج عضلي، الحساسية بالزغابة).

نادراً (حدثت لدى أقل من واحد بالمائة وأكثر من واحد بالالف): تشنجات مزاجية، أرق في النوم، تشنج
قصبي (أي الحساسية بضغط في الصدر، نفس ضاح وقصير)، وامة وعارض يأتي على شكل صغر في التنفس، أو
تضخم في البشرة أو في اللسان، حرق فرفرية purpura (أي ظهور بقع حمراء على سطح الجلد، اضطرابات كبدية،
عجز جنسي، ترقق.

نادراً جداً (حدثت لدى أقل من واحد بالعشرة آلاف): حيرة، اضطرابات قلبية واعتلالية (خربات غير
منتظمة، دجمة صدرية، إمالة قلبية)، داء البرية البوزيتية (أشكال نادر من داء البرية)، زكام (إسداد أو سيلان الأنف،
ظهور طفح جلدي، حاد الحساسية المتعددة الأشكال، فإن كنت تشكو من الذئب الشمسي المجموعي (داء كلاجيني)،
غير يزداد الوضع سوءاً وقد لوحظت تحسُّس من الغدق (يُبدَّلُ تظهر على سطح الجلد، اضطرابات كبدية،
القدس أو لطفلة إسفادته فوق الترسية.

المرض معروفة لعدم توفر أية معطيات نشر إلى نسبة تلك الحالات، وكذلك خربات القلب غير منتظمة تؤثر على
المؤشرات الحيوية، مضطط القلب البياني الكهربائي غير طبيعي، إرتفاع نسبة الأنزيمات الكبدية.

كما قد تطرأ اضطرابات كبدية أو كبدية أو على مستوى المخفظة / البكرياس، وتشنجات و مقاييس الدم.
فيمكن طبيبك أن يطلب منك القيام بالتحاليل اللازمة لمتابعة حالة الدم مع مراقبة وضعت. في حال القصور الكبدية
قد تحدث ولعل إمالة الإسفاد الدماعي الكبدية (اضطرابات معدية قوية تظهر وتلف في الإصابات السمية في الكبد).

إذا أصبت بأي آثار جانبية تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي، هذا يشمل أي آثار جانبية ممكنة حتى وإن لم يرد
ذكرها في هذه النشرة.

5- كيف يتم تعزيز بريكتال؟
يزك بعيدا عن متناول وبصر الأطفال.

لا تستخدم بريكتال بعد الموعد المشار إليها على العبوة الخارجية وعلى العبوة التي يتبع تاريخ انتهاء الصلاحية
إلى اليوم الأخير من الشهر.

أعلى العبوة بتكمم واحتفظ بها بعيدا عن الرطوبة.

لا ينبغي التخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو التفتايات المنزلية، أسأل الصيدلي عن كيفية التخلص
من الأدوية التي لم تعد مطلوبة، سوف تساعد هذه التناجيات لحماية البيئة.

6- معلومات إضافية

على عاذا يحتوي بريكتال؟ وما على عاذا يحتوي؟
للمزيد من التفاصيل، راجع بروشور، أو جدول، أو إنداباميد.

بين /
ت ملية

قبل اتخاذ

لقرائها مرة

إذا كان لديك أسئلة

فلا تعطيها للآخرين

صديدي إذا أحسست بأثار جانبية. وهذا ينطبق أيضا على أي آثار جانبية مح

استخدمه؟

1- بريكتال؟

1- بريكتال؟

2- بريكتال؟

3- بريكتال؟

4- بريكتال؟

5- بريكتال؟

6- بريكتال؟

7- بريكتال؟

8- بريكتال؟

9- بريكتال؟

10- بريكتال؟

11- بريكتال؟

12- بريكتال؟

13- بريكتال؟

14- بريكتال؟

15- بريكتال؟

16- بريكتال؟

17- بريكتال؟

18- بريكتال؟

19- بريكتال؟

20- بريكتال؟

21- بريكتال؟

22- بريكتال؟

23- بريكتال؟

24- بريكتال؟

25- بريكتال؟

26- بريكتال؟

27- بريكتال؟

28- بريكتال؟

29- بريكتال؟

30- بريكتال؟

31- بريكتال؟

32- بريكتال؟

33- بريكتال؟

34- بريكتال؟

35- بريكتال؟

36- بريكتال؟

37- بريكتال؟

38- بريكتال؟

39- بريكتال؟

40- بريكتال؟

41- بريكتال؟

42- بريكتال؟

43- بريكتال؟

44- بريكتال؟

45- بريكتال؟

46- بريكتال؟

47- بريكتال؟

48- بريكتال؟

49- بريكتال؟

50- بريكتال؟

