

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
20/03/2023	Medecine Générale	1	150,00	Houda Boushane
	Marhoul 2 N 2023 pp N 1			Médecine Générale
	Jeroua - Berrechid			Marhoul 2 N 2023 pp N 1

EXECUTION DES ORDONNANCES

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESSES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MARCHATOIRE		

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES


DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000

D

00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

Coefficient des travaux

MONTANTS
DES SOINS

DATE DU
DEVIS

DATE DE
L'EXECUTION

DR. Houda BOUANANE
Médecine Générale

Diplômée de la faculté de
Médecine de Casablanca
Tél : 05 22 51 59 13



الدكتورة هدى بو عنان
الطب العام
خريجة كلية الطب بالدار البيضاء
الهاتف : 05 22 51 59 13

Deroua le, 20/03/2023

Mme CHAJI Mina

250100 x 2

ROSUVA 20 mg

1cp/J le soir (pendant 03 mois)

23,80 x 3

ASKARDIL 160

1 sach / j, ap rep (pendant 03 mois)

69,60

RIACEN CREME 1%

1 appX 2 / j

641100

Drcteur Houda Bouanane
Médecine Générale
Makhlouf 2 N° 228 appartement 1
Deroua - Berrchid
Tél : 0522 51 59 13

PHARMACE QUSSAMA ACHA.
LOT DR. Faizi Youness
TEL: 05 22 51 49 56
INPE: 062103445

PHARMACE QUSSAMA ACHA
LOT DR. Faizi Youness
TEL: 05 22 51 49 56
INPE: 062103445

تجزئة مخلوف 2 الرقم 228 الشقة 1 الدروة - برشيد
Lot Maklouf 2 N° 228 Appartement 1 Deroua - Berrchid
E-mail: cabinetdrbouanane@gmail.com

ROSUVA® Promopharm 5 mg, 10 mg et 20 mg

Boîte de 30 comprimés enrobés
Rosuvastatine calcium

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- Qu'est-ce que Rosuva Promopharm et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Rosuva Promopharm ?
- Comment prendre Rosuva Promopharm ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver Rosuva Promopharm ?
- Informations supplémentaires.
- Qu'est-ce que Rosuva Promopharm et dans quels cas est-il utilisé ?

Classe Pharmaco thérapeutique

La substance active est la rosuvastatine.

Elle appartient à la classe pharmacothérapeutique : Inhibiteur de l'HMG-CoA réductase - Code ATC : C10A A07

Rosuva Promopharm appartient au groupe des médicaments appelés statines.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Rosuva Promopharm vous a été prescrit parce que :

- Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez un risque de faire une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Rosuva Promopharm est utilisé chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 6 ans et plus pour traiter un taux de cholestérol élevé.
- Il vous est recommandé de prendre des statines, car parfois un régime alimentaire adapté et une activité physique ne suffisent pas à corriger votre taux de cholestérol. Vous devez poursuivre le régime hypcholestérolémiant et l'activité physique en même temps que la prise de Rosuva Promopharm.
- Vous avez d'autres facteurs qui augmentent votre risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs.

Une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs peuvent être causés par une maladie appelée l'athérosclérose. L'athérosclérose est due à une accumulation de dépôts de graisse dans vos artères.

Pourquoi il est important de continuer de prendre Rosuva Promopharm :

Rosuva Promopharm est utilisé pour corriger le taux de substances grasses dans le sang appelées lipides, le plus fréquent étant le cholestérol.

Il y a différents types de cholestérol trouvé dans le sang : le « mauvais cholestérol » (LDL-C) et le « bon cholestérol » (HDL-C).

Rosuva Promopharm peut réduire le « mauvais cholestérol » et augmenter le « bon cholestérol ».

Il agit en aidant à bloquer la production de « mauvais cholestérol » par votre organisme. Il améliore également l'aptitude de votre corps à l'éliminer de votre sang.

Pour la plupart des personnes, un taux de cholestérol élevé n'a pas de conséquence sur la façon dont elles se sentent parce que cela n'entraîne aucun symptôme. Cependant, sans traitement, des dépôts grasses peuvent s'accumuler sur la paroi des vaisseaux sanguins et réduire leur diamètre.

Parfois, un rétrécissement des vaisseaux peut empêcher le passage du sang jusqu'au cœur ou au cerveau conduisant à une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

En diminuant votre taux de cholestérol, vous pouvez réduire le risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé qui y sont liés.

Il est très important de continuer à prendre Rosuva Promopharm, même si votre taux de cholestérol revient à la normale, parce qu'il prévient la remontée de votre taux de cholestérol et donc l'accumulation de dépôts de graisse. Cependant, vous devez arrêter votre traitement si votre médecin vous le dit, ou si vous découvrez que vous êtes enceinte.

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Rosuva Promopharm ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

- Si vous avez des antécédents musculaires, musculaires, cholestérol, des douleurs, ou vous savez également quelque chose.
- Si vous avez pris de l'alcool ;
- Si vous avez des symptômes de cholestérol, tels que la douleur dans le pectoral, l'insomnie, l'association de cause de douleur.
- Si vous avez une dose initiale.
- Si vous avez une dose élevée.
- Si vous êtes vietnamien et que la dose initiale.

Lot : 22002
Per : 06/24
PPV : 250 DH 00



vez

un doute),
De plus, vous
Promopharm
• Vous avez
demandé
• Vous avez
inexplicable
problème
douleurs
taux de ch
• Vous con
d'alcool ;
• Vous êtes
vietnamien
• Vous êtes
taux de ch
Si vous êtes
un doute), p
Mises en g
Avertissem
Adresser-v
prendre Ro
• Si vous a
• Si vous a
• Si vous a
des antéc
musculaire
musculaire
cholestérol
des doule
ne vous s
également
fablable
• Si vous c
d'alcool ;
• Si vous a
• Si vous e
de chole
contenu
• Si vous p
exemplar
• Si vous p
médicam
les infectio
L'associati
causer de
• Si vous a
dose initi
• Si vous a
dose élev
• Si vous e
vietnamie
la dose in

ROSUVA® Promopharm 5 mg, 10 mg et 20 mg

Boîte de 30 comprimés embossés
Rosuvastatine calcium

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Rosuva Promopharm et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Rosuva Promopharm ?
3. Comment prendre Rosuva Promopharm ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Rosuva Promopharm ?
6. Informations supplémentaires.
1. Qu'est-ce que Rosuva Promopharm et dans quels cas est-il utilisé ?

Classe Pharmacothérapeutique

La substance active est la rosuvastatine.

Elle appartient à la classe pharmacothérapeutique: Inhibiteur de l'HMG-CoA réductase - Code ATC : C10AA07

Rosuva Promopharm appartient au groupe des médicaments appelés statines.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Rosuva Promopharm vous a été prescrit parce que:

- Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez un risque de faire une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Rosuva Promopharm est utilisé chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 6 ans et plus pour traiter un taux de cholestérol élevé.
- Il vous est recommandé de prendre des statines, car parfois un régime alimentaire adapté et une activité physique ne suffisent pas à corriger votre taux de cholestérol. Vous devez poursuivre le régime hypocholestérolémiant et l'activité physique en même temps que la prise de Rosuva Promopharm.
- Vous avez d'autres facteurs qui augmentent votre risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs.

Ou

Une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs peuvent être causés par une maladie appelée l'athérosclérose. L'athérosclérose est due à une accumulation de dépôts de graisse dans vos artères.

Pourquoi il est important de continuer de prendre Rosuva Promopharm :

Rosuva promopharm est utilisé pour corriger le taux de substances graisseuses dans le sang appelées lipides, le plus fréquent étant le cholestérol.

Il y a différents types de cholestérol trouvé dans le sang : le « mauvais cholestérol » (LDL-C) et le « bon cholestérol » (HDL-C).

• Rosuva promopharm peut réduire le « mauvais cholestérol » et augmenter le « bon cholestérol ».

• Il agit en aidant à bloquer la production de « mauvais cholestérol » par votre organisme. Il améliore également l'aptitude de votre corps à l'éliminer de votre sang.

Pour la plupart des personnes, un taux de cholestérol élevé n'a pas de conséquence sur la façon dont elles se sentent parce que cela n'entraîne aucun symptôme. Cependant, sans traitement, des dépôts graisseux peuvent s'accumuler sur la paroi des vaisseaux sanguins et réduire leur diamètre.

Parfois, une rétrécissement des vaisseaux peut empêcher le passage du sang jusqu'au cœur ou au cerveau conduisant à une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

En diminuant votre taux de cholestérol, vous pouvez réduire le risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé qui y sont liés.

Il est très important de continuer à prendre Rosuva promopharm, même si votre taux de cholestérol revient à la normale, parce qu'il prévient la remontée de votre taux de cholestérol et donc l'accumulation de dépôts de graisse. Cependant, vous devez arrêter votre traitement si votre médecin vous le dit, ou si vous découvrez que vous êtes enceinte.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Rosuva Promopharm ?

Lot : 22002
Per : 06/24
PPV : 250 DH 00

Si vous

un doute), p.
De plus, vo...
Promophar...
demande...
Vous ave...
Vous ave...
inexpliqu...
problème...
douleurs...
taux de c...
• Vous co...
d'alcool...
• Vous éte...
vietnamie...
• Vous éte...
taux de c...
Si vous éte...
un doute), p.
Mises en g...
Avertissem...
Adresser...
prendre R...
• Si vous a...
• Si vous a...
• Si vous a...
des anté...
musculai...
musculai...
cholesté...
des doule...
ne vous é...
également...
faiblesse...
• Si vous c...
d'alcool ;
• Si vous a...
• Si vous é...
de chole...
contenu...
le p...
• Si vous p...
exempl...
• Si vous p...
médicam...
les infect...
L'associe...
causer de...
• Si vous a...
dose inti...
• Si vous a...
• Si vous é...
vietnamie...
la dose i...



8)

lors de

ces situations (ou si vous avez

RIACEN® 1% crème

Piroxicam

Composition :

Piroxicam	1 g
Excipients (dont propylèneglycol) q.s.p.	100 g

Propriétés :

Anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) de la famille des oxicams.

Indications :

Traitements symptomatiques des états douloureux ou inflammatoires d'origine rhumatisante ou traumatique tels que arthrose, tendinite, entorse, foulures, ténosynovites, périarthrites.

Contre-indications :

RIACEN crème est contre indiqué en cas d'hypersensibilité au piroxicam, et/ou d'allergie à l'Aspirine et aux autres anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Effets indésirables :

Manifestations allergiques cutanées, photosensibilisation.

En cas de doute, signalez-le à votre médecin traitant.

Enfants de moins de 15 ans : exceptionnelles infections graves de la peau en cas de varicelle.

Précaution d'emploi :

En cas d'irritation locale, arrêter immédiatement le traitement et instaurer un traitement symptomatique.

éviter l'application de la crème sur les yeux, les muqueuses et sur les lésions ouvertes de la peau.

Consultez votre médecin avant de prendre ce traitement en cas de grossesse.

Signalez tout autre traitement en cours à votre médecin traitant ou

Enfants de moins de 15 ans : lors de la varicelle, il est prudent d'éviter le médicament.

Mode d'emploi et posologie :

Appliquer RIACEN® crème sur la région à traiter, 2 à 4 fois par jour jusqu'à pénétration complète.

Formes et autres présentations :

RIACEN® 1% crème - Tube de 15 g et tube de 50 g

RIACEN® 20 mg - Boîte de 10 suppositoires

RIACEN® 20 mg - Boîte de 20 gélules

RIACEN® 10 mg - Boîte de 20 gélules

Liste I (Tableau A)

A conserver à l'abri de la chaleur.

LOT 22001
SER 02/25
PPV 20/06/00

Avoir date 201

PROMOPHARM S.A.
Z.I. du Sahel - Had Soualem - Maroc

ASKARDIL®

(Acide acétylsalicylique)

DENOMINATION DU MEDICAMENT

- **ASKARDIL® comprimés dispersibles** à 75 mg : boîte de 30 comprimés.
- **ASKARDIL® comprimés dispersibles** à 160 mg : boîte de 30 comprimés.

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
- Vous devrez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice?

1. Qu'est-ce que ASKARDIL® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ASKARDIL® ?
3. Comment prendre ASKARDIL® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ASKARDIL® ?
6. Informations supplémentaires.

1 - QU'EST-CE QUE ASKARDIL® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

ANTITHROMBOIQUE/INHIBITEUR DE L'AGRÉATION PLAQUETTAIRE HÉPARINE EXCLUE

Ce médicament contient de l'aspirine.

ASKARDIL® appartient à la famille des inhibiteurs de l'agrégation plaquetttaire.

ASKARDIL® agit sur les plaquettes présentes dans le sang et permet de fluidifier le sang.

- Indications thérapeutiques

ASKARDIL® est utilisé pour prévenir les récidives d'accidents vasculaires cérébraux ou cardiaques provoqués par des caillots dans les artères du cerveau ou du cœur.

Votre médecin peut décider d'associer ce médicament à d'autres traitements s'il le juge nécessaire.

Ce médicament est réservé à l'adulte. Vous ne devez pas débuter un traitement par ASKARDIL® sans l'accord de votre médecin.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ASKARDIL® ?

- Ne prenez Jamais ASKARDIL® (Contre-indications)

- si vous êtes allergique à la substance active (acide acétylsalicylique) ou à l'un des autres composants contenus dans ASKARDIL®.
- si vous êtes allergique (hypersensible) à un médicament de la même famille que l'aspirine (les anti-inflammatoires non stéroïdiens =AINS).
- si vous avez déjà eu de l'asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'un médicament de la même famille (les AINS).
- si vous souffrez actuellement d'un ulcère de l'estomac ou du duodénum,
- si vous souffrez de saignements ou si votre médecin a identifié chez vous des risques de saignements,
- durant la grossesse, à partir du début du 6^{me} mois (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée), pour des doses supérieures à 100 mg par jour,
- si vous avez une maladie grave du foie, des reins ou du cœur,
- si vous êtes atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères,

- Aspirant : est contre indiqué en cas de phénylhydanturie (maladie héréditaire dépeinte à la page 10).

- **Faites attention avec ASKARDIL® (Mises en garde spéciales et précautions particulières)**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ASKARDIL®.

Avant de prendre ce médicament, prévenez votre médecin :

- si vous avez une maladie héréditaire des globules rouges, appelée déficit en G6PD, car des doses d'aspirine peuvent alors provoquer une destruction des globules rouges,
- si vous avez déjà eu un ulcère de l'estomac ou du duodénum ou une inflammation de l'estomac,
- si vous avez déjà eu des saignements digestifs (vomissements de sang ou présence de sang dans les selles),
- si vous avez une maladie des reins ou du foie,
- si vous avez une hypertension artérielle (tension artérielle élevée),
- si vous avez des règles abondantes,

Des syndromes de Reye, pathologies très rares mais présentant un risque vital, ont été observés chez certains enfants avec des signes d'infection virale (en particulier varicelle et épisodes d'allure grippale) et l'acide acétylsalicylique. ASKARDIL® ne doit pas être administré aux enfants et aux adolescents.

Si une intervention chirurgicale est prévue :

L'aspirine augmente les risques de saignements même à de très faibles doses, et ce même dernière prise de ce médicament de plusieurs jours.

Prévenez votre médecin traitant, votre chirurgien, l'anesthésiste ou votre dentiste de la médication, dans le cas où une opération, même mineure, est envisagée.

- Enfants et «adolescents»

Sans objet.

- Prises d'autres médicaments (Interactions avec d'autres médicaments)

Ce médicament contient de l'aspirine. D'autres médicaments en contiennent. Vous ne devez pas en même temps que ASKARDIL® d'autres médicaments contenant de l'aspirine ou un médicament de la même famille (les AINS comme par exemple l'ibuprofène) sans en parler à votre médecin ou pharmacien. L'association de ces médicaments à ASKARDIL® pourrait entraîner un surdosage, augmenter ainsi le risque d'effets indésirables, notamment les saignements. Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer que ces médicaments ne contiennent pas d'aspirine et/ou d'anti-inflammatoire non stéroïdiens.

Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas prendre ASKARDIL® en même temps que :

- un anticoagulant oral (médicament utilisé pour fluidifier le sang) si vous avez un antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum,

- un autre médicament à base de ticlopidine ou clopidogrel dans certaines situations où votre médecin ou pharmacien prescrit ces médicaments,
- un autre médicament à base de benz bromarone ou goutte,
- un autre médicament à base de lévothyroxine (hormone de la glande thyroïde),
- un autre médicament à base de pemetrexed (médicament contre le cancer),
- un autre médicament à base d'anagrelide (médicament dans le sang),
- le vaccin contre la varicelle : il est recommandé d'attendre ce médicament.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez

médicamenteusement.

- Aliments et boissons (Interactions avec les aliments)

La consommation d'alcool doit être évitée pendant le traitement.

- Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez conseiller à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ASKARDIL®.

Ce médicament contient de l'aspirine (acide acétylsalicylique) contenant de l'aspirine (y compris les médicaments suivants) :

- jusqu'à 100 mg par jour : Pendant toute la grossesse, amenez à votre pharmacien de l'aspirine à faibles doses dans des circonstances exceptionnelles nécessitant une surveillance de respecter scrupuleusement l'ordonnance de votre médecin.
- entre 100 et 500 mg par jour : Par mesure de précaution, suivez l'ordonnance de votre pharmacien, sauf prescription contraire de votre médecin spécialiste.
- à partir de 500 mg par jour :
- jusqu'à la fin du 5^{me} mois de grossesse (jusqu'à la fin de la grossesse) : Ce médicament sauf si c'est absolument nécessaire, sans vous prescrire ce médicament sauf si vous présentez des fausses couches ou malformations.

Dans ce cas, la dose devra être la plus faible possible et sans effets indésirables.

- à partir du début du 6^{me} mois jusqu'à la fin d'aménorrhée), ce médicament est contre-indiqué, voire dangereux. Suivez l'ordonnance de votre pharmacien.

Car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences cardio-pulmonaires et rénales et cérébrales avec une seule prise.

Si vous avez pris ce médicament alors que vous êtes enceinte, contactez immédiatement un gynécologue obstétricien afin qu'une surveillance adaptée soit réalisée.

- Allaitement

Ce médicament passant dans le lait maternel, ce médicament est contre-indiqué.

- Fertilité

L'aspirine, comme tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens, pose des difficultés pour devenir enceinte, de façon indépendante de la grossesse ou si vous avez une grossesse.

- Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser un appareil : Sans objet.

- Excipient à effet notable

- Aspartam : est contre indiqué en cas de phénylcétoneurie.

3 - COMMENT PRENDRE ASKARDIL® ?

- Instruction pour un bon usage

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant les instructions de votre pharmacien ou pharmacien.

- Posologie, mode et/ou voie (s) d'administration, fréquence

a - Posologie :

Ce médicament est réservé à l'adulte. La dose habituelle est de 1 comprimé dispersible par jour.

Votre médecin vous indiquera combien de comprimés dispersibles il faut prendre.

Respectez toujours la dose indiquée par votre pharmacien.

En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou pharmacien.

En cas d'incertitude, consultez votre pharmacien.

Ce médicament est à prendre par voie orale.

Dissoudre le comprimé d'ASKARDIL® dans un verre d'eau.

Le médicament doit être pris au moment de la journée ou de la nuit.

Le médicament doit être pris au moment de la journée ou de la nuit.

Le médicament doit être pris au moment de la journée ou de la nuit.

Le médicament doit être pris au moment de la journée ou de la nuit.

Le médicament doit être pris au moment de la journée ou de la nuit.

Le médicament doit être pris au moment de la journée ou de la nuit.

Le médicament doit être pris au moment de la journée ou de la nuit.

Le médicament doit être pris au moment de la journée ou de la nuit.

Le médicament doit être pris au moment de la journée ou de la nuit.

ASKARDIL® 160 mg 30 comprimés dispersibles

PPU 23DH80
EXP 06/2024
LOT 23009 2

INDESIRABLES EVENTUELS

Les effets indésirables suivants peuvent survenir :

- douleurs abdominales, difficultés de digestion, brûlures, inflammation de l'œsophage, de l'estomac, du duodénum et/ou ulcération de l'œsophage, de l'estomac, du duodénum.

ASKARDIL®

(Acide acétylsalicylique)

DENOMINATION DU MEDICAMENT

- **ASKARDIL® comprimés dispersibles** à 75 mg : boîte de 30 comprimés.
- **ASKARDIL® comprimés dispersibles** à 160 mg : boîte de 30 comprimés.

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
- Vous devrez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice?

1. Qu'est-ce que ASKARDIL® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ASKARDIL® ?
3. Comment prendre ASKARDIL® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ASKARDIL® ?
6. Informations supplémentaires.

1 - QU'EST-CE QUE ASKARDIL® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

ANTITHROMBOIQUE/INHIBITEUR DE L'AGRÉATION PLAQUETTAIRE HÉPARINE EXCLUE

Ce médicament contient de l'aspirine.

ASKARDIL® appartient à la famille des inhibiteurs de l'agrégation plaquetttaire.

ASKARDIL® agit sur les plaquettes présentes dans le sang et permet de fluidifier le sang.

- Indications thérapeutiques

ASKARDIL® est utilisé pour prévenir les récidives d'accidents vasculaires cérébraux ou cardiaques provoqués par des caillots dans les artères du cerveau ou du cœur.

Votre médecin peut décider d'associer ce médicament à d'autres traitements s'il le juge nécessaire.

Ce médicament est réservé à l'adulte. Vous ne devez pas débuter un traitement par ASKARDIL® sans l'accord de votre médecin.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ASKARDIL® ?

- Ne prenez Jamais ASKARDIL® (Contre-indications)

- si vous êtes allergique à la substance active (acide acétylsalicylique) ou à l'un des autres composants contenus dans ASKARDIL®.
- si vous êtes allergique (hypersensible) à un médicament de la même famille que l'aspirine (les anti-inflammatoires non stéroïdiens =AINS).
- si vous avez déjà eu de l'asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'un médicament de la même famille (les AINS).
- si vous souffrez actuellement d'un ulcère de l'estomac ou du duodénum,
- si vous souffrez de saignements ou si votre médecin a identifié chez vous des risques de saignements,
- durant la grossesse, à partir du début du 6^{me} mois (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée), pour des doses supérieures à 100 mg par jour,
- si vous avez une maladie grave du foie, des reins ou du cœur,
- si vous êtes atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères,

- Aspirant : est contre indiqué en cas de phénylhydanturie (maladie héréditaire dépeinte à la page 10).

- **Faites attention avec ASKARDIL® (Mises en garde spéciales et précautions particulières)**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ASKARDIL®.

Avant de prendre ce médicament, prévenez votre médecin :

- si vous avez une maladie héréditaire des globules rouges, appelée déficit en G6PD, car des doses d'aspirine peuvent alors provoquer une destruction des globules rouges,
- si vous avez déjà eu un ulcère de l'estomac ou du duodénum ou une inflammation de l'estomac,
- si vous avez déjà eu des saignements digestifs (vomissements de sang ou présence de sang dans les selles),
- si vous avez une maladie des reins ou du foie,
- si vous avez une hypertension artérielle (tension artérielle élevée),
- si vous avez des règles abondantes,

Des syndromes de Reye, pathologies très rares mais présentant un risque vital, ont été observés chez certains enfants avec des signes d'infection virale (en particulier varicelle et épisodes d'allure grippale) et l'acide acétylsalicylique. ASKARDIL® ne doit pas être administré aux enfants et aux adolescents.

Si une intervention chirurgicale est prévue :

L'aspirine augmente les risques de saignements même à de très faibles doses, et ce même dernière prise de ce médicament de plusieurs jours.

Prévenez votre médecin traitant, votre chirurgien, l'anesthésiste ou votre dentiste de la médication, dans le cas où une opération, même mineure, est envisagée.

- Enfants et «adolescents»

Sans objet.

- Prises d'autres médicaments (Interactions avec d'autres médicaments)

Ce médicament contient de l'aspirine. D'autres médicaments en contiennent. Vous ne devez pas en même temps que ASKARDIL® d'autres médicaments contenant de l'aspirine ou un médicament de la même famille (les AINS comme par exemple l'ibuprofène) sans en parler à votre médecin ou pharmacien. L'association de ces médicaments à ASKARDIL® pourrait entraîner un surdosage, augmenter ainsi le risque d'effets indésirables, notamment les saignements. Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer que ces médicaments ne contiennent pas d'aspirine et/ou d'anti-inflammatoire non stéroïdiens.

Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas prendre ASKARDIL® en même temps que :

- un anticoagulant oral (médicament utilisé pour fluidifier le sang) si vous avez un antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum,

- un autre médicament à base de ticlopidine ou clopidogrel dans certaines situations où votre médecin ou pharmacien prescrit ces médicaments,
- un autre médicament à base de benz bromarone ou goutte,
- un autre médicament à base de lévothyroxine (hormone de la glande thyroïde),
- un autre médicament à base de pemetrexed (médicament contre le cancer),
- un autre médicament à base d'anagrelide (médicament contre la leucémie),
- le vaccin contre la varicelle : il est recommandé d'attendre ce médicament.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ces médicaments.

- Aliments et boissons (Interactions avec les aliments)

La consommation d'alcool doit être évitée pendant le traitement.

- Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez que vous devrez prendre ce médicament, consultez votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Ce médicament contient de l'aspirine (acide acétylsalicylique) contenant de l'aspirine (y compris les médicaments suivants) :

- jusqu'à 100 mg par jour : Pendant toute la grossesse, amenez à votre pharmacien de l'aspirine à faibles doses dans des circonstances exceptionnelles nécessitant une surveillance étroite et respectueuse l'ordonnance de votre médecin.
- entre 100 et 500 mg par jour : Par mesure de précaution, suivez les instructions de votre pharmacien au sujet de la prescription contrariale de votre médecin spécialiste.
- à partir de 500 mg par jour :
- jusqu'à la fin du 5^{me} mois de grossesse (jusqu'à la fin de la grossesse) : Ce médicament peut causer des fausses couches ou malformations. Dans ce cas, la dose devra être la plus faible possible et

• à partir du début du 6^{me} mois jusqu'à la fin d'aménorrhée), ce médicament est contre-indiqué, voire dangereux. Les effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences cardio-pulmonaires et rénales et cela même avec une seule prise.

Si vous avez pris ce médicament alors que vous êtes enceinte, contactez immédiatement un gynécologue obstétricien afin qu'une surveillance adaptée soit mise en place.

- Allaitement

Ce médicament passant dans le lait maternel, ce médicament peut être absorbé par l'enfant.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Fertilité

L'aspirine, comme tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens, pose des difficultés pour devenir enceinte, de façon indépendante de la grossesse ou si vous avez une grossesse.

- Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser un appareil : Sans objet.

- Excipient à effet notable

- Aspartam : est contre indiqué en cas de phénylcétoneurie.

3 - COMMENT PRENDRE ASKARDIL® ?

- Instruction pour un bon usage

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant les instructions de votre pharmacien ou pharmacien.

- Posologie, mode et/ou voie (s) d'administration, fréquence

a - Posologie :

Ce médicament est réservé à l'adulte. La dose habituelle est de 1 comprimé dispersible par jour.

Votre médecin vous indiquera combien de comprimés dispersibles il faut prendre.

Respectez toujours la dose indiquée par votre médecin.

En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou pharmacien.

ASKARDIL® 160 mg ce dosage faible d'aspirine n'est pas adapté à l'adulte.

b - Mode et/ou voie d'administration :

Ce médicament est à prendre par voie orale.

Dissoudre le comprimé d'ASKARDIL® dans un verre d'eau.

Le médicament doit être pris au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moment de la journée.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.

Il est recommandé de prendre ce médicament au moins une heure avant ou au moins une heure après les repas.