

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|--|-----------------------|
| <input type="radio"/> Réclamation | : contact@mupras.com |
| <input type="radio"/> Prise en charge | : pec@mupras.com |
| <input type="radio"/> Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0050510

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 26.17 Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : CHAJIA MOHAMED

Date de naissance : 02/11/56

Adresse : RES TWIN BD ABDELKOUN N° 245

APP N° 13c CASA

Tél. : 0670274025 Total des frais engagés : 385,90 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

156008

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age:

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : MALADIE CHRONIQUE

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : MASA Le : 01 AVR 2023

Signature de l'adhérent(e) : EM



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien Pharmacie Charles Nicolle HEDYA TAK-TAK 19, Place Charles Nicolle Casablanca Tél. 05 22 47 56 44 / 05 22 29 20 41	Date 03/04/23	Montant de la Facture 385,90

ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficent																
																			
COEFFICIENT DES TRAVAUX																			
MONTANTS DES SOINS																			
DEBUT D'EXECUTION																			
FIN D'EXECUTION																			
COEFFICIENT DES TRAVAUX																			
MONTANTS DES SOINS																			
DATE DU DEVIS																			
DATE DE L'EXECUTION																			
O.D.F PROTHESES DENTAIRES 	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">H</td> <td style="text-align: left;">25533412</td> <td style="text-align: right;">21433552</td> </tr> <tr> <td></td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">D</td> <td style="text-align: left;">00000000</td> <td style="text-align: right;">00000000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">G</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> (Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession	H	25533412	21433552		00000000	00000000	D	00000000	00000000		35533411	11433553	B			G		
H	25533412	21433552																	
	00000000	00000000																	
D	00000000	00000000																	
	35533411	11433553																	
B																			
G																			
	VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS	VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION																	



PHARMACIE CHARLES NICOLLE

19 Place Charles Nicolle -Inst PASTEUR-

R.C :244430 Patente:34400841
T.V.A :826317 C.N.S.S:2284975
Banque:RIB :011780000070210006045996
Tél :0522202041

Le 03/04/2023

FACTURE N°747800

N° ICE : 00173640400005

N° IF : 42045500

MR CHAJIA MOHAMED

ICE N° :

Qté	Désignation	PPV Unitaire	Total BRUT	Dont TVA	% Taux
1	SULIAT160/10/25MG B/28	185,20	185,20		
2	CARDIOASPIRINE 100MG	27,70	55,40		
1	NEBILET 28CPS	87,50	87,50		
1	LD-NOR10MG BT30CP	57,80	57,80		

Pharmacie Charles Nicolle
 HEDYATAK - TAK
 19, Place Charles Nicolle
 Casablanca
 Tél: 05 22 47 56 44 / 05 22 20 20 41

TOTAL T.T.C :

385,90

Nbr Articles	TVA 7% Base :	Montant :	TVA 20% Base :	Montant
--------------	---------------	-----------	----------------	---------

*Arrêté la présente facture à la somme de :
Trois Cent Quatre-vingt Cinq Dirhams et 90 centimes.*

troubles sévères de la circulation sanguine dans les bras et dans les jambes.

Précautions particulières à prendre avec NEBILET 5mg comprimé quadrisécable:

Mises en garde

En général

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

En l'absence de données, NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent.

L'
di
a
F
-R

nébivolol au vérapamil ou au ti-arythmiques de classe I, aux s centraux n'est généralement je.

er le traitement brutalement sans decin.

térielle essentielle

its souffrant d'insuffisance rénale, recommandée est de 2,5 mg comprimé). Si nécessaire, la dose t être augmentée à 5 mg par jour. s âgés de plus de 65 ans, la dose nnée est de 2,5 mg par jour (1/2 i nécessaire, la dose journalière

peut être augmentée à 5 mg par jour. Cependant du fait de l'expérience limitée chez les patients de plus de 75 ans, la prudence s'impose et une surveillance étroite doit être assurée.

Insuffisance cardiaque chronique

Le traitement de l'insuffisance cardiaque doit être instauré pendant les premières semaines par un médecin ayant l'expérience de la prise en charge de patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique, et la posologie ne doit pas être modifiée sans son avis. Si la première dose est bien tolérée, le traitement sera poursuivi avec une posologie progressivement croissante.

L'initiation du traitement par nébivolol nécessite une surveillance particulière. Elle comprend une surveillance clinique avec mesure de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, et un électrocardiogramme si nécessaire.

avant une insuffisance rénale ient posologique la phase de

* VIGNETTE

NEBILET® 5mg
28 comprimés O

PPV 87DH50

V1097701



NEBILET 5 mg, comprimé pelliculé doit être pris tous les jours.

Il est conseillé de prendre votre traitement chaque jour au même moment de la journée pour éviter tout oubli.

L'hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque chronique sont des maladies qui nécessitent un traitement prolongé. Il est donc particulièrement important que vous preniez ce médicament aussi longtemps que votre médecin vous l'a demandé.

Si vous avez pris plus de NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Peut apparaître un pouls anormalement faible, une baisse de la pression artérielle, des difficultés respiratoires et des problèmes cardiaques.

Avant l'arrivée du médecin, vous pouvez prendre du charbon activé (disponible chez votre pharmacien) qui adsorbera le produit présent dans l'estomac.

Si vous oubliez de prendre NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Dans l'hypertension artérielle essentielle, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont :

- Maux de tête.
- Etourdissements.
- Fourmillements, picotement au niveau des extrémités des membres.
- Essoufflement.
- Constipation.
- Nausées.

LD-NOR®

10 mg, 20 mg & 40 mg, Comprimé pelliculé (DCI: Atorvastatine)

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LD-NOR, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé?
3. Comment prendre LD-NOR, comprimé pelliculé?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver LD-NOR, comprimé pelliculé?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE LD-NOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

LD-NOR appartient à un groupe de médicaments appelés statines, qui interviennent dans la régulation des lipides (graisses).

LD-NOR est utilisé pour diminuer le taux sanguin des lipides appelés cholestérol et triglycérides lorsqu'un régime pauvre en graisses associé à des modifications du mode de vie ne sont pas suffisants. Si vous présentez des facteurs de risque de survenue de maladie du cœur, LD-NOR peut également être utilisé pour réduire ce risque même si votre taux de cholestérol est normal. Vous devez continuer à poursuivre un régime alimentaire standard pauvre en cholestérol pendant toute la durée du traitement.

3. COMMENT PRENDRE LD-NOR, comprimé pelliculé?

Avant que vous ne commencez le traitement, votre médecin vous prescrira un régime pauvre en cholestérol, que vous devrez poursuivre pendant toute la durée de votre traitement par LD-NOR.

La posologie initiale habituelle de LD-NOR est de 10 mg en une prise par jour chez les adultes et enfants âgés de 10 ans ou plus. La posologie peut être augmentée si nécessaire par votre médecin jusqu'à la posologie dont vous avez besoin. La posologie sera adaptée par votre médecin à intervalles d'au moins 4 semaines. La dose maximale de LD-NOR est de 80 mg une fois par jour.

Les comprimés de LD-NOR doivent être avalés entiers avec un verre d'eau et peuvent être pris à tout moment de la journée, avec ou sans aliments. Essayez cependant de prendre vos comprimés tous les jours à la même heure.

Veuillez à toujours prendre LD-NOR comme prescrit par votre pharmacien.

La durée de

Si vous pe

Si vous a

Si vous a

dose quel

plus prod

Si vous o

Si vous a

normale. N

Si vous ar

Sans objet,

Si vous ave

traitement, c

4. QUELS S

Comme tous les médicaments, LD-NOR peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas nécessairement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'un des effets indésirables ou symptômes graves suivants, arrêtez de prendre vos comprimés et contactez immédiatement votre médecin ou allez au service des urgences de l'hôpital le plus proche.

Rare : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000

LOT : 230051
EXP : 01/2026
PPV : 57.80DH

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.



Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le comprimé ne se dissout que dans l'intestin grêle. C'est pour cette raison que CardioAspirine ménage la muqueuse gastrique.

CardioAspirine ne doit être pris que selon la prescription du médecin.

CardioAspirine est indiqué pour:

- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur les artères coronaires (portage et suppression d'une sténose des artères coronaires);
- la prévention des attaques cérébrales, suite à l'apparition de signes précurseurs (accidents ischémiques transitoires, AIT);
- la prévention des thromboses artérielles (caillots sanguins dans les vaisseaux coronaires) suite à un infarctus (prophylaxie secondaire de l'infarctus);
- la prévention de l'infarctus du myocarde chez les patients chez lesquels le médecin a constaté un risque élevé. Les affections concomitantes telles que hypertension artérielle, diabète sucré, taux de lipides élevés, doivent également être traitées. De plus, il faut arrêter de fumer;
- le traitement de l'angine de poitrine instable;
- le traitement de l'infarctus du myocarde aigu;
- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur...
- la prévention de l'aggravation d'une artériopathie oblitérante.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT ?

CARDIOASPIRINE 100 MG

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.



Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le comprimé ne se dissout que dans l'intestin grêle. C'est pour cette raison que CardioAspirine ménage la muqueuse gastrique.

CardioAspirine ne doit être pris que selon la prescription du médecin.

CardioAspirine est indiqué pour:

- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur les artères coronaires (portage et suppression d'une sténose des artères coronaires);
- la prévention des attaques cérébrales, suite à l'apparition de signes précurseurs (accidents ischémiques transitoires, AIT);
- la prévention des thromboses artérielles (caillots sanguins dans les vaisseaux coronaires) suite à un infarctus (prophylaxie secondaire de l'infarctus);
- la prévention de l'infarctus du myocarde chez les patients chez lesquels le médecin a constaté un risque élevé. Les affections concomitantes telles que hypertension artérielle, diabète sucré, taux de lipides élevés, doivent également être traitées. De plus, il faut arrêter de fumer;
- le traitement de l'angine de poitrine instable;
- le traitement de l'infarctus du myocarde aigu;
- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur...
- la prévention de l'aggravation d'une artériopathie oblitérante.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT ?

CARDIOASPIRINE 100 MG

une protection à
- L'utilisation d'
Si vous êtes dia
Enfants et adol
L'utilisation de Si
Sujets âgés (à p
SULIAT HCT peut
façon identique
notamment pour
contrôler régulièrement
Interactions av
Prise de SULIAT
Veuillez informer
Votre médecin po
que vous deviez a

- Ne prenez pas Si
- Le lithium (un t
- Les médicame
potassiques ou i
- Les IEC ou l'allé
précautions.
Faites attention si
- L'alcool, les soins
d'autres procédures
- L'Amantadine (un t
causées par des virus) ;
- Les anticholinergiques,
spasmes de la vessie, l'asthme,
l'anesthésie) ;

- Les médicaments anti-épileptiques et thymo-régulateurs utilisés pour traiter l'épilepsie et les troubles bipolaires (ex. Carbamazép
Phénobarbital, Phénytoïne, Fosphénytoïne, Primidone) ;
- La Cholestyramine, le Colestipol ou d'autres résines (des substances utilisées principalement dans le traitement des taux élevés
lipides dans le sang) ;
- Simvastatine (médicament utilisé pour contrôler des taux élevés de cholestérol) ;
- La Ciclosporine (un médicament utilisé en cas de greffe d'organe pour prévenir le rejet d'organe ou utilisé dans d'autres circonstances
par exemple la polyarthrite rhumatoïde ou la dermatite atopique) ;
- Les médicaments cytotoxiques (utilisés dans le traitement des cancers), tels que le Méthotrexate ou le Cyclophosphamide ;
- La Digoxine ou d'autres glycosides cardiaques (médicaments utilisés pour traiter les problèmes cardiaques) ;
- Vérapamil, Diltiazem (médicaments à visée cardiologique) ;
- Les produits de contraste iodés (agents utilisés dans le cadre d'un examen d'imagerie) ;
- Les médicaments utilisés dans le traitement du diabète (antidiabétiques oraux tels que la Metformine ou les insulines) ;
- Les médicaments utilisés dans le traitement de la goutte, tels que l'allopurinol ;
- Les médicaments pouvant augmenter le taux de sucre dans le sang (bêta-bloquants, Diazoxide) ;
- Les médicaments pouvant induire des « torsades de pointes » (rythme cardiaque irrégulier) tels que les antiarythmiques
(médicaments utilisés pour traiter les problèmes cardiaques) et certains antipsychotiques ;
- Les médicaments pouvant réduire le taux de sodium dans le sang, tels que les antidépresseurs, les antipsychotiques et les
antiépileptiques ;
- Les médicaments pouvant réduire le taux de potassium dans le sang, tels que les diurétiques (médicaments faisant uriner)
corticoïdes, les laxatifs, l'Amphotéricine ou la Pénicilline G ;
- Les médicaments utilisés pour augmenter la tension artérielle tels que l'adrénaline ou la noradrénaline ;
- Les médicaments utilisés dans le HIV/SIDA (ex. Ritonavir, Indinavir, Nelfinavir) ;
- Médicaments utilisés pour traiter des mycoses (ex. Kétoconazole, Itraconazole) ;
- Les médicaments utilisés dans le traitement des ulcérations et de l'inflammation de l'œsophage (Carbénoxolone) ;
- Les médicaments utilisés pour soulager la douleur ou l'inflammation, en particulier les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
dont les inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase-2 (inhibiteurs de la Cox-2) ;
- Les décontractants musculaires (médicaments permettant le relâchement des muscles utilisés au cours des opérations) ;
- La Trinitrine/Nitroglycérine et autres nitrates ou autres substances appelées « vasodilatateurs » ;
- Les autres médicaments utilisés pour traiter l'hypertension, dont la Méthyldopa ;
- La Rifampicine (utilisée par exemple pour traiter la tuberculose) ;
- Le millepertuis ;
- Dantrolène (perfusion pour traiter des anomalies graves de température corporelle) ;
- La vitamine D et les sels de calcium.

Interactions avec les aliments et les boissons

SULIAT HCT avec des aliments, boissons et de l'alcool :

Le pamplemousse et le jus de pamplemousse ne doivent pas être consommés par les personnes à qui SULIAT HCT a été prescrit. C'est dû au fait que le pamplemousse et le jus de pamplemousse peuvent conduire à une augmentation des taux sanguins de la substance active Amiodipine, pouvant induire une augmentation imprévue de l'effet hypotenseur de SULIAT HCT. Avant de consommer de l'alcool, parlez-en à votre médecin. L'alcool peut provoquer une diminution plus importante de votre tension artérielle et/ou augmenter la possibilité de sensation vertigineuse ou d'évanouissement.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse

Veuillez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre SULIAT HCT avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place de SULIAT HCT.

SULIAT HCT est déconseillé en début de grossesse, et il ne doit pas être pris lorsque vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant s'il est utilisé après le troisième mois de grossesse.

Allaitement

Informez votre médecin si vous allaitez ou êtes sur le point de commencer à allaiter. SULIAT HCT est déconseillé chez les femmes qui allaient et votre médecin pourrait choisir un autre traitement si vous souhaitez allaiter, surtout si votre enfant est un nouveau-né ou un prématuré.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines

Ce médicament peut provoquer des étourdissements, une somnolence, des nausées ou des maux de tête. Si vous présentez ces symptômes, ne conduisez pas de véhicules et n'utilisez pas d'outils ou de machines.

Ce médicament contient du sodium à prendre en considération les patients contrôlant leur apport en sodium.

3- COMMENT PRENDRE SULIAT HCT ?

Instructions pour un bon usage

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie, Mode et/ou voies(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Mode et voie d'administration

- Prenez ce médicament par voie orale, au même moment de la journée chaque jour, en général le matin.

Posologie, Fréquence d'administration et Durée du traitement

La dose habituelle de SULIAT HCT est d'un comprimé par jour.

- Il est recommandé de prendre le comprimé à la même heure chaque jour, de préférence le matin.

- Avaler les comprimés tels quels avec un verre d'eau.

- Vous pouvez prendre SULIAT HCT au cours ou en dehors des repas. Ne prenez pas SULIAT HCT avec du pamplemousse ou du jus de pamplemousse.

Selon la manière dont vous allez réagir au traitement, votre médecin pourra vous proposer une dose plus forte ou plus faible.

Ne pas dépasser la dose prescrite.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de SULIAT HCT, comprimés que vous n'avez pas, parlez-en immédiatement à votre médecin. Des soins médicaux pourront être nécessaires.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre SULIAT HCT, comprimés :

- Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez et prenez ensuite la dose suivante au moment habituel de votre prochaine prise est proche, prenez simplement le comprimé suivant au moment habituel.

- Ne prenez pas de dose double (deux comprimés en une seule fois) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou

ent de cancer de la peau.

pour les autres adultes et les enfants. Les patients âgés de 65 ans et plus doivent prendre 25 mg/25 mg, ils doivent prendre 10 mg/25 mg.

indre tout autre médicament. Il se peut, dans certains cas, que les médicaments énumérés ci-dessous

apprennent des suppléments et de l'héparine.

• Mises en garde spéciales

ne intervention chirurgicale

er ou prévenir certaines maladie

tels que les crampes intestinales

de Parkinson ainsi que pour faciliter

la digestion.

Les médicaments utilisés pour traiter l'épilepsie et les troubles bipolaires (ex. Carbamazép

Phénobarbital, Phénytoïne, Fosphénytoïne, Primidone) ;

La Cholestyramine, le Colestipol ou d'autres résines (des substances utilisées principalement dans le traitement des taux élevés

lipides dans le sang) ;

Simvastatine (médicament utilisé pour contrôler des taux élevés de cholestérol) ;

La Ciclosporine (un médicament utilisé en cas de greffe d'organe pour prévenir le rejet d'organe ou utilisé dans d'autres circonstances

par exemple la polyarthrite rhumatoïde ou la dermatite atopique) ;

Les médicaments cytotoxiques (utilisés dans le traitement des cancers), tels que le Méthotrexate ou le Cyclophosphamide ;

La Digoxine ou d'autres glycosides cardiaques (médicaments utilisés pour traiter les problèmes cardiaques) ;

Vérapamil, Diltiazem (médicaments à visée cardiologique) ;

Les produits de contraste iodés (agents utilisés dans le cadre d'un examen d'imagerie) ;

Les médicaments utilisés dans le traitement du diabète (antidiabétiques oraux tels que la Metformine ou les insulines) ;

Les médicaments utilisés dans le traitement de la goutte, tels que l'allopurinol ;

Les médicaments pouvant augmenter le taux de sucre dans le sang (bêta-bloquants, Diazoxide) ;

Les médicaments pouvant induire des « torsades de pointes » (rythme cardiaque irrégulier) tels que les antiarythmiques

(médicaments utilisés pour traiter les problèmes cardiaques) et certains antipsychotiques ;

Les médicaments pouvant réduire le taux de sodium dans le sang, tels que les antidépresseurs, les antipsychotiques et les antiépileptiques ;

Les médicaments pouvant réduire le taux de potassium dans le sang, tels que les diurétiques (médicaments faisant uriner)

corticoïdes, les laxatifs, l'Amphotéricine ou la Pénicilline G ;

Les médicaments utilisés pour augmenter la tension artérielle tels que l'adrénaline ou la noradrénaline ;

Les médicaments utilisés dans le HIV/SIDA (ex. Ritonavir, Indinavir, Nelfinavir) ;

Médicaments utilisés pour traiter des mycoses (ex. Kétoconazole, Itraconazole) ;

Les médicaments utilisés dans le traitement des ulcérations et de l'inflammation de l'œsophage (Carbénoxolone) ;

Les médicaments utilisés pour soulager la douleur ou l'inflammation, en particulier les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

dont les inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase-2 (inhibiteurs de la Cox-2) ;

Les décontractants musculaires (médicaments permettant le relâchement des muscles utilisés au cours des opérations) ;

La Trinitrine/Nitroglycérine et autres nitrates ou autres substances appelées « vasodilatateurs » ;

Les autres médicaments utilisés pour traiter l'hypertension, dont la Méthyldopa ;

La Rifampicine (utilisée par exemple pour traiter la tuberculose) ;

Le millepertuis ;

Dantrolène (perfusion pour traiter des anomalies graves de température corporelle) ;

La vitamine D et les sels de calcium.

185,20

5013 b