

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0029302

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1895 Société :

Actif Pensionné(e) Autre : Ben Chebroun Ass 95961

Nom & Prénom : Ben Chebroun Henri


Date de naissance : 1948

Adresse : Idem

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 25/03/2023

Nom et prénom du malade : Ben Chebroun, Henri Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Anatomie, physiologie et physiopathologie de l'œil


Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) : 



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
25/03/2023	CB		300 - 6	25/03/2023 Dr. BD RAHMAN Médecin Généraliste + 28/03/2023 Dr. BD RAHMAN Médecin Généraliste

EXECUTION DES ORDONNANCES

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
<i>Akram Daali</i> Inpe :065032633	31/03/93		4000			<i>M-A-D Optic Opticien Optométriste 63 Rue Roger Bide Casa</i>

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	21433552
00	00000000
00	00000000
11	11433553

[Création, remont, adjonction]

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

CABINET MÉDICAL D'OPHTALMOLOGIE

الدكتورة مبارش لحلو صباح

Dr MBARECHE LAHLOU Sabah
Maladies et Chirurgie des Yeux

Diplômée du CES d'Ophtalmologie

Université de Montpellier France

Ancien Médecin Spécialiste au

C.H.U. Ibnou Rochd Casablanca

Chirurgie Oculaire

Lentilles de Contact

Laser - Angiographie

INP : 091098152



00162512500060

طب العيون



الدكتور لحلو نور اليقين

Dr LAHLOU Nourelyakine

Maladies et Chirurgie des Yeux

Diplômé du CES d'Ophtalmologie

Université de Montpellier France

Ancien Médecin Spécialiste au

C.H.U. Ibnou Rochd Casablanca

Ancien Médecin Chef et Chef de Service

à l'Hôpital Omar Idrissi Fès

Chirurgie des Paupières et annexes

Chirurgie des Voies lacrymales

INP : 091032979



001626216000091

Casablanca, le 25/3/2023

Beach proen Yacit

158,00 - Cathionom Lengye 48/-


56,10 - CORNABAK Cof : yele 48/-

129,50 - Lijestanine spray culene

2 pulications 28/-

20,00 - correctif cof yele 38/-

PHARMACIE NOUVELLE
CASABLANCA
K. Boushoubaa
16, Bd de la Liberté - Casablanca
Tél. : 05 22 31 47 17



لا تغير تاريخ الفحص

On ne change pas la Date d'Examen

124, Bd Rahal el Meskini, 5ème étage, Quartier benjdia Casablanca, CP : 20120
entre MARJANE Liberté, L'OREAL et la Maisons VOLVO

Tél. : 05 22 44 20 64 / 05 22 45 20 64 - Tél. fax : 05 22 44 28 94 - E-mail : lahlou.nourlyakine@gmail.com

en cas d'urgences appelez 0766 44 70 26

CABINET MÉDICAL D'OPHTALMOLOGIE

الدكتورة مبارش لحلو صباح

Dr MBARECHE LAHLOU Sabah
Maladies et Chirurgie des Yeux

Diplômée du CES d'Ophtalmologie

Université de Montpellier France

Ancien Médecin Spécialiste au

C.H.U. Ibnou Rochd Casablanca

Chirurgie Oculaire

Lentilles de Contact

Laser - Angiographie

INP : 091098152



001625125000060

طب العيون



Casablanca, le 25/3/2023

INP : 091032979



001626216000091

لا يغير تاريخ الفحص

On ne change pas la Date d'Examen

7 BEN CHE p Roca Horst
 80.74mm ~~8~~ BUL + master
 25 (35° - 0,7r)
 75 (135° - 2) profond
 saline free

~~8~~ BUL + 3
 25 (35° - 0,7r) + 3
 75 (135° - 2) + 3

M-A-D Optic
Opticien Optométriste
63 Rue rguibate Casa

1-05 22442064 / 05 22442064
2A, Bd Rahal el Meskini
L'Atelier Opticien Optométriste
Dr Lahlou Nourelyakine

124, Bd Rahal el Meskini, 5ème étage, Quartier benjdia Casablanca, CP : 20120
entre MARJANE Liberté, L'OREAL et la Maisons VOLVO

Tél. : 05 22 44 20 64 / 05 22 45 20 64 - Tél. fax : 05 22 44 28 94 - E-mail : lahlou.nourlyakine@gmail.com
en cas d'urgences appelez 0766 44 70 26



Un autre regard sur vos yeux

OPTICIEN - LUNETTIER - CONSEILS VISAGISTE

FACTURE N° :

N° 04944

Casablanca, le: 31.03.23.

Akram Daali
Inpe : 065032633

Mme / Mr :

Dr: LAHLOU Nour El Lyahia

VL
OD : $(35^\circ - 075)$
OG : $(135^\circ - 2)$

Monture

Monture
1500-- DH

VP-Add
OD :
OG : + 3,00.

Verres

Progressif OR AR
2500-- DH

Total à payer: 4.000-- DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : 4.000--

M. / h DHS

Cachet et signature
M-A-D OPTIC
Opticien Optométriste
63 Rue Rguibat Casa

Adresse: 63 Rue Rguibat Bourgogne - Casablanca - Tél : 05 22 29 55 36
Capitale 100.000 - Patente: 35402703 - IF: 47232711 - RC: 6123
ICE: 002642590000069

LOT 223547 1

EXP 10 2025

Veul-
ce n-
imp-
Vous-
scrup-
notic-
• Gon-
• Adre-
information

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne sera pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

• Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre ?
3. Comment utiliser CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

AUTRES MEDICAMENTS OPHTALMOLOGIQUES - code ATC : S01XA10

Traitement d'appoint des troubles de la vision binoculaire en complément de la rééducation.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre ?

N'utilisez jamais CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre :

• si vous êtes allergique (hypersensible) à l'inosine phosphate disodique dihydraté ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre.

Mises en garde spéciales

Ce médicament est réservé à l'adulte.

Ne pas injecter, ne pas avaler.

En cas d'aggravation des symptômes, la conduite à tenir doit être réévaluée.

Précautions d'emploi

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, espacer de 5 minutes les instillations.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Autres médicaments et CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre

L'efficacité d'un collyre peut être affectée par l'instillation simultanée d'un autre collyre. Dans ce cas, il convient d'attendre 5 minutes avant de pratiquer la deuxième instillation. Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Comme avec tout collyre, l'instillation de CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre peut provoquer des troubles visuels transitoires.

Ne conduisez pas de véhicules et n'utilisez pas de machines avant que cet effet ait disparu.

3. COMMENT UTILISER CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les

indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

La dose recommandée est de : 2 gouttes de collyre par jour, pendant 15 jours, puis un jour sur deux.

Utilisation chez les enfants

Les données actuellement disponibles ne permettent pas de recommander une posologie et une durée de traitement chez les patients âgés de moins de 18 ans.

Mode et voie d'administration

Voie locale.

EN INSTILLATION OCULAIRE.

Ne pas avaler, ne pas injecter.

Se laver soigneusement les mains avant de procéder à l'instillation.

Eviter de toucher l'œil ou les paupières avec l'embout compte-gouttes.

Instiller la solution dans l'œil en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas. L'œil fermé, essuyer proprement l'excédent. Refermer le flacon après utilisation.

Fréquence d'administration

Après les 15 premiers jours de traitement, poursuivre les instillations oculaires au rythme d'un jour sur deux.

Si vous avez utilisé plus de CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre que vous n'auriez dû : Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Aucun effet toxique n'est à prévoir.

En cas de surdosage, rincer au sérum physiologique stérile.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants peuvent se manifester dans votre œil :

- douleur oculaire,
- irritation oculaire (les fréquences ne peuvent être estimées sur la base des données disponibles).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne sera pas mentionné dans cette notice. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le conditionnement extérieur.

La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois. A conserver à une température inférieure à 25°C. Tout flacon entamé doit être utilisé dans les 15 jours.

Notez sur l'étiquette du flacon la date limite d'utilisation = date d'ouverture + 15 jours après la mention « A utiliser jusqu'à (jour, mois) ».

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre ? La substance active est : inosine phosphate disodique dihydraté : 0,1 g pour 100 ml de collyre.

Les autres composants sont : gluconate de chlорhexidine, chlorure de sodium, eau purifiée.

Qu'est-ce que CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous la forme d'un collyre - flacon compte-gouttes de 10 ml.

Titulaire de l'AMM/ Fabricant :

Laboratoires SOTHEMA
B.P. N° 1, 27182 Bouskoura
Maroc.

 سوتما

Conditions de prescription et de délivrance :

Médicament non soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : Septembre 2019.

Larmabak 0,9 POUR CENT,

LARMABAK 0,9%
Collyre 10 ml - PPV : 54,10 DH



6 118001 100651

Veuillez cont

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. QU'EST-CE QUE LARMABAK 0,9 POUR CENT, collyre ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LARMABAK 0,9 POUR CENT, collyre ?
3. COMMENT UTILISER LARMABAK 0,9 POUR CENT, collyre ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER LARMABAK 0,9 POUR CENT, collyre ?
6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS.

1. QU'EST-CE QUE LARMABAK 0,9 POUR CENT, collyre ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique : Supplément lacrymale – code ATC : S01XA20

Ce médicament est préconisé pour soulager les symptômes d'irritation liés à la sécheresse oculaire (quand il existe une insuffisance de larmes).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LARMABAK 0,9 POUR CENT, collyre ?

N'utilisez jamais LARMABAK 0,9 POUR CENT, collyre :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (chlorure de sodium) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

lyre le sodium

avant d'utiliser ce médicament car elle pour vous.

Fréquence d'administration

Repartir les instillations au cours de la journée, en fonction des besoins. En moyenne, 3 à 4 instillations par jour et jusqu'à 8, si nécessaire.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Possibilité de légères irritations oculaires. Si vous souffrez de dommages sévères de la cornée (couche transparente située à l'avant de l'œil) les phosphates peuvent causer, dans de très rares cas, des troubles de la vision en raison de l'accumulation de calcium pendant le traitement (nuage).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER LARMABAK 0,9 POUR CENT, collyre ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage et le flacon après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

comprue que el producto
en caso de excesiva lacrimatione,
sensazione di corpo
della
anche
ano da
enteros
solieito
' della
di eccesivo sensazione di corpo

ISOPHARM

LIPOSTAMIN

129.50 DH

Sodio Cionuro, Sodio Cionuro,
Lettaborato, Capparis spinosa,
Estratto di Capparis spinosa, Euphrasia
Helichrysum italicum, Euphrasia
Officinalis, Glycyrrhiza glabra
Soluione isotonica tamponata a
pH 7,2.

CONTENUTO

1 flacone da 15 ml
1 prospetto illustrativo
Dispositivo Medico
Text Rev 01 24.04.20
0477

SCHALCON S.p.A.
Viale Enrico Ortolani, 195
00125 ROMA Italy

VATEURS.

Euphrasia officinalis, Capparis spinosa, Helichrysum italicum.

CONTENUTO

Complex e phospholipidique, acide borique, tetraborate de sodium, chlorure de sodium.

Extrait de:

Capparis spinosa

Helichrysum italicum

Euphrasia officinalis

Glycyrrhiza glabra

Solution isotonique tamponnée à pH 7,2

PRESENTATION ET CONTENU

Solution ophthalmique spray en flacon.

INDICATIONS

Solution spray oculaire et pour les paupières à base de liposomes et extraits végétaux de *Glycyrrhiza glabra*, *Euphrasia officinalis*, *Capparis spinosa*, *Helichrysum italicum*, notamment connus comme coadjutants en cas de formes allergiques provoquées par les pollens, la poussière ou d'autres facteurs externes.

L'utilisation du produit est utile en cas de larmoiements, rougeurs, sensation de corps étranger, brûlures et démangeaisons de la zone oculaire et des paupières.

L'utilisation du produit favorise la formation d'un fin film de protection au niveau oculaire capable de lutter, par effet barrière, contre le contact des allergènes environnementaux sur la muqueuse oculaire. Les extraits végétaux contenus dans le produit contribuent à rétablir les conditions physiologiques optimales de la muqueuse oculaire, procurant ainsi un soulagement rapide et prolongé.

L'extrait d'Euphrase est connu pour ses propriétés astringentes et anti-inflammatoires; il est utile pour décongestionner les paupières et soulager irritations et brûlures oculaires.

L'extrait de Régisse est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et grâce à la présence d'acide glycyrrhizique, il est indiqué en cas de rougeur oculaire.

L'extrait de Câprier contient une concentration de flavonoïdes élevée, en particulier la quercétine et le kaempférone qui jouent un rôle fondamental dans le traitement des allergies. L'extrait de Câprier, en particulier associé avec la *Glycyrrhiza glabra*, montre une action antioxydante et similaire à la cortisone.

L'extrait d'Immortelle est depuis longtemps utilisé pour ses propriétés thérapeutiques anti-inflammatoires, analgésiques, décongestionnantes et anti-allergiques.

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité subjective à un ou plusieurs composants.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Ne pas utiliser le produit sur des yeux maquillés avec des cosmétiques non waterproof: les liposomes pourraient également véhiculer dans l'œil les composants du maquillage. En tenant la paupière fermée ou ouverte, positionner le spray à environ 10 cm de l'œil. Lors de la première utilisation, il faut plusieurs vaporisations pour bien remplir la canule du diffuseur. Vaporiser une ou deux fois par œil. Répéter le traitement au moins 3 ou 4 fois par jour.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas congeler, tenir éloigné des sources de chaleur et des rayons directs du soleil
- Ne pas utiliser le produit après la date de péremption indiquée sur l'emballage
- Ne pas ingérer
- Conserver à température ambiante.

SANS CONSERVATEURS

Dispositif médical

 SCHALCON S.p.A.
Viale Enrico Ortolani, 195
00125 ROMA Italy

 0477




STERILE A

Cationorm®

Multi

Emulsion
Ophtalmique

PPC 158,00 DH



Cationorm® M

Emulsion ophtalmique

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

1. QU'EST-CE QUE CATIONORM® MULTI ET DANS QUEL(S) CAS L'UTILISER ?

Cationorm® multi est une émulsion ophtalmique hypotonique à conservateur absent, présente sous la forme d'un liquide d'aspect laiteux.

Cationorm® multi est composé de : huiles minérales, glycérol, tylapol, pectine, tris-hydrochlorure, trométhamine, chlorure de cétalkonium et eau purifiée.

Un flacon de Cationorm® multi contient 10 ml d'émulsion stérile.

De par ses propriétés, Cationorm® multi contribue à l'hydratation, à la lubrification et à la protection de la surface oculaire.

Son utilisation est recommandée dans le traitement des symptômes de la sécheresse oculaire qui peuvent être caractérisés par des yeux qui piquent, démangent, par une sensation de corps étranger dans l'oeil (sensation de grain de sable, poussière). Ces symptômes peuvent être liés à des facteurs extérieurs (climat, pollution, fumée, poussière, voyage en avion, etc.) ou à une fatigue oculaire.