

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE AVANT DE FAIRE UN SOIN

ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0030105

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 12193 Société : R.A.M

Actif Pensionné(e)

Autre : 155959

Nom & Prénom : FARISSI OMAR

Date de naissance :

1941


Adresse : Hay Tarabout Rue 10 N 4, CASA, BORGEOIS

BORGEOIS

Tél. : 4668976498 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 13/03/23

Nom et prénom du malade : EL Abdellaoui latifa Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

Affection droite

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :



04 AVR 2023

ZAAHANE

A0027413/3023

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
13/03/23		1	150 DA	Dr. Imade KOURAICHY EL IDRISI Dr. Imade KOURAICHY EL IDRISI Médecine Générale Ouled Zouz Farah El Soussi - Ag.1 (Inane Louz) Oulla Hay Hassani - Casablanca INPE: 001234567890
22/03/23	Control	G		

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE DE L'ATLANTIQUE Dr. ESADIQ Salim Boulevard Zaitouni - Casablanca Tel: 05 22 26 74 19	13-03-23	524,80
PHARMACIE DE L'ATLANTIQUE Dr. ESADIQ Salim Boulevard Zaitouni - Casablanca Tel: 05 22 26 74 19	22-03-23	569,80

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien se souvient de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
	00000000	00000000
D	00000000	00000000
B	35533411	11433553
G		

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

ORDONNANCE

le 22/03/23

Mr/Mme

EL ABDELLAOUI

LATIFA

172,00

1) iodine SV
1 gélule le soir

M 5,00 x 2
28,00

2) Flavir plus 2 gélules
1 gélule le soir / j

M 3,80 x 2

3) Heyam SV ACP x 3 (2ème boîte)

569,80

Dr. Imane KOURAICHI EL IDRISI
Médecine Générale
Farah El Salam 2 Fés, Ouled Azouz
G.H.2 Imm. 8 N°3 Err. 1 (Jn. de Louz)
Oulfa Hay Hassan 20 Casa
INPE 09122209

Cachet du médecin



Flavia Plus

La ménopause survient en moyenne aux alentours de l'âge de 50 ans. De nos jours, l'espérance de vie des femmes au Maroc dépasse les 75 ans.

A partir de la cinquantaine, la baisse de production des hormones féminines aboutit à l'apparition de bouffées de chaleur, sensations d'étouffement, sueurs nocturnes, altérations de l'humeur et du sommeil, sensations de fatigue ... Par ailleurs, ce déséquilibre biologique engendre des effets sur le long terme, notamment sur les os et le système cardiovasculaire de la femme.

Une alimentation équilibrée durant cette étape de la ménopause est très importante. Celle-ci devra notamment comprendre les produits riches en isoflavones de soja, tels que les petits pois, les lentilles et le thé, les produits laitiers riches en calcium, les poissons gras, le foie, le jaune d'oeuf, les légumineuses, les céréales, les fruits secs et les protéines d'origine animale, riches en vitamines telles que B6, B9, B12 et vitamine D. Les légumes-feuilles vertes (tels que les choux, le cresson, les épinards, la bette), les choux de Bruxelles, le brocoli et les asperges sont riches en vitamine K.

La pratique quotidienne d'exercice physique accompagnée d'un régime alimentaire varié et équilibré contribuent à améliorer la qualité de vie chez la femme ménopausée.

Qu'est-ce que Flavia Plus ?

Flavia Plus est un complément alimentaire qui associe l'extrait de soja à 40% d'isoflavones, calcium, vitamine D, vitamine K, ainsi qu'un complexe de trois vitamines du groupe B et l'acide alpha-linolénique.

Flavia Plus aide à couvrir les besoins nutritionnels chez la femme durant la ménopause.

Composition

Ingrédients: Agent de charge (huile de lin raffinée (45% d'acide alpha-linolénique), carbonate de calcium, agent d'enrobage (gélatine), **soja (Glycine max L.)**, agent humectant (glycérine (E-422)), émulsifiants (**lécithine de soja (E-322)**, cyanocobalamine (vitamine B12), phytométhadione (vitamine K), pyridoxine hydrate, colorants (E-120, E-171, E-172), acide ptéroylmonoglutamique (folate), cholécalciférol (vitamine D) et antioxydants (extrait riche en tocopherol (vitamine E), acide ascorbique (vitamine C), gallate de propyle (E-310).

Complément alimentaire

Nutriments

Acide alpha-linolénique
Calcium
Isoflavones de soja
Vitamine B6
Vitamine B9
Vitamine K1
Vitamine D
Vitamine B12

Information nutritionnelle

Valeur énergétique
Gras
- dont, acides gras saturés
Hydrates de carbone
- dont, sucres
Protéines
Sel

Poids net: 46,9 g

Lot:

Consommer
de préférence
avant la fin de:
PPC 125 Dhs

U0796
05/2025

*VNR=Valeur Nutritionnelle de Référence

Sans sucre. Sans gluten.

Soja

Le soja est une plante naturellement riche en isoflavones. Ces isoflavones sont des hormones végétales ayant une structure très similaire à celle des hormones féminines.

Calcium, vitamines D et K

Le calcium est le minéral le plus abondant dans l'organisme. Il est concentré en presque totalité dans le squelette. Pendant la ménopause, les besoins en calcium augmentent. Le calcium est nécessaire pour maintenir les os en conditions normales.

La vitamine D peut être synthétisée par la peau sous les effets des rayons ultraviolets du soleil. La vitamine D contribue à l'absorption et à l'utilisation normale du calcium.

Les vitamines D et K contribuent à maintenir les os en conditions normales.

Folates, vitamines B6 et B12

Ces vitamines n'étant pas accumulées par l'organisme, un apport régulier est donc recommandé. Toutes ces vitamines participent au métabolisme normal de l'homocystéine. Par ailleurs, celles-ci aident à réduire la fatigue. La vitamine B6, quant à elle, aide à réguler l'activité hormonale.

Acide alpha-linolénique

Cet acide gras contribue à maintenir des taux normaux de cholestérol sanguin. Il est décrit que l'effet bénéfique est obtenu à partir d'une dose quotidienne de 2g de cet acide gras.

Posologie

Prise journalière recommandée : 1 capsule molle par jour avec un verre d'eau.

Avertissement

Ne pas dépasser la prise journalière expressément recommandée.

Ce complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.

Maintenir hors de la portée des enfants.

Déconseillé aux femmes enceintes.

A conserver bien fermé dans un endroit frais et sec.

A consommer de préférence avant la date indiquée sur l'emballage.

Présentation : Boîte de 30 capsules molles.

FABRICANT

HC CLOVER, P.S. SL

C/Alicante nº 8 – 10

28500 Arganda del Rey (Madrid)

DISTRIBUTEUR

 **Versalya**
La femme et son enfant

Zone Industrielle du Sahel,
lot 149 Had Soualem.
Province de Berrechid, Maroc.

Flavia

Plus

La ménopause survient en moyenne aux alentours de l'âge de 50 ans. De nos jours, l'espérance de vie des femmes au Maroc dépasse les 75 ans.

A partir de la cinquantaine, la baisse de production des hormones féminines aboutit à l'apparition de bouffées de chaleur, sensations d'étouffement, sueurs nocturnes, altérations de l'humeur et du sommeil, sensations de fatigue ... Par ailleurs, ce déséquilibre biologique engendre des effets sur le long terme, notamment sur les os et le système cardiovasculaire de la femme.

Une alimentation équilibrée durant cette étape de la ménopause est très importante. Celle-ci devra notamment comprendre les produits riches en isoflavones de soja, tels que les petits pois, les lentilles et le thé, les produits laitiers riches en calcium, les poissons gras, le foie, le jaune d'oeuf, les légumineuses, les céréales, les fruits secs et les protéines d'origine animale, riches en vitamines telles que B6, B9, B12 et vitamine D. Les légumes-feuilles vertes (tels que les choux, le cresson, les épinards, la bette), les choux de Bruxelles, le brocoli et les asperges sont riches en vitamine K.

La pratique quotidienne d'exercice physique accompagnée d'un régime alimentaire varié et équilibré contribuent à améliorer la qualité de vie chez la femme ménopausée.

Qu'est-ce que Flavia Plus ?

Flavia Plus est un complément alimentaire qui associe l'extrait de soja à 40% d'isoflavones, calcium, vitamine D, vitamine K, ainsi qu'un complexe de trois vitamines du groupe B et l'acide alpha-linolénique.

Flavia Plus aide à couvrir les besoins nutritionnels chez la femme durant la ménopause.

Composition

Ingrédients: Agent de charge (huile de lin raffinée (45% d'acide alpha-linolénique), carbonate de calcium, agent d'enrobage (gélatine), **soja (Glycine max L.)**, agent humectant (glycérine (E-422)), émulsifiants (**lécithine de soja (E-322)**, cyanocobalamine (vitamine B12), phytoménadione (vitamine K), pyridoxine chlorhydrate, colorants (E-120, E-171, E-172), acide ptéroylmonoglutamique (folate), cholestérol (vitamine D) et antioxydants (extrait riche en tocophérol (E-306))

late
Complément alimentaire

Nutriments

- Acide alpha-linolénique
- Calcium
- Isoflavones de soja
- Vitamine B6
- Vitamine B9
- Vitamine K1
- Vitamine D
- Vitamine B12

Information nutritionnelle

Valeur énergétique

Gras

- dont, acides gras saturés

Hydrates de carbone

- dont, sucres

Protéines

Sel

Flavia

Plus

Poids net: 46,9 g

Lot:

Consommer
de préférence
avant la fin de:
PPC 125 Dhs

U0796
05/2025

*VNR=Valeur Nutritionnelle de Référence

Sans sucre. Sans gluten.

Soja

Le soja est une plante naturellement riche en isoflavones. Ces isoflavones sont des hormones végétales ayant une structure très similaire à celle des hormones féminines.

Calcium, vitamines D et K

Le calcium est le minéral le plus abondant dans l'organisme. Il est concentré en presque totalité dans le squelette. Pendant la ménopause, les besoins en calcium augmentent. Le calcium est nécessaire pour maintenir les os en conditions normales.

La vitamine D peut être synthétisée par la peau sous les effets des rayons ultraviolets du soleil. La vitamine D contribue à l'absorption et à l'utilisation normale du calcium.

Les vitamines D et K contribuent à maintenir les os en conditions normales.

Folates, vitamines B6 et B12

Ces vitamines n'étant pas accumulées par l'organisme, un apport régulier est donc recommandé. Toutes ces vitamines participent au métabolisme normal de l'homocystéine. Par ailleurs, celles-ci aident à réduire la fatigue. La vitamine B6, quant à elle, aide à réguler l'activité hormonale.

Acide alpha-linolénique

Cet acide gras contribue à maintenir des taux normaux de cholestérol sanguin. Il est décrit que l'effet bénéfique est obtenu à partir d'une dose quotidienne de 2g de cet acide gras.

Posologie

Prise journalière recommandée : 1 capsule molle par jour avec un verre d'eau.

Avertissement

Ne pas dépasser la prise journalière expressément recommandée.

Ce complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.

Maintenir hors de la portée des enfants.

Déconseillé aux femmes enceintes.

A conserver bien fermé dans un endroit frais et sec.

A consommer de préférence avant la date indiquée sur l'emballage.

Présentation : Boîte de 30 capsules molles.


FABRICANT

HC CLOVER, P.S. SL

C/Alicante n° 8 - 10

28500 Arganda del Rey (Madrid)

DISTRIBUTEUR

 **Versalya**

La femme et son enfant

Zone Industrielle du Sahel,

lot 149 Had Soualem.

Province de Berrechid, Maroc.



كبسولات ممتدة المفعول ؟

تناول الأطفال وعيونهم.
ممتدة المفعول بعد تارikh انتهاء مدة صلاحيته المبين على العلبة.
قل عن 30 درجة متغيرة.

لأعراض الظاهرة للتلذف

رف المحمي أو مع النفايات المنزلية.
لـ الأدوية التي لم تعد تستعملها.
له على البيئة.

(لديك أو الكليسوم (نحضر كالسيوم الدم) أو المغنيزيوم (نحضر مغنزيوم الدم)

حدث بشأن ذلك إلى الطبيب أو الصيدلي قبل شروع في تناول هذا الدواء.

يعانون من حساسية للكالاكوز أو نحضر من لاكتاز لاب أو من متلازمة سوء امتصاص

4 ملغ

2.74 ملغم

جيري التبل، كوليبدون (ر) س.ر، دوكوسات الصوديوم، هيدروكسيلابوروبيلميثسلولوز، سيارات
إيثانول بدون ماء، حمض مينتكريليك-أركيلات إيثيل، 2-بروبيلين غليكول، ماء مصفى.

المفعول. علبة تحتوي على 14 و 28 كبسولة.

أن تتفاعل مع الأدوية الأخرى.

إريثروميسين، كلارايرثروميسين؛

(تحتوي مثلاً على كيتوكافازول، إيتاكافازول)؛

ة المكبسنة.

لـ الأدوية الثانية :

ي مثلاً على مينوكارياميد، سيساريدي

تحتوي مثلاً على أمبودارون، سوتاولوكينيدين، بروكيناميدي

يتوفر عليها إيرودين^(*) (الخصائص المضادة لتنفس الماسكارين) أو الأدوية التي لها

ية كوكينية الفعل، في حالة الشك، تحدث بشأن ذلك إلى الطبيب.

وإن الأمر يدواء تم الحصول عليه بدون وصفة، تحدث بشأن ذلك إلى الطبيب.

أثناء وجية الطعام أو قبلها أو بعدها.

لمفعول أثناء العمل.

ت في الحمل، تحدث بشأن ذلك إلى الطبيب فوراً.

(*) في حليب الأم أمر غير معروف.

ت ممتدة المفعول.

ي دواه.

- أكادير المغرب
في المسؤول

ة المفعول، إلى الدوخة أو التعب أو اضطرابات بصرية؛ ويمكن أن تتأثر القدرة على

المفعول ؟

ـ عمال و مدة العلاج

حالة عدم التيقن، استشر الطبيب أو الصيدلي.

على 4 ملغ يتم تناولها مرة واحدة في اليوم، ماعدا بالنسبة للمرضى الذين يعانون من
جانبية مزعجة و في هذه الحالات، يمكن للطبيب أن يخفف المفرغات إلى كبسولة
في اليوم.

دول لدى الأطفال.

مرفق الفم ويجب ابتلاعها بالكامل، لا ينبغي مضغ الكبسولة.

ـ، كبسولات ممتدة المفعول.

ـ، إن التكيف مع العلاج يتطلب وقتاً، أقム العلاج الذي وصفه لك الطبيب، إذا لم
ك إلى الطبيب، يجب إعادة تقييم العلاج بعد شهرين أو ثلاثة أشهر.

ـ، علاج.



HEPANAT®

le dieci erbe

Composition par comprimé de 400 mg :

Rhamnus purshiana écorce 85,4 mg. Jus d'aloë ferox 64 mg. Foeniculum vulgare graines 53,4 mg. Cassia angustifolia feuilles 42,7 mg. Glycyrrhiza glabra racine 16 mg. Gentiana lutea racine 16 mg. Taraxacum officinale racine 10,7 mg. Rhamnus alpinus écorce 10,7 mg. Rheum palmatum racine 10,7 mg. Marrubium vulgare sommités fleuries 10,7 mg. Maltodextrine ; agent de charge : Cellulose microcristalline ; antiagglomérants : sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium; agents de revêtement : Hydroxypropylméthylcellulose, acides gras, cellulose microcristalline.

ENOHV20-002

Propriétés :

Confort digestif et intestinal.

Conseils d'utilisation :

2 à 4 comprimés par jour.

Précautions d'emploi :

- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
- Ne pas utiliser pendant la grossesse.

Présentations :

- Boîte de 20 comprimés.
- Boîte de 40 comprimés.



HEPANAT®

le dieci erbe

Composition par comprimé de 400 mg :

Rhamnus purshiana écorce 85,4 mg. Jus d'aloë ferox 64 mg. Foeniculum vulgare graines 53,4 mg. Cassia angustifolia feuilles 42,7 mg. Glycyrrhiza glabra racine 16 mg. Gentiana lutea racine 16 mg. Taraxacum officinale racine 10,7 mg. Rhamnus alpinus écorce 10,7 mg. Rheum palmatum racine 10,7 mg. Marrubium vulgare sommités fleuries 10,7 mg. Maltodextrine ; agent de charge : Cellulose microcristalline ; antiagglomérants : sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium; agents de revêtement : Hydroxypropylméthylcellulose, acides gras, cellulose microcristalline.

ENOHNV020-002

Propriétés :

Confort digestif et intestinal.

Conseils d'utilisation :

2 à 4 comprimés par jour.

Précautions d'emploi :

- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
- Ne pas utiliser pendant la grossesse.

Présentations :

- Boîte de 20 comprimés.
- Boîte de 40 comprimés.



4/DMP/CA/18

Docteur

Imane KOURAICHI EL IDRISI

Médecine Générale
Echographie Générale



Diplômée à l'Hôpital Universitaire Ibn Rochd
et Faculté de Médecine et de Pharmacie
Casablanca

الدكتورة
إيمان قريشي الأدريسي

الطب العام
الفحص بالصدى

خريجة المستشفى الجامعي ابن رشد
وكليّة الطب والصيدلة الدار البيضاء

Casablanca, le : 13/03/23

Ela bde flaqui Lahfa

63,30

- Bellamy
1 gel

(2h après repas)

75,00

- Enso long
1 gel le soir avant dormir
(nuit)

89,50

- Néo bi
1 cap

aplat
M. Salim
PHARMACIE M. Salim
512, Boulevard Zerktouni
Dr. ESSALI
Dr. Imane KOURAICHI EL IDRISI
Tel.: 05 22 29 71

125,00

- Flexia plus
1 cap

Hypenel
Dr. Imane KOURAICHI EL IDRISI
Farah El Salam 2, Résidence Ouled Azouz GH2, Imm. 3, N° 3-1^{er} étage (Jnane Louz)
Oulfa - Hay Hassani
Tel.: 05 22 89 71 79

فرح السلام 2، (قامة أولاد عزوي)، GH2، عمارة 8، شقة 3 الطابق الأول جنان اللوز - الألفة - الحي الحسني
Farah El Salam 2, Résidence Ouled Azouz GH2, Imm.3, N°3-1^{er} étage (Jnane Louz) - Oulfa - Hay Hassani

Tel.: 05 22 89 71 79

Lot :
A consommer avant le : 09/2024
PPC : 89,50 DH

oules buvables

Neobiline®

PHARMACIE DE L'ATLANTIQUE
Dr. ESSADIO Salim
512, Boulevard Zerktouni - Casablanca
Tél.: 05 22 26 74 10

PHARMACIE DE L'ATLANTIQUE
Dr. ESSADIO Salim
512, Boulevard Zerktouni - Casablanca
Tél.: 05 22 26 74 10

Dr. Imane KOULATI EL IDRISI
Médecin Généraliste
G.H.2 Mamm N°1391 (L'Urgence)
Farech El Salim Rés. Ouled Aicha
INPE 091339491
G.H.2 Mamm N°1391 (L'Urgence)
Farech El Salim Rés. Ouled Aicha
INPE 091339491



PHARMACIE DE L'ATLANTIQUE
Dr. ESSADIO Salim
512, Boulevard Zerktouni - Casablanca
Tél.: 05 22 26 74 10

PHARMACIE DE L'ATLANTIQUE
Dr. ESSADIO Salim
512, Boulevard Zerktouni - Casablanca
Tél.: 05 22 26 74 10



pp
11.40 - 38.70 x 2
= 57.40



pp
11.40 - 38.70 x 2
= 57.40

SYMPOTMES ET INSTRUCTIONS EN CAS DE SURDOSSAGE

Si vous avez pris plus d'Inéso que vous n'en auriez dû : consultez immédiatement le [pharmacien](#) ou votre [pharmacien](#).

INSTRUCTIONS EN CAS D'OMISSION D'UNE OU DE PLUSIEURS DOSES

Si vous oubliez de prendre Inéso, prenez-le dès que possible. Cependant, si vous êtes à proximité du moment de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée, mais poursuivez votre traitement normalement.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre [médecin](#) ou à votre [pharmacien](#).

RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE

Sans objet.

EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous remarquez l'un de ces effets indésirables graves, arrêtez de prendre ce médicament et contactez un [médecin](#) immédiatement :

Apparition soudaine d'une respiration sifflante, gonflement des lèvres, de la langue, de la gorge ou du corps, éruptions cutanées, perte de connaissance et difficultés à avaler (réactions allergiques graves).

Rougeurs de la peau avec des bulles ou une desquamation. Parfois, les bulles peuvent être importantes et s'accompagner d'un saignement au niveau des lèvres, des yeux, de la bouche, du nez ou des parties génitales. Ceci peut correspondre à un syndrome de Stevens-Johnson ou à une destruction toxique de la peau.

Jaunisse, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie.

Ces effets sont rares et peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1000.

Les autres effets indésirables sont :

- Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :

Maux de tête. Effets sur l'estomac ou l'intestin : diarrhée, douleurs à l'estomac, constipation, flatulence.

Nausées, vomissements.

- Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100) :

Gonflement des pieds et des chevilles. Troubles du sommeil (insomnie). Etoffissements, fourmillements, somnolence. Vertiges. Sécheresse de la bouche. Augmentation dans le sang des enzymes du foie. Éruptions cutanées, urticaire et démangeaisons. Fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres (si Inéso 20 mg et 40mg, gélules gastro-résistantes est utilisé à des doses élevées et sur une longue période).

- Effets indésirables très rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1000)

Troubles sanguins tels qu'une diminution du nombre de globules blancs ou de plaquettes. Ces effets peuvent provoquer une faiblesse, des ecchymoses et faciliter la survenue d'infections. Diminution du taux de sodium dans le sang. Celle-ci peut provoquer une faiblesse, des nausées, des vomissements et des crampes. Agitation, confusion, dépression. Troubles du goût. Troubles de la vue, tels que vision trouble. Respiration sifflante ou souffle court (bronchospasme). Inflammation de l'intérieur de la bouche. Infection de l'intestin liée à un champignon (candidose gastro-intestinale). Troubles hépatiques incluant la jaunisse, pouvant entraîner une peau colorée en jaune, des urines sombres et de la fatigue. Perte de cheveux (alopecie). Éruption cutanée lors d'exposition au soleil. Douleurs articulaires (arthralgie) ou musculaires (myalgie). Sensation de faiblesse et manque d'énergie. Augmentation de la sueur.

- Effets indésirables très rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000)

Modification du nombre de cellules du sang incluant l'agranulocytose (déficit en globules blancs). Agressivité. Hallucinations visuelles, sensorielles ou auditives. Troubles hépatiques sévères entraînant une insuffisance hépatique et une inflammation du cerveau. Apparition soudaine d'éruptions cutanées sévères, bulles ou desquamations importantes (réactions bulleuses) pouvant être associées à une fièvre et à des douleurs articulaires (érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell). Faiblesse musculaire. Troubles rénaux sévères. Gonflement des seins chez l'homme.

- Effets indésirables de fréquence indéterminée (ne peut pas être estimée à partir des données disponibles).

Si vous prenez l'ésoméprazole pendant plus de trois mois, il est possible que le taux de magnésium dans votre sang diminue. De faibles taux de magnésium peuvent se traduire par une fatigue, des contractions musculaires involontaires, une désorientation, des convulsions, des sensations vertigineuses, une accélération du rythme cardiaque. Si vous présentez l'un de ces symptômes, veuillez en informer immédiatement votre [médecin](#). De faibles taux de magnésium peuvent également entraîner une diminution des taux de potassium ou de calcium dans le sang. Votre [médecin](#) pourra décider d'effectuer des examens sanguins réguliers pour surveiller votre taux de magnésium. Inflammation de l'intestin (entraînant des diarrhées).

l'ésoméprazole peut dans de très rares cas affecter les globules blancs entraînant un déficit immunitaire. Vous devez consulter votre [médecin](#) dès que possible si vous avez une infection avec des symptômes tels que de la fièvre avec une fatigue générale très importante, ou de la fièvre avec des symptômes d'infection locale tels que des douleurs dans le cou, la gorge, la bouche, ou des difficultés à uriner. Si vous avez ces symptômes, un déficit de globules blancs (agranulocytose) pourra être éliminé par un test sanguin. Il est important que vous donniez des informations sur vos médicaments dans ce cas.

CONDITIONS DE CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C et à l'abri de l'humidité.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

(ce que contient Inéso 20 mg, gélule gastro-résistante : chaque gélule gastro-résistante

contient 20 mg d'ésoméprazole

(ce que contient Inéso 40 mg, gélule gastro-résistante : chaque gélule gastro-résistante

contient 40 mg d'ésoméprazole

Excipient(s) à effet notable : saccharose

Conditions de prescription et de délivrance : Tableau C (Liste II)

Ce médicament est disponible en forme de gélules sous plaque (Aluminium) sous les présentations suivantes :

Inéso 20 mg :

Boîtes : de 7 gélules / AMM n° 177/18 DMP/21/NCN

Boîtes : de 14 gélules / AMM n° 178/18 DMP/21/NCN

Boîtes : de 28 gélules / AMM n° 179/18 DMP/21/NCN

Inéso 40 mg :

Boîtes : de 7 gélules / AMM n° 180/18 DMP/21/NCN

Boîtes : de 14 gélules / AMM n° 181/18 DMP/21/NCN

Boîtes : de 28 gélules / AMM n° 182/18 DMP/21/NCN

Code : AC2 - 00088

OU A UTILISER DES MACHINES

de conduire des véhicules et à utiliser des machines. Certains effets et une vision trouble peuvent survenir peu après l'ingestion. Si ces effets, vous ne devez pas conduire ou utiliser des machines.

ON, FREQUENCE D'ADMINISTRATION ET DUREE

ien (brûlures et remontées acides)

usage, la dose recommandée est de 40 mg d'Inéso une fois par jour pendant une semaine. Votre [médecin](#) peut recommander une autre dose ou une autre durée. Si l'effet thérapeutique n'est pas obtenu, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

d'anti-inflammatoires non stéroïdiens

usage, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

remédatoires non stéroïdiens

usage, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg une fois par jour.

ndrome de Zollinger-Ellison.

usage, la dose recommandée est de 40 mg d'Inéso une fois par jour pendant 4 à 8 semaines. Votre [médecin](#) peut recommander une autre dose ou une autre durée.

ien (brûlures et remontées acides)

usage, la dose recommandée est de 40 mg d'Inéso une fois par jour pendant 4 à 8 semaines. Votre [médecin](#) peut recommander une autre dose ou une autre durée.

usage, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

usage, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

ndrome de Zollinger-Ellison.

usage, la dose recommandée est de 40 mg d'Inéso une fois par jour pendant 4 à 8 semaines. Votre [médecin](#) peut recommander une autre dose ou une autre durée.

ien (brûlures et remontées acides)

usage, la dose recommandée est de 40 mg d'Inéso une fois par jour pendant 4 à 8 semaines. Votre [médecin](#) peut recommander une autre dose ou une autre durée.

ndrome de Zollinger-Ellison.

usage, la dose recommandée est de 40 mg d'Inéso une fois par jour pendant 4 à 8 semaines. Votre [médecin](#) peut recommander une autre dose ou une autre durée.

ien (brûlures et remontées acides)

usage, la dose recommandée est de 40 mg d'Inéso une fois par jour pendant 4 à 8 semaines. Votre [médecin](#) peut recommander une autre dose ou une autre durée.

ndrome de Zollinger-Ellison.

usage, la dose recommandée est de 40 mg d'Inéso une fois par jour pendant 4 à 8 semaines. Votre [médecin](#) peut recommander une autre dose ou une autre durée.

usage, la dose recommandée est de 40 mg d'Inéso une fois par jour pendant 4 à 8 semaines. Votre [médecin](#) peut recommander une autre dose ou une autre durée.

usage, la dose recommandée est de 40 mg d'Inéso une fois par jour pendant 4 à 8 semaines. Votre [médecin](#) peut recommander une autre dose ou une autre durée.



Gélule
Microgranules
gastro-résistants
Par voie orale

Inéso

ésoméprazole

Deva
Pharmaceutique

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Inéso contient une substance appelée esoméprazole. C'est un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Inéso 20 mg, gélule gastro-résistante est utilisé dans le traitement des maladies suivantes :

Adultes

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.
- L'ulcère de l'estomac ou duodénal en cas d'infection par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Si vous êtes dans cette situation votre médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser.
- Le traitement et la prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Inéso peut aussi être utilisé pour stopper la formation d'ulcères si vous prenez des anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.

Adolescents âgés de 12 ans et plus

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.
- L'ulcère de l'estomac ou duodénal en cas d'infection par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Si vous êtes dans cette situation votre médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser.

Inéso 40 mg, gélule gastro-résistante est utilisé dans le traitement des maladies suivantes

Adultes

- Le traitement de l'œsophagite érosive par reflux lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.

Adolescents âgés de 12 ans et plus

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.

LISTE DES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT LA PRISE DU MÉDICAMENT

Sans objet.

CONTRE-INDICATIONS

- Si vous êtes allergique à l'esoméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons, (par exemple : pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, oméprazole),
- Si vous prenez un médicament contenant du néfénatr.

Il est particulièrement important d'informer votre médecin si vous prenez d'autres médicaments, même ceux sans prescription médicale.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ; MISES EN GARDE SPÉCIALES

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant toute administration d'Inéso :

- si vous avez des problèmes hépatiques sévères.

- si vous avez des problèmes rénaux sévères.

Si vous prenez Inéso vous devez informer immédiatement votre médecin si : "vous perdez du poids sans raison et vous avez des problèmes pour avaler," vous avez des douleurs à l'estomac ou une indigestion, "vous vomissez de la nourriture ou du sang, "vous avez des selles noires teintées de sang.

La prise d'un inhibiteur de la pompe à proton tel qu'Inéso, en particulier sur une période supérieure à un an, peut légèrement augmenter le risque de fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres. Prévenez votre médecin si vous souffrez d'ostéoporose ou si vous prenez des corticoïdes (qui peuvent augmenter le risque d'ostéoporose).

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez autre médicament, y compris les médicaments obtenus sans ordonnance. Vous ne devez pas prendre Inéso si vous prenez le métamiviro (pour l'infection par le VIH).

Vous devez informer votre médecin ou pharmacien si clopidogrel, kétocanazole, itraconazole ou voriconazole, diazépam, phénytoïne, warfarine, cilostazol, cisapride, di

INTERACTIONS AVEC LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

Vous pouvez prendre vos gélules avec de la nourriture ou sans.

INTERACTIONS AVEC LES PRODUITS DE PHYTOTHÉRAPIE

Sans objet.

UTILISATION PENDANT LA GROSSESSE ET L'allaitement

Grossesse, allaitement et fertilité.

Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Votre médecin vous dira si vous pouvez prendre Inéso pendant cette période.

On ne sait pas si Inéso passe dans le lait maternel, en conséquence, vous demandez conseil à votre médecin ou pharmacien lorsque vous allaitez.

SPORTIFS

Sans objet.

EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DES VÉHICULES

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Inéso n'est pas susceptible d'entraîner des effets sur l'aptitude à conduire des véhicules. Cependant, des effets secondaires tels que des étourdissements peuvent se produire fréquemment ou rarement. Si vous êtes affectés par l'un de ces effets, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Saccharose

POSÉLOGIE, MODE ET/OU VOIE(S) D'ADMINISTRATION ET TRAITEMENT

Inéso 20 MG :

Adultes âgés de 18 ans et plus :

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien : Si votre médecin diagnostique une inflammation de l'œsophage, une infection par une bactérie appelée Helicobacter pylori ou une œsophagite érosive, il peut recommander une thérapie combinée. Un traitement supplémentaire peut être nécessaire pour la guérison complète. La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg une fois par jour, en fonction de votre état de santé. Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg une fois par jour.

En cas d'infection par la bactérie appelée Helicobacter pylori : Si votre médecin diagnostique une infection par cette bactérie, il peut recommander une thérapie combinée. La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg deux fois par jour, en fonction de votre état de santé.

Traitement des ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg une fois par jour.

Prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg une fois par jour.

Traitement de l'excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison : La dose recommandée est d'Inéso 40 mg deux fois par jour.

Utilisation chez les adolescents (âgés de 12 ans et plus)

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien : Si votre médecin diagnostique une inflammation de l'œsophage, une infection par une bactérie appelée Helicobacter pylori ou une œsophagite érosive, il peut recommander une thérapie combinée. Un traitement supplémentaire peut être nécessaire pour la guérison complète. La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg une fois par jour.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

En cas d'infection par la bactérie appelée Helicobacter pylori : Si votre médecin diagnostique une infection par cette bactérie, il peut recommander une thérapie combinée. La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg deux fois par jour.

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien : Si votre médecin diagnostique une inflammation de l'œsophage, une infection par une bactérie appelée Helicobacter pylori ou une œsophagite érosive, il peut recommander une thérapie combinée. Un traitement supplémentaire peut être nécessaire pour la guérison complète. Si vous avez une maladie hépatique importante, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg une fois par jour.

Traitement de l'excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison : La dose recommandée est d'Inéso 40 mg deux fois par jour.

Inéso 40 mg : La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Adultes âgés de 18 ans et plus :

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien : Si votre médecin diagnostique une inflammation de l'œsophage, une infection par une bactérie appelée Helicobacter pylori ou une œsophagite érosive, il peut recommander une thérapie combinée. Un traitement supplémentaire peut être nécessaire pour la guérison complète. Si vous avez une maladie hépatique importante, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Traitement de l'excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison : La dose recommandée est d'Inéso 40 mg deux fois par jour.

Utilisation chez les adolescents (âgés de 12 ans et plus) : La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso

Soja

Le soja est une plante naturellement riche en isoflavones. Ces isoflavones sont des hormones végétales ayant une structure très similaire à celle des hormones féminines.

Calcium, vitamines D et K

Le calcium est le minéral le plus abondant dans l'organisme. Il est concentré en presque totalité dans le squelette. Pendant la ménopause, les besoins en calcium augmentent. Le calcium est nécessaire pour maintenir les os en conditions normales.

La vitamine D peut être synthétisée par la peau sous les effets des rayons ultraviolets du soleil. La vitamine D contribue à l'absorption et à l'utilisation normale du calcium.

Les vitamines D et K contribuent à maintenir les os en conditions normales.

Folates, vitamines B6 et B12

Ces vitamines n'étant pas accumulées par l'organisme, un apport régulier est donc recommandé. Toutes ces vitamines participent au métabolisme normal de l'homocystéine. Par ailleurs, celles-ci aident à réduire la fatigue. La vitamine B6, quant à elle, aide à réguler l'activité hormonale.

Acide alpha-linolénique

Cet acide gras contribue à maintenir des taux normaux de cholestérol sanguin. Il est décrit que l'effet bénéfique est obtenu à partir d'une dose quotidienne de 2g de cet acide gras.

Posologie

Prise journalière recommandée : 1 capsule molle par jour avec un verre d'eau.

Avertissement

Ne pas dépasser la prise journalière expressément recommandée.

Ce complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.

Maintenir hors de la portée des enfants.

Déconseillé aux femmes enceintes.

A conserver bien fermé dans un endroit frais et sec.

A consommer de préférence avant la date indiquée sur l'emballage.

Présentation : Boîte de 30 capsules molles.

FABRICANT

HC CLOVER, P.S. SL

C/Alicante n° 8 – 10

28500 Arganda del Rey (Madrid)

DISTRIBUTEUR



Zone Industrielle du Sahel,
49 Had Soualem.
Ville de Berrechid, Maroc.

Flavia Plus

La ménopause survient en moyenne aux alentours de l'âge de 50 ans. De nos jours, l'espérance de vie des femmes au Maroc dépasse les 75 ans.

A partir de la cinquantaine, la baisse de production des hormones féminines aboutit à l'apparition de bouffées de chaleur, sensations d'étouffement, sueurs nocturnes, altérations de l'humeur et du sommeil, sensations de fatigue ... Par ailleurs, ce déséquilibre biologique engendre des effets sur le long terme, notamment sur les os et le système cardiovasculaire de la femme.

Une alimentation équilibrée durant cette étape de la ménopause est très importante. Celle-ci devra notamment comprendre les produits riches en isoflavones de soja, tels que les petits pois, les lentilles et le thé, les produits laitiers riches en calcium, les poissons gras, le foie, le jaune d'oeuf, les légumineuses, les céréales, les fruits secs et les protéines d'origine animale, riches en vitamines telles que B6, B9, B12 et vitamine D. Les légumes-feuilles vertes (tels que les choux, le cresson, les épinards, la bette), les choux de Bruxelles, le brocoli et les asperges sont riches en vitamine K.

La pratique quotidienne d'exercice physique accompagnée d'un régime alimentaire varié et équilibré contribuent à améliorer la qualité de vie chez la femme ménopausée.

Qu'est-ce que Flavia Plus ?

Flavia Plus est un complément alimentaire qui associe l'extrait de soja à 40% d'isoflavones, calcium, vitamine D, vitamine K, ainsi qu'un complexe de trois vitamines du groupe B et l'acide alpha-linolénique.

Flavia Plus aide à couvrir les besoins nutritionnels chez la femme durant la ménopause.

Composition

Ingrédients: Agent de charge (huile de lin raffinée (45% d'acide alpha-linolénique), carbonate de calcium, agent d'enrobage (gélatine), **soja (Glycine max L.)**, agent humectant (glycérine (E-422)), émulsifiants (**lécithine de soja (E-322)**, cyanocobalamine (vitamine B12), phytoménadione (vitamine K), pyridoxine chlorhydrate, colorants (E-120, E-171, E-172), acide ptéroylmonoglutamique (folate), cholécalciférol (vitamine D) et antioxydants (extrait riche en tocophérols (E-306), palmitate de L-ascorbyl (E-304), gallate de propyle (E-310).

Nutriments

Acide alpha-linolénique
Calcium
Isoflavones de soja
Vitamine B6
Vitamine B9
Vitamine K1
Vitamine D
Vitamine B12

Information nutritionnelle

Valeur énergétique
Gras
- dont, acides gras saturés
Hydrates de carbone
- dont, sucres
Protéines
Sel

Flavia Plus

Poids net: 46,9 g

Lot:
Consommer
de préférence
avant la fin de:
PPC 125 Dhs

T0419
03/2024

*VNR=Valeur Nutritionnelle de Référence.

Sans sucre. Sans gluten.

Gélule
Voie orale

Ballonyl®

Charbon activé

Deva
Pharmaceutique

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Charbon activé 162 mg.
Excipients : qsp 1 gélule.

FORME ET PRESENTATIONS

Gélules

Boite de 20, 30 et 60

PROPRIETES

Ballonyl contient du charbon végétal activé. Grâce à son fort pouvoir adsorbant au niveau intestinal, il permet la capture des gaz, des toxines et des bactéries responsables de la fermentation.

Il possède un effet bénéfique sur le processus de digestion , en luttant contre les phénomènes de ballonnements et de flatulences.

VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

Prendre 2 gélules avec un grand verre d'eau, 3 fois par jour à distance des repas, en complément d'une alimentation variée et équilibrée. Renouveler les prises en fonction des sensibilités individuelles.

La posologie usuelle est de 4 gélules par jour. Sur les conseils de votre médecin ou de votre pharmacien, la posologie peut être portée à 6 gélules par jour.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec et frais.

Autorisation ministère de santé n° : DA201818053131



Deva
Pharmaceutique

HEPANAT®

le dieci erbe

Composition par comprimé de 400 mg :

Rhamnus purshiana écorce 85,4 mg. Jus d'aloë ferox 64 mg. Foeniculum vulgare graines 53,4 mg. Cassia angustifolia feuilles 42,7 mg. Glycyrrhiza glabra racine 16 mg. Gentiana lutea racine 16 mg. Taraxacum officinale racine 10,7 mg. Rhamnus alpinus écorce 10,7 mg. Rheum palmatum racine 10,7 mg. Marrubium vulgare sommités fleuries 10,7 mg. Maltodextrine ; agent de charge : Cellulose microcristalline ; antiagglomérants : sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium; agents de revêtement : Hydroxypropylméthylcellulose, acides gras, cellulose microcristalline.

ENOHNV020-002

Propriétés :

Confort digestif et intestinal.

Conseils d'utilisation :

2 à 4 comprimés par jour.

Précautions d'emploi :

- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
- Ne pas utiliser pendant la grossesse.

Présentations :

- Boîte de 20 comprimés.
- Boîte de 40 comprimés.

MP/CA/18



تعريف الدواء:

التركيب:

سولبيرويد

سواغ.....

الكمية الكافية للقرص.

التصعيمية:

سولريد® 50 مل، أقراص.

الشكل الصيدلي:

علبة من 20 قرص في لويحات.

صنف صيدلي-علاجي:

مضاد الذهان، مهدئ الأعصاب، بازرميد (ن: الجهاز العصبي)

في أي الحالات يستعمل هذا الدواء؟

هذا الدواء يوصف لعلاج بعض حالات القلق عند الكبار، ولعلاج بعض

اضطرابات السلوك عند الكبار والصغار أكثر من 6 سنوات.

تحذير:

ما هي حالات عدم استعمال هذا الدواء؟

هذا الدواء لا يجب أن يستعمل في الحالات التالية:

- فرط الحساسية للسولبيرويد أو أحد مكونات الدواء.

- الفيروكروموسوتوم (اصابة الغدة فوق الكثلاة ينتج عنه ارتفاع حاد في

الضغط الشرياني) معروف أو مشتبه به.

- باشرت الداء مع مضادات باركشنون الوبامينية.

هذا الدواء، لا يستعمل غالباً، ما لم تصدر تعليمات مخالفة، من طبيبك، في

فترقة الإرضا.

في حالة الشك لا بد من استشارة الطبيب أو الصيدلي.

احتياطات خاصة واحتياطات الاستعمال:

احتياطات خاصة:

- سرعة سعيده، انتظامه وعرق شديد، من الضروري

- يمنع أخذ القرص عند الطفل قبل 6 سنوات لأن القرص قد ينحرف عند

البلع ويحدث خرقاً.

- بسبب وجود الألكتروز لا يجب استعمال هذا الدواء في حالة وجود

الغالاكوز في الدم الخالي، تناول نفس امتصاص الغلوکوز والغالاكوز،

احتياطات الاستعمال:

لكي يستطع الطبيب تكيف المقادير و/ أو المرآبة لعلاجكم، من الضروري

إدخاله في حالة:

- مرض قلبي.

- مرض باركشنون.

- فصوص كلوية.

- حالات سابقة للأختلال (قيمة أو حديثة)، الصرع.

- ينصح بشدة عدم أخذ مشروبات كحولية في فترة العلاج.

في حالة الشك، لا تتردوا في طلب المشورة من طبيبك أو الصيدلي.

تأثيرات دولية:

حتى تتجبروا تأثيرات مختلفة بين أنواع مختلفة، لا بد من اطلاع طبيبك أو

الصيدلي، على كل علاج مازال العلاج الذي تخضعون له، وكذلك كل علامة

غير عادية، حيث فجأة اثناء العلاج.

لا يترك في متناول أيدي الأطفال

جدول ١

**مخثرات جنفارما
260-254
المنطقة الصناعية
الجديدة - المغرب.**

GENPHARMA

Sulrid® 50 mg

Sulpiride

Comprimés



IDENTIFICATION DU MEDICAMENT :

Composition :

Sulpiride 50 mg.
Excipients q.s.p. un comprimé.

DENOMINATION :

Sulrid® 50 mg, comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE :

Boîte de 20 comprimés sous plaquettes thermoformées.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Antipsychotique neuroleptique, BENZAMIDE (N : système nerveux).

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

-Ce médicament est indiqué dans le traitement de certaines formes d'anxiété chez l'adulte et dans le traitement de certains troubles du comportement de l'adulte et de l'enfant de plus de 6 ans.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Hypersensibilité au sulpiride ou à l'un des autres constituants du comprimé.
 - Phéochromocytome (atteinte de la glande ménudosurrénale provoquant une hypertension artérielle sévère) connu ou suspecté.
 - En association avec les antiparkinsoniens dopaminergiques.
- Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS être utilisé, sauf avis contraire de votre médecin, pendant l'allaitement.
- EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

MISES EN GARDE SPECIALES :

- En cas d'apparition de fièvre inexplicable, de pâleur ou de forte transpiration, il est impératif d'alerter immédiatement un médecin ou un service d'urgence.
- Afin de dépister un éventuel trouble cardiaque, votre médecin pourra être amené à vous faire pratiquer un électrocardiogramme.

Chez l'enfant, un sulvédum médical régulier est indispensable.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Afin que votre médecin puisse adapter la posologie et/ou la surveillance de votre traitement, il est nécessaire de le prévenir en cas de :

- Maladie cardiaque,
- Maladie de Parkinson,
- Insuffisance rénale,
- Antécédents de convulsions (ancienne ou récente), épilepsie.

La prise de boissons alcoolisées est fortement déconseillée pendant la durée du traitement.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS AINSI QUE TOUT SIGNE ANORMAL SURVENANT EN COURS DE TRAITEMENT A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse : Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser le sulpiride pendant la grossesse.

Si ce médicament vous est prescrit au cours de la grossesse, respectez les doses et la durée de traitement établies par votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Allaitement : L'allaitement est déconseillé pendant le traitement en raison du passage du sulpiride dans le lait maternel.

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

a) POSOLOGIE :

Réservez à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.

La posologie est variable et doit être adaptée à chaque cas.

b) MODE D'ADMINISTRATION :

Voie orale.

c) DUREE DU TRAITEMENT :

SE CONFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSSAGE :

Prévenir votre médecin ou l'hôpital.

EFFECTS INDESIRABLES :

CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFECTS PLUS OU MOINS GENANTS :

- Absence de règles, augmentation du volume des seins, écoulement de lait par le mamelon en dehors des périodes normales d'allaitement,
- Impuissance, frigidité,
- Prise de poids,
- Somnolence,

... et position debout, ... et position allongée

N'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION :

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation.

conditionnement extérieur

Tableau A.

GARDER HORS DE LA POSE

Sulrid® 50 mg
20 Comprimés

sur le

6 118000 130383

SULPIRIDE

LOT SL 050108
PER 04/2025 PPV 26 DH

LABORATOIRE
254-260 Z.I. E.I.

pour également se produire avec doses insuffisantes si vous avez une maladie cardiaque préexistante.

Allongement de l'intervalle QT

Un problème cardiaque, appelé « allongement de l'intervalle QT ou QTc » (que l'on voit à l'électrocardiogramme, ECG) et des troubles du rythme cardiaque (battements rapides ou irréguliers du cœur) ont été signalés avec LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé. Informez votre médecin si :

- vous avez un rythme cardiaque lent,
- vous avez ou vous avez eu un problème cardiaque dans lequel le cœur ne pompe pas suffisamment de sang vers l'organisme (insuffisance cardiaque),
- vous prenez tout autre médicament qui pourrait provoquer des problèmes cardiaques, ou
- vous avez un problème qui entraîne un taux faible de potassium ou de magnésium dans le sang, ou un taux élevé de potassium dans le sang,
- une intervention chirurgicale est prévue, car il pourrait être nécessaire d'arrêter le traitement par amitriptyline avant de vous donner des anesthésiques. En cas de chirurgie d'urgence, l'anesthésiste doit être informé du traitement par amitriptyline,
- vous avez une glande thyroïde suractive ou vous recevez des médicaments pour les troubles de la thyroïde.

Pensées suicidaires et aggravation de la dépression

Si vous êtes déprimé(e), il se peut que vous ayez parfois des pensées d'automutilation ou suicidaires. Cela peut être augmenté à la première prise d'antidépresseurs, car ces médicaments prennent du temps avant d'agir, généralement environ deux semaines, mais parfois plus longtemps.

Vous serez plus susceptible d'avoir ce type de pensées, si :

- vous avez déjà eu des pensées suicidaires ou d'automutilation.
- vous êtes un jeune adulte. Les informations issues des essais cliniques ont montré un risque accru de comportement suicidaire chez les jeunes adultes (moins de 25 ans) atteints d'affections psychiatriques et traités par antidépresseur.

Si vous avez à tout moment des pensées suicidaires ou d'automutilation, contactez votre médecin ou rendez-vous à l'hôpital immédiatement.

Il peut être utile de dire à l'un de vos proches ou de vos amis que vous êtes déprimé(e), et de lui demander de lire cette notice. Vous pourriez lui demander s'il trouve que votre dépression ou votre anxiété s'aggrave, ou s'il observe des changements de votre comportement.

Épisodes maniaques

Certains patients atteints de troubles maniaxo-dépressifs peuvent entrer dans une phase maniaque. Celle-ci se caractérise par des idées abondantes et très changeantes, une gaieté exagérée et une activité physique excessive. Dans de tels cas, il est important de contacter votre médecin qui changera probablement votre traitement. Indiquez à votre médecin si vous avez, ou avez eu par le passé, des problèmes médicaux, en particulier :

- glaucome à angle fermé (perte de la vue due à une pression anormalement élevée dans l'œil)
- épilepsie, antécédents de convulsions ou de crises convulsives
- difficultés à la miction
- augmentation du volume de la prostate
- maladie de la thyroïde
- trouble bipolaire
- schizophrénie
- maladie hépatique sévère
- maladie cardiaque sévère
- sténose du pylore (rétrécissement de la partie terminale de l'estomac) et îlots paralytique (occlusion intestinale)
- diabète car vous pourriez avoir besoin d'ajuster la posologie de votre médicament antidiabétique

Si vous utilisez des antidépresseurs comme les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), votre médecin pourra envisager de modifier la dose de votre médicament (voir également la rubrique 2 Autres médicaments et LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé, et la rubrique 3).

Les personnes âgées sont plus susceptibles de développer certains effets indésirables, comme des vertiges en se levant à cause d'une tension artérielle basse (voir également la rubrique 4 Effets indésirables éventuels). Enfants et adolescents

Dépression, douleurs neuropathiques, prévention des tensions chroniques de type céphalées et prophylaxie des migraines

Ne pas administrer ce médicament aux enfants et adolescents de moins de 18 ans pour ces pathologies car sa sécurité et son efficacité n'ont pas été établies pour cette tranche d'âge.

toins)

- médicaments utilisés pour certaines maladies mentales (par ex. imipramine et sertindole)
- cisapride (pour certains types d'indigestion)
- halofantrine (contre le paludisme)
- méthadone (pour soulager la douleur et la désintoxication)
- diurétiques (par ex. furosémide)

Si vous devez subir une opération et une anesthésie locale ou générale, vous devez informer votre médecin que vous prenez ce médicament.

De même, vous devez informer votre dentiste que vous prenez ce médicament si vous devez recevoir une anesthésie locale.

LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé avec de l'alcool

Il n'est pas conseillé de boire de l'alcool pendant le traitement avec ce médicament car cela pourrait augmenter l'effet sédatif.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

L'amitriptyline n'est pas recommandée pendant la grossesse, sauf si votre médecin considère qu'il s'agit d'une nécessité incontestable et uniquement après un examen rigoureux du rapport bénéfice/risque. Si vous avez pris ce médicament au cours de la dernière partie de la grossesse, le nouveau-né peut présenter des symptômes de sevrage tels qu'irritabilité, augmentation de la tension musculaire, tremblements, respiration irrégulière, mauvaise absorption alimentaire, pleurs intenses, rétention urinaire et constipation. Votre médecin vous informera si vous pouvez commencer/continuer/devez arrêter l'allaitement ou devez arrêter de prendre ce médicament, en prenant en compte le bénéfice de l'allaitement pour votre enfant et le bénéfice du traitement pour vous.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ce médicament peut entraîner somnolence et étourdissement, en particulier au début du traitement. Si vous êtes sujet(te) à ces symptômes, ne conduisez pas de véhicule et n'utilisez pas d'outils ou de machines. **LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé contient lactose et sodium**

Si votre médecin vous a diagnostiqué une intolérance à certains sucrels, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament. Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé, c'est-à-dire qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. COMMENT PRENDRE LAROXYL 25 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin en cas de doute.

Tous les schémas posologiques ne peuvent pas être obtenus avec toutes les formes/tous les dosages pharmaceutiques. La formulation/dose appropriée doit être sélectionnée pour les doses initiales et toutes les augmentations de dose ultérieures.

Dépression

Adultes

La dose initiale recommandée est de 25 mg deux fois par jour.

Selon votre réponse au médicament, votre médecin peut progressivement augmenter la dose à 150 mg par jour divisée en deux doses.

Personnes âgées (au-delà de 65 ans) et patients atteints d'une pathologie cardiovasculaire

La dose initiale recommandée est de 10 à 25 mg par jour.

Selon votre réponse au médicament, votre médecin peut augmenter progressivement la dose jusqu'à une dose quotidienne totale de 100 mg divisée en deux doses.

Si vous prenez des doses comprises entre 100 mg et 150 mg, votre médecin peut être amené à faire un suivi plus fréquent avec vous.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Ce médicament ne doit pas être administré aux enfants ou aux adolescents dans le traitement de la dépression. Pour plus d'informations, consultez la rubrique 2.

Douleurs neuropathiques, prévention des céphalées de tension et traitement de fond de la migraine

Votre médecin ajustera la posologie du médicament en fonction de vos symptômes et de votre réponse au traitement.

Adultes

La dose initiale recommandée est de 10 mg à 25 mg le soir.

La dose quotidienne recommandée est de 25 mg à 75 mg.

Selon votre réponse au médicament, votre médecin peut progressivement augmenter la dose.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Laroxyl 25 mg, comprimé pelliculé

Amitriptyline



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE LAROXYL 25 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique: ANTIDÉPRESSEUR / INHIBITEUR NON SELECTIF DE LA RECAPTURE DE LA MONOAMINE - code ATC : N06AA09

LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé appartient à un groupe de médicaments appelés antidépresseurs tricycliques. Ce médicament sert à :

- Soigner la dépression chez les adultes (épisodes dépressifs majeurs)
- Soulager les douleurs neuropathiques chez les adultes
- Prophylaxie des céphalées de tension chez les adultes
- Traitement de fond de la migraine chez les adultes
- Soigner l'enurésie (pipi au lit) nocturne chez les enfants de 6 ans et plus, uniquement lorsque des causes organiques, telles que spina bifida et troubles associés, ont été exclues et en l'absence de réponse à tous les autres traitements pharmacologiques et non pharmacologiques, y compris les relaxants musculaires et la desmopressine. Ce médicament doit être prescrit uniquement par des médecins expérimentés dans la prise en charge de l'enurésie persistante.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LAROXYL 25 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Ne prenez jamais LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé:

- si vous êtes allergique à l'amitriptyline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez récemment eu une attaque cardiaque (infarctus du myocarde)
- si vous avez eu des problèmes cardiaques tels que des troubles du rythme que l'on détecte à l'électrocardiogramme (ECG), un bloc cardiaque, ou une insuffisance coronarienne
- si vous prenez certains médicaments appelés inhibiteurs de la sécrétion de monoamines oxydase (IMAO).
- si vous prenez LAROXYL 25 mg au cours des 14 derniers jours
- si vous prenez moclobémide la veille
- si vous avez une pathologie hépatique sévère.

Si vous devez prendre LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé, vous devrez arrêter de prendre ce médicament et attendre 14 jours avant de prendre de nouveau LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé.

utilisé chez les enfants de moins de 12 ans.

6 118001 040384
LAROXYL 25 mg
(Chlorhydrate d'amitriptyline)
60 comprimés pelliculés
PPV: 38 DH 70

BOTTU S.A. 100 mg comprimé pelliculé.

Des troubles du rythme cardiaque et une hypotension peuvent survenir si vous prenez une dose élevée d'amitriptyline. Cela

Enurésie nocturne

- Un ECG doit être pratiqué avant l'instauration du traitement par amitriptyline afin d'exclure un syndrome du QT long
- Ce médicament ne doit pas être pris en même temps qu'un autre médicament anticholinergique (voir également la rubrique 2 Autres médicaments et LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé)
- Des pensées et des comportements suicidaires peuvent également survenir en début de traitement par antidépresseurs pour des troubles autres que la dépression ; les mêmes précautions qu'avec les patients traités pour dépression doivent, par conséquent, être suivies lors du traitement de patients atteints d'enurésie.

Autres médicaments et LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé

Certains médicaments peuvent altérer l'action d'autres médicaments et cela peut parfois entraîner des effets indésirables graves.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, tel que :

- des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO), par ex. phénelzine, iproniazide, isocarboxazide, nialamide ou tranylcypromine (pour la dépression), ou sélegiline (pour la maladie de Parkinson). Ces médicaments ne doivent pas être pris en même temps que LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé (voir la rubrique 2 Ne prenez pas LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé),
- adrénaline, éphédrine, isoprénaline, noradrénaline, phényléphrine et phénylpropanolamine (ceux-ci peuvent être présents dans des médicaments contre la toux ou le rhume, et dans certains anesthésiques),
- des médicaments contre l'hypertension, par exemple des inhibiteurs des canaux calciques (par ex. diltiazem et vérapamil), guanéthidine, bétanidine, clonidine, réserpine et méthyldopa,
- médicaments anticholinergiques comme certains médicaments pour traiter la maladie de Parkinson et des troubles gastro-intestinaux (par ex. atropine, hyoscyamine),
- thioridazine (pour la schizophrénie),
- tramadol (analgésique),
- médicaments contre les infections fongiques (par ex. fluconazole, terbinafine, kétocozaïne et itraconazole),
- sédatifs (par ex. barbituriques),
- antidépresseurs (par ex. ISRS [fluoxétine, paroxétine, fluvoxamine], duloxétine et bupropion),
- médicaments pour certaines maladies cardiaques (par ex. bêta-bloquants et antiarythmiques),
- cimétidine (contre les ulcères d'estomac),
- méthylphénidate (pour le TDAH),
- ritonavir (pour le VIH),
- contraceptifs oraux,
- rifampicine (pour les infections),
- phénytoïne et carbamazépine (pour l'épilepsie),
- méthylperuptis (hypericum perforatum), plante utilisée pour soigner la dépression
- médicaments pour la thyroïde
- acide valproïque.

Vous devez également informer votre médecin si vous prenez ou avez récemment pris un médicament pouvant affecter le rythme cardiaque, par ex.

- les médicaments pour soigner les rythmes cardiaques irréguliers (par ex. quinidine et sotalol)
- astémizole et terfénadine (pour les allergies et le rhume des

pourrait également se produire aux doses inhabituelles si vous avez une maladie cardiaque préexistante.

Allongement de l'intervalle QT

Un problème cardiaque, appelé « allongement de l'intervalle QT ou QT long » (que l'on voit à l'électrocardiogramme, ECG) et des troubles du rythme cardiaque (battements rapides ou irréguliers du cœur) ont été signalés avec LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé. Informez votre médecin si :

- vous avez un rythme cardiaque lent,
- vous avez ou vous avez eu un problème cardiaque dans lequel le cœur ne pompe pas suffisamment de sang vers l'organisme (insuffisance cardiaque),
- vous prenez tout autre médicament qui pourrait provoquer des problèmes cardiaques, ou
- vous avez un problème qui entraîne un taux faible de potassium ou de magnésium dans le sang, ou un taux élevé de potassium dans le sang,
- une intervention chirurgicale est prévue, car il pourrait être nécessaire d'arrêter le traitement par amitriptyline avant de vous donner des anesthésiques. En cas de chirurgie d'urgence, l'anesthésiste doit être informé du traitement par amitriptyline,
- vous avez une glande thyroïde suractive ou vous recevez des médicaments pour les troubles de la thyroïde.

Pensées suicidaires et aggravation de la dépression

Si vous êtes déprimé(e), il se peut que vous ayez parfois des pensées d'automutilation ou suicidaires. Cela peut être augmenté à la première prise d'antidépresseurs, car ces médicaments prennent du temps avant d'agir, généralement environ deux semaines, mais parfois plus longtemps.

Vous serez plus susceptible d'avoir ce type de pensées, si :

- vous avez déjà eu des pensées suicidaires ou d'automutilation.
- vous êtes un jeune adulte. Les informations issues des essais cliniques ont montré un risque accru de comportement suicidaire chez les jeunes adultes (moins de 25 ans) atteints d'affections psychiatriques et traités par antidépresseur.

Si vous avez à tout moment des pensées suicidaires ou d'automutilation, contactez votre médecin ou rendez-vous à l'hôpital immédiatement.

Il peut être utile de dire à l'un de vos proches ou de vos amis que vous êtes déprimé(e), et de lui demander de lire cette notice. Vous pourriez lui demander s'il trouve que votre dépression ou votre anxiété s'aggrave, ou s'il observe des changements de votre comportement.

Épisodes maniaques

Certains patients atteints de troubles maniaxo-dépressifs peuvent entrer dans une phase maniaque. Celle-ci se caractérise par des idées abondantes et très changeantes, une gaieté exagérée et une activité physique excessive. Dans de tels cas, il est important de contacter votre médecin qui changera probablement votre traitement. Indiquez à votre médecin si vous avez, ou avez eu par le passé, des problèmes médicaux, en particulier :

- glaucome à angle fermé (perte de la vue due à une pression anormalement élevée dans l'œil)
- épilepsie, antécédents de convulsions ou de crises convulsives
- difficultés à la miction
- augmentation du volume de la prostate
- maladie de la thyroïde
- trouble bipolaire
- schizophrénie
- maladie hépatique sévère
- maladie cardiaque sévère
- sténose du pylore (rétrécissement de la partie terminale de l'estomac) et iléus paralytique (occlusion intestinale)
- diabète car vous pourriez avoir besoin d'ajuster la posologie de votre médicament antidiabétique

Si vous utilisez des antidépresseurs comme les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), votre médecin pourra envisager de modifier la dose de votre médicament (voir également la rubrique 2 Autres médicaments et LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé, et la rubrique 3).

Les personnes âgées sont plus susceptibles de développer certains effets indésirables, comme des vertiges en se levant à cause d'une tension artérielle basse (voir également la rubrique 4 Effets indésirables éventuels). Enfants et adolescents

Dépression, douleurs neuropathiques, prévention des tensions chroniques de type céphalées et prophylaxie des migraines. Ne pas administrer ce médicament aux enfants et adolescents de moins de 18 ans pour ces pathologies car sa sécurité et son efficacité n'ont pas été établies pour cette tranche d'âge.

foins)

- médicaments utilisés pour certains rhumes (pour les allergies et le rhume des pivoines et sertindole)
- cisapride (pour certains types d'indigestion)
- halofantrine (contre le paludisme)
- méthadone (pour soulager la douleur et la désintoxication)
- diurétiques (par ex. furosémide)

Si vous devez subir une opération et une anesthésie locale ou générale, vous devez informer votre dentiste que vous prenez ce médicament.

De même, vous devez informer votre dentiste que vous prenez ce médicament si vous devez recevoir une anesthésie locale.

LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé avec de l'alcool

Il n'est pas conseillé de boire de l'alcool pendant le traitement avec ce médicament car cela pourrait augmenter l'effet sédatif.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

L'amitriptyline n'est pas recommandée pendant la grossesse, sauf si votre médecin considère qu'il s'agit d'une nécessité incontestable et uniquement après un examen rigoureux du rapport bénéfice/risque. Si vous avez pris ce médicament au cours de la dernière partie de la grossesse, le nouveau-né peut présenter des symptômes de sevrage tels qu'irritabilité, augmentation de la tension musculaire, tremblements, respiration irrégulière, mauvaise absorption alimentaire, pleurs intenses, rétention urinaire et constipation. Votre médecin vous informera si vous pouvez commencer/continuer/devez arrêter l'allaitement ou devez arrêter de prendre ce médicament, en tenant en compte le bénéfice de l'allaitement pour votre enfant et le bénéfice du traitement pour vous.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ce médicament peut entraîner somnolence et étourdissement, en particulier au début du traitement. Si vous êtes sujet(te) à ces symptômes, ne conduisez pas de véhicule et n'utilisez pas d'outils ou de machines.

LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé contient lactose et sodium

Si votre médecin vous a diagnostiquée une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament. Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé, c'est-à-dire qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. COMMENT PRENDRE LAROXYL 25 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin en cas de doute.

Tous les schémas posologiques ne peuvent pas être obtenus avec toutes les formes/tous les dosages pharmaceutiques. La formulation/dose appropriée doit être sélectionnée pour les doses initiales et toutes les augmentations de dose ultérieures.

Dépression

Adultes

La dose initiale recommandée est de 25 mg deux fois par jour. Selon votre réponse au médicament, votre médecin peut progressivement augmenter la dose à 150 mg par jour divisée en deux doses.

Personnes âgées (au-delà de 65 ans) et patients atteints d'une pathologie cardiovasculaire

La dose initiale recommandée est de 10 à 25 mg par jour.

Selon votre réponse au médicament, votre médecin peut augmenter progressivement la dose jusqu'à une dose quotidienne totale de 100 mg divisée en deux doses.

Si vous prenez des doses comprises entre 100 mg et 150 mg, votre médecin peut être amené à faire un suivi plus fréquent avec vous.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Ce médicament ne doit pas être administré aux enfants ou aux adolescents dans le traitement de la dépression. Pour plus d'informations, consultez la rubrique 2.

Douleurs neuropathiques, prévention des céphalées de tension et traitement de fond de la migraine

Votre médecin ajustera la posologie du médicament en fonction de vos symptômes et de votre réponse au traitement.

Adultes

La dose initiale recommandée est de 10 mg à 25 mg le soir.

La dose quotidienne recommandée est de 25 mg à 75 mg.

Selon votre réponse au médicament, votre médecin peut progressivement augmenter la dose.

