

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



## Déclaration de Maladie

M22- N° 004600

156 296

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 4258 Société : RAM

☐ Actif

☒ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : M. JABRI RACHIDA

Date de naissance : 06/09/1955


Adresse : 2, Av HASSAN SOUKTANI

CMSA

Tél. : 0661 32 94 49 Total des frais engagés : ..... Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 27/03/2023

Nom et prénom du malade : JABRI Rachida Age : .....

Lien de parenté : ☐ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie : ALD

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie : .....

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : .....

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : .....

Le : ...../...../.....

Signature de l'adhérent(e) : .....

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

### Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



**Docteur MIR Hassane**

**Maladies du Coeur  
CARDIOLOGUE**

Diplômé des Universités de Paris V et VI  
Diplômé d'échodoppler cardiaque (Paris VI)

Casablanca, le : 27/03/2023

**Mme. JABRI Rachida**

NEBILET 5 mg : 1 comp. par jour le matin \*\*\* Q.S.P. 6 mois \*\*\*

DOLOSTOP 1000 mg : 1 comp. par jour le soir

DI-INDO 50 mg Cp dispersibles : 1 comp. 2 fois par jour pendant 5 jours

ZOPIDOX 10 mg : 1/2 comp. au coucher au besoin

Pharmacie FOUCAULT  
27 Rue Moussa Binou Noussair  
Gauthier - Casablanca  
Tél : 05 22 22 81 34

**Dr. Hassane MIR**  
Cardiologue  
79 Rue Jaber B. Hayane  
Bd. Anfa - Casablanca  
Tél : 05 22 22 81 34

Adresse : N° 79 rue Jaber Ben Hayane, Bd ANFA  
(en face de la commune Sidi Beyout), CP 20020, Casablanca

Bur : 0522222134 -0520070709 Bur mobile : 0664514961 Urgences : 0661 13 83 31  
ICE : 00168117200008 INP : 091113209 - Email : cabinetmir@gmail.com

V14097101

NEBILET® 5mg  
28 comprimés  
PPV 87DH50

\* VIGNETTE

NEBILET® 5 mg

### 3. COMMENT PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable ?

(un médicament protégeant l'estomac ou les ulcères (médicament antacide) par exemple la ciméidine : NEBILET 5 mg doit être pris pendant les repas et l'antacide entre les repas. L'utilisation de ces médicaments est généralement déconseillée sous traitement par nébivolol sauf avis contraire de votre médecin.

### Hypertension

La dose est généralement d'un comprimé par jour. Chez les sujets âgés et chez les insuffisants rénaux, la posologie initiale est de 1/2 comprimé par jour. L'activité antihypertensive se manifeste généralement après 1 à 2 semaines de traitement, l'effet maximal ne pouvant apparaître qu'au bout de 4 semaines. Votre médecin peut décider d'associer des médicaments antihypertenseurs, en cas d'insuffisance.

### Insuffisance cardiaque chronique stable

La posologie est adaptée à chaque patient, par augmentation progressive des doses toutes les 2 semaines en fonction de la tolérance. Le traitement est instauré à 1,25 mg (soit 1/2 comprimé) par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 5 mg (soit 1 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 10 mg (soit 2 comprimés) par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 15 mg (soit 3 comprimés) par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 20 mg (soit 4 comprimés) par jour. La posologie maximale recommandée est de 10 mg une fois par jour. Si vous avez l'impression que l'effet de NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

### Ne prenez jamais NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable dans les cas suivants :

• Allergie au nébivolol ou à l'un des constituants de ce médicament.

• Insuffisance hépatique (du foie) ou altération de la fonction hépatique.

• Insuffisance cardiaque (cf. rubriques Grossesse et allaitement).

• Insuffisance rénale (cf. rubrique Insuffisance rénale).

• Insuffisance cardiaque (cf. rubrique Insuffisance cardiaque).

• Insuffisance hépatique (cf. rubrique Insuffisance hépatique).

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. • Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

### NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable

La substance active est :

Nébivolol 5,40 mg

Sous forme de chlorhydrate de nébivolol 5,45 mg pour un comprimé quadriscabable

### Les autres composants sont :

Polyсорбат 80, hypromellose, lactose monohydraté, amidon de maïs, croscarmellose sodique, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

### 1. QU'EST-CE QUE NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable

### ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous la forme d'un comprimé quadriscabable en boîte de 28 comprimés.

Ce médicament est un bêta-bloquant sélectif.

Ce médicament est prescrit dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (d'origine inconnue).

Ce médicament est également utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable légère à modérée, en complément du traitement habituel de l'insuffisance cardiaque, chez les patients âgés de 70 ans ou plus.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable ?

Ne prenez jamais NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable dans les cas suivants :

• Allergie au nébivolol ou à l'un des constituants de ce médicament.

• Insuffisance hépatique (du foie) ou altération de la fonction hépatique.

• Insuffisance cardiaque (cf. rubrique Grossesse et allaitement).

• Insuffisance rénale (cf. rubrique Insuffisance rénale).

• Insuffisance cardiaque (cf. rubrique Insuffisance cardiaque).

**NEBILET® 5mg**  
28 comprimés C  
PPV 87DH50

\* VIGNETTE

**\* VIGNETTE**

3. COMMENT PRENDRE NEBLET 5 mg, comprimé quadriscable ?

**Hypertension**  
La dose est généralement d'un comprimé par jour.

## Hypertension

La dose est généralement d'un comprimé par jour. Chez les sujets âgés et chez les insuffisants rénaux, la posologie initiale est de 1/2 comprimé par jour. L'activité antihypertensive se manifeste généralement après 1 à 2 semaines de traitement. L'efficacité pouvant apparaître qu'au bout de 4 semaines. Votre médecin peut décider de classer les médicaments antihypertenseurs, en cas d'insuffisante.

### Insuffisance cardiaque chronique stable

Le traitement est instauré à 1,25 mg (s) comprimé par jour pendant 1 à 2 semaines en fonction de la tolérance progressive des doses toutes les 2 semaines. La posologie est adaptée à chaque patient, par augmentation progressive des doses toutes les 2 semaines en fonction de la tolérance progressive des doses toutes les 2 semaines.

Si le médicament est bien toléré, la posologie sera augmentée à 2,5 mg (soit 1/2 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 5 mg (soit 1 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines selon la prescription de votre médecin, et enfin à 10 mg (2 comprimés en une prise) par jour. La posologie maximale recommandée est de 10 mg une fois par jour. Si vous avez l'impression que l'effet de NEBILET 5 mg, comprimé quadsriséable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Voie orale.  
Oralment.  
Les comprimés peuvent être pris pendant les repas.  
L'absence de traitement et les changements

Limitation du traitement des ventes augmentées  
successives de la dose doivent être réalisées  
par un médecin ayant l'expérience de la prise  
en charge des patients atteints d'insuffisance  
cardiaque chronique.  
Si votre médecin vous a prescrit 1/4 de comprimé  
ou 1/2 comprimé une fois par jour, NEBILET 5 mg,  
comprimé quadriscabable doit être cassé comme  
indiqué ci-après :  
Pour obtenir 1/2 comprimé, tenir le comprimé

NEBILET 5 mg, comprimé quadriseccable  
La substance active est :

Nébivolol ..... 5,40 mg  
Sous forme de chlorhydrate de nébivolol ..... 5,45 mg

Les autres composants sont :

Polysorbate 80, hypromellose, lactose monohydrate, amidon de maïs, croscarmellose sodique, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, stéarate

1. QU'EST-CE QUE NEBILET 5 mg, comprimé

ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous la forme d'un comprimé quadriséable en boîte de 28 comprimés.

de l'hypertension artérielle essentielle (d'origine

Ce médicament est également utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque (inconnue).

chronique stable légère à modérée, en complément du traitement habituel de l'insuffisance cardiaque,

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE

NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable ?

**quadriscable dans les cas suivants :**

- Allergie au nébivolol ou à l'un des constituants de

...ce me dicament.  
...naissance hépatique (*du foie*) ou altération de la  
...hépatique.

ou allaitement (cf. rubriques Grossesse

Chaque aigue, choc cardiogénique

V14097101

NEBILET® 5mg  
28 comprimés  
PPV 87DH50

\* VIGNETTE

NEBILET® 5 mg

### 3. COMMENT PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable ?

(un médicament protégeant l'estomac ou les ulcères (médicament antacide) par exemple la cimetidine : NEBILET 5 mg doit être pris pendant les repas et l'antacide entre les repas. L'utilisation de ces médicaments est généralement déconseillée sous traitement par nébivolol sauf avis contraire de votre médecin.

### Hypertension

La dose est généralement d'un comprimé par jour. Chez les sujets âgés et chez les insuffisants rénaux, la posologie initiale est de 1/2 comprimé par jour. L'activité antihypertensive se manifeste généralement après 1 à 2 semaines de traitement, l'effet maximal ne pouvant apparaître qu'au bout de 4 semaines. Votre médecin peut décider d'associer des médicaments antihypertenseurs, en cas d'insuffisance.

### Insuffisance cardiaque chronique stable

La posologie est adaptée à chaque patient, par augmentation progressive des doses toutes les 2 semaines en fonction de la tolérance. Le traitement est instauré à 1,25 mg (soit 1/2 comprimé) par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 2,5 mg (soit 1/2 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 5 mg (soit 1 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 10 mg (2 comprimés en une prise) par jour. La posologie maximale recommandée est de 10 mg une fois par jour. Si vous avez l'impression que l'effet de NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

### NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable

La substance active est :

Nébivolol 5,40 mg

Sous forme de chlorhydrate de nébivolol 5,45 mg

Les autres composants sont :

Polyсорбат 80, hypromellose, lactose monohydraté, amidon de maïs, croscarmellose sodique, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

### 1. QU'EST-CE QUE NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable

### ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous la forme d'un comprimé quadriscabable en boîte de 28 comprimés.

Ce médicament est un bêta-bloquant sélectif.

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (d'origine inconnue).

Ce médicament est également utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable légère à modérée, en complément du traitement habituel de l'insuffisance cardiaque, chez les patients âgés de 70 ans ou plus.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable ?

Ne prenez jamais NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable dans les cas suivants :

• Allergie au nébivolol ou à l'un des constituants de ce médicament.

• Insuffisance hépatique (du foie) ou altération de la fonction hépatique.

• Insuffisance cardiaque (cf. rubriques Grossesse et allaitement).

• Insuffisance cardiaque aiguë, choc cardiogénique ou de la conduction cardiaque.

• Insuffisance cardiaque.

• Insuffisance cardiaque.

Les comprimés peuvent être pris pendant les repas. L'initiation du traitement et les augmentations successives de la dose doivent être réalisées par un médecin ayant l'expérience de la prise en charge des patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique. Si votre médecin vous a prescrit 1/4 de comprimé ou 1/2 comprimé une fois par jour, NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable doit être cassé comme indiqué ci-après :

Voie orale. pharmacien.

La posologie maximale recommandée est de 10 mg une fois par jour. Si vous avez l'impression que l'effet de NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Le traitement est instauré à 1,25 mg (soit 1/2 comprimé) par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 2,5 mg (soit 1/2 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 5 mg (soit 1 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 10 mg (2 comprimés en une prise) par jour. La posologie maximale recommandée est de 10 mg une fois par jour. Si vous avez l'impression que l'effet de NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Les comprimés peuvent être pris pendant les repas. L'initiation du traitement et les augmentations successives de la dose doivent être réalisées par un médecin ayant l'expérience de la prise en charge des patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique.

Si votre médecin vous a prescrit 1/4 de comprimé ou 1/2 comprimé une fois par jour, NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable doit être cassé comme indiqué ci-après :

Voie orale. pharmacien.

La posologie maximale recommandée est de 10 mg une fois par jour. Si vous avez l'impression que l'effet de NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Le traitement est instauré à 1,25 mg (soit 1/2 comprimé) par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 2,5 mg (soit 1/2 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 5 mg (soit 1 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 10 mg (2 comprimés en une prise) par jour. La posologie maximale recommandée est de 10 mg une fois par jour. Si vous avez l'impression que l'effet de NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Le traitement est instauré à 1,25 mg (soit 1/2 comprimé) par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 2,5 mg (soit 1/2 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 5 mg (soit 1 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 10 mg (2 comprimés en une prise) par jour. La posologie maximale recommandée est de 10 mg une fois par jour. Si vous avez l'impression que l'effet de NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

V14097101

NEBILET® 5mg  
28 comprimés  
PPV 87DH50

\* VIGNETTE

NEBILET® 5 mg

### 3. COMMENT PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable ?

(un médicament protégeant l'estomac ou les ulcères (médicament antacide) par exemple la cimetidine : NEBILET 5 mg doit être pris pendant les repas et l'antacide entre les repas. L'utilisation de ces médicaments est généralement déconseillée sous traitement par nébivolol sauf avis contraire de votre médecin.

### Hypertension

La dose est généralement d'un comprimé par jour. Chez les sujets âgés et chez les insuffisants rénaux, la posologie initiale est de 1/2 comprimé par jour. L'activité antihypertensive se manifeste généralement après 1 à 2 semaines de traitement, l'effet maximal ne pouvant apparaître qu'au bout de 4 semaines. Votre médecin peut décider d'associer des médicaments antihypertenseurs, en cas d'insuffisance.

### Insuffisance cardiaque chronique stable

La posologie est adaptée à chaque patient, par augmentation progressive des doses toutes les 2 semaines en fonction de la tolérance. Le traitement est instauré à 1,25 mg (soit 1/2 comprimé) par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 2,5 mg (soit 1/2 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 5 mg (soit 1 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 10 mg (2 comprimés en une prise) par jour. La posologie maximale recommandée est de 10 mg une fois par jour. Si vous avez l'impression que l'effet de NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

### NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable

La substance active est :

Nébivolol 5,40 mg

Sous forme de chlorhydrate de nébivolol 5,45 mg pour un comprimé quadriscabable

Les autres composants sont :

Polyсорбат 80, hypromellose, lactose monohydraté, amidon de maïs, croscarmellose sodique, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

### 1. QU'EST-CE QUE NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable

### ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous la forme d'un comprimé quadriscabable en boîte de 28 comprimés.

Ce médicament est un bêta-bloquant sélectif.

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (d'origine inconnue).

Ce médicament est également utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable légère à modérée, en complément du traitement habituel de l'insuffisance cardiaque, chez les patients âgés de 70 ans ou plus.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable ?

Ne prenez jamais NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable dans les cas suivants :

• Allergie au nébivolol ou à l'un des constituants de ce médicament.

Insuffisance hépatique (du foie) ou altération de la fonction hépatique.

Insuffisance cardiaque (cf. rubriques Grossesse et allaitement).

Insuffisance cardiaque aiguë, choc cardiogénique ou de la conduction cardiaque.

Insuffisance cardiaque (cf. rubriques Grossesse et allaitement).

Insuffisance cardiaque (cf. rubriques Grossesse et allaitement).

V14097101

NEBILET® 5mg  
28 comprimés  
PPV 87DH50

\* VIGNETTE

NEBILET® 5 mg

### 3. COMMENT PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable ?

(un médicament protégeant l'estomac ou les ulcères (médicament antacide) par exemple la cimetidine : NEBILET 5 mg doit être pris pendant les repas et l'antacide entre les repas. L'utilisation de ces médicaments est généralement déconseillée sous traitement par nébivolol sauf avis contraire de votre médecin.

### Hypertension

La dose est généralement d'un comprimé par jour. Chez les sujets âgés et chez les insuffisants rénaux, la posologie initiale est de 1/2 comprimé par jour. L'activité antihypertensive se manifeste généralement après 1 à 2 semaines de traitement, l'effet maximal ne pouvant apparaître qu'au bout de 4 semaines. Votre médecin peut décider d'associer des médicaments antihypertenseurs, en cas d'insuffisance.

### Insuffisance cardiaque chronique stable

La posologie est adaptée à chaque patient, par augmentation progressive des doses toutes les 2 semaines en fonction de la tolérance. Le traitement est instauré à 1,25 mg (soit 1/2 comprimé) par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 2,5 mg (soit 1/2 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 5 mg (soit 1 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 10 mg (2 comprimés en une prise) par jour. La posologie maximale recommandée est de 10 mg une fois par jour. Si vous avez l'impression que l'effet de NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

### NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable

La substance active est :

Nébivolol 5,40 mg

Sous forme de chlorhydrate de nébivolol 5,45 mg pour un comprimé quadriscabable

Les autres composants sont :

Polyсорбат 80, hypromellose, lactose monohydraté, amidon de maïs, croscarmellose sodique, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

### 1. QU'EST-CE QUE NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable

### ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous la forme d'un comprimé quadriscabable en boîte de 28 comprimés.

Ce médicament est un bêta-bloquant sélectif.

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (d'origine inconnue).

Ce médicament est également utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable légère à modérée, en complément du traitement habituel de l'insuffisance cardiaque, chez les patients âgés de 70 ans ou plus.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable ?

Ne prenez jamais NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable dans les cas suivants :

• Allergie au nébivolol ou à l'un des constituants de ce médicament.

Insuffisance hépatique (du foie) ou altération de la fonction hépatique.

Insuffisance cardiaque (cf. rubriques Grossesse et allaitement).

Insuffisance cardiaque aiguë, choc cardiogénique ou de la conduction cardiaque.

Insuffisance cardiaque (cf. rubriques Grossesse et allaitement).

Insuffisance cardiaque (cf. rubriques Grossesse et allaitement).

V14097101

NEBILET® 5mg  
28 comprimés  
PPV 87DH50

\* VIGNETTE

NEBILET® 5 mg

### 3. COMMENT PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable ?

(un médicament protégeant l'estomac ou les ulcères (médicament antacide) par exemple la cimetidine : NEBILET 5 mg doit être pris pendant les repas et l'antacide entre les repas. L'utilisation de ces médicaments est généralement déconseillée sous traitement par nébivolol sauf avis contraire de votre médecin.

### Hypertension

La dose est généralement d'un comprimé par jour. Chez les sujets âgés et chez les insuffisants rénaux, la posologie initiale est de 1/2 comprimé par jour. L'activité antihypertensive se manifeste généralement après 1 à 2 semaines de traitement, l'effet maximal ne pouvant apparaître qu'au bout de 4 semaines. Votre médecin peut décider d'associer des médicaments antihypertenseurs, en cas d'insuffisance.

### Insuffisance cardiaque chronique stable

La posologie est adaptée à chaque patient, par augmentation progressive des doses toutes les 2 semaines en fonction de la tolérance. Le traitement est instauré à 1,25 mg (soit 1/2 comprimé) par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 2,5 mg (soit 1/2 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 5 mg (soit 1 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 10 mg (2 comprimés en une prise) par jour. La posologie maximale recommandée est de 10 mg une fois par jour. Si vous avez l'impression que l'effet de NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

### NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable

La substance active est :

Nébivolol 5,40 mg

Sous forme de chlorhydrate de nébivolol 5,45 mg pour un comprimé quadriscabable

Les autres composants sont :

Polyсорбат 80, hypromellose, lactose monohydraté, amidon de maïs, croscarmellose sodique, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

### 1. QU'EST-CE QUE NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable

### ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous la forme d'un comprimé quadriscabable en boîte de 28 comprimés.

Ce médicament est un bêta-bloquant sélectif.

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (d'origine inconnue).

Ce médicament est également utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable légère à modérée, en complément du traitement habituel de l'insuffisance cardiaque, chez les patients âgés de 70 ans ou plus.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable ?

Ne prenez jamais NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable dans les cas suivants :

• Allergie au nébivolol ou à l'un des constituants de ce médicament.

• Insuffisance hépatique (du foie) ou altération de la fonction hépatique.

• Insuffisance cardiaque (cf. rubriques Grossesse et allaitement).

• Insuffisance cardiaque aiguë, choc cardiogénique ou de la conduction cardiaque.

• Insuffisance cardiaque.

• Insuffisance cardiaque.