

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

156592

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 0.621 Société : Retraité

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : EL 72 A H I D I Brahim

Date de naissance : 01/07/1941

Adresse : Av des plages de rues 59 N° 59 Hermitage

Carablanca

Tél. : 05 20 44 36 62 Total des frais engagés : 2.252,40 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 09/07/2023 Nom et prénom du malade : EL 72 A H I D I Brahim Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : dysurie

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 07.103.12023

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le paiement des Actes
9/3/2013	5	1	30500	Dr. Charles Hôpital des Hôpitaux - Casablanca

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fourisseur	Date	Montant de la Facture
	09/03/23	131.90 DT

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
24/02/2013	10/03/2013	UVR + PC	1300,-

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	<hr/>
00000000	00000000
35533411	11433553

A diagram of a dental arch (maxilla) with numbered teeth (1-8 on each side) and a coordinate system. The vertical axis is labeled H at the top, D on the left, and B at the bottom. The horizontal axis is labeled G on the right. The teeth are arranged in a curve, with the first molar on each side being the lowest point of the curve.

[Création, remont, adjonction]

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVOIR

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Dr. Mohamed Fouad BENNOUNA

- Scanner Multibarrette : Corps entiers en 3D - Angio Scanner - Denta-Scan - Colo Scan
- Echographie Corps entier 3/4D • Echodoppler Couleur, energie • Radiologie Générale
- Mammographie • Radio Panoramique Dentaire • IRM • Biopsie Scannoguidée et Echoguidée

Casablanca le 10/03/2023

FACTURE

N°1146/23

EL ZZAHIDI BRAHIM

EXAMEN	MONTANT
UCR+PC	1300 DHS

RADIOLOGIE ALANDALOUSS
 Dr. BENNOUNA Mohamed Fouad
 et Rue Jean Jaures
 Angle Bd Brahim
 Tél. : 05 22 49 00 03 - 05 22 22 67 09
 Casablanca

Adresse : Angle Boulevard Brahim Roudani et Rue Jean Jaures N° 8 Casablanca - Tél : 05 22 49 00 03 - 05 22 22 67 09

T.P N° : 35547765 - I.F : 1051982 - N° d'Affiliation C.N.S.S : 7494248 - ICE N° : 001714794000020

Site Web : www.radiologiealandouss.com - E-mail : andaloussradiologie@gmail.com

eddiki Afif

CHIRURGIEN UROLOGUE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris - France

Ancien Urologue des Hôpitaux Militaires - Maroc

Andrologie - Troubles sexuels

Stérilité masculine

Diplômé de l'Université de Paris

الدكتور الصديقي عفيف

اختصاصي في جراحة

الجهاز البولي والتسلسي

جراح سابقا بمستشفيات فرنسا

ثم المستشفيات العسكرية بالمغرب

خريج كلية باريز

Fait à Casablanca, le

9/3/2023

MR El Zzaghidi Lali

no. 00000000

~~RADILOGIE ET LABORATOIRES
DE BENIDJIBNA Ben Ali ALLOUSSI
et Rue Jemaa El Fna, Angle Bd Ben Ali N° 8 - Casablanca
Tél. : 05 22 43 00 03~~

pleure de sueflux
Docteur SEDDIKI AFIF
Chirurgien - Urologue
Résidence Nour, Place Charles Nicolas
Quartier des Hôpitaux - Casablanca

Docteur Seddiki Afif

CHIRURGIEN UROLOGUE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris - France

Ancien Urologue des Hôpitaux Militaires - Maroc

Andrologie - Troubles sexuels

Stérilité masculine

Diplômé de l'Université de Paris

الدكتور الصديقي عفيف

انتظامي في جراحة

الجهاز البولي والتناسلي

دراخ سابق بمستشفيات فرنسا

ثم المستشفيات العسكرية بالمغرب

خريج كلية باريس

Fait à Casablanca, le

9/3/2023

MT EL 2744izi (alim)



Dr
Seddiki Afif
Casablanca
Maurice Lemaire
Résidence Nour - Place Charles Nicolle
Quartier des Hôpitaux - Casablanca

Dr. SEDDIKI AFIF
Chirurgien - Urologue
Résidence Nour, Place Charles Nicolle
Quartier des Hôpitaux - Casablanca

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

TERAZOSINE NORMON®
TERAZOSINE NORMON®
DCI: Térazosine

Veuillez lire attentivement

- Gardez cette notice, vous
- Si vous avez d'autres questions
- Ce médicament vous a-t-il causé des effets indésirables ?

• Que contient cette notice ?

1. Qu'est ce que TERAZO...
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
3. Comment prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST CE QUE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

La térazosine est un médicament qui améliore les symptômes urinaires des patients présentant des difficultés à la miction (en conséquence de l'augmentation de la pression artérielle). La térazosine génère aussi une diminution de la pression artérielle.

TERAZOSINE NORMON® comprimés, s'utilisent pour le traitement des symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate et pour le traitement de l'hypertension artérielle.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ?

- Ne prenez jamais TERAZOSINE NORMON® comprimés dans les cas suivants :
- Si vous êtes allergiques (hypersensibles) à la térazosine, une substance similaire ou à l'un des composants de ce médicament.
- Si vous avez des antécédents de syncope (évanouissement) au moment d'uriner.

• Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés.

- En cas d'hypotension orthostatique et syncope, avisez votre médecin.
- En cas de vertige, somnolence, étourdissement et palpitations, restez assis ou en position allongée, évitez de conduire ou de faire un travail dangereux.
- Une syncope (évanouissement) peut survenir (chez moins de 1 % des patients) après la première prise initiale du médicament, suite à un non-respect de la posologie.
- En cas de traitement par TERAZOSINE NORMON® comprimés et avant toute opération chirurgicale oculaire de cataracte, prévenez votre médecin. TERAZOSINE NORMON® comprimés peut engendrer des complications durant l'opération, votre ophtalmologue adoptera les mesures adéquates et nécessaires pour le chirurgical.

• Utilisation chez les enfants et les personnes âgées

Enfants : Il est déconseillé d'utiliser la TERAZOSINE NORMON® comprimés chez les enfants, car la sécurité et l'efficacité de ce médicament n'ont pas été établies.

Personnes âgées : La sensibilité à la TERAZOSINE NORMON® comprimés est beaucoup plus accentuée chez les personnes âgées.

Si l'un des symptômes énumérés ci-dessous apparaît au cours de la prise du médicament, avisez votre médecin.

• Interactions avec d'autres médicaments :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament ou d'un complément alimentaire. Les médicaments peuvent interagir entre eux.

L'administration concomitante de la térazosine avec d'autres antihypertenseurs (médicament qui diminue la pression artérielle) est déconseillée.

Certaines patients prenant un traitement à base d'alpha-bloquant pour le traitement de l'hypertension artérielle ou de l'hypertrophie bénigne de la prostate, vertigineuses ou des étourdissements, qui peuvent être dus à une pression artérielle basse lors du passage rapide à la position assise ou à la position debout. Ces symptômes lors de la prise de médicaments indiqués dans la dysfonction érectile (impuissance) avec les alpha-bloquants. Afin de réduire la probabilité que vous deviez être traité par une dose quotidienne constante d'alpha-bloquants avant de débuter un traitement pour la dysfonction érectile.

• Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Si vous êtes enceinte ou que vous allez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien. La sécurité de la térazosine pendant la grossesse n'a pas été établie. La térazosine ne doit pas être utilisée durant la grossesse, seul votre médecin peut vous conseiller si l'utilisation de ce médicament est nécessaire.

Aucune information n'a été confirmée sur le passage de la térazosine dans le lait maternel. Le traitement ne devrait pas être envisagé chez la femme qui allaitait.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

• Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines :

La térazosine peut provoquer une diminution de la pression artérielle. Au début du traitement, une prudence particulière doit être envisagée par les personnes réalisant des tâches difficiles, car l'apparition fréquente de symptômes prémonitoires peut engendrer un problème à la réalisation de leurs tâches. Il est déconseillé d'éviter de conduire ou d'utiliser des machines durant les 12 premières heures suivant l'administration de la dose initiale ou en cas de modification de dose ou reprise du traitement interrompu auparavant.

Dans le cas d'une hypotension, le patient devra être allongé jusqu'à disparition complète des symptômes.

• Informations importantes sur les composants de TERAZOSINE NORMON® comprimés :

Ce médicament contient du lactose. Demandez l'avis de votre médecin en cas d'intolérance à certains sucres, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament. La laque jaune orangé (colorant de TERAZOSINE NORMON® 2 mg) et la laque rouge porcelet (colorant de TERAZOSINE NORMON® 5mg), peuvent provoquer une crise d'asthme chez les patients allergiques à l'acide acétylsalicylique.

3. COMMENT PRENDRE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ?

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Conformez-vous strictement aux instructions d'administration de TERAZOSINE NORMON® comprimés indiquées par votre médecin. En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

La posologie est adaptée à chaque cas individuel.

Hyperplasie bénigne de prostate :

Dose initiale : Pour tous les patients, la dose initiale est de 1 mg (la moitié d'un comprimé de TERAZOSINE NORMON® 2 mg) en une seule prise le soir. Respectez le même schéma d'augmentation des doses que lors de l'initiation du traitement, afin d'éviter l'apparition d'une hypotension aiguë.

Doses suivantes : Après 3 ou 4 jours de traitement, et selon la réponse de chaque patient, la dose peut être augmentée à 2 mg/jour, soit un comprimé de TERAZOSINE NORMON® 2 mg pris unique pendant une semaine.

Postérieurement, la posologie pourra être augmentée progressivement jusqu'à obtenir la réponse clinique voulue.

La dose d'entretien recommandée chez le patient présentant une hyperplasie bénigne de la prostate est de 5 mg/jour au coucher (un comprimé de TERAZOSINE NORMON® 5 mg).

Les patients manifestant une réponse clinique jugée insuffisante, la posologie peut être augmentée à un maximum de 10 mg/jour (2 comprimés de TERAZOSINE NORMON® 5 mg).

MEGAFLOX®

250 mg : Boîte de 10 comprimés pelliculés
500 mg : Boîte de 10 comprimés pelliculés
Ciprofloxacine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la lire.
- Si vous avez d'autres questions, contactez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Le médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont similaires.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Quel contient cette notice :

- 1- Qu'est-ce que MEGAFLOX® et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MEGAFLOX® ?
- 3- Comment prendre MEGAFLOX® ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver MEGAFLOX® ?
- 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QU'EGALIX® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique ou type d'activité:

Fluorquinolone - code ATC : J01MA02.

MEGAFLOX® contient une substance active, la ciprofloxacine.

La ciprofloxacine est un antibiotique appartenant à la famille des fluorquinolones. Elle agit en tuant les bactéries responsables des infections. Elle est active uniquement sur les bactéries.

Indications thérapeutiques :

Chez l'adulte

MEGAFLOX® est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des voies respiratoires.
- Infections persistantes ou récurrentes de l'oreille ou des sinus.
- Infections urinaires.
- Infections de l'appareil génital chez l'homme et chez la femme.
- Infections gastro-intestinales et infections intra-abdominales.
- Infections de la peau et des tissus mous.
- Infections des os et des articulations.
- Prévention des infections dues à la bactérie *Neisseria meningitidis*.
- Exposition à la maladie du charbon.

MEGAFLOX® peut également être utilisé dans le traitement de patients présentant un tableau toxique de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique additionnel pourra vous être prescrit en complément de MEGAFLOX®.

Chez l'enfant et l'adolescent

MEGAFLOX® est utilisé chez l'enfant et l'adolescent, sous le contrôle d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des poumons et des bronches chez l'enfant et l'adolescent atteint de mucoviscidose.
- Infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyélonéphrite).
- Exposition à la maladie du charbon.

MEGAFLOX® peut également être utilisé pour traiter d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et de l'adolescent si votre médecin le juge nécessaire.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE MEGAFLOX® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Contre-indications :

Ne prenez jamais MEGAFLOX®, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique à la substance active, ou aux autres composants ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous êtes alcoolique.

Ne prenez pas ce médicament si les précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec MEGAFLOX® :

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre MEGAFLOX®, comprimé pelliculé.

Avant de prendre les comprimés, parlez-en à votre médecin dans les cas suivants :

- si vous avez déjà présenté des problèmes rénaux car il pourra être nécessaire d'adopter votre traitement ;
- si vous souffrez d'ulcération ou d'une autre affection neurologique ;
- si vous avez déjà eu des problèmes aux tendons avec des antécédents de la même famille que la vôtre (maladie de Achilles) ;
- si vous êtes diabétique car vous pourriez risquer de présenter une hypoglycémie avec la ciprofloxacine ;
- si vous souffrez de myopathie (maladie rare qui entraîne une faiblesse musculaire) car les symptômes peuvent être exacerbés ;
- si vous avez des problèmes cardiaques. La ciprofloxacine doit être utilisée avec précaution si vous êtes née (a) avec ou si vous avez des antécédents familiaux d'allongement de l'intervalle QT (observé sur un trace ECG, enregistrement du tracé électrique du cœur), si vous avez un décalquement électrolytique dans le sang (notamment un taux de potassium ou de magnésium dans le sang), si vous avez un taux rénal (système urinaire) ou un taux cardiaque (insuffisance cardiaque), si vous avez déjà eu une crise cardiaque (infarctus du myocarde), si vous avez déjà eu une crise cardiaque (infarctus du myocarde), si vous êtes une femme ou une personne âgée ou si vous prenez d'autres médicaments qui peuvent entraîner certaines anomalies de l'ECG.

• Si vous êtes un membre de votre famille étant atteinte d'un déficit en glucose-6-phosphate déhydrogénase (G6PD), car vous pourrez alors risquer de présenter une anémie avec la ciprofloxacine.

• Si vous souffrez d'un diabète d'hypertrophie ou de « renflement » d'un gros vaisseau sanguin (névrisme artique ou anévrisme périphérique d'un gros vaisseau) ;

• Si vous avez déjà eu une lipodermite de la peau (œdème de la peau) ;

• Si vous présentez des antécédents familiaux d'antécédents de maladie de Marfan ou de syndrome d'Ellis-Dempsey vasculaire, ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite de cellulite plante, la maladie de Behcet, l'hypertension artérielle ou une artérite périphérique.

• Si vous ressentez une douleur soudaine et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou des os, rendez-vous immédiatement au service d'urgence d'un hôpital. Pour le traitement de certaines infections de l'appareil génital, votre médecin peut vous prescrire un autre antibiotique en association à MEGAFLOX®. Si aucune amélioration des symptômes n'est observée dans les 48 heures de traitement, veuillez consulter votre médecin.

Pendant la prise de MEGAFLOX®, comprimé pelliculé :

Prévenez immédiatement votre médecin si l'un des troubles suivants se produit pendant le traitement par MEGAFLOX®. Votre médecin déterminera si le traitement par MEGAFLOX® doit être arrêté.

- Réaction allergique sévère et soutenue (réaction/choc anaphylactique, anémie de Quincke). Des symptômes peuvent être des symptômes suivants : oppression de la poitrine, vertiges lors du passage sur position debout, etc.
- Des douleurs et gonflements des articulations.

• Des dou

Docteur Seddiki Afif

CHIRURGIEN UROLOGUE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris - France

Ancien Urologue des Hôpitaux Militaires - Maroc

Andrologie - Troubles sexuels

Stérilité masculine

Diplômé de l'Université de Paris

الدكتور الصديقي عفيف

اختصاصي في جراحة

البهار البولي والتسلسي

دراح سابق بمستشفيات فرنسا

ثم المستشفيات العسكرية بالمغرب

خريج كلية باريس

PHARMACIE HAY RAJA
Hicham ABOU TAKA
Doktoren Pharmacie
125 Bis, Av. Sidi M'hamed
Hay Raja l'Henné
Casablanca - Tel. 022 88 05 25



125 Bis, Av. Sidi M'hamed
Hay Raja l'Henné
Casablanca - Tel. 022 88 05 25
Fait à Casablanca, le

9/3/2023

MR Elzazati Fati

74.80 x 2
149.60

12 Reflexes Song
x 2 x 15 - 5

42.30
191.90

25 Test d'urine N - 2

100 ml x 15 j

Docteur SEDDIKI AFIF
Chirurgien - Urologue
Résidence Nour, Place Charles Nicolas
Quartier des Hôpitaux - Casablanca

Docteur Seddiki Afif

CHIRURGIEN UROLOGUE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris - France

Ancien Urologue des Hôpitaux Militaires - Maroc

Andrologie - Troubles sexuels

Stérilité masculine

Diplômé de l'Université de Paris

الدكتور الصديقي عفيف

اختصاصي في جراحة

الجهاز البولي والتالسي

جراح سابق بمستشفيات فرنسا

ثم المستشفيات العسكرية بالمغرب

خريج كلية باريز

SANTEBIO
LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALE
31. 022 99 58 2223 - Fax 022 23 42 2
11 RUE KADI LASS
Casablanca, Maroc
Fait à Casablanca, le 14/3/88

MF El ZEZZAHIDI Brahim

re P Mc Avoy

re NRS

re CRM

Docteur SEDDIKI AFIF
Chirurgien - Urologue
Résidence Nour - Place Charles Nicolas
Quartier des Hôpitaux - Casablanca

مختبر التحاليل الطبية المختصة

SANTEBIO

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES SPECIALISEES

Mariam Alaoui M'HAMDI
Pharmacienne Biologiste

Ancienne interne au CHU de Reims
DIU de la Reproduction de la Faculté de
Médecine de Reims

Casablanca le 16 mars 2023

Mr EL ZZAHIDI BRAHIM

FACTURE N°	1265
------------	------

Analyses :

Numération formule sanguine NC B216 -----	B	80	
Groupe sanguin -----	B	65	
Taux de Prothrombine (TP) -----	B	40	
Temps de céphaline active -----	B	40	
Protéine C réactive US NC457 -----	B	100	Total : B 325

Prélèvements :

Sang-----	Pc	1,5
-----------	----	-----

TOTAL DOSSIER	460,50 DH
---------------	-----------

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Quatre Cent Soixante Dirhams et Cinquante Centimes



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'BRAHIM' and 'SANTEBIO'.

Handwritten text in blue ink:
BRAHIM
SANTEBIO
460,50 DH
022 23 42 32
1er étage
022 23 42 32

SEDDIKI AFIK
UNINET D'UROLOGIE

< ID: >

09.03.23
18:58:16
DE 0.0CH



D

23.3.98

3.5.3MHz

F3.75

G 98

TT 8

SEDDIKI AFIF < ID :
CLINIQUE D'UROLOGIE <

09:03:23
19:06:37

DE

0.0CM



F3.75 G 98 TT 8