

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'incident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

8830

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 8830 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

FAIDI khadija 156663

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 31/03/2023

Nom et prénom du malade : FAIDI khadija Age :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

CN crise

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>ABDELMALEK EL RHAZI</i>	31/03/23	T = 159.80
<i>ABDELMALEK EL RHAZI</i>	07/04/23	T = 354.00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Sachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Ctr. * Bd. Abdelmoumen N° 7 Rue Souleymane Tel: 05.22.99.19.11 Fax: 05.22.99.19.11	07/04	23 RAASF	760 DA

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIBES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE


	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel. Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Dr BENNISS Fouad

Pr FATHI Khadija

Dr LARAQUI BENSOUDA Nadia

الدكتور بننيس فؤاد

الأستاذة فتحي خديجة

الدكتورة العراقي بنسودة نادية

Médecin Traitant : DR LEMSEFER YOUSSEF

Nom du patient : FAIDI KHADIJA

Examen réalisé : ASP.F Date : 07/04/2023

COMPTE RENDU

RC : 61 ans, coliques néphrétiques gauches.

RESULTATS :

- Petite image de tonalité calcique se projetant sur l'aire rénale droite correspondant vraisemblablement à un calcul urinaire.
- Absence d'autres images de tonalité calcique décelable par ailleurs.



Confraternellement
DR F. BENNISS

مركز الكلية الاصطناعية مرس السلطان
CENTRE D'HEMODIALYSE MERS-SULTAN

Dr.LEMSEFFER Youssef

Spécialiste des maladies des reins-rein Artificiel
Diplômé de la faculté de médecine de marseille

الدكتور ليمسفيه يوسف

اختصاصي في أمراض الكلية

خريج كلية الطب بمارسيليا

Casablanca le : 31.3.2023 الدار البيضاء في :

Amna FAIDI khadija

41.70

Profenid suffo S.V
150ffox² |

58.30

Neosfum 160 orodes possibl S.V

52.80

Acp a-Sufer x 3

Octy 20 ngl |

S.V

DR LEMSEFFER
NEPHROLOGY
125, Avenue Mers Sultan - Casa
Tel.: 05 22 26 95 34 - 05 22 26 95 24

—

T=152.80



l'estomac ou du duodénum ancien).

• Vous suivez déjà un traitement avec un médicament qui augmente le risque d'ulcère gastroduodénal ou d'hémorragie (voir rubrique « Autres médicaments et PROFENID 100 mg, suppositoire »).

• Vous avez déjà eu une réaction exacerbée de la peau au soleil ou aux UV (cabine de bronzage).

• Vous avez du diabète, une maladie du rein (insuffisance rénale), ou vous suivez déjà un traitement avec un médicament susceptible d'augmenter le taux de potassium dans le sang (hyperkaliémie) ; ce médicament peut induire une hyperkaliémie.

Personnes ayant un risque cardiovasculaire

Vous devez prévenir votre médecin si vous êtes dans l'une des situations suivantes :

• Vous avez des problèmes cardiaques.

• Vous avez déjà eu une attaque cérébrale (accident vasculaire cérébral).

• Ou vous pensez avoir des facteurs de risques de maladies cardio-vasculaires (par exemple vous avez une tension artérielle élevée, du diabète, un taux de cholestérol élevé ou si vous fumez).

Les médicaments tels que PROFENID 100 mg, suppositoire, pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée de traitement prolongée.

Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement.

Pendant le traitement :

Arrêtez le traitement et consultez immédiatement un médecin ou les urgences médicales :

• Si une crise d'asthme ou une difficulté à respirer survient après avoir pris ce médicament. Ceci peut être le signe d'une allergie à ce médicament.

• Si vous avez une éruption de boutons ou des plaques sur la peau, des démangeaisons, un brusque gonflement du visage et du cou. Il peut alors s'agir d'une allergie à ce médicament.

• Si vous rejetez du sang par la bouche, si vous avez du sang dans les selles ou si vos selles sont colorées en noir. Il peut alors s'agir de saignements localisés dans votre estomac et/ou votre intestin (hémorragie digestive).

• Si vous souffrez d'ulcération gastro-intestinale.

Arrêtez le traitement et prévenez votre médecin si des troubles de la vision surviennent (vision floue).

• **Prévenez votre médecin** si vous pensez avoir une infection (notamment en cas de fièvre), ou si vos symptômes s'aggravent.

Comme tout anti-inflammatoire non stéroïdien, le kétoprofène peut masquer les symptômes d'une infection.

Patients âgés et patients de faible poids

Si vous êtes âgé ou si votre poids corporel est faible, vous avez plus de risques d'avoir des effets indésirables, en particulier des hémorragies

gastro-intestinales, des ulcères et des perforations.

Votre médecin vous demandera de faire une prise de sang pour surveiller le fonctionnement de vos reins, de votre foie, et de votre cœur, et réduira la dose.

Autres médicaments et PROFENID 100 mg, suppositoire

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : le kétoprofène.

Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou de l'aspirine.

Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou d'aspirine.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. En effet, certains médicaments ne doivent pas être pris ensemble et d'autres peuvent nécessiter une modification de la dose lorsqu'ils sont pris ensemble.

Vous devez toujours prévenir votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez ou recevez l'un des médicaments suivants avant de prendre PROFENID 100 mg, suppositoire :

• Des médicaments de la même famille que PROFENID (aspirine, anti-inflammatoires non stéroïdiens) qui sont utilisés pour diminuer l'inflammation et la fièvre et/ou pour calmer la douleur, • Des corticostéroïdes,

• Des médicaments qui empêchent la formation de caillots et fluidifient le sang (anticoagulant par voie orale comme la warfarine, les inhibiteurs de la thrombine comme le dabigatran, les inhibiteurs directs du facteur Xa comme l'apixaban, le rivaroxaban et l'édoxaban, les antiagrégants plaquettaires, l'héparine injectable). Si la prise ou l'utilisation concomitante de l'un de ces médicaments s'avérait nécessaire, votre médecin devra vous surveiller étroitement en raison d'un risque accru de saignements,

• Du lithium (utilisé pour certains troubles de l'humeur), • Certains anti-cancéreux (pemetrexed, méthotrexate), • Des médicaments utilisés pour diminuer la tension et traiter certaines maladies du cœur (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, diurétiques, bêta-bloquants, antagonistes de l'angiotensine II, nicorandil et glycosides cardiaques),

• Certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine), • Du deferasirox (utilisé pour abaisser la quantité de fer dans le sang).

• Certains médicaments immunosupresseurs utilisés en cas de greffe d'organe (ciclosporine, tacrolimus).

endommagé, la dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre une dose de 40 mg pendant 8 semaines supplémentaires si votre œsophage n'a pas encore cictré.

La dose recommandée une fois que votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour.

Si votre œsophage n'a pas été endommagé, la dose usuelle est de 10 mg une fois par jour.

Traitement des ulcères dans la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal).

La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 2 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre la même dose pendant 2 semaines supplémentaires si votre ulcère n'a pas été cictré.

Si l'ulcère n'a pas été complètement cictré, la dose peut être augmentée à 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

Traitement des ulcères de l'estomac (ulcère gastrique).

La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre la même dose pendant 4 semaines supplémentaires si votre ulcère n'a pas été cictré.

Si l'ulcère n'est pas complètement cictré, la dose peut être augmentée à 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

Prévention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique.

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut augmenter la dose à 40 mg une fois par jour.

Traitement de l'ulcère duodénal et gastrique provoqué par des AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens).

La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Prévention des ulcères du duodénum et de l'estomac si vous prenez des AINS.

La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour.

Traitement et prévention des ulcères provoqués par une infection par Helicobacter pilon.

La dose recommandée est de 20 mg d'OEDES® 20 mg deux fois par jour pendant une semaine.

Votre médecin va vous prescrire en même temps deux antibiotiques parmi l'amoxicilline, la clarithromycine et le métronidazole.

Traitement d'un excès d'acide dans l'estomac dû à une grossesse au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison).

La dose recommandée est de 60 mg par jour.

Votre médecin peut ajuster la dose en fonction de vos besoins et il décidera également de la durée pendant laquelle vous prendrez le médicament.

Utilisation chez les enfants et adolescents:

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien tels que brûlures et régurgitations acides.

Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant plus de 10 kg peuvent prendre OEDES® 20 mg. La posologie dépendra du poids de l'enfant et le médecin décidera de la dose correcte à administrer.

Traitement et prévention des ulcères provoqués par une infection par Helicobacter pylori.

Les enfants âgés de plus de 4 ans peuvent prendre OEDES® 20 mg. La posologie dépendra du poids de l'enfant et le médecin décidera de la dose correcte à administrer.

Votre médecin prescrira à votre enfant deux antibiotiques en même temps : l'amoxicilline et la clarithromycine.

Posologie :

• Il est recommandé de prendre vos gélules le matin.

• Les gélules peuvent être prises avec ou sans la nourriture ou à jeun.

• Elles doivent être consommées portées avec un demi-verre d'eau. Les gélules ne doivent pas être mordues ni croquées car elles contiennent des granules pelliculés ce qui empêche le médicament d'être détruit par l'acidité de l'estomac. Il est important de ne pas détruire les granules.

Que faire si vous ou votre enfant avez des difficultés à avaler les gélules :

• Ouvrir la gélule et avaler le contenu directement avec un demi-verre d'eau ou mieux le conserver dans un verre d'eau non

- Troubles de la vue, tels que vision trouble.
- Respiration sifflante ou souffle court (bronchospasme).
- Sécheresse bucale.
- Inflammation de l'intérieur de la bouche.
- Infection appelée « muguet » qui peut affecter l'intestin et est causé par un champignon.
- Troubles hépatiques incluant la jaunisse, pouvant entraîner une peau colorée en jaune, des urines sombres et de la fatigue.
- Pertre de cheveux (alopecie).
- Eruption cutanée lors d'une exposition au soleil.
- Douleurs articulaires (arthralgie) ou musculaires (myalgie).
- Problèmes rénaux sévères (néphrite interstitielle).
- Augmentation de la sueur.

Effets indésirables très rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000)

- Modification du nombre de cellules du sang incluant l'agranulocytose (déficit en globules blancs).
- Agressivité.
- Hallucinations visuelles, sensorielles ou auditives.
- Troubles hépatiques sévères entraînant une insuffisance hépatique et une inflammation du cerveau.
- Apparition soudaine d'éruptions cutanées sévères, bulles ou desquamations importantes de la peau pouvant être associées à une fièvre importante et à des douleurs articulaires (érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique).
- Faiblesse musculaire.
- Gonflement des seins chez l'homme.

Effets indésirables de fréquence indéterminée (ne peut pas être estimé à partir des données disponibles).

- Inflammation de l'intestin (entraînant des diarrhées)
- Si vous prenez OEDES® 20 mg pendant plus de trois mois, il est possible que le taux de magnésium dans votre sang diminue. De faibles taux de magnésium peuvent se traduire par une fatigue, des contractions musculaires involontaires, une désorientation, des convulsions, des sensations vertigineuses, une accélération du rythme cardiaque. Si vous présentez l'un de ces symptômes, veuillez en informer immédiatement votre médecin. De faibles taux de magnésium peuvent également entraîner une diminution des taux de potassium ou calcium dans le sang. Votre médecin pourra décider d'effectuer des examens sanguins réguliers pour surveiller votre taux de magnésium.
- Eruption cutanée, éventuellement avec des douleurs dans les articulations.

OEDES® 20 mg peut dans de très rares cas affecter les globules blancs entraînant un déficit immunitaire. Vous devez consulter votre médecin dès que possible si vous avez une infection avec des symptômes tels que de la fièvre avec une fatigue générale très importante, ou de la fièvre avec des symptômes d'infection locale tels que des douleurs dans le cou, la gorge, la bouche, ou des difficultés à uriner. Si vous avez ces symptômes, un déficit de globules blancs (agranulocytose) pourra être éliminé par un test sanguin. Il est important que vous donnez des informations sur vos médicaments dans ce cas.

Déclaration des effets secondaires :
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne sera pas mentionné dans cette notice.

8. Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Adresser vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre OEDES® 20 mg, géleule.

OEDES® 20 mg peut masquer des symptômes d'autres maladies. Par conséquent, avant que vous ne commencez à prendre OEDES® 20 mg ou lorsque vous êtes sous traitement, vous devez informer immédiatement votre médecin si l'un des éléments suivants se produit :

- Vous perdez du poids sans raison ou si vous avez des problèmes à avaler.
- Vous avez des douleurs à l'estomac ou une indigestion.
- Vous vomissez de la nourriture ou du sang.

• Mutation exotique (médicament utilisé en cancérologie à forte dose dans le traitement du cancer) – si vous prenez une forte dose de méthotrexate, votre médecin peut temporairement arrêter votre traitement par OEDES® 20 mg, gélule gastro-résistante.

Si votre médecin vous a prescrit les antibiotiques suivants : amoxicilline et clarithromycine avec OEDES® 20 mg pour le traitement d'un ulcère à Helicobacter pylori, il est important que vous informiez votre médecin de tous les autres médicaments que vous prenez.

Interactions avec les aliments et les boissons :
Voir Posologie.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :
Sans objet.

10. Grossesse, Allaitement et Fertilité:

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. L'oméprazole est excrété dans le lait maternel mais il est peu probable qu'il y ait une influence sur l'enfant lorsqu'il est utilisé à doses thérapeutiques.

Votre médecin vous dira si vous pouvez prendre OEDES® 20 mg pendant l'allaitement.

11. Sportifs :

12. Conduite de véhicule et utilisation des machines :
OEDES® n'est pas susceptible d'entraîner des effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Des effets secondaires tels qu'un étourdissement et des troubles visuels peuvent se produire (voir effets indésirables). Si c'est le cas, vous ne devez pas conduire de véhicules ou utiliser des machines.

13. Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de OEDES® 20 mg que vous n'auriez dû : Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

14. Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :
Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous y pensez. Cependant, si vous êtes à proximité du moment de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

15. Si vous avez à prendre OEDES® 20 mg :

N'arrêtez pas de prendre OEDES® 20 mg sans avis au préalable de votre médecin ou pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

16. Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :
Sans objet.

Conditions de prescription et de délivrance:

Tableau C (Liste II).

Précaution particulières de conservation :

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

• Précautions particulières d'élimination des médicaments non utilisés ou des déchets provenant de ces médicaments :

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le : 17/01/2019.



41, rue Mohamed Diouri, 20110 Casablanca.

OEDES® 20 mg**Microgranules gastrorésistants en gélule**
(Oméprazole)

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre

OEDES 20mg

14 gélules



1. Id

For

OE

de

2. C

Princ

Oméprazole

Excipients : o.s.p une gélule.

Excipient à effet notoire : Saccharose.

3. Classe pharmaco-thérapeutique :

OEDES® 20 mg contient la substance active Oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

4. Indications thérapeutiques

OEDES® 20 mg est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Chez les adultes :

• le reflux gastro-oesophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

• les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).

• les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

• les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). OEDES® 20 mg peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.

• un excès d'acide dans l'estomac dû à une gousseur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison).

Chez les enfants :Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel ≥ 10 kg :

• le reflux gastro-oesophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

• Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limite.

Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents :

• les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

5. Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement :

Veuillez toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doule. Votre médecin vous dira combien de gélules vous devez prendre et pendant combien de temps vous devez les prendre. Cela dépendra de votre état de santé et de votre âge.

Posologie :

Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous :

Utilisation chez les adultes :

Traitement des symptômes du reflux gastro-oesophagien tels que brûlures et régurgitation acide :

Si votre médecin constate que votre œsophage a été légèrement

gazeuse, un jus de fruit légèrement acide (jus d'orange, pomme ou ananas) ou dans de la compote de pomme.

• Toujours remuer juste avant de boire le mélange (le mélange ne sera pas homogène). Puis boire le mélange immédiatement ou dans les 30 minutes.

• Pour s'assurer que vous avez bu tout le médicament, bien rincer le verre avec un demi-verre d'eau et le boire. Les morceaux solides

• Vous avez des selles noires (teintées de sang).

• Vous souffrez de diarrhée sévère ou persistante, car l'oméprazole a été associé à une faible augmentation de diarrhées infectieuses.

• Si vous avez des problèmes hépatiques sévères.

• S'il vous est déjà arrivé de développer une réaction cutanée après un traitement par un médicament similaire à OEDES® qui réduit l'acide de l'estomac :

• effectuer un examen sanguin spécifique

à A).

OEDES® 20 mg au long-cours (durée supérieure à médecine vous surveillera probablement de façon détaillée précisément tous les symptômes et événements exceptionnels quand vous voyez votre

utilisateur de la pompe à protons tel que OEDES® 20 mg est résistante, en particulier sur une période de 12 mois, peut légèrement augmenter le risque de fracture du poignet ou des vertèbres. Prévenez votre médecin d'ostéoporose ou si vous prenez des corticoïdes (qui peuvent augmenter le risque d'ostéoporose).

Si vous avez une éruption sur la peau, en particulier au niveau des zones exposées au soleil, prévenez votre médecin dès que possible, car vous devrez peut-être arrêter votre traitement avec OEDES® 20 mg. N'oubliez pas de mentionner également tout autre effet indésirable tel que des douleurs dans vos articulations.

Enfants :

Certains enfants atteints d'une maladie chronique peuvent nécessiter un traitement à long terme bien que celui-ci ne soit pas recommandé. Ne donnez pas ce médicament aux enfants de moins de 1 an ou < 10 kg.

Mentions relatives aux excipients à effet notoire :

En raison de la présence de Saccharose, ce médicament est déconseillé chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

9. Interactions avec d'autres médicaments :**Prise d'autres médicaments :**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou pharmacien. OEDES® 20 mg peut interagir sur le fonctionnement d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur OEDES® 20 mg.

Vous ne devez pas prendre OEDES® 20 mg si vous prenez un médicament contenant du nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).

Vous devez informer votre médecin ou pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants :

• Kétoconazole, itraconazole, posaconazole ou voriconazole (utilisés dans le traitement des infections fongiques);

• Digoxine (utilisé dans le traitement de problèmes cardiaques);

• Diazépam (utilisé dans le traitement de l'anxiété, de l'épilepsie ou comme relaxant musculaire);

• Phénytoïne (utilisé dans l'épilepsie) : si vous prenez de la phénytoïne, une surveillance par votre médecin serait nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de OEDES® 20 mg;

• Médicaments anticoagulants pour fluidifier le sang tel que la warfarine ou autres anti vitamines K; une surveillance par votre médecin serait nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de OEDES® 20 mg;

• Rifampicine (utilisé pour traiter la tuberculose);

• Atazanavir (utilisé pour traiter l'infection VIH);

• Tacrolimus (dans le cas de greffe d'organe);

• Milteperimus (Hypericum perforatum) (utilisé dans le traitement de la dépression modérée);

• Clofazol (utilisé dans le traitement de la claudication intermittente);

• Saquinavir (utilisé pour traiter l'infection VIH);

• Clopidogrel (utilisé pour prévenir les caillots de sang (thrombosis));

• Erlotinib (utilisé dans le traitement du cancer);

• Bicalutamide (utilisé dans le traitement de l'acné et dans les tumeurs d'ovaires);

• Budesonide (utilisé dans le traitement de l'acné et dans les tumeurs d'ovaires);

• Bicalutamide (utilisé dans le traitement de l'acné et dans les tumeurs d'ovaires);

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MEGASFON® ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant d'utiliser

MEGASFON® 80 mg, comprimé orodispersible.

N'utilisez jamais MEGASFON® :

- Si vous êtes allergique au phloroglucinol, au triméthylphloroglucinol ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- En cas de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam dans le MEGASFON®, comprimé orodispersible.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser MEGASFON®.

Enfants et adolescents

MEGASFON® 80 mg, comprimé orodispersible : Sans objet.
MEGASFON® 160 mg, comprimé orodispersible : Ce dosage n'est pas adapté à l'enfant.

MEGASFON® 150 mg/150 mg, suppositoire : Ce dosage n'est pas adapté à l'enfant.

Autres médicaments et MEGASFON®

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

MEGASFON® avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Grossesse

L'utilisation de ce médicament ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.

Allaitement

L'administration de ce médicament est déconseillée chez la femme qui allaite.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

MEGASFON® n'a aucun effet ou qu'un effet négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

1 comprimé orodispersible, au moment de la crise.

Renouvez en cas de spasmes importants en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise sans dépasser 3 comprimés orodispersibles par jour.

Utilisation chez les enfants et adolescents

Ce dosage n'est pas adapté à l'enfant.

MEGASFON® 150 mg/150 mg, suppositoire :

Chez l'adulte

1 suppositoire, trois fois par jour en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise sans dépasser 3 suppositoires par jour.

Utilisation chez les enfants

Ce dosage n'est pas adapté à l'enfant.

Voie et mode d'administration

MEGASFON® comprimé orodispersible : Voie orale.

Chez l'adulte, les comprimés sont à dissoudre dans un verre d'eau ou à laisser fondre sous la langue pour obtenir un effet rapide.

Chez l'enfant, les comprimés sont à dissoudre dans un verre d'eau.

MEGASFON® 150 mg/150 mg, suppositoire : Voie rectale.

Si vous avez utilisé plus de MEGASFON® que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez d'utiliser MEGASFON® :

N'utilisez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez d'utiliser MEGASFON® :

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, ou à votre pharmacien.

4. QUELLES SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Fréquence indéterminée :

- Une éruption étendue squameuse rouge avec des masses

MEGASFON® 80 mg, comprimé orodispersible :

• La substance active : Phloroglucinol

Phloroglucinol dihydraté.....80 mg

(Sous forme de phloroglucinol anhydre)

Excipients q.s.p 1 comprimé

Excipients à effet notoire : Aspartam, lactose.

MEGASFON® 160 mg, comprimé orodispersible :

• La substance active : Phloroglucinol

Phloroglucinol hydraté.....160 mg

Excipients q.s.p..... 1 comprimé

Excipient à effet notoire : Aspartam.

MEGASFON® 150 mg/150 mg, suppositoire :

• Les substances actives : Phloroglucinol/Triméthylphloroglucinol

Phloroglucinol hydraté.....150 mg

(Sous forme de phloroglucinol anhydre)

Triméthylphloroglucinol.....150 mg

Excipients q.s.p..... 1 suppositoire

Qu'est-ce que MEGASFON® et contenu de l'emballage extérieur ?

MEGASFON® se présente sous forme de comprimé orodispersible et suppositoire :

- MEGASFON® 80 mg, comprimé orodispersible, boîte de 10 et boîte de 20.

- MEGASFON® 160 mg, comprimé orodispersible, boîte de 10 et boîte de 20.

- MEGASFON® 150 mg/150 mg, suppositoire, boîte de 8.

Conditions de livraison :

Médicament non soumis à prescription médicale.

Date de révision de la notice :

Juin 2020.

Megasfon®

Phloroglucinol/ Triméthylphloroglucinol

Megasfon 160 mg
Boîte de 20 comprimés



6118000094937

LOT : 3907
PER : 10-24
P.P.V : 58 DH 30

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir des informations.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que MEGASFON® et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser MEGASFON® ?
3. Comment utiliser MEGASFON® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MEGASFON® ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE MEGASFON® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE.

MEGASFON® appartient à une classe de médicaments appelés antispasmodiques. Il agit contre les spasmes (contractions). Ce médicament est indiqué dans le traitement des douleurs spastiques de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus.

MEGASFON® 80 mg, comprimé orodispersible contient : De l'aspartam qui contient une source de phénylalanine. Peut être dangereux pour les personnes atteintes de phénylcétonurie (PCU), une maladie génétique rare caractérisée par l'accumulation de phénylcétonurie ne pouvant être éliminée correctement.

se, son utilisation est déconseillée chez les patients qui ont une intolérance au galactose, un déficit en lactase ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du sucre (maladies héréditaires rares).

FON® 160 mg, comprimé orodispersible contient : d'aspartam qui contient une source de phénylalanine. Peut être dangereux pour les personnes atteintes de phénylcétonurie (PCU), une maladie génétique rare caractérisée par l'accumulation de phénylcétonurie ne pouvant être éliminée correctement.

MEGASFON® 150 mg/150 mg, suppositoire contient : Sans objet.

3. COMMENT UTILISER MEGASFON® ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

MEGASFON® est un traitement symptomatique. La durée du traitement est variable en fonction de l'indication. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

Posologie

MEGASFON® 80 mg, comprimé orodispersible :

Chez l'adulte

2 comprimés orodispersibles au moment de la crise. Renouvez en cas de spasmes importants, en respectant un intervalle de 2 heures entre chaque prise sans dépasser 6 comprimés orodispersibles par jour.

Chez l'enfant (plus de 2 ans)

1 comprimé orodispersible au moment de la crise. Renouvez en cas de spasmes importants, en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise et sans dépasser 2 comprimés orodispersibles par jour.

MEGASFON® 160 mg, comprimé orodispersible :

Chez l'adulte

sous la peau et des cloques accompagnée de fièvre à l'instauration du traitement (pustulose exanthématique aiguë généralisée).

Si vous développez ces symptômes, arrêtez d'utiliser ce médicament et contactez votre généraliste ou consultez immédiatement un médecin.

Dans certains cas, une allergie peut survenir.

Vous reconnaîtrez les signes d'une allergie :

- Par des boutons et/ou des rougeurs sur la peau, démangeaisons
- Par un brusque gonflement du visage et du cou (œdème de Quincke)
- Ou par un malaise brutal dû à une chute de la pression artérielle (choc anaphylactique).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez déclarer les effets indésirables directement ou via le centre national de pharmacovigilance. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER MEGASFON® ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte.

MEGASFON® 80 mg, comprimé orodispersible : Pas de précautions particulières de conservation.

MEGASFON® 160 mg, comprimé orodispersible : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C et à l'abri de l'humidité.

MEGASFON® 150 mg/150 mg, suppositoire : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS.

Ce que contient MEGASFON® :

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse

L'utilisation de ce médicament est contre-indiquée pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Allaitemt

Ce médicament est contre-indiqué en cas d'allaitement.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT !

POSOLOGIE :

RESERVE A L'ADULTE (plus de 15 ans).

La dose quotidienne est de 1 à 2 comprimés par prise, 3 fois par jour, à 4 heures d'intervalle au minimum. Ne pas dépasser 6 comprimés par 24 heures.

Insuffisant rénal : en cas d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure à 10 ml/min), l'intervalle entre deux prises sera au minimum de 8 heures.

VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Voie orale.

Avaler les comprimés avec un verre d'eau.

FREQUENCE ET DUREE DU TRAITEMENT :

Se conformer strictement à la prescription de votre médecin.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE :

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir immédiatement un médecin.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

EFFETS NON SOUHAITES OU GENANTS :

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

Liés au paracétamol :

- Hépatotoxicité à très forte dose ou après traitement prolongé.
- Quelques rares cas d'accidents allergiques (simples rashes cutanés avec érythème ou urticaire) qui nécessitent l'arrêt du traitement.
- Exceptionnellement, thrombopénie.

Liés au thiocolchicoside :

- Possibilité de manifestations allergiques cutanées.
- Rares troubles digestifs : diarrhée, douleurs de l'estomac.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE OU GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION :

À conserver à une température inférieure à 25°C.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Liste I

AMM N° : 270/19DMP/21/ NRQ

EPI TITULAIRE DE L'AMM AU MAROC ET FABRICANT :

POLYMÉDIC

Rue Amyot d'Inville Quartier Arsalane
CASABLANCA - MAROC

Dr T. BELABDA - Pharmacien Responsable.

Dernière date de vérification du texte de la notice : Décembre 2021

DUOXOL® 500 mg/2 mg

Comprimé

Boîte de 20

Paracétamol - Thiocolchicoside

DUOXOL

500 mg/2 mg

Boîte de 20 comprimés

دوخول

عافية من 20 قرص

37/00

avant de p
i relire.

à, demande
crit. Ne le

us remarq

DUOXOL 500 mg/2 mg

20 comprimés



votre pharmacien.
ême en cas de

ans cette notice,

Avant de prendre ce médicament...

Thiocolchicoside..... 2 mg

Excipients :

q.s.p..... 1 comprimé

Excipients à effet notoire : Amidon de blé, lactose.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est préconisé dans :

- Traitement symptomatique de la douleur d'origine rhumatismale ou musculaire en traumatologie et gynécologie.
- Traitement d'appoint des contractures douloureuses au cours :
 - des affections vertébrales dégénératives et des troubles statiques vertébraux : torticolis, dorsalgies, lombalgies.
 - des affections traumatologiques et neurologiques (avec spasticité).

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas :

- d'hypersensibilité au thiocolchicoside ou au paracétamol,
- de grossesse,
- d'allaitement,
- d'insuffisance hépatocellulaire,
- d'hypersensibilité à l'un des excipients du produit,
- chez l'enfant de moins de 15 ans.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique et/ou rénale, d'affections cardiaques ou pulmonaires, éviter les traitements prolongés.
- Pour éviter le risque de surdosage au paracétamol, vérifier l'absence de paracétamol dans la composition d'autres médicaments.
- Le thiocolchicoside doit être administré avec prudence chez les patients épileptiques ou à risque de convulsions.
- En cas de diarrhée, prévenez votre médecin qui pourra éventuellement réajuster la posologie.
- Eventuellement, ingérer les comprimés avec un pansement gastrique.
- Ne pas dépasser la dose prescrite.
- Il est conseillé de consulter un médecin pour des traitements excédant 7 jours.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et de galactose, ou de déficit en lactose.

L'amidon de blé peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes allergiques au blé ainsi que des intolérances chez les personnes souffrant de maladies coeliaques.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN. DUOXOL® peut augmenter la toxicité du chloramphénicol.

En cas de traitement avec des anticoagulants oraux, on peut l'administrer occasionnellement comme analgésique d'élection.

Examens paracliniques :

La prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin par la méthode à l'acide phosphotungstique et le dosage de la glycémie par la méthode à la glucose oxydase-peroxydase.

3- COMMENT PRENDRE SULIAT® ?

Instructions pour un bon usage

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie, Fréquence d'administration et Durée du traitement

- La dose unique de SULIAT® est de 1 comprimé par jour.
- Patients âgés (âgés de 65 ans et plus) : votre médecin doit prendre des précautions lorsqu'il augmente votre dose.
- Ne pas dépasser la dose prescrite.

Selon la manière dont vous allez réagir au traitement, votre médecin pourra vous proposer une dose plus forte ou plus faible.

Mode et voie d'administration :

- Prenez ce médicament par voie orale, au même moment de la journée chaque jour.
- Avez les comprimés avec un verre d'eau.
- Vous pouvez prendre SULIAT® au cours ou en dehors des repas. Ne le prenez pas avec du pomme-mousse ou du jus de pomme-mousse.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage

Un surdosage avec le valsartan et l'amlodipine peut provoquer une hypotension avec des sensations vertigineuses, une vasodilatation périphérique et peut être une tachycardie.

Si vous avez pris plus de SULIAT®, comprimés que vous n'en aviez dû, parlez-en immédiatement à votre médecin.

Conduite à tenir en cas d'émission d'une ou plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre SULIAT®, comprimé :

- Prenez le dès que vous vous en souvenez et prenez ensuite la dose suivante au moment habituel. Si le moment de votre prochaine prise est proche, prenez simplement le comprimé suivant au moment habituel.
- Ne prenez pas de dose double (deux comprimés en une seule fois) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage

Si vous arrêtez de prendre SULIAT®, comprimé :

- L'arrêt de votre traitement par SULIAT® peut entraîner une aggravation de votre maladie.
- N'arrêtez pas votre traitement sauf avis contraire de votre médecin.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Certains effets indésirables peuvent être graves et demandent une attention médicale immédiate:

Quelques patients ont présenté les effets indésirables graves suivants (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000). Si vous présentez l'un de ces effets, prévenez immédiatement votre médecin:

Réaction allergique avec des symptômes tels que : éruption, démangeaisons, gonflement du visage ou des lèvres ou de la langue, difficulté à respirer, tension artérielle basse (impression de s'évanouir, sensation de tête vide).

Autres effets indésirables possibles de ce médicament:

-Fréquent (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : grêle ; nez bouché, mal de gorge et gêne pour avaler ; maux de tête ; gonflement des bras, des mains, des jambes, des chevilles ou des pieds ; fatigue ; asthénie (faiblesse) ; rougeur et sensation de chaleur du visage et/ou du cou.

-Peu fréquent (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) : sensations vertigineuses ; nausées et douleur abdominale ; sécheresse de la bouche ; somnolence, picotements ou engourdissement des mains ou des pieds ; vertige ; accélération des battements du cœur, y compris palpitations ; sensations vertigineuses au passage en position debout ; toux ; diarrhée ; constipation ; éruption cutanée, rougeur de la peau ; gonflement des articulations, mal de dos ; douleurs articulaires.

-Rare (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) : sensation d'anxiété ; bouffements dans les oreilles (acouphènes) ; évanouissement ; envies d'uriner plus fréquentes que la normale ou impression de plus grande urgence à uriner ; impossibilité d' avoir ou de maintenir une érection ; sensation de lourdeur ; tension artérielle basse avec des symptômes tels que sensations vertigineuses, sensation de tête vide ; transpiration excessive ; éruption cutanée sur tout le corps ; démangeaisons ; spasmes musculaires.

Si vous présentez un de ces effets sous une forme sévère, veuillez-en informer votre médecin.

Effets indésirables rapportés avec l'amlodipine seule ou le valsartan seul et qui sont soit nonobservés avec l'association fixe valsartan/amlodipine soit observés plus fréquemment qu'avec valsartan/amlodipine:

Amlodipine

Consultez votre médecin immédiatement si vous présentez l'un des effets indésirables suivants, sévères et très rares après la prise de ce médicament :

-Respiration sifflante soudaine, douleur thoracique, essoufflement ou difficultés respiratoires.

-Gonflement des paupières, du visage ou des lèvres.

-Gonflement de la langue et de la gorge entraînant de grandes difficultés respiratoires.

-Réactions cutanées sévères, notamment éruption cutanée intense, urticaire, rougeur de la peau sur l'ensemble du corps, démangeaisons sévères, apposition de vésicules, érythème et gonflement de la peau, inflammation des muqueuses (syndrome de Stevens-Johnson) ou autres réactions allergiques.

SULIAT®

80 mg/5 mg

160 mg/5 mg

160 mg/10 mg

221 Comprimés pelliculés, boîtes de 14, 28 et 56
Valsartan/ Amlodipine

Veuillez lire attentivement les informations ci-dessous

- Pour vous aider à prendre ce médicament correctement :
- Gardez ce prospectus pour le lire à nouveau.
 - Si vous avez des questions, demandez à votre pharmacien ou à votre médecin.
 - Ce médicament a été prescrit pour vous.
 - Si l'un d'entre eux n'est pas compris, demandez à votre pharmacien ou à votre médecin.

- Que contient ce médicament ?
- 1- Qu'est-ce que ce médicament ?
 - 2- Quelles sont les substances actives ?
 - 3- Comment prendre ce médicament ?
 - 4- Quels sont les effets secondaires ?
 - 5- Comment le stocker ?
 - 6- Informations pratiques.

1- QU'EST-CE QUE CE MÉDICAMENT ?
Classe ATC : C08

Le Suliat® contient deux substances actives : Valsartan et Amlodipine. Ces substances sont dotées de mécanismes complémentaires pour le contrôle de la tension artérielle lorsque celle-ci est trop élevée.

Le Valsartan appartient à la classe des « antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ». L'angiotensine II est produite par le corps et elle provoque le rétrécissement des vaisseaux sanguins, avec pour conséquence une augmentation de la tension artérielle. Le Valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II.

Le Amlodipine empêche le calcium de traverser la paroi des vaisseaux sanguins, ce qui empêche les vaisseaux sanguins de se rétrécir. Cela signifie que ces deux substances contribuent à empêcher le rétrécissement des vaisseaux sanguins. De ce fait, les vaisseaux sanguins se relâchent et la tension artérielle diminue.

Indications thérapeutiques :

SULIAT® est utilisé pour traiter la tension artérielle élevée (hypertension), chez les patients adultes dont la tension artérielle n'est pas suffisamment contrôlée soit par l'amlopipine soit par le valsartan, chacun administré seul.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SULIAT® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Contre-indications :

Ne prenez jamais SULIAT®, comprimés pelliculés dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique au valsartan, à l'amlopipine, aux dihydropyridines ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament. Si vous pensez que vous pouvez être allergique, ne prenez pas SULIAT® et parlez-en à votre médecin.
- Si vous avez de graves problèmes hépatiques ou des problèmes biliaires tels que cirrhose biliaire ou cholestase.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. (Il est également recommandé d'éviter de prendre SULIAT® en début de grossesse).
- Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle (hypotension sévère).
- Si vous avez de graves problèmes rénaux ou si vous êtes sous dialyse.
- Si vous présentez un diabète ou une insuffisance rénale (GFR < 60 ml/min/1,73 m²) et vous avez l'association de SULIAT® à des médicaments contenant de l'oliskiran.
- Si vous présentez un choc, y compris choc cardiogénique (une affection dans laquelle votre cœur est incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme).
- Si vous présentez une obstruction de la voie d'éjection du ventricule gauche (par exemple, cardiomyopathie hypertrophique obstructive et sténose aortique de degré élevé).
- Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque après un infarctus aigu du myocarde.

SULIAT® 80 mg/5 mg

28 comprimés pelliculés



6 118000 072379

maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, insuffisance cardiaque (modérée ou sévère), cardiaque, piégeage coronarien, maladie des artères vasculaires cérébrales y compris un accident cérébral, y compris un accident aigu, augmenter le risque de crise cardiaque, est la raison pour laquelle il ne doit pas être prescrits cardiaques ou un accident vasculaire aigu. [vérifiez avec votre médecin ou la pression artérielle soit bien contrôlée]. Cependant, ne prenez pas les comprimés sans

90mg & 120mg, comprimé pelliculé peut être pris systématiquement chez tout le

devez immédiatement arrêter DOLICOX® et contacter votre médecin.

de douleurs thoraciques ou d'œdème des jambes] : cela peut être le signe évocateur de

ou coloration noire des selles, taches cutanées tels qu'apparition d'ulcérations

lèvres, de la langue ou de la gorge pouvant être ci-dessous est définie selon la convention

sur 10] 100] sur 1 000] sur 10 000] pendant le traitement par DOLICOX®

pieds dû à une rétention d'eau, rythme cardiaque irrégulier, - Élevation de la pression artérielle; Constipation, flatulence, gêne à l'estomac, nausées, vomissements, gêne dans la bouche; Modifications des examens Hématomes, Faiblesse et fatigue, syndrome

res huites, infection urinaire, diminution du nombre de globules blancs, diminution des leucocytes, diminution de l'appétit, prise de poids, et, voir, ressentir ou entendre des choses qui

émission d'engourdissement ou picotements, de l'œil, bourdonnements d'oreilles, vertiges, cardiaque rapide, insuffisance cardiaque, gêne dans la poitrine, crise cardiaque, bouffées mini-AVC, élévation sévère de la pression artérielle, toux, essoufflement, saignements de nez, modification du transit intestinal, sécheresse de la paroi de l'estomac pouvant devenir

du côlon irritable, inflammation du pancréas, démangeaisons, rougeur de la peau, et/ou rougeur, taux de potassium élevés dans le

urines évaluant le fonctionnement du rein, anomalie du rythme cardiaque, infection des

œsophage, gastrite, Inflammation de l'œsophage.

nécessite un avis médical immédiat], taux bas de sodium dans le sang, et des yeux; Réactions cutanées sévères, rougeur de la peau.

ont moins de 1 personne sur 10 000].

ment graves pour nécessiter immédiatement l'essoufflement], réactions cutanées sévères, gêne dans l'estomac pouvant devenir grave et aller

bles rénaux graves, élévation importante de

ou entendre des choses qui n'existent pas, estimé sur la base des données disponibles] (sexe), inflammation du pancréas, fréquence

comme étant grave ou si vous présentez des

notice, veuillez en informer votre médecin ou

particulières d'emploi :

hacien avant de prendre DOLICOX® 60mg,

et d'ulcère de l'estomac,

- Vous avez des œdèmes dus à une rétention de liquide;
- Vous avez des antécédents d'insuffisance cardiaque ou de toute autre forme de maladie cardiaque,
- Vous avez des antécédents d'hypertension artérielle. DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé peut augmenter la pression artérielle chez certains patients, en particulier lorsqu'il est utilisé à hautes doses;
- Vous avez des antécédents de maladie du foie, ou des reins;
- Vous avez un traitement anti-infectieux. DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé peut masquer une fièvre, qui est un signe d'infection;
- Vous êtes une femme et souhaitez concevoir un enfant;
- Vous êtes âgée(e);
- Vous avez du diabète, le cholestérol élevé ou vous êtes fumeur. Cela peut augmenter votre risque de maladie cardiaque.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de l'appauvrissement du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares). Si vous n'êtes pas sûr que l'un des points ci-dessus vous concerne, contactez votre médecin avant de prendre DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé.

Enfants et adolescents

Ne donnez pas ce médicament aux enfants et adolescents de moins de 16 ans.

Interactions :

Autres médicaments et DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance.

Évitez après le début du traitement par DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé, votre médecin peut être amené à vérifier, que vos médicaments agissent correctement, si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- Médicaments qui fluidifient votre sang (anticoagulants) tels que la warfarine, rifampicine (un antibiotique), méthotrexate (un médicament immunosupresseur, souvent utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde), médicaments pour aider à contrôler l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque appelés inhibiteurs de l'enzyme de conversion (par exemple l'énapril et le ramipril) et antagonistes des récepteurs de l'angiotensine (comme le losartan et le valsartan), lithium (médicament pour traiter certains types de dépression), diurétiques, ciclosporine ou Tacrolimus (médicaments immunosupresseurs), digoxine (médicament pour traiter l'insuffisance cardiaque et le rythme cardiaque irrégulier), minoxidil (médicament pour traiter l'hypertension artérielle), salbutamol en comprimés ou en solution buvable (médicament pour traiter l'asthme), pilule contraceptive, traitement hormonal substitutif de la ménopause, aspirine car le risque d'ulcère de l'estomac est plus élevé si vous prenez DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé avec de l'aspirine.

DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé peut être pris avec de l'aspirine à faibles doses. Si vous prenez actuellement de l'aspirine à faibles doses pour la prévention d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral, vous ne devez pas interrompre le traitement par l'aspirine sans l'avis de votre médecin.

Interactions avec les aliments et les boissons :

L'efficacité de DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé peut être plus rapide si la prise se fait sans aliments.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Grossesse et allaitement
Les comprimés pelliculés DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, ne doivent pas être pris pendant la grossesse. Si vous êtes enceinte ou susceptible de l'être ou en cas de désir de grossesse, ne prenez pas les comprimés. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, arrêtez de prendre les comprimés et consultez votre médecin. Consultez votre médecin si vous n'êtes pas sûre ou si vous avez besoin de plus de conseils.

Le passage de l'étoricoxib dans le lait maternel n'est pas connu. Si vous allaitez ou envisagez d'allaiter, consultez votre médecin avant de prendre DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé. Si vous prenez DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé, vous ne devez pas allaiter.

Les effets possibles du traitement sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser des machines :

La prise DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé peut entraîner des étourdissements et une somnolence chez certains patients. Ne conduisez pas si vous ressentez des étourdissements ou une somnolence.

N'utilisez ni outil ni machine si vous ressentez des étourdissements ou une somnolence.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :
Vous ne devez jamais prendre plus de comprimés que la posologie recommandée par votre médecin. Si vous prenez trop de comprimés DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé, vous devez immédiatement prendre un avis médical.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :
Il est important de prendre la dose DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé que votre médecin vous a prescrite. Si vous oubliez une dose, reprenez votre traitement à la dose habituelle le jour suivant l'oubli. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Mentions, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :

- Sans objet.

- Sous prescription médicale. Tableau A (liste I).

- Pas de précautions particulières de conservation.

- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

- Ne pas utiliser DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.



bottu®
B2, Allée des Casuarinas - Ain Séba - Casablanca

S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

DOLICOX®

Etoricoxib

DOLICOX
Etoricoxib

90 mg

60 mg

90 mg

120 mg

Comprimé pelliculé

notice avant de prendre ce

la relire.
oute, demandez plus d'informations

Ne le donnez jamais à quelqu'un
pourrait lui être nocif.
ous remarquez un effet indésirable
édecin ou à votre pharmacien.

active par unité de prise : 60 mg



• Com
Etorica
120mg
• Com
Etorica
Excipie
Classe
DOLIC
classe
La clas
coxib.
Indicat
DOLIC
(inflam
DOLIC
(inflamm
rhumatoïde et

DOLICOX® 90mg, comprimé pelliculé est également utilisé pour le traitement de courte durée de la douleur modérée après chirurgie dentaire.

DOLICOX® 120 mg, comprimé pelliculé contribue à réduire la douleur et le gonflement (inflammation) des articulations et des muscles chez les patients atteints de goutte.

Pas de goutte

Les comprimés pelliculés DOLICOX® 60mg, 90mg & 120mg, ne doivent être pris ni par les enfants, ni par les adolescents de moins de 16 ans.

Ne pas dépasser la dose recommandée pour le traitement de votre maladie. Il est important d'utiliser la dose la plus faible qui soulage votre douleur et de ne pas prendre DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé plus longtemps que prescrit.

Arthrose

La dose recommandée est de 30 mg une fois par jour, augmentée à 60 mg maximum une fois par jour si nécessaire.

Patients avec problèmes hépatiques.

Polyarthrite rhumatoïde

La dose recommandée est de 90 mg une fois par jour.

Douleur aiguë

L'étoricoxib ne doit être utilisé que pendant la période de douleur aiguë.

Douleur post-opératoire après chirurgie dentaire.

La dose recommandée est de 90 mg une fois par jour, traitement limité à 3 jours au maximum.

Patients avec problèmes hépatiques

Goutte

La dose recommandée est de 120 mg une fois par jour qui ne doit être utilisée que pendant la période aiguë de la douleur, limitée à 8 jours au maximum.

Patients avec problèmes hépatiques

En cas d'insuffisance hépatique légère (maladie du foie), vous ne devez pas prendre plus de 60 mg par jour.

Si vous avez une forme modérée d'insuffisance hépatique, la dose maximale recommandée est de 60 mg un jour sur deux, ou de 30 mg par jour.

Mode d'administration :

Voie orale.

Le ou les comprimés pelliculés DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, doivent être avalés en une prise par jour. DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé peut être pris au cours ou en dehors des repas.

• Durée du traitement

Ne prenez jamais DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé dans les cas

suivants :

- Allergie (hypersensibilité) à l'étoricoxib ou à l'un des autres composants contenus dans DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé,

- Allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), y compris l'aspirine et les inhibiteurs sélectifs de la COX-2,

- Ulcère de l'estomac évolutif au saignement gastro-intestinal,

- Maladie grave du foie,

- Maladie grave des reins,

- Grossesse et allaitement ou prévision de grossesse (voir Rubrique « Grossesse et allaitement »),

- Enfants et adolescents de moins de 16 ans.

- Maladie inflammatoire de l'intestin, telle que ou colite,

- Diagnostic de maladie cardiaque à type d'angine de poitrine, antécédents de crise cardiaque périphériques, ou toute sorte d'accident ischémique transitoire. L'étoricoxib pourrait cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, d'être utilisé chez les patients ayant déjà eu des prob

- Hypertension artérielle non contrôlée par un votre infirmière si vous n'êtes pas sûr que votre. Si vous pensez que l'un de ces points vous avoir consulté votre médecin au préalable.

Effets indésirables :

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, DOLICOX® 60mg peuvent provoquer des effets indésirables, mais ils ne sont pas tous connus.

Si vous présentez un de ces symptômes, vous 60mg, 90mg & 120mg, comprimé pelliculé.

- Anémie et/ou aggravation d'un es

yeux (ja

troubles

des prob

age, des

possibles)

- 1 patie

lents sur

0 patient

ts sur 10

1 patient

avent sur

né pelliculé

très fréquents : Troubles de l'estomac.

Fréquents :

- Alvéolite, Gonflement des jambes et/ou des

- Étouffements, maux de tête; Palpitations, pression artérielle; Sifflements ou difficultés respiratoires d'estomac, diarrhée, indigestion / inflammation de l'œsophage, ulcérations de

sanglots évaluant le fonctionnement du foie; pseudo-grippal.

Peu fréquents :

- Gastroentérite, infection des voies respiratoires, nombre de globules rouges, diminution de plaquettes, hypersensibilité, augmentation de l'anxiété, dépression, diminution du discernement n'existent pas, altération du goût, insomnie, somnolence, vision trouble, irritation et rougeur anomale du rythme cardiaque, fréquence sensation d'oppression, de pression ou de poing de chaleur, accident vasculaire cérébral, pression artérielle, inflammation des vaisseaux sanguins, ballonnement de l'estomac ou de l'intestin, ma bouche, ulcère de l'estomac, inflammation grave et aigre jusqu'à l'hémorragie, syndrome de gonflement de la face, éruption cutanée, crampes/ spasme musculaire, douleur musculaire, sang, modification des examens sanguins ou troubles rénaux graves, douleur thoracique.

Peu fréquents pour DOLICOX® 120mg : A

voies respiratoires hautes, Ulcérations de la bo

Rares

- Angio-oedème (réaction allergique sévère qui

- Confusion, agitation, Problèmes hépatiques;

- Insuffisance hépatique, jaunissement de la pe

- Diminution du taux de sodium dans le sang.

Très rares pour DOLICOX® 120mg. (survenant

Réactions allergiques (qui peuvent être suffisamment graves pour entraîner la mort)

- Sifflements respiratoires ou

inflammation de la paroi de l'estomac ou ulcérations jusqu'à l'hémorragie, troubles hépatiques, trai

la pression artérielle, confusion, voir, ressentir

Fréquence indéterminée (ne pouvant être é

jaunissement de la peau et des yeux (jaunissement cardiaque rapide).

Si vous ressentez un des effets mentionnés ci-dessous, il peut s'agir d'un effet indésirable non mentionné dans cette notice pharmacien.

Mises en garde spéciales et précautions p

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien.

- Vous avez des antécédents de saignement ou

- Vous êtes déshydraté(e),

DOSAGE:

For adults.

Take 2 tablets daily, in one take.

DURATION OF USE:

Program of 15 days minimum.

DIRECTION FOR USE:

Oral route.

Food supplement, it is not a medicine.



Lot Bachkou, rue 7, lot 10 - Casablanca - Morocco
Qualified person : O.MOTII

Myobil®

TABLETS

À consommer de préférence avant fin /

Best before :

Lot n° / Batch n° : PPC : 79,00 DH

V003 - ETMYOB30CPMC



6 111250 430289

INGREDIENTS

Bitter orange
croscarmelos,
extract; white
agents: silica [na]

stalline,
arjoram
iti-caking

730115.01.21

Intakes for 2 tablets

Bitter Orange tree extract	41,68 mg
Skullcap extract	200 mg
Marjoram extract	120 mg
White willow extract	100 mg
Curcumin	55 mg
Piperine	5,5 mg
Taurine	50 mg
Calcium	125 mg
Potassium	80 mg
Magnesium	57 mg

INDICATIONS:

- Muscle contractions.
- Soothing and relaxing.
- Improves mobility.

CONTRAINDICATIONS:

Not recommended for pregnant or breastfeeding women, to children and in case of antihypertensive treatment (orange tree) and people allergic to salicylate derivatives (white willow).

PRECAUTIONS OF USE:

- To be used as part of a diversified diet and a healthy lifestyle.
- Keep out of the reach of children.
- Store in a cool, dry place protected from light.

PRESENTATIONS :

MYOBIL comes in tablet form to be swallowed. Boxes of 15 and 30 tablets of 1 000 mg.

مركز الكلية الاصطناعية مرس السلطان
CENTRE D'HEMODIALYSE MERS-SULTAN

Dr.LEMSEFFER Youssef

Spécialiste des maladies des reins-rein Artificiel
Diplômé de la faculté de médecine de marseille

الدكتور المسفر يوسف

اختصاصي في أمراض الكلية
خريج كلية الطب بمارسيليا

Casablanca le : 31.3.2023 : الدار البيضاء في :

Amee FALDI Khadija

A. S. P.

Cn 6000 -





Dr BENNISS Fouad

Pr FATHI Khadija

Dr LARAQUI BENSOUDA Nadia

الدكتور بنسيس فؤاد

الأستاذة فتحي خديجة

الدكتورة العراقي بنسودة نادية

Date : 07/04/2023

Facture N° : 001488/2023

➤ Nom patient : FAIDI KHADIJA

➤ Examen(s) réalisé(s) : RX ASP F


➤

➤ Net à payer T.T.C : 250 DH

➤ Arrêter la présente facture a la somme de :DEUX CENT
CINQUANTE DH

➤ Mode de règlement : ESPECE

L'adhérent :



مركز الكلية الاصطناعية مرس السلطان CENTRE D'HEMODIALYSE MERS-SULTAN

Dr.LEMSEFFER Youssef

**Spécialiste des maladies des reins-rein Artificiel
Diplômé de la faculté de médecine de marseille**

الدار البيضاء في: 07/4/2023

الدكتور المسفر يوسف

الكلية في أمراض اختصاصي

خريج كلية الطب بمارسيليا

الدراز والبرهان

Amna Faizi Khadija

86.40

S.V

Dolox 90 14/18/77

37.00

Droxol 14p x 3 15 S.V

Ayobill

24p en 1 sechje per fm
(S.D.)

154.6

60 Subiect 80 is S.V Acq | T

$$T = 354.0^{\circ}$$



~~DR. LEMSTAFFERY
- NEPHROLOGUE
125, Avenue de l'Europe - 75025 Paris - Casa
Tel: 05 26 98 24~~

125 شارع مرسى سلطان 20، الدار البيضاء الهاتف: 05 22 26 96 34 / 05 22 26 95 24 الفاكس: 05 22 26 46 34

125, Avenue Mers Sultan 20 000 Casablanca - Tél.: 05 22 26 95 24 / 05 22 26 96 34 - Fax : 05 22 26 46 34

E-mail : ylemseffer@hotmail.fr - I.C.E.: 000230943000087