

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Déclaration de Maladie

N° W21-692844

156923



Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1616

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

BERRA EL HOUSSINE

Date de naissance :

1952

Adresse :

HASSANIA 2 Rue 16 N° 58
BEN HSICK CASA

Tél. : 0676375490

Total des frais engagés :

300 Dhs

MUPRAS

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Age :

Nom et prénom du malade :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

ESSAFI YOUSSEF
Chirurgien Traumatologue
304 Bd Brahim Roudani 2ème Etage - Casablanca
INPE: 16116917
Le : 11 AVR. 2023

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10/04/2023			300	Dr. Essafi Chirurgien Dentiste 304 Bd Brahim Boudaïd Residence Echifae 2ème Etage - Casablanca INPE : 161169107

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Le 10/04/2023 Dr. ENKIRAE Pharmacie Saadi Hasanien III, Rue 37 N° 44100 Casablanca - Tél. 0523 20 03 88	10/04/2023	676,90

ANALYSES - RADIGRAPHIES


Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
G	00000000	00000000
B	35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



جراح العظام والمفاصل - جراحة العمود الفقري - جراحة المفاصل بالمنظار

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE & TRAUMATOLOGIQUE - CHIRURGIE DU RACHIS - ARTHROSCOPIE

NOTE D'HONORAIRES

Date	10/04/2023	IF / ICE	/
N°	F2021-1292	Patient (e)	Berra el houssine
Docteur	Essafi Youssef	Paiement	

DETAIL DES ACTES		MM Dx	Prix
Consultation			300,00
		Total	300,00

Arrêté la présent document à la somme de:

trois cents DH

Dr. ESSAFI Youssef
 Chirurgien Traumatologue
 104 Bd Brahim Roudani Résidence
 Echifae 2^{ème} Etage - Casablanca
 NPE : 161169107



10/07/2023

جراح العظام والمعفاضات - جراحة العمود الفقري - جراحة المفاصل بالمنظار

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE & TRAUMATOLOGIQUE - CHIRURGIE DU RACHIS - ARTHROSCOPIE

Berre El Houssine

205003 tavanic

S.V.

10/07/2023

2nd m - Cervical spine

S.V.

10/07/2023

30.70

- Fucilin pommele

S.V.

676.00

صيادلة الأسمدة
Pharmacie Saadi
Dr. BENKIRANE Sadi
Hassania III, Rue 47 N° 44/46
Casablanca - Tel: 0522 29 19 57

10/07/2023

Dr. ESSAFI Youssef
Chirurgien Traumatologue
304, AV. BRAHIM ROUDANI, RÉSIDENCE ECHIAF, 2^{EME} ÉTAGE, N°3, CASABLANCA, MAROC
T. +212 (0) 522 25 68 18 M. +212 (0) 668 03 62 22 E.: essafiyoucef@gmail.com

304

NIC®

floxacin

500 mg

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Tavanic 500mg, cp pel b7
P.P.V : 205,00 DH



6 118001 080830

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATION
Tavanic® 250 mg
Tavanic® 500 mg
lévofloxacine

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice. Vous pourrez en faire usage si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit pour traiter une maladie ou un état de santé. Il peut également être donné à d'autres personnes, il peut survenir que leur maladie soit identique à la vôtre.
- Si vous resentez un quelconque effet indésirable, contactez votre pharmacien qui appliquera au mieux ce qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice :

- Qu'est-ce que Tavanic et dans quels cas peut-il être utilisé?
- Quelles sont les informations connues sur l'utilisation de prendre Tavanic.
- Comment prendre Tavanic.
- Quels sont les effets indésirables potentiels.
- Comment conserver Tavanic.
- Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE TAVANIC ET DANS QUELLES CAS PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ ?

Ce médicament s'appelle Tavanic. Il contient une substance active appelée lévofloxacine. Celle-ci fait partie des médicaments nommés « antibiotiques » et appartient plus précisément à la famille des « fluoroquinolones ». Elle agit en détruisant les bactéries responsables de certaines infections dans votre organisme.

- Tavanic permet de traiter les infections touchant :
 - les sinus
 - les bronches/poumons, chez les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques ou de pneumonie
 - les voies urinaires, y compris les reins et la vessie
 - la prostate, en cas d'infection persistante
 - la peau et les tissus sous-cutanés, y compris les muscles (ces parties sont aussi appelées « tissus mous »)

Parfois, dans certaines circonstances, Tavanic peut être prescrit pour diminuer le risque de contracter la forme pulmonaire de la maladie du charbon, ou pour réduire l'aggravation de la maladie.

ELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT

NIC®

floxacin

500 mg

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Tavanic 500mg, cp pel b7
P.P.V : 205,00 DH



6 118001 080830

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATION
Tavanic® 250 mg
Tavanic® 500 mg
lévofloxacine

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice. Vous pourrez en faire usage si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit pour traiter une maladie ou un état de santé. Il peut également être donné à d'autres personnes, il peut survenir que leur maladie soit identique à la vôtre.
- Si vous resentez un quelconque effet indésirable, contactez votre pharmacien qui appliquera au mieux ce qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice :

- Qu'est-ce que Tavanic et dans quels cas peut-il être utilisé?
- Quelles sont les informations connues sur l'utilisation de prendre Tavanic.
- Comment prendre Tavanic.
- Quels sont les effets indésirables potentiels.
- Comment conserver Tavanic.
- Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE TAVANIC ET DANS QUELLES CAS PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ ?

Ce médicament s'appelle Tavanic. Il contient une substance active appelée lévofloxacine. Celle-ci fait partie des médicaments nommés « antibiotiques » et appartient plus précisément à la famille des « fluoroquinolones ». Elle agit en détruisant les bactéries responsables de certaines infections dans votre organisme.

- Tavanic permet de traiter les infections touchant :
 - les sinus
 - les bronches/poumons, chez les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques ou de pneumonie
 - les voies urinaires, y compris les reins et la vessie
 - la prostate, en cas d'infection persistante
 - la peau et les tissus sous-cutanés, y compris les muscles (ces parties sont aussi appelées « tissus mous »)

Parfois, dans certaines circonstances, Tavanic peut être prescrit pour diminuer le risque de contracter la forme pulmonaire de la maladie du charbon, ou pour réduire le risque d'exposition au bacille du charbon ou encore pour réduire le risque d'aggravation de la maladie.

ELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT

Fucidine® 2% pommade

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Ga nouveau. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien ne le donnez à personne d'autre. Vous risqueriez de lui causer tort, même si elle présente

بناية
المédicale
conservation.

Prescription
الرقم
الخاص



la lire à
prescrit,

فوسيدين®
مرهم أنبوب من 15 غ

39,70

◆ IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

DENOMINATION

FUCIDINE® 2%, pommade

COMPOSITION QUALITATIVE / QUANTITATIVE

COMPOSITION	Centésimale
Fusidate de sodium	2 g
Excipients q.s.p.	100 g

Excipients : alcool cétylique, lanoline, vaseline, paraffine liquide.

FORME PHARMACEUTIQUE

Pommade. Tube de 15 g.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

ANTI-INFECTIEUX

Antibiotiques-antibactériens / antibiotiques actifs sur la synthèse des protéines
(D : Dermatologie).

◆ DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est un antibiotique.

Ce médicament est préconisé dans les infections cutanées dues à des germes staphylocoques et streptocoques.

◆ ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- allergie à l'acide fusidique ou à l'un des excipients,
- infections mammaires lors de l'allaitement en raison du risque d'absorption du produit par le nouveau-né.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES

NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- La pommade ne doit pas être appliquée sur l'oeil.

- Ne pas utiliser la pommade sur de trop grandes surfaces, en particulier chez le nourrisson.

- Ne pas utiliser la pommade sur les lésions suintantes macérées, ni dans les plis, ni sur les ulcères de jambe.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSieurs MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

En cas d'allaitement, ne pas appliquer sur le sein.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

LISTE DES EXCIPiens DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Lanoline, alcool cétylique, et butylhydroxytoluène.

◆ COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

POSOLOGIE

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie cutanée, application locale avec ou sans pansage. Eviter l'application en couche épaisse.

FREQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ

Une ou deux applications par jour après nettoyage de la surface infectée.

DURÉE DU TRAITEMENT

Limiter le traitement à une semaine, à titre indicatif.

◆ EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÉNANTS :

Dans certains cas, il est possible que survienne un eczème allergique avec parfois des lésions éloignées du lieu de traitement : il faut IMMÉDIATEMENT ARRÊTER le traitement et avertir votre médecin.

En fonction de l'absorption du produit à travers la peau, en particulier chez le nourrisson, la possibilité d'effets non souhaités au niveau du foie ne peut être exclue. SIGNALISE À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

◆ CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Ce médicament doit être conservé à température ambiante.

◆ CONDITION DE DÉLIVRANCE :

CE MÉDICAMENT EST INSCRIT EN LISTE I

VOTRE PHARMACIEN NE POURRA VOUS EN DELIVRER QUE SUR ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PERSONNELLEMENT PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRÉCISE :

- IL PEUT NE PAS ÊTRE ADAPTÉ A UN AUTRE CAS.

- NE PAS LE REUTILISER SANS AVIS MEDICAL.

- NE PAS LE CONSEILLER À UNE AUTRE PERSONNE.

Fabriqué par  POLYMÉDIC sous licence Léo Pharma.

Rue Amyot d'Invile, Quartier Arsalane - Maroc

Dr. T. BELABDA : Pharmacien Responsable

Codoliprane®

PARACETAMOL ET CODEINE

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

COMPOSITION

Paracétamol
Phosphate de codeïne hémihydraté
(Quantité correspondant à codeïne base)
Excipients : gélatine, acide stéarique, amidon de pomme de terre



82, Allée des Castors
S. Bachouchi -

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé sécable - boîte de 16.

PPV: 22DH20

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTALGIQUE CENTRAL ET PERIPHERIQUE

PER: 12/24

LOT: L4074

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Traitement chez l'adulte des douleurs d'intensité modérée nécessitant l'aspirine ou le paracétamol utilisé seul.



DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :
- allergie connue au paracétamol ou à la codeïne,
- maladie grave du foie,
- chez l'asthmatique,
- en cas d'insuffisance respiratoire,
- allaitement.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin avec des médicaments contenant de la buprénorphine, de la nalbuphine ou de la pentazocine. EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant d'expectoration, en cas de maladie du foie ou d'insuffisance rénale ainsi que chez les sujets âgés, un avis médical est indispensable. Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée en raison du risque de dépendance.

PRECAUTION D'EMPLOI

La prise de boissons alcoolisées durant le traitement est déconseillée.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, Notamment avec la buprénorphine, la nalbuphine ou la pentazocine, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol et de la codeïne. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (cf. posologie).

