

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
1/4/2023	02		3000dh	Jr. Lahou Nour EL HARI Médecin Ophtalmologiste 124, Bd Hassan II - Casablanca - CASA Tél: 0522 44 20 61 / 0522 44 28 94 NIP: 091032479



EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien et du Commissaire	Date	Montant de la Facture
	01/04/23	814,80

ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des travaux
		</		

CABINET ET MÉDICAL D'OPHTHALMOLOGIE

الدكتورة مبارش لحلو صباح

Dr MBARECHE LAHLOU Sabah

Maladies et Chirurgie des Yeux

Diplômée du CES d'Ophtalmologie

Université de Montpellier France

Ancien Médecin Spécialiste au

C.H.U. Ibnou Rochd Casablanca

Chirurgie Oculaire

Lentilles de Contact

Laser - Angiographie

INP : 091098152



00162512500060



Casablanca, le 14/02/2023

الدكتور لحلو نور اليقين

Dr LAHLOU Nourelyakine

Maladies et Chirurgie des Yeux

Diplômé du CES d'Ophtalmologie

Université de Montpellier France

Ancien Médecin Spécialiste au

C.H.U. Ibnou Rochd Casablanca

Ancien Médecin Chef et Chef de Service

à l'Hôpital Omar Idrissi Fès

Chirurgie des Paupières et annexes

Chirurgie des Voies lacrymales

INP : 091032979



00162621600091

لا تغير تاريخ الفحص

On ne change pas la Date d'Examen

نـ سـاـكـنـ نـ

1,30+6



- TANALCON

gr: 1g-5 / 3ml

129; 0.5x3



- visneurox



8/14/23

124, Bd Rahal el Meskini, 5ème étage, Quartier benjdia Casablanca, CP : 20120

entre MARJANE Liberté, L'OREAL et la Maisons VOLVO

Tél. : 05 22 44 20 64 / 05 22 45 20 64 - Tél. fax : 05 22 44 28 94 - E-mail : lahloou.nourlyakine@gmail.co

en cas d'urgencesappelez 0766 44 70 26

tanakan 40mg

Ginkgo (extrait sec de)

Comprimé enrobé

1. QU'EST-CE QUE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : autres médicaments de la décence - code ATC : N06DX02.

Médicament à base de plantes indiqué dans le traitement symptomatique de certains troubles cognitifs du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de décence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé :

- si vous êtes allergique au ginkgo ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes enceinte.

Avertissements et précautions

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

En raison du risque d'accroissement des saignements en présence de préparations à base de ginkgo, arrêtez ce médicament 3 à 4 jours avant tout acte chirurgical. L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé.

- Si vous avez des prédispositions à saigner (terrain

Autres médicaments TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

TANAKAN peut modifier l'effet d'autres médicaments : anticoagulants (phencoumarone, warfarine), médicaments anti-plaquettes (clopidogrel, acide salicylique et autres anti-inflammatoires non stéroïdiens).

En cas de prise concomitante de ce médicament avec la warfarine, une surveillance est nécessaire, consultez votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce médicament avec l'éteilate de dabigatran, l'effet de celui-ci peut être potentiellement, consultez votre médecin.

L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation peut être importante et provoquer des vertiges et une augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce m
L'utilis
l'allait
TANA
lactos
3. COI
compr
Veillez
exacte
pharma
pharma
Les comp
7130
0000000000
osseuse
pendant
du
ant
verre

tanakan 40mg

Ginkgo (extrait sec de)

Comprimé enrobé

1. QU'EST-CE QUE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : autres médicaments de la décence - code ATC : N06DX02.

Médicament à base de plantes indiqué dans le traitement symptomatique de certains troubles cognitifs du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de décence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé :

- si vous êtes allergique au ginkgo ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes enceinte.

Avertissements et précautions

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

En raison du risque d'accroissement des saignements en présence de préparations à base de ginkgo, arrêtez ce médicament 3 à 4 jours avant tout acte chirurgical. L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé.

- Si vous avez des prédispositions à saigner (terrain

Autres médicaments TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

TANAKAN peut modifier l'effet d'autres médicaments : anticoagulants (phencoumarone, warfarine), médicaments anti-plaquettes (clopidogrel, acide salicylique et autres anti-inflammatoires non stéroïdiens).

En cas de prise concomitante de ce médicament avec la warfarine, une surveillance est nécessaire, consultez votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce médicament avec l'éteilate de dabigatran, l'effet de celui-ci peut être potentiellement, consultez votre médecin.

L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation peut être importante et provoquer des vertiges et une augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce m
L'utilis
l'allait
TANA
lactos
3. COI
compr
Veillez
exacte
pharma
pharma
Les comp
7130
0000000000
osseuse
pendant
du
ant
verre

tanakan 40mg

Ginkgo (extrait sec de)

Comprimé enrobé

1. QU'EST-CE QUE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : autres médicaments de la décence - code ATC : N06DX02.

Médicament à base de plantes indiqué dans le traitement symptomatique de certains troubles cognitifs du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de décence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé :

- si vous êtes allergique au ginkgo ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes enceinte.

Avertissements et précautions

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

En raison du risque d'accroissement des saignements en présence de préparations à base de ginkgo, arrêtez ce médicament 3 à 4 jours avant tout acte chirurgical. L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé.

- Si vous avez des prédispositions à saigner (terrain

Autres médicaments TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

TANAKAN peut modifier l'effet d'autres médicaments : anticoagulants (phencoumarone, warfarine), médicaments anti-plaquettes (clopidogrel, acide salicylique et autres anti-inflammatoires non stéroïdiens).

En cas de prise concomitante de ce médicament avec la warfarine, une surveillance est nécessaire, consultez votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce médicament avec l'éteilate de dabigatran, l'effet de celui-ci peut être potentiellement, consultez votre médecin.

L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation peut être importante et provoquer des vertiges et une augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce m
L'utilis
l'allait
TANA
lactos
3. COI
compr
Veillez
exacte
pharma
pharma
Les comp
7130
0000000000
osseuse
pendant
du
ant
verre

tanakan 40mg

Ginkgo (extrait sec de)

Comprimé enrobé

1. QU'EST-CE QUE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : autres médicaments de la décence - code ATC : N06DX02.

Médicament à base de plantes indiqué dans le traitement symptomatique de certains troubles cognitifs du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de décence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé :

- si vous êtes allergique au ginkgo ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes enceinte.

Avertissements et précautions

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

En raison du risque d'accroissement des saignements en présence de préparations à base de ginkgo, arrêtez ce médicament 3 à 4 jours avant tout acte chirurgical. L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé.

- Si vous avez des prédispositions à saigner (terrain

Autres médicaments TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

TANAKAN peut modifier l'effet d'autres médicaments : anticoagulants (phencoumarone, warfarine), médicaments anti-plaquettes (clopidogrel, acide salicylique et autres anti-inflammatoires non stéroïdiens).

En cas de prise concomitante de ce médicament avec la warfarine, une surveillance est nécessaire, consultez votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce médicament avec l'éteilate de dabigatran, l'effet de celui-ci peut être potentiellement, consultez votre médecin.

L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation peut être importante et provoquer des vertiges et une augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

Grossesse et allaitement

Ce m
L'utilis
l'allait
TANA
lactos
3. COI
compr
Veillez
exacte
pharma
pharma
Les comp
7130
0000000000
osseuse
pendant
du
ant
verre

VIS

neurox®


OMK1

Citicoline et Acide Hyaluronique**Composition:**

Citicoline sodique monohydraté, Phosphate de sodium, Chlorure

Présentation:

Solution ophtalmique



VISNEUROX OMK1® est une solution ophtalmique de citoline à 2% et à 0,2% d'acide hyaluronique avec un poids moléculaire élevé.

VISNEUROX OMK1® grâce à la présence de citoline, exerce une action structurelle qui favorise la réparation de l'intégrité des membranes cellulaires endommagées, lors de pathologies ophtalmiques dégénératives, telles que le Glaucome.

De plus la solution contient de l'acide hyaluronique favorisant, par ailleurs, un microenvironnement propice au processus de réparation de la surface oculaire dans les cas où l'épithélium cornéen et conjonctival ont été endommagés.

En fait l'acide hyaluronique est obtenu par une synthèse biotechnologique qui permet de produire des solutions mucomimétiques, mucoadhésives, et viscoélastiques, utiles pour améliorer la stabilité du film lacrymal et ainsi maintenir la surface oculaire lubrifiée, hydratée et protégée.

Quand l'utiliser

VISNEUROX OMK1®, du fait de la présence de citoline et de son action structurelle sur les cellules ganglionnaires rétiniennes, est indiqué comme adjuvant dans le traitement de l'hypertension oculaire chez les patients souffrant de glaucome.

D'autre part, les propriétés hydratantes et protectrices de ce produit assurent un soulagement oculaire en cas d'irritation, de sensation de brûlure et de sensation de corps étranger causées par des facteurs environnementaux, une chirurgie oculaire ou une conjonctivite.

Mode d'emploi

1 goutte trois fois par jour, selon le besoin.

Précautions et avertissements

- Ne pas utiliser si le flacon est endommagé.
- Ne pas utiliser en cas d'intolérance à l'un des composants du produit.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Eviter le contact de l'embout du flacon avec les yeux.

VIS

neurox®


OMK1

Citicoline et Acide Hyaluronique**Composition:**

Citicoline sodique monohydraté, Phosphate de sodium, Chlorure

Présentation:

Solution ophtalmique



VISNEUROX OMK1® est une solution ophtalmique de citoline à 2% et à 0,2% d'acide hyaluronique avec un poids moléculaire élevé.

VISNEUROX OMK1® grâce à la présence de citoline, exerce une action structurelle qui favorise la réparation de l'intégrité des membranes cellulaires endommagées, lors de pathologies ophtalmiques dégénératives, telles que le Glaucome.

De plus la solution contient de l'acide hyaluronique favorisant, par ailleurs, un microenvironnement propice au processus de réparation de la surface oculaire dans les cas où l'épithélium cornéen et conjonctival ont été endommagés.

En fait l'acide hyaluronique est obtenu par une synthèse biotechnologique qui permet de produire des solutions mucomimétiques, mucoadhésives, et viscoélastiques, utiles pour améliorer la stabilité du film lacrymal et ainsi maintenir la surface oculaire lubrifiée, hydratée et protégée.

Quand l'utiliser

VISNEUROX OMK1®, du fait de la présence de citoline et de son action structurelle sur les cellules ganglionnaires rétiniennes, est indiqué comme adjuvant dans le traitement de l'hypertension oculaire chez les patients souffrant de glaucome.

D'autre part, les propriétés hydratantes et protectrices de ce produit assurent un soulagement oculaire en cas d'irritation, de sensation de brûlure et de sensation de corps étranger causées par des facteurs environnementaux, une chirurgie oculaire ou une conjonctivite.

Mode d'emploi

1 goutte trois fois par jour, selon le besoin.

Précautions et avertissements

- Ne pas utiliser si le flacon est endommagé.
- Ne pas utiliser en cas d'intolérance à l'un des composants du produit.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Eviter le contact de l'embout du flacon avec les yeux.

VIS

neurox®


OMK1

Citicoline et Acide Hyaluronique**Composition:**

Citicoline sodique monohydraté, Phosphate de sodium, Chlorure

Présentation:

Solution ophtalmique



VISNEUROX OMK1® est une solution ophtalmique de citoline à 2% et à 0,2% d'acide hyaluronique avec un poids moléculaire élevé.

VISNEUROX OMK1® grâce à la présence de citoline, exerce une action structurelle qui favorise la réparation de l'intégrité des membranes cellulaires endommagées, lors de pathologies ophtalmiques dégénératives, telles que le Glaucome.

De plus la solution contient de l'acide hyaluronique favorisant, par ailleurs, un microenvironnement propice au processus de réparation de la surface oculaire dans les cas où l'épithélium cornéen et conjonctival ont été endommagés.

En fait l'acide hyaluronique est obtenu par une synthèse biotechnologique qui permet de produire des solutions mucomimétiques, mucoadhésives, et viscoélastiques, utiles pour améliorer la stabilité du film lacrymal et ainsi maintenir la surface oculaire lubrifiée, hydratée et protégée.

Quand l'utiliser

VISNEUROX OMK1®, du fait de la présence de citoline et de son action structurelle sur les cellules ganglionnaires rétiniennes, est indiqué comme adjuvant dans le traitement de l'hypertension oculaire chez les patients souffrant de glaucome.

D'autre part, les propriétés hydratantes et protectrices de ce produit assurent un soulagement oculaire en cas d'irritation, de sensation de brûlure et de sensation de corps étranger causées par des facteurs environnementaux, une chirurgie oculaire ou une conjonctivite.

Mode d'emploi

1 goutte trois fois par jour, selon le besoin.

Précautions et avertissements

- Ne pas utiliser si le flacon est endommagé.
- Ne pas utiliser en cas d'intolérance à l'un des composants du produit.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Eviter le contact de l'embout du flacon avec les yeux.