

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage An/le Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W21-715860

Maladie Dentaire Optique Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 01407 Société : Ram
 Actif Pensionné(e) Autre :
 Nom & Prénom : ELKETTANI Sidi HAMID
 Date de naissance : 19.04.1950
 Adresse : 92 RUE MIMOUZA ANP 23 HAY AZZAHRA
 Tél. : 0611220765 Total des frais engagés : 263770 Dhs

Cadre réservé au médecin

Cachet du médecin :
 Date de consultation : 15/03/2023
 Nom et prénom du malade : ELKETTANI Sidi HAMID Age: 72 Ans
 Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant
 Nature de la maladie : Dermite
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA Le : 15/03/2023
 Signature de l'adhérent(e) : [Signature] 12106 WJ

Autorisation CNDP N° : A-A-215/019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
15/03/23	C	C	3300	
15/03/23	Kp de l'ocul			

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE AL VOUSSEUR Rue des Roses, Casablanca Tél: 22 36 84 30 - Patente 34808192	15/03/23	335,70

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
CASA Centre de Radiologie	15/03/23		


AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'OOF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="checkbox"/>
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="checkbox"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="checkbox"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="checkbox"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="checkbox"/>

O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE	COEFFICIENT DES TRAVAUX																
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">D</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">G</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>	H		25533412	21433552	00000000	00000000	D		00000000	00000000	35533411	11433553	G		B		COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="checkbox"/>
	H																	
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D																	
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	G																	
	B																	
		[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession	MONTANTS DES SOINS <input type="checkbox"/>															
		DATE DU DEVIS <input type="checkbox"/>																
		DATE DE L'EXECUTION <input type="checkbox"/>																

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

URGENT

Professeur d'Anatomie Pathologique
Ex. Enseignante à la Faculté de
Médecine de Casablanca



Dr. Amal BENKIRANE
Professeur d'Anatomie Pathologique
Ex. Enseignante à la Faculté de
Médecine de Casablanca

DEMANDE D'EXAMEN ANATOMO-CYTOPATHOLOGIQUE

Dr. BENNANI Maha
Dermatologue - Vénérologue
Rés du Palais, Imm E, 2ème Etage
Rue Yasmine Angle Bd. Ghandi
et Yacoub El Mansour - Casa
Tel 05 22 94 03 13

De la part du Dr :

Nom et prénom du patient : **EL FETTARI EMMO HANIP**

Age : **72 Ans** Sexe : **MASCULIN**

Date de prélèvement : **20/03/2023**

Renseignements cliniques et paracliniques : **Cancer**

Shaving
Prelevé du
Moyeu
avec modification
recule

Organe prélevé :

Nature de l'acte réalisé :

Biopsie antérieure : Oui Non Réf :

FCV : Vagin Exocol : Endocol :

Date des dernière règles : Parité :

Thérapeutique antérieure ou en cours :

Signature & Cachet
Dr. BENNANI Maha
Dermatologue - Vénérologue
Rés du Palais, Imm E, 2ème Etage
Rue Yasmine Angle Bd. Ghandi
et Yacoub El Mansour - Casa
Tel 05 22 94 03 13

Sans savon.

ALCASTERIL

PEAUX ET MUQUEUSES DELICATES

AM88 1025
LOT PER
Prix 69.00

Sans savon, hypoallergénique, à PH alcalin,
peaux délicates.

pour minimiser les risques de réactions

ALCASTERIL est un produit adéquat pour l'hygiène intime
en adjuvant des traitements antimycosiques.

ALCASTERIL calme les démangeaisons et les irritations. Ses actifs très doux
permettent un lavage quotidien des muqueuses et des peaux sensibles. La Bardane
est reconnue pour ses propriétés adoucissantes et calmantes des irritations.

ALCASTERIL est un soin lavant anti-odeurs. Il laisse une odeur agréable sur les
muqueuses et la peau.

CONSEILS D'UTILISATION :

Usage externe.

A utiliser sur la peau et les muqueuses préalablement mouillées, puis rincer à l'eau.
Éviter tout contact avec les yeux, en cas de contact, rincer immédiatement et
abondamment à l'eau claire.

INGRÉDIENTS :

Aqua, Sodium Chloride, Cocamide DEA, Lauryl Betaine, Cocamidopropyl Betaine,
Glycerin, Polysorbate 20, Arctium majus Root Extract, Salicylic Acid, Sodium
Glycolate, Lavandula angustifolia oil, Sodium Benzoate, Magnesium Nitrate, Sodium
hydroxide, Methylchloroisothiazolinone, Magnesium Chloride, Methylisothiazolinone.

PRESENTATION :

- Flacon de 125 ml
- Flacon de 250 ml

LABORATOIRES JUVA SANTE
8, Rue CHRISTOPHE COLOMB, 75008 PARIS
FRANCE

Certains effets indésirables sont peu fréquents (atteint jusqu'à 1 patient sur 100) : lésion de la peau, croute, trouble de la peau, changement de couleur de la peau, rougeur, sensation de brûlure, douleur, douleur au site d'application, irritation au site d'application. Certains effets indésirables sont rares (atteint jusqu'à 1 patient sur 1000) : sécheresse de la peau, eczéma, réaction inflammatoire de la peau suite au contact de la crème, irritation des yeux, aggravation des symptômes.

Si TEGUMA® 1%, crème est accidentellement appliqué sur les yeux, une irritation des yeux peut survenir. Rincez abondamment et consultez un médecin.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

5. COMMENT CONSERVER TEGUMA® 1%, crème ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

À conserver à une température inférieure à 25°C.

Né jetez aucun médicament au tout-à-égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient TEGUMA® 1%, Crème ?

La substance active :

	Tube/15g	Tube/30g
Chlorhydrate de Terbinafine.....	0,15 g	0,30 g

Excipients : Alcool cétoestéarylique, Cetomacrogol 1000, Monostéarate de glyceryl, Diméthicone (DMPS 100), Poloxamer (Lutrol F127), Paraffine liquide légère, Alcool benzyle, Vaseline blanche, Edétate disodique, Propylène glycol, Triéthanolamine, Eau purifiée.

Liste des Excipients à effet notoire : Alcool cétoestéarylique, Propylène glycol.

Nom et adresse de l'EPI titulaire de l'AMM au Maroc :

COOPER PHARMA

41, rue Mohamed Diouri, 20110 Casablanca - Maroc

Nom et adresse du Fabricant :

COOPER PHARMA

Route 107, Km 2,5 Douar Ould Abbou, Tit Mellil Casablanca-Maroc

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée :

Avril 2022.

Conditions de prescription et de délivrance :

Tableau C (Liste II).



TEGUMA® 1%
Cream - Tube of 15g & 30g
Terbinafine

Read all of this leaflet carefully before using this medicine because it contains important information for you.

- Keep this leaflet, you might need to read it again.
- If you have any further questions; ask your doctor or pharmacist for more information.
- This medicine has been prescribed for you. Do not give this to anyone else. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

What is in this leaflet?

1. What TEGUMA® 1%, Cream is and what it is used for?
2. What you need to know before you use TEGUMA® 1%, cream?
3. How to use TEGUMA® 1%, Cream?
4. What are the possible side effects?
5. How to store TEGUMA® 1%, Cream?
6. Further information

1. WHAT TEGUMA® 1%, cream IS AND WHAT IT IS USED FOR?

Pharmaceutical group - ATC code: TOPICAL ANTIFUNGALS - D01AE15.

This medicine is a topical cream containing an antifungal of the allylamine family.

It is recommended in the treatment or adjunctive treatment of certain

skin diseases caused by fungi (mycoses).

2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU USE TEGUMA® 1%, cream?

Never use TEGUMA® 1%, cream:

- If you are allergic to terbinafine hydrochloride or any of the other ingredients of this medicine, listed in section 6.

Warnings and precautions:

Talk to your doctor or pharmacist before using TEGUMA 1%, cream.

- This medication is for external use only.
- Do not use in the mouth and do not swallow.
- Avoid applications near the eyes especially if applied on the face; in case of accidental contact with the eyes, rinse thoroughly with water. If discomfort persists, consult a doctor.

In the event of application in children under an occlusive dressing or diaper, over a large surface or on damaged skin, it is imperative to follow the recommendations and the dosage indicated by your doctor because of the greater risk of penetration of the product in these circumstances.

- Newborns/infants should not be in contact with the treated skin area, including breasts of nursing mothers. This medication is not suitable for fungal nail infections. If you have a fungal nail infection (fungus inside or under the nail), accompanied by nail discoloration and a change in the texture of the nail (thick, crumbling), see a doctor.

- In rare cases, the underlying fungal infection may be aggravated.
- It is important to apply this cream regularly on the lesions every day in order to achieve healing. Stopping treatment too early or irregular applications can lead to failures or relapses.

Thus, even if the condition of the skin improves in a few days, it is imperative to continue to apply this cream for the indicated duration.

- At the end of the treatment, although you no longer use the cream, the improvement in your skin continues and complete healing may take longer, up to 4 weeks.

Children and adults

KEEP OUT OF THE REACH AND SIGHT OF CHILDREN.

Other medicines and TEGUMA® 1%, cream

Please tell your doctor or pharmacist if you are using/taking, have recently used/taken or might use any other medicines.

TEGUMA® 1%, cream with food and drink

Not applicable

Pregnancy and breast-feeding

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or plan to become pregnant, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

This medicine should not be used during pregnancy unless your doctor has prescribed it.

Terbinafine can pass into breast milk. Its use during breastfeeding should be avoided.

In addition, the newborn/infant should not be in contact with the treated skin area, including the breasts.

Driving and using machines

Not applicable.

Information relating to excipients with a known effect.

This medicine contains cetostearyl alcohol and may cause local skin reactions (eg eczema).

This medicine contains propylene glycol and may cause skin irritation.

3. HOW TO USE TEGUMA® 1%, cream?

Dosage

Always use this medicine exactly as your doctor has told you; you should. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

- Inter-toe dermatophyte intertrigo (Athlete's Foot) : Once a day for 1 week.
- Plantar intertrigo: Twice a day for 2 weeks
- Cutaneous candidiasis: Once or twice a day for 1 to 2 weeks.
- Dermatophytosis of glabrous skin and crural intertrigo: once a day for one 1 week;
- Pityriasis versicolor: Once or twice a day for 2 weeks.
- Do not stop using the cream before the end of treatment, even if the infection seems to improve after a few days. Infections usually appear to improve within a few days of treatment, but may reappear if the cream is not applied regularly or is stopped too early.
- If you have not noticed any signs of improvement within a week of first starting treatment, please seek advice from your doctor or pharmacist.

Mode and routes of administration

Cutaneous use.

Cleanse and dry the affected areas.

Unscrew the cap, use the tip on the cap to puncture the seal on the

LOT : 220840
PER : 06 - 2024
PPV : 35,50 DH

® 1%

15g & 30g

Crème

Le contenu de cette notice avant
contient des informations

Si vous avez besoin de la retirer,
demandez plus d'information à

Le médecin peut prescrire. Ne le
pourrait leur être nocif, même si
antiques aux vôtres.

Si les effets deviennent graves ou si vous

remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice,
parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TEGUMA® 1%, crème et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser TEGUMA® 1%, crème ?
3. Comment utiliser TEGUMA® 1%, crème ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TEGUMA® 1%, crème ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE TEGUMA® 1%, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : ANTIFONGIQUES TOPIQUES - D01AE15

Ce médicament est une crème pour application locale contenant un antifongique de la famille des allylamines.

Il est préconisé dans le traitement ou le traitement d'appoint de certaines affections cutanées dues à des champignons (mycoses).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER TEGUMA® 1%, crème ?

N'utilisez jamais TEGUMA® 1%, crème :

- Si vous êtes allergique au chlorhydrate de terbinafine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser TEGUMA 1%, crème.

- Ce médicament est réservé à l'usage externe.
- Ne pas utiliser dans la bouche et ne pas avaler.
- Éviter les applications près des yeux ; en particulier si l'application se fait sur le visage. En cas de contact accidentel avec les yeux, essuyer et laver abondamment avec de l'eau. En cas de persistance de l'inconfort, consulter un médecin.
- En cas d'application chez l'enfant sous pansement occlusif ou couche, sur une grande surface ou sur une peau lésée, respecter impérativement les recommandations et la posologie indiquées par votre médecin en raison du risque de pénétration plus important du produit dans ces circonstances.
- Les nouveau-nés/nourrissons ne doivent pas être en contact avec la zone de peau traitée, y compris les seins de la femme allaitante. Ce médicament ne convient pas pour les infections fongiques des ongles. Si vous avez une infection fongique au niveau des ongles (champignons à l'intérieur ou sous l'ongle), s'accompagnant d'une décoloration des ongles et d'un changement de la texture de l'ongle (épais, effrité), consultez un médecin.
- Dans de rares cas, l'infection fongique sous-jacente peut être aggravée.

• Il est important d'appliquer cette crème régulièrement sur les lésions chaque jour afin d'obtenir la guérison. Un arrêt du traitement trop précoce ou des applications irrégulières peuvent entraîner des échecs ou des rechutes.

• Ainsi, même si l'état de la peau s'améliore en quelques jours, il est impératif de continuer d'appliquer cette crème pendant la durée indiquée.

• Au terme du traitement, bien que vous n'utilisiez plus la crème, l'amélioration de votre peau se poursuit et la guérison complète peut prendre plus longtemps, jusqu'à 4 semaines.

Enfants et adolescents

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants
Autres médicaments et TEGUMA® 1%, crème
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, utilisez, avez récemment pris utilisé ou pourriez utiliser tout autre

médicament.

TEGUMA® 1%, crème avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse sauf si votre médecin vous l'a prescrit.

La terbinafine peut passer dans le lait maternel. Son utilisation pendant l'allaitement est à éviter.

Par ailleurs, le nouveau-né/nourrisson ne doit pas être en contact avec la zone de peau traitée, y compris les seins.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

Mentions relatives aux excipients à effet notoire.

Ce médicament contient de l'alcool cétylostéarylique et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma).

Ce médicament contient du propylène glycol et peut induire des irritations de la peau.

3. COMMENT PRENDRE TEGUMA® 1%, Crème ?

Posologie

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

- Intertrigos inter-orteils et dermatophytes (pied d'athlète) : 1 application par jour pendant 1 semaine.
- Intertrigo plantaire : 2 applications par jour pendant 2 semaines.
- Candidoses cutanées : 1 à 2 applications par jour pendant 1 à 2 semaines
- Dermatophytes de la peau glabre et intertrigos cruraux : 1 application par jour pendant 1 semaine.
- Pityriasis versicolor : 1 à 2 applications application par jour pendant 2 semaines
- Ne pas arrêter l'utilisation de la crème avant la fin du traitement même si l'infection semble s'améliorer après quelques jours. Les infections semblent habituellement guéries après quelques jours de traitement mais peuvent réapparaître si la crème n'est pas appliquée régulièrement ou si l'application est arrêtée trop tôt.
- Si vous ne remarquez aucune amélioration dans la semaine suivant le début du traitement, vous devez vous adresser à votre médecin ou votre pharmacien.

Mode et voie d'administration

VOIE CUTANÉE

Nettoyer et sécher les zones infectées.

Dévisser le bouchon, et si vous utilisez TEGUMA® 1%, crème pour la première fois, utiliser la pointe sur le bouchon pour percer le haut du tube, puis presser doucement le tube.

Appliquer suffisamment de crème pour déposer une fine couche sur la zone de peau affectée et son pourtour.

Faites pénétrer doucement par un massage léger ;

Revisser le bouchon sur le tube.

Lavez-vous les mains afin de ne pas contaminer d'autres zones du corps. Si vous traitez une infection située dans des plis cutanés, vous pouvez recouvrir la zone traitée d'une gaze, en particulier la nuit.

Utilisez une nouvelle gaze propre à chaque application.

Si vous avez utilisé plus de TEGUMA® 1%, crème que vous n'auriez dû

Contactez votre médecin qui vous conseillera.

Si vous oubliez d'utiliser TEGUMA® 1%, crème

Si vous avez accidentellement oublié de prendre votre dose, appliquez là au moment où vous vous en rappelez et continuez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous arrêtez d'utiliser TEGUMA® 1%, crème

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Arrêtez d'utiliser TEGUMA® 1%, crème et demandez une aide médicale immédiatement si vous avez l'un des symptômes suivants pouvant correspondre à une réaction allergique (fréquence indéterminée) :

- Difficulté à respirer ou à avaler
- Gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge
- Démangeaisons sévères de la peau, avec une éruption rouge ou en relief (urticaire).

Certains effets indésirables sont fréquents (atteint jusqu'à 1 patient sur 10) : desquamation de la peau, démangeaisons.



فوسيدين 2% مرهم

ينبغي قراءة كامل هذه النشرة قبل استعمال هذا الدواء. إن احتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج إلى إعادة قراءتها من جديد. إذا كانت لديك أسئلة أخرى، إذا كان لديك شك من أطب المزيد من المعلومات من طبيبك أو من الصيدلي. وصف هذا الدواء لك بشكل شخصي. لا تعطه أبداً لشخص آخر، حتى في حالة وجود أعراض مشابهة. قد يمرض ذلك لدى.

- التعريف بالدواء
- السمية:
- فوسيدين 2% مرهم
- التركيب النوعية الكلية

التركيب	المئوي	لأنبوب من 15 غ
الحامض الفوسيديك (أي أن ان) ملح الصوديوم	2 غ	300 ملغ
السواغات بكمية كافية لـ	100 غ	15 غ

السواغات: كحول سيتيلي، لانولين، فانيلين، بارافين سائل، الشكل الدوائي

مرهم أنبوب من 15 غ
الحقة الدوائية العلاجية

مضادات حيوية - مضادات للبكتيريا / مضادات حيوية تؤثر على تركيب البوروتينات.

(D، طب الجلد).

◆ في أية حالة (حالات) يستعمل الدواء؟

هذا الدواء هو مضاد حيوي.

◆ إنتبه!

في أية حالة (حالات) يجب عدم استعمال هذا الدواء؟

◆ يجب ألا يستعمل هذا الدواء في الحالات التالية:

◆ الحساسية تجاه الحامض الفوسيديك أو أحد السواغات.

◆ إنتانات الشدي لدى الإرضاع بسبب احتمال إمتصاص المستحضر من قبل المولود الجديد.

في حال الشك، ينبغي طلب رأي الطبيب أو الصيدلي.

تحذيرات خاصة

لا يترك أبداً بمنازل الأطفال

احتياطات الاستعمال

◆ لا يوضع المرهم على العين.

◆ لا يستعمل المرهم على مساحات كبيرة جداً، وخاصة لدى الطفل الرضيع.

◆ يجب ألا يستعمل المرهم على الإصابات الراشحة المعقنة أو بين الكتلها أو على الفروح الساق.

في حال الشك، لا تردد في طلب رأي الطبيب أو الصيدلي.

تفا علاقت بين الأوية وتفاعلات أخرى

من أجل تفادي تفاعلات محتملة بين عدة أدوية، يجب أن تقوم دائماً بإبلاغ الطبيب أو الصيدلي عن أي علاج آخر تخضع له.

الحمل - الإرضاع

في حالة الإرضاع، يجب ألا يوضع المرهم على الثدي.

بشكل عام، ينبغي دائماً خلال فترة الحمل أو الإرضاع طلب رأي الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال أي دواء.

لأشدة السواغات التي تعتبر معرفتها ضرورية لاستعمال دون خطر لدى بعض المرضى

لانولين، كحول سيتيلي، و يونيايديوكسي الطويل.

◆ كيفية استعمال هذا الدواء؟

الجرعات

في كافة الأحوال، يجب أن تلتزم بدقة بوصفة طبيبك.

أسلوب وطريقة الاستعمال

للاستعمال الجلدي، تطبيق موضعي مع أو بدون ضمادة، ينبغي عدم وضع طبقة سميكة من المرهم.

مدة العلاج

يستعمل العلاج لمدة القصصا أسبوع على سبيل البيان.

وثيرة ووقت إعطاء الدواء

يستعمل مره أو مرتين في اليوم بعد تنظيف المنطقة المصابة بالانتان.

◆ تأثيرات غير مرغوب فيها ومزعجة

مثل كل مستحضر داعم، يمكن أن يؤدي هذا الدواء، لدى بعض الأشخاص، إلى تأثيرات متقاربة الإزعاج.

في بعض الحالات، من الممكن أن تحدث أكرما ناتجة من الحساسية تتوافق أحيانا مع ظهور إصابات بعيدة من منطقة العلاج، يجب بالتالي إيقاف العلاج فوراً وإبلاغ الطبيب.

نظراً لإمتصاص المستحضر عبر الجلد، وخاصة لدى الرضع، ينبغي عدم إستعماله إذا حدثت تأثيرات غير مرغوب فيها على مستوى الكبد.

◆ يجب أن تقوم بإبلاغ الطبيب أو الصيدلي عن أي تغيير غير مرغوب فيه، ومزجج لم تتم الإشارة إليه في هذه النشرة.

◆ الحفظ

يجب عدم تخلي تاريخ إنتهاء صلاحية الاستعمال المذكور على الغلاف الخارجي.

احتياطات خاصة بالحفظ

يجب حفظ الدواء عند درجة حرارة الغرفة.

◆ شروط التسليم:

هذا الدواء مخيف في الأشعة رقم 1

لا يمكن للصيدلي أن يزودكم به إلا بوصفة من الطبيب.

تم وصف هذا الدواء لكم شخصيا في حالة معينة،

- فإنه قد لا يستعمل في حالة أخرى.

- و لا ينبغي إعادة استعماله دون استشارة الطبيب.

- و لا ينبغي أن نعتقه لشخص آخر.

مستوح من طرف **ب. بولومبيديك** بترخيص من **بيوفارما**.

زنتة أميوط دناطيل حي زسلمان الدار البيضاء - المغرب

د. ب. بولومبيديك - صيدلي مسؤول

Fucidin

Fucidine® 2%
pommade Tube de 15 g



Veillez lire attentivement
nouveau. Si vous avez d
ne le donnez à personne

médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à
ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit,
si elle présente les mêmes symptômes que vous.

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

DÉNOMINATION

FUCIDINE® 2%, pommade

COMPOSITION QUALITATIVE

39120

COMPOSITION	Quantité	Par tube de 15 g
Fusidate de sodium	2 g	300 mg
Excipients q.s.p.	100 g	15 g

Excipients : alcool cétylique, lanoline, vaseline, paraffine liquide.

FORME PHARMACEUTIQUE

Pommade, Tube de 15 g.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

ANTI-INFECTIEUX

Antibiotiques-antibactériens / antibiotiques actifs sur la synthèse des protéines

(D : Dermatologie).

◆ DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est un antibiotique.

Ce médicament est préconisé dans les infections cutanées dues à des germes staphylocoques et streptocoques.

◆ ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

• allergie à l'acide fusidique ou à l'un des excipients,

• infections mammaires lors de l'allaitement en raison du risque d'absorption du produit par le nouveau-né.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

• La pommade ne doit pas être appliquée sur l'oeil.

• Ne pas utiliser la pommade sur de trop grandes surfaces, en particulier chez le nourrisson.

• Ne pas utiliser la pommade sur les lésions suintantes macérées, ni dans les plis, ni sur les ulcères de jambe.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

En cas d'allaitement, ne pas appliquer sur le sein.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Lanoline, alcool cétylique, et butylhydroxytoluène.

◆ COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

POSOLOGIE

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie cutanée, application locale avec ou sans pansement. Éviter l'application en couche épaisse.

FREQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ

Une ou deux applications par jour après nettoyage de la surface infectée.

DURÉE DU TRAITEMENT

Limiter le traitement à une semaine, à titre indicatif.

◆ EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÉNANTS :

Dans certains cas, il est possible que survienne un eczéma allergique avec parfois des lésions éloignées du lieu de traitement :

il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

En fonction de l'absorption du produit à travers la peau, en particulier chez le nourrisson, la possibilité d'effets non souhaités au niveau du foie ne peut être exclue.

SIGNALER À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

◆ CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Ce médicament doit être conservé à température ambiante.

◆ CONDITION DE DÉLIVRANCE :

CE MÉDICAMENT EST INSCRIT EN LISTE I

VOTRE PHARMACIEN NE POURRA VOUS EN DELIVRER QUE SUR ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PERSONNELLEMENT PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRÉCISE :

- IL PEUT NE PAS ÊTRE ADAPTÉ À UN AUTRE CAS

- NE PAS LE REUTILISER SANS AVIS MÉDICAL.

- NE PAS LE CONSEILLER À UNE AUTRE PERSONNE.

Fabriqué par **POLYMÉDIC** sous licence Léo Pharma.

Rue Amyot d'Inville, Quartier Arsalane - Maroc

Dr. T. BELABDA : Pharmacien Responsable

ACV02000066-03
C82564-03 Agré 01/22

CONSEILS D'UTILISATION

Vaporiser le produit pur directement sur les zones concernées, ne pas rincer.
Usage externe. Ne pas avaler.

COMPOSITION

Chlorhexidine, Chlorure de benzalkonium, Chlorphénésine, Glycérine, Propylène glycol.

INGREDIENTS

Aqua, propylen glycol, glycerol, benzalkonium chloride, chlorhexidine digluconate, chlorphenesin.

URGO AQUA-PROTECT

URGO AQUA-PROTECT/URGO DISCREET

Apósito precortado para la protección de las

Bandas

sur les plaies superficielles/

sur les plaies superficielles.

BACTOSPRAY

LOT: 2207006

EXP: 10/2025

PPC: 148.00DH

125 ml

Distribué par :
Laboratoire ADDAX MAROC
Avenue Stendhal.RES BENBER
Casablanca - MAROC
www.addaxmaroc.com

IDEMCO

in caso di corpi
di importante fuoriuscita di sangue, di morso,
di puntura con un ago affilato e/o sforcio annure se non si

Docteur Maha BENNANI LAHLOU

Spécialiste en Dermatologie médicale
chirurgicale, esthétique et Laser

Diplômée de la faculté de médecine de Paris
Ancienne interne des Hôpitaux de Paris

الدكتورة مها بناني لحلو

إختصاصية في أمراض الجلد، الشعر، الأظافر
والأمراض التناسلية
طب التجميل - جراحة الجلد - الليزر
خريجة كلية الطب بباريس
طبيبة داخلية سابقا بمستشفيات باريس

Casablanca, le :

15 mars 2023

الدار البيضاء، في

Mr. ELKETTANI Sidi Hamid

69,00

1/ ALCASTERIL

pour la toilette des pieds bien rincer et secher

35,50

2/ TEGUMA CREME

Appliquer le soir entre les orteils

148,05

3/ BACTOSPRAY

pour desinfecter mati et soir

39,70

4/ FUCIDINE POMMADE

matin et soir

43,50

5/ URGO DISCRET

le matin

335,70



Dr. BENNANI Maha
Dermatologue - Venérologue
Rés du Palais Imm. Angle Bd. Ghandi
et Yacoub El Mansour - Casa
Rue Yasmine Imm. Bd. Ghandi
et Yacoub El Mansour - Casa
Tel. : 05 22 94 03 13

إقامة القصر، عمارة "E"، زنقة الياسمين، زاوية شارع غاندي و يعقوب المنصور، الدار البيضاء

Résidence du Palais Imm, "E" 2^{ème} Étage, Rue Yasmine - Angle Bd Ghandi et Yacoub El Mansour, Casablanca 20000

البريد الإلكتروني: Email: drmahabennani@gmail.com - الهاتف: 05 22 94 03 13

I.C.E.: 001927407000026 - I.N.P.E.: 091170431

le port Beauva

Bs SPF
 50

la journée

300
1600
400
2300
350, 20
—————
263570

Docteur Maha BENNANI LAHLOU

Spécialiste en Dermatologie médicale
chirurgicale, esthétique et Laser

Diplômée de la faculté de médecine de Paris
Ancienne interne des Hôpitaux de Paris

الدكتورة مها بناني لعلو

إختصاصية في أمراض الجلد، الشعر، الأظافر
و الأمراض التناسلية
طب التجميل - جراحة الجلد - الليزر
خريجة كلية الطب بباريس
طبيبة داخلية سابقا بمستشفيات باريس

20/03/2023

Casablanca, le : في : الدار البيضاء،

Note d'honoraire

Mr. ELKETTANI Sidi Hamid

1600 dhs pour exeresse sous anesthesie locale

de 5 keratoses du visage et du cou

Dr. BENNANI Maha
Dermatologue - Vénérologue
Res du Palais Imm, "E" 2^{ème} Étage
Rue Yasmine Angle Bd. Ghandi
et Yacoub El Mansour - Casa
Tel 05 22 94 03 13

إقامة القصر، عمارة "E"، زنقة الياسمين، زاوية شارع غاندي و يعقوب المنصور، الدار البيضاء

Résidence du Palais Imm, "E" 2^{ème} Étage, Rue Yasmine - Angle Bd Ghandi et Yacoub El Mansour, Casablanca 20000

Tél. : 05 22 94 03 13 - الهاتف : Email : drmahabennani@gmail.com - البريد الإلكتروني :

I.C.E.: 001927407000026 - I.N.P.E.: 091170431

Dr. Amal BENKIRANE

Professeur d'Anatomie Pathologique
Ex. Enseignante à la Faculté de
Médecine de Casablanca



**CENTRE DE
PATHOLOGIE
SPÉCIALISÉE
CASABLANCA**

CASAPATH

Dr. Lamia JABRI

Professeur d'Anatomie Pathologique
Ex. Enseignante à la Faculté de
Médecine de Casablanca

RECU LE : 23/03/2023
EDITE LE : 28/03/2023

NOM & PRENOM : EL KETTANI SIDI HAMID
PRESCRIPTEUR : Dr. BENNANI LAHLOU MAHA
AGE : 72 ans
Code Patient : 108475
N/REF : 30323146
ORGANE : PEAU

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Exérèse - shaving - kératose du visage avec modification de couleur.

COMPTE RENDU ANATOMOPATHOLOGIQUE

Biopsie exérèse cutanée en plusieurs fragments mesurant entre 0,1 et 0,6 cm.

A l'examen histologique, l'épiderme est hyperkératosique, orthokératosique, hyperacanthosique et papillomateux avec des kystes cornés. Les cellules malpighiennes, très régulières, ont une morphologie très proche des cellules basales avec un pigment mélanique assez abondant.

Le derme superficiel est fibreux et contient quelques cellules inflammatoires mononucléées à disposition périvasculaire.

CONCLUSION :

- Kératose séborrhéique.
- Absence de signes de malignité.

Signé : Dr. Amal BENKIRANE
Pr. Amal BENKIRANE
Anatomo-Pathologiste
Centre de Pathologie Casapath
5, Rue des Hôpitaux - Rés. du Parc Casablanca
Tél.: 05 22 22 13 46 / 66 - Fax: 05 22 22 14 24

Docteur Maha BENNANI LAHLOU

Dermatologie - Vénérologie

Cosmétologie - Laser

Diplômée de la faculté de médecine de Paris

Ancienne interne des Hôpitaux de Paris

الدكتورة مها بناني لعلو

إختصاصية في أمراض الجلد، الشعر، الأظافر

و الأمراض التناسلية

طب التجميل - جراحة الجلد - الليزر

خريجة كلية الطب بباريس

طبيبة داخلية سابقا بمستشفيات باريس

COMPTE RENDU OPÉRATOIRE

patient: Mr. ELKETTANI Sidi Hamid A Casablanca, le 20/03/2023

Intervention réalisée sous anesthésie locale.

Asepsie réalisée a la betadine en solution dermique et mise en place d'un champ stérile.

Infiltration sous cutanée de 2 ml de lidocaïne a 2 % des 5 lesions

Incision en quartier d'orange et exérèse en monobloc des 5 lesions

Hémostase rigoureuse.

Mise en place d'un pansement gras.

1 pièce opératoire a été adressée pour examen histologique.

Dr. BENNANI Maha
Dermatologue - Vénérologue
Rés du Palais, Imm. "E", 2ème Etage
Rue Yasmine Angle Bd. Ghandi
et Yacoub El Mansour - Casa
Tél / Fax : 05 22 94 03 13



CENTRE DE PATHOLOGIE SPÉCIALISÉE CASABLANCA

6, rue des Hôpitaux - Résidence du Parc - 1er étage 20360 - Casablanca
Tel: 0522 22 13 46/66 - Fax : 0522 22 14 24 - Email : labocasapath@gmail.com
Patente 36333531 ICE 001624540000044 IF 40204512

FACTURE

REF : 23/03969

Date de facturation 23 / 03 / 2023
Médecin traitant Dr. BENNANI LAHLOU MAHA
Patient EL KETTANI SIDI HAMID - 108475
Demande **H30323146 - 23/03/2023**

Liste des examens

PETITE PIECE

Total 400,00 Dhs
coefficient-P 364
Mode de règlement Espèce

Arrêtée la présente facture à la somme de : QUATRE CENTS DIRHAMS

Centre de Pathologie Spécialisée Casablanca
6, Rue des Hôpitaux - Résidence du Parc
1er Etage - 1 - Casablanca
Tél: 05 22 22 13 46 - Fax: 05 22 22 14 24
CASPAPH