

## ~~RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS~~

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W21-713430

A 570.75

Maladie       Dentaire       Optique       Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)  
Matricule : 4514      Société : R.A.M.

Actif       Pensionné(e)       Autre :

Nom & Prénom : TARITALI MOHAMED

Date de naissance : 24/03/61

Adresse : Ida m'm

Tél. : 0661187159      Total des frais engagés : 2283,8 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 02/04/2023      Nom et prénom du malade : DR. FATHALI MOHAMED Age : 59

Lien de parenté :  Lui-même       Conjoint       Enfant

Nature de la maladie : Doncure Augment de st

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA      Le : 01/04/2023

Signature de l'adhérent(e) :

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
27/03/2023	consultation	300 DT	300 DT	INP - DR. BERNARD HEPATO - GASTRO ENTE FIBROSCOPIE - ECHO MEMOROIDES - REC Centre Commercial NADIA : 98.95.12
11/08/2023	consultation	300 DT	300 DT	

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 Dr. Sadiq Khan Chandi - Chandi 22/03/2014	07/03/23	138,60

#### **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**



#### AUXILIAIRES MEDICAUX

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins

**Important:**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ONDE.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000	G 21433552 00000000	B 35533411 11433553	COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



# **Dr. BERRADA Abderrahim**

Diplômé de la Faculté de médecine de REIMS (FRANCE)

**HEPATO - GASTRO - ENTEROLOGUE**

(Fibroscopie - Coloscopie)

**Diplômé d'échographie**

**Diplômé de chirurgie proctologique**

(Hémorroïdes, Fissures, fistules de l'anus)

**Diplômé de Régimes - Nutritions Diététiques**

(Obésité - maigreur)

Ex. Attaché au C. H. U. de REIMS

**الدكتور برادة عبد الرحيم**

خريج كلية الطب رانس بفرنسا  
اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي

(الكشف بالمنظار)  
الكشط بالمنظار

مجاز في علاج و جراحة المخرج  
(البواسير والدمى)

مجاز في الكشف بالتلفرزة  
مجاز في وقاية وعلاج أمراض التغذية

(السمنة والضعف)

طبيب مساعد سابق بمستشفيات رانس

Casablanca, le ..... 07/03/2023 ..... الدار البيضاء، في

Mr Tarhali Mohamed

37.0°  
DULASTAN  
2 CP X 2 / JOUR APRES REPAS



2 0 2  
1 1 1

28.8°  
VITANEVRIL FORT  
1 CP X 3 / JOUR AVANT REPAS




— 0 —

72.8°  
ALGANTIL POMMADÉE  
1 APPLICATION X 2 / JOUR



T = 38.6°



PHARMACIE BOUZOUBAA  
Mr. Bouzoubaa Mouhssine  
283, Bd. Gharsendi - Casablanca  
Tél: 0522 98 44 14

مركز تجاري نادية - عمارة 4 - الشقة 4 - الطابق الأول - شارع ابراهيم الرو丹ي (طريق الجديدة سابقا) المعاريف - الدار البيضاء 20.100

Centre Commercial NADIA, Imm. 4, Appt 4, 1<sup>er</sup> Etage, Bd Brahim Roudani (Ex. Route d'El Jadida) - Maârif Extension - Casablanca 20.100

Tél. : 05 22 98 95 12 / 05 22 98 35 77 - الهاتف: 05 22 98 35 77 - Fax : 05 22 98 35 77 - الفاكس :

E-mail : berradagastro@hotmail.fr

# DULASTAN® 500mg/2mg

Comprimé  
Boîte de 20

DULASTAN®

دولاستان®

Boîte de 20 comprimés

38,00

علبة من 20 قرصاً

ide

ment.

à votre médecin ou à votre pharmacien,  
même en cas de symptômes

mentionnés dans cette notice.

DULASTAN®

500mg/2mg

Boîte de 20 comprimés



- Veuillez lire attentivement cette notice.
- Gardez cette notice.
- Si vous avez toute question, consultez votre pharmacien.
- Ce médicament vous ressemble-t-il ? Si oui, parlez-en à votre médecin.
- Si l'un des effets indésirables mentionnés dans cette notice vous concerne, consultez votre pharmacien.

## COMPOSITION :

Paracétamol.....

Thiocolchicoside.....

Excipients : .....

Excipients à effet notoire : Amidon de blé, lactose.

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est préconisé dans :

- Traitement symptomatique de la douleur d'origine rhumatismale ou musculaire en traumatologie et gynécologie.
- Traitemen t d'appoint des contractures douloureuses au cours :
  - des affections vertébrales dégénératives et des troubles statiques vertébraux : torticolis, dorsalgies, lombalgie s.
  - des affections traumatologiques et neurologiques (avec spasticité).

## ATTENTION !

## DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas :

- d'hypersensibilité au thiocolchicoside ou au paracétamol,
- de grossesse,
- d'allaitement,
- d'insuffisance hépatocellulaire,
- d'hypersensibilité à l'un des excipients du produit,
- chez l'enfant de moins de 15 ans.

## MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique et/ou rénale, d'affections cardiaques ou pulmonaires, éviter les traitements prolongés.
- Pour éviter le risque de surdosage au paracétamol, vérifier l'absence de paracétamol dans la composition d'autres médicaments.
- Le thiocolchicoside doit être administré avec prudence chez les patients épileptiques ou à risque de convulsions.
- En cas de diarrhée, prévenez votre médecin qui pourra éventuellement réajuster la posologie.
- Éventuellement, ingérer les comprimés avec un pansement gastrique.
- Ne pas dépasser la dose prescrite.
- Il est conseillé de consulter un médecin pour des traitements excédant 7 jours.

## EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et de galactose, ou de déficit en lactose.

L'amidon de blé peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes allergiques au blé ainsi que des intolérances chez les personnes souffrant de maladies coeliaques.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

DULASTAN® peut augmenter la toxicité du chloramphénicol.

En cas de traitement avec des anticoagulants oraux, on peut l'administrer occasionnellement comme analgésique d'élection.

## Examens paracliniques :

La prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin par la méthode à l'acide phosphotungstique et le dosage de la glycémie par la méthode à la glucose oxydase-peroxydase.

## 6. موانع الاستعمال

حالات التالية:

PPV

LOT

PER

فيتامين.  
هذا الدواء خلال الرضاعة  
ر ذلك في حالة الشك من  
صيوليكوم

28/80

من غير مرفوب فيه خاصة الآثار التي لا تتضمنها  
هذه النشرة.

8. احتياطات خاصة:  
بسبب تواجد الكتوز والسكروز لا ينصح بأخذ هذا الدواء في  
حالة حساسية للفركتوز وتواجد الغالاكتوز بكثرة في الدم  
ناتج عن مرض خلقي أو أعراض عدم امتصاص الغالاكتوز  
والغالاكتوز أو نقص في الكتاز (أمراض أيضية نادرة).  
قائمة السواغ الذي من الواجب معرفته لاستعمال بدون خطر  
عند بعض المرضى:  
الاكتوز والسكروز.  
احتياطات الاستعمال:

في حالة الشك، لا تترددوا في استشارة طبيبك أو صيوليكوم

9. التفاعلات الدوائية:  
لفرض تفادي تفاعلات بين الأدوية يتعين إطلاع طبيبك أو  
صيوليكوم على أي علاج آخر تأخذونه

10. الحمل-الرضاعة:  
ينصح بعدم أخذ فيتافيريل " قوي عند المرأة المرضعة و  
الحامل، في حالة اكتشاف الحمل أثناء العلاج بفيتافيريل  
قوي أطلعوا طبيبك على العموم يتعين خلال الحمل أو  
الرضاعة استشارة طبيبك أو صيوليكوم قبل استعمال أي دواء.

11. السائقون ومستعملو الآلات:

12. ما يجب القيام به في حالة الإفراط في الجرعة:  
13. ما يجب القيام به في حالة نسيان أو الإفراط في الجرعة:  
14. الحفظ:

لا تتجاوزوا التاريخ المبين على الغلاف الخارجي  
لا يترك في متناول الأطفال  
تاريخ المراجعة: مارس 2015

مخابر سانتيميدوك  
22- زنقة الزبير بن العوام  
الصخور السوداء، الدار البيضاء

100 ملغ

VITANEVRIL® FORT 10%

20 comprimés pelliculés



الرجاء قراءة:  
- احتفظ بهذه الصيغة  
- إذا كانت لديك أي استئنة إضافية أو أي شكوك. استشر  
طبيب أو الصيدلي للمزيد من المعلومات  
- لقد وصف هذا الدواء لك أنت شخصياً. لا يجرد بك إعطاؤه  
لآخرين فقد يؤذيهم حتى لو كانت عوارضهم مثل عوارضك

1. الشكل و  
علبة تحتوي  
العلبة  
- احتفظ بهذه الصيغة  
- إذا كانت لديك أي استئنة إضافية أو أي شكوك. استشر  
طبيب أو الصيدلي للمزيد من المعلومات  
- لقد وصف هذا الدواء لك أنت شخصياً. لا يجرد بك إعطاؤه  
لآخرين فقد يؤذيهم حتى لو كانت عوارضهم مثل عوارضك

2. التركيب النوعي والكمي:  
بنفوتيامين ..... 100 ملغ ..... ما يكفي لقرص واحد  
السواغ ..... قائمة السواغ الذي من الواجب معرفته لاستعمال بدون خطر  
عند بعض المرضى:الاكتوز والسكروز

3. الصنف الصيدلي والعلاج:  
ينتسب بنفوتيامين إلى مجموعة الأدوية ذات التأثير على  
الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي.

4. الوصف:  
- علاج البري بري،  
- الوقاية من نقص الفيتامين B1 الناتج عن انخفاض في

الاستهلاك الغذائي على سبيل المثال : سوء الامتصاص،  
الحمية الغذائية الفنية ..... بالبروتينات، التغذية بالحقن و  
بالاشتراك مع غيرها من الفيتامينات.

- ينصح به الأشخاص الذين يشتكون من التهاب الأعصاب  
و يعانون للمسروبات الكهولية،  
- ينصح به في حالة التهاب الأعصاب،

- يستخدم بتركيزات عالية في بعض متلازمات الألم.  
5. المقدار/طريقة الاستعمال:

المقدار:  
2 إلى 4 أقرص خلال 24 ساعة.  
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك  
طريقة الاستعمال:  
عن طريق الفم  
مدة العلاج:  
تقيدوا بوصفة طبيبك

IMPIMEPEL 10/18 (105 x 120) mm

# ALGANTIL®

(Ibuprofène)

ALGANTIL®

ALGANTIL®  
GEL

100 g

5 g  
0 g

PPV 72DH80

100 g



6 118000 031000

## POUR APPLICATION

nté, notamment autres

ant d'allergie à l'un des excipients,

- peau lésée, quelle que soit la lésion : lésions suintantes, eczéma, lésion infectée, brûlure ou plaie.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Faites attention avec Algantil® gel :

- Ne pas appliquer sur les muqueuses, ni sur les yeux.
- L'apparition d'une éruption cutanée après application du gel impose l'arrêt immédiat du traitement.
- En cas d'utilisation fréquente par un professionnel de santé, le port de gants est recommandé.

Respecter les conseils d'utilisation :

- ne jamais appliquer une dose supérieure à celle qui est recommandée.
- ne pas appliquer sur une surface étendue du corps.
- respecter la fréquence et la durée de traitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

#### Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé pendant les 5 PREMIERS MOIS de la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

A partir du 6<sup>ème</sup> mois de la grossesse, vous ne devez EN AUCUN CAS prendre de VOUS-MÊME ce médicament. Bien que le passage de ce médicament dans la circulation générale soit faible, il ne peut être exclu. Dans ce cas, l'effet de ce médicament sur votre enfant pourrait avoir des conséquences graves, notamment au plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela, même avec une seule application.

#### Allaitemt

Les A.I.N.S passant dans le lait maternel, par mesure de précaution, il convient d'éviter de les administrer chez la femme qui allaita.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

### COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

La posologie usuelle est de 1 application, 3 fois par jour.



## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

## DUREE RECOMMANDEE D'UTILISATION

Durée moyenne d'utilisation 7 jours.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec et frais.

Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805312DMP/20UCAv1

**Deva**  
Pharmaceutique

146-147 Zone industrielle Tit Mellil, Casablanca

**CLARIL®**  
Clarithromycine 500 mg  
Boîte de 14 comprimés  
**PPV : 160,00 DH**

75x60x20



6 118000191001

**CLARIL®**  
comprimé pelliculé  
Clarithromycine 250 mg - 500 mg

08/14.  
CLARIL 250 mg  
250 mg  
1 comprimé

CLARIL 500 mg  
500 mg  
1 comprimé

6118000191001

Pei : jaune de quinoléine.

#### PROPRIÉTÉS :

Antibiotique de la famille des macrolides.

#### INDICATIONS :

Traitements des infections dues aux germes définis comme sensibles dans les manifestations :

- Sinusites aiguës.
- Exacerbations des bronchites chroniques.
- Pneumopathies communautaires non sévères.
- Traitement curatif des infections à Mycobacterium avium chez les patients infectés par le VIH.
- Angines documentées à streptocoque A bêta-hémolytique.
- Surinfections des bronchites aiguës.
- Infections cutanées bénignes.
- Infections stomatologiques.
- En association à un autre antibiotique et à un antisécrétorien, éradication de Hélicobacter pylori en cas de maladie ulcéreuse gastroduodénale.

#### CONTRE-INDICATIONS :

##### Absolues :

- Hypersensibilité à la clarithromycine ou à l'un des composants.
- Allergie aux macrolides.
- Alcaloïdes de l'ergot de seigle (dihydroergotamine, ergotamine), cisapride, mizolastine, pimozide, bérpidil.

##### Relatives :

- Bromocriptine, cabergoline et pergolide, tacrolimus, ebastine, tolterodine, halofantrine.
- Grossesse et allaitement.

#### POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

- Angines : 500 mg/j, en 2 prises pendant 5 jours.
- Infections stomatologiques et cutanées : 500 mg/j en 2 prises.
- Infections bronchiques : 500 mg à 1 g/j en 2 prises pendant 7 jours.
- Sinusites aiguës, pneumopathies, bronchiques chroniques : 1 g/j en 2 prises pendant 7 jours.
- Eradication de Helicobacter pylori : 500 mg soit 1 comprimé associé à 1 g d'amoxicilline et 20 mg d'omeprazole matin et soir pendant 7 jours. La trithérapie sera suivie d'un traitement antisécrétorien d'une durée de 3 à 5 semaines.
- Respecter la prescription médicale.

- Avaler les comprimés avec un verre d'eau de préférence au cours des repas.

#### ADAPTATION DE LA POSOLOGIE :

- Chez les insuffisants rénaux ( clairance de créatinine < 30 ml/min ) réduire la posologie de moitié.

#### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

##### Mises en garde :

- Tenir compte de la possibilité de survenue de colites pseudomembraneuses.
- Associer obligatoirement la clarithromycine à d'autres antibiotiques dans le traitement des infections VIH (+).
- Ne pas associer la clarithromycine à d'autres médicaments oto-toxiques, et en particulier les aminosides.

##### Précautions d'emploi :

- En cas de survenue d'acouphènes ou de baisse de l'acuité auditive, un audiogramme devra être réalisé en plus d'une modification posologique.
- Insuffisance hépatique sévère.
- Insuffisance rénale sévère.
- Prendre en compte la possibilité de résistance croisée entre la clarithromycine et les autres macrolides, et d'autres antibiotiques tels que : la lincomycine et la clindamycine.

*En cas de doute, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.*

**CLARIL® est un médicament, ne pas laisser à la portée des enfants.**

#### SURDOSAGE :

En cas de surdosage, un lavage gastrique et un traitement symptomatique s'imposent.

#### EFFETS INDÉSIRABLES :

- Manifestations digestives : nausées, vomissements, gastralgies, diarrhée.
- Candidose buccale, glossite, stomatite.
- Manifestations cutanées allergiques.
- Hépatite cholestastique due à une augmentation transitoire des transaminases ASAT-ALAT.
- Des cas d'acouphènes et d'hypoacusie dus à une posologie > à 1 g/j sur des périodes de traitement prolongées, réversibles à l'arrêt du traitement.
- Rares cas de dysgueusies.
- Colorations dentaires réversibles avec des soins dentaires.

Tout autre effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice devra être signalé systématiquement à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

**CLARIL®** est déconseillé pendant la grossesse sauf nécessité absolue.

Interrompre l'allaitement en cas de survenue de troubles digestifs chez le nouveau-né allaité.

En cas de prise de cisapride par le nouveau-né allaité, la clarithromycine est formellement interdite.

#### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Associations contre-indiquées :** Alcaloïdes de l'ergot de seigle vasoconstricteurs, Cisapride, Pimozide, Bépridil, Mizolastine.

**Associations déconseillées :** Agonistes dopamnergiques, Ebastine, Tacrolimus, Tolterodine, Halofantrine.

**Associations nécessitant des précautions d'emploi :** Anticoagulants oraux, Ciclosporine, Digoxine, Midazolam, Triazolam, Rifabutine, Atorvastatine, Céfirostatine, Simvastatine, Carbamazépine, Antiprotozoaires (indinavir, ritonavir), Disopyramide.

**Associations à prendre en compte :** Théophylline (base et sels) et Aminophylline.

#### CONDITIONS DE CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

LISTE I - Délivré uniquement sur ordonnance.

- Comprimé à 250 mg Boîte de 14 : AMM N : 100/14 DMP/21/NCF

- Comprimé à 500 mg Boîte de 14 : AMM N : 101/14 DMP/21/NCF

Date de révision de la notice : Avril 2012



# NEOMOX®

## Amoxicilline

Veuillez lire attentivement cette notice avant médicamenteusement car elle contient des informations pour vous.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de Si vous avez toute autre question, si vous avez demandé plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourra lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Que contient cette notice ?

1. QU'EST-CE QUE NEOMOX®, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE NEOMOX® ?
3. COMMENT PRENDRE NEOMOX® ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER NEOMOX® ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

### 1. QU'EST-CE QUE NEOMOX®, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :

NEOMOX® a pour principe actif l'amoxicilline : antibiotique bactéricide à large spectre de la famille des bêta-lactamines du groupe des aménopénicillines.

Indications thérapeutiques :

Traitements des infections dues aux germes reconnus sensibles à l'amoxicilline :

En général : **Adulte, Enfant et Nourrisson** : Traitement initial : Pneumopathies aiguës. Surinfections de bronchites aiguës et exacerbation de bronchites chroniques. Infections ORL (otite, sinusite, angine) et stomatologiques. Infections urinaires. Infections génitales masculines et infections gynécologiques. Infections digestives et biliaires. Maladie de Lyme - Traitement de relais de la voie injectable des endocardites, septicémies.

Traitement prophylactique de l'endocardite bactérienne.

**Adulte** :

Eradication de Helicobacter pylori en cas d'ulcère gastroduodénal.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE NEOMOX® ?

Ne prenez jamais NEOMOX® dans les cas suivants:

Contre-indications absolues :

En cas d'allergie ou antécédent d'allergie aux antibiotiques de la famille des bêta-lactamines (pénicillines et céphalosporines) ou à l'un des autres constituants : La prise des gélules et prise des comprimés dispersibles sans les disperser dans l'eau sont contre indiquées chez les enfants de moins de 7 ans en raison du risque de fausse route.

### EN CAS DE DOUTE, DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec NEOMOX® :

**Mise en garde spéciale** : allergie aux pénicillines.

Précautions d'emploi : La survenue de toute manifestation allergique impose l'arrêt du traitement et la mise en place d'un traitement adapté.

- Réactions d'hypersensibilité (anaphylaxie) exceptionnellement sévères et parfois fatales.

Un interrogatoire préalable est nécessaire.

- En cas d'insuffisance rénale, adapter la posologie en fonction de la clairance de la créatinine ou de la créatininémie.

En cas d'administration de doses élevées d'amoxicilline, un apport hydrique suffisant doit être assuré, pour réduire les risques de cristallurie.

- Traitement de la maladie de Lyme : des réactions de Jarisch-Herxheimer peuvent survenir.

- Tenir compte de la teneur en sodium de la poudre pour suspension buvable, chez les personnes suivant un régime hyposodé strict.

- La poudre pour suspension buvable contient du sorbitol. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).

### EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

NEOMOX® EST UN MEDICAMENT : NE JAMAIS LE LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

Autres médicaments et NEOMOX® :

on d'autres médicaments : médecin ou pharmacien si vous prenez d'autres que : probénécide, tétracyclines, aurovagulants, etc., allopurinol.

objets : sans objet.

léggalement : si administré, si besoin, chez la femme enceinte

rompre le traitement à la survenue d'une diarrhée, de l'éruption cutanée due à la nourriture ou à la boisson utilisée.

**En cas d'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines :**

NEOMOX® peut provoquer des effets indésirables comme des réactions allergiques, des vertiges et des convulsions susceptibles de réduire votre capacité à conduire.

Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines à moins que vous vous sentiez bien.

### 3. COMMENT PRENDRE NEOMOX® ?

#### POSOLOGIE :

Les formes 1 g sont réservées pour les posologies à 2 g par jour. Poudres pour suspension buvable à 500 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 125 mg/5 ml : une cuillère mesure (5 ml) contient 500 mg, 250 mg, 125 mg d'amoxicilline.

**Adulte normoréna :** La posologie usuelle est de 1 à 1,5 ou 2 g/jour en 2 à 3 prises.

\* Angines : 500 mg toutes les 12 heures, pendant 10 jours. Dans l'angine aiguë streptococcique, un traitement de 6 jours à la posologie de 2 g/jour en 2 prises assure l'éradication du streptocoque :

\* Pneumopathies aiguës : 3 g/jour, soit 1 g toutes les 8 heures ; Maladie de Lyme : Erythème chronique migrant strictement isolé : 4 g/24 heures.

\* Endocardites et septicémies (relais de la voie injectable) : jusqu'à 6 g par 24 heures en un moins 3 prises.

\* Prophylaxie de l'endocardite bactérienne : Protocole oral : 3 g en prise unique, administrés dans l'heure qui précède le geste à risque : Relais du protocole parentéral :

\* 1 g par os 6 heures après l'administration parentérale.

\* Eradication de Helicobacter pylori en cas de maladie ulcéreuse gastroduodénale de l'adulte :

Traitement séquentiel : IPP (20 mg x 2/j) + Amoxicilline (1 g x 2/j) pendant 5 jours puis IPP (20 mg x 2/j) + Clarithromycine (500 mg x 2/j) + Métronidazole (500 mg x 2/j) pendant 5 jours.

**Enfant et Nourrisson normoréna :** La posologie usuelle est la suivante :

- Enfant < 30 mois : 50 à 100 mg/kg/jour, en 3 prises espacées de 8 heures ;

- Enfant > 30 mois : 25 à 50 mg/kg/jour en 2 ou, mieux, en 3 prises, sans dépasser la posologie de 3 g/jour.

Pour les infections plus sévères, (endocardites et septicémies) : la posologie peut être augmentée jusqu'à 150 mg/kg/jour en 3 ou 4 prises, sans dépasser 6 g/jour.

Cas particuliers :

\* Maladie de Lyme : - Erythème chronique migrant strictement isolé : 50 mg/kg/24 h - En cas de manifestations systémiques évoquant une dissemination hématoïgène de Borrelia burgdorferi, les posologies peuvent être augmentées jusqu'à 6 g/24 h, pendant 15 à 21 jours.

\* Prophylaxie de l'endocardite bactérienne : - Protocole oral : 75 mg/kg en prise unique, administrés dans l'heure qui précède le geste à risque : - Relais du protocole parentéral :

25 mg/kg par os 6 heures après l'administration parentérale ;

\* Angines : dans l'angine aiguë streptococcique chez l'enfant de plus de 30 mois, un traitement de 6 jours à la posologie de 50 mg/kg/jour en 2 prises assure l'éradication du streptocoque.

Insuffisant rénal : Adapter la dose en fonction de la clairance de la créatinine.

#### MODE D'ADMINISTRATION :

NEOMOX® peut être pris indifféremment avant, pendant ou après les repas.

- **Suspension** : Ajouter de l'eau minérale non gazeuse jusqu'au niveau indiqué sur le flacon. Bien agiter avant chaque usage. Utiliser la cuillère mesure.

- **Gélules** : Avaler les gélules sans les ouvrir avec un peu d'eau.

- **Comprimés dispersibles** : mettre le comprimé dans un verre, ajouter de l'eau, mélanger et boire. Chez l'adulte, le comprimé dispersible peut aussi être pris directement avec un demi-verre d'eau.

Symptômes et instructions en cas de surdosage :

**Si vous avez pris plus de NEOMOX® que vous n'auriez dû :**

Les manifestations de surdosage peuvent être neuropsychiques, rénales (cristallurie) et gastro-intestinales.

Le traitement en est symptomatique en surveillant particulièrement l'équilibre hydro-électrolytique.

L'amoxicilline peut être éliminée par hémodialyse.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

**Si vous oubliez de prendre NEOMOX® :**

Ne prenez pas la dose suivante trop tôt ; attendez environ 4 heures avant de prendre la dose suivante.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

**Si vous arrêtez de prendre NEOMOX® : sans objet.**

**Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.**

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES ÉVENTUELS ?

#### Description des effets indésirables :

Comme tous les médicaments NEOMOX® est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- Possibilité de : manifestations allergiques, notamment urticaire, éosinophilie, œdème de Quincke, gène respiratoire, exceptionnellement choc anaphylactique ;

Erptions cutanées maculopapuleuses d'origine allergique ou non. Exceptionnellement, syndrome de Stevens-Johnson, d'érythème polymorphe et de dermatite bulleuse ou exfoliative ; Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, candidose.

- Rarement : Colite pseudomembraneuse ou manifestations d'origine immunoallergique telles que : augmentation modérée et transitoire des transaminases sériques, nphrite interstitielle aigüe, anémie, leucopénie, thrombopénie réversibles.

**SIGNALISEZ A VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN TOUT AUTRE EFFET INDESIRABLE NON MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.**

### 5. COMMENT CONSERVER NEOMOX® ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

#### Conditions de conservation :

NEOMOX® doit être conservé à l'abri de l'humidité et à une température inférieure à 25°C.

La suspension reconstituée doit être conservée au réfrigérateur entre 2° et 8° C pendant la durée du traitement et doit être utilisée dans les 7 jours.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

### 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

#### Que contient NEOMOX® Comprimés dispersibles 1g :

La substance active est l'amoxicilline (sous forme de trihydrate). Excipients q.s.p. .... 1 comprimé.

Excipients à effet notable : sodium.

#### Que contient NEOMOX® Comprimés dispersibles 500 mg :

La substance active est l'amoxicilline (sous forme de trihydrate). Excipients q.s.p. .... 1 comprimé.

Excipients à effet notable : sodium.

#### Que contient NEOMOX® Comprimés dispersibles 250 mg :

La substance active est l'amoxicilline (sous forme de trihydrate). Excipients q.s.p. .... 1 comprimé.

Excipients à effet notable : sodium.

#### Que contient NEOMOX® Gélules 500 mg :

La substance active est l'amoxicilline (sous forme de trihydrate). Excipients q.s.p. .... 1 gélule.

#### Que contient NEOMOX 125 mg/5ml, Poudre pour suspension buvable :

La substance active est l'amoxicilline (sous forme de trihydrate). FU/60 ml FI/100 ml

Excipients q.s.p. .... 9 g ..... 15 g

Excipients à effet notable : sodium, sorbitol.

#### Que contient NEOMOX 250 mg/5ml, Poudre pour suspension buvable :

La substance active est l'amoxicilline (sous forme de trihydrate). FU/60 ml FI/100 ml

Excipients q.s.p. .... 9 g ..... 15 g

Excipients à effet notable : sodium, sorbitol.

#### Que contient NEOMOX 500 mg/5ml, Poudre pour suspension buvable :

La substance active est l'amoxicilline (sous forme de trihydrate). FU/60 ml FI/100 ml

Excipients q.s.p. .... 9 g ..... 15 g

Excipients à effet notable : sodium, sorbitol.

#### Forme pharmaceutique et contenu :

- Comprimés dispersibles à 1 g - Btes/12, 14 et 24 ;

- Comprimés dispersibles à 500 mg - Btes/12 et 24 ;

- Gélules à 500 mg - Bte/12.

- Poudre pour suspension buvable à 500 mg/5 ml - FU/60 ml et 100 ml ;

- Poudre pour suspension buvable à 250 mg/5 ml - FU/60 ml et 100 ml ;

- Poudre pour suspension buvable à 125 mg/5 ml - FU/60 ml et 100 ml ;

**Nom et adresse de l'EPI titulaire de l'AMM MAROC :** Laboratoires pharmaceutiques GALENICA, N 13, G 5 - Z.I. Ouled Saleh - Bouskoura - 20180 - Casablanca - Maroc

**Nom et adresse du fabricant (quand celui-ci n'est pas titulaire de l'AMM) :** Néant.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée :** Février 2019.

#### Conditions de prescription et de délivrance :

Liste 1 : uniquement sur ordonnance

Informations réservées aux professionnels de santé : Sans objet.

~~OEDES~~ 20mg

28 gélules



LOT 211322  
EXP 04/2024  
PPV 99.00DH

**Forme pharmaceutique et présentation:**  
OEDES® 20 mg, Microgranules gastro-résistants en gélules, boîtes de 7, 14, 28 et 56.

**2. Composition du médicament :**

**Principe actives:**

Oméprazole ..... 20 mg

**EXCIPIENTS :** q.s.p une gélule.

Excipient à effet notoire : Saccharose.

**3. Classe phamaco-thérapeutique :**

OEDES® 20 mg contient la substance active Oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

**4. Indications thérapeutiques**

OEDES® 20 mg est utilisé pour traiter les affections suivantes :  
**Chez les adultes :**

• le reflux gastro-oesophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

• les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).

• les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

• les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). OEDES® 20 mg peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.

• un excès d'acide dans l'estomac dû à une grossesse au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)

**Chez les enfants :**

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel ≥ 10 kg :  
• le reflux gastro-oesophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

• Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

**Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents :**

• les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, le médicament peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

**5. Posologie, Mode d'emploi(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement :**

Veillez toujours à prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. Votre médecin vous dira combien de gélules vous devez prendre et pendant combien de temps vous devrez les prendre. Cela dépendra de votre état de santé et de votre âge.

**Posologie :**

Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous:

**Utilisation chez les adultes :**

**Traitement des symptômes du reflux gastro-oesophagien tels que brûlures et régurgitation acide :**

Si votre médecin constate que votre œsophage a été légèrement endommagé, la dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre une dose supplémentaire de 40 mg pendant 8 semaines supplémentaires si votre œsophage n'a pas encore cicatrisé.

La dose recommandée une fois que votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour.

Si votre œsophage n'a pas été endommagé, la dose usuelle est de 10 mg une fois par jour.

**Traitement des ulcères dans la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) :**

La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 2 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre la même dose pendant 2 semaines supplémentaires si votre ulcère n'a pas été cicatrisé.

Si l'ulcère n'a pas été complètement cicatrisé, la dose peut être augmentée à 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

**Traitement des ulcères de l'estomac (ulcère gastrique) :**

La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre la même dose pendant 4 semaines supplémentaires si votre ulcère n'a pas été cicatrisé.

Si l'ulcère n'est pas complètement cicatrisé, la dose peut être augmentée à 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

**Prévention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique :**

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut augmenter la dose à 40 mg une fois par jour.

**Traitement de l'ulcère duodénal et gastrique provoqué par une infection par Helicobacter pylori :**

La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

**Prévention des ulcères duodénal et de l'estomac si vous prenez des AINS :**

La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour.

**Traitement et prévention des ulcères provoqués par une infection par Helicobacter pylori :**

La dose recommandée est de 20 mg OEDES® 20 mg deux fois par jour pendant une semaine.

Votre médecin va vous prescrire en même temps deux antibiotiques

parmi l'amoxicilline, la clarithromycine et le métronidazole.

**Traitement d'un excès d'acide dans l'estomac dû à une grossesse au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison) :**

La dose recommandée est de 60 mg par jour.

Votre médecin peut ajuster la dose en fonction de vos besoins et il décidera également de la durée pendant laquelle vous prendrez le médicament.

**Utilisation chez les enfants et adolescents :**

**Traitement des symptômes du reflux gastro-oesophagien tels que brûlures et régurgitations acides :**

Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant plus de 10 kg peuvent prendre OEDES® 20 mg. La posologie dépendra du poids de l'enfant et le médecin décidera de la dose correcte à administrer.

**Traitement et prévention des ulcères provoqués par une infection par Helicobacter pylori :**

Les enfants âgés de plus de 4 ans peuvent prendre OEDES® 20 mg.

La posologie dépendra du poids de l'enfant et le médecin décidera de la dose correcte à administrer.

Votre médecin prescrira à votre enfant deux antibiotiques en même temps : l'amoxicilline et la clarithromycine.

**Posologie :**

• Il est recommandé de prendre vos gélules le matin.

• Les gélules peuvent être prises avec de la nourriture ou à jeun.

• Elles doivent être avalées entières avec un demi-verre d'eau. Elles ne doivent pas être mordues ni croquées car elles contiennent des granulés pelliculés ce qui empêche le médicament d'être détruit par l'acidité de l'estomac. Il est important de ne pas détruire les granulés.

**Que faire si vous ou votre enfant avez des difficultés à avaler les gélules :**

• Ouvrir la gélule et avaler le contenu directement avec un demi-verre d'eau ou mettre le contenu dans un verre d'eau non

OEDES 20mg

28 gélules



LOT 211322

EXP 04/2024

PPV 99.00DH

éoméprazole).

• Si vous prenez un médicament contenant du nerflavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).

• Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, ne prenez pas OEDES® 20 mg, gélule gastro-résistante. Si vous avez des douleurs, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre OEDES® 20 mg.

7. Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

**Si vous remarquez un des effets indésirables suivants, ceux-ci étant rares mais sérieux, arrêtez de prendre OEDES® 20 mg et contactez immédiatement un médecin :**

• Apparition soudaine d'une respiration sifflante, gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge ou des boutons, éruptions cutanées, perte de connaissance ou difficultés à avaler (réactions allergiques graves).

• Rouges de la peau avec des bulles ou une desquamation. Parfois, les bulles peuvent être importantes et s'accompagner d'un saignement au niveau des lèvres, des yeux, de la bouche, du nez et des parties génitales. Ceci peut correspondre à un syndrome de Stevens-Johnson ou à une nécrose épidermique toxique.

• Jaunisse, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie de foie.

Les autres effets indésirables sont :

**Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10)**

• Mauvaise tête.

• Effets sur l'estomac ou l'intestin ; diarrhée, douleurs à l'estomac, constipation, flatulence.

• Nausées ou vomissements.

• Polypes bénins dans l'estomac.

**Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100)**

• Gonflement des pieds et des chevilles.

• Troubles du sommeil (insomnie).

• Étourdissements, fourmillements, somnolence.

• Vertiges.

• Modifications des résultats des tests sanguins contrôlant le fonctionnement de votre foie.

• Éruptions cutanées, urticaire et démangeaisons.

• Malaise général, manque d'énergie.

**Effets indésirables rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1000)**

• Troubles sanguins tels qu'une diminution du nombre de globules blancs ou de plaquettes. Ces effets peuvent provoquer une faiblesse, des ecchymoses ou faciliter la survenue d'infections.

• Réactions allergiques, parfois très graves incluant le gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge, de la fièvre, une respiration sifflante.

• Diminution du taux de sodium dans le sang. Celle-ci peut provoquer une faiblesse, des vomissements et des crampes.

• Agitation, confusion ou dépression.

• Troubles du goût.

• Troubles de la vue, tels que vision trouble.

• Respiration sifflante ou souffle court (bronchospasme).

• Sécheresse buccale.

• Inflammation de l'intérieur de la bouche.

• Infection appelée « mycet » qui peut affecter l'intestin et est causé par un champignon.

• Troubles hépatiques incluant la jaunisse, pouvant entraîner une peau colorée en jaune, des urines sombres et de la fatigue.

• Perte de cheveux (alopecie).

• Eruption cutanée lors d'une exposition au soleil.

• Douleurs articulaires (arthralgie) ou musculaires (myalgie).

• Problèmes rénaux sévères (néphrite interstitielle).

• Augmentation de la sueur.

**Effets indésirables très rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000)**

• Modification du nombre de cellules du sang incluant l'agranulocytose (déficit en globules blancs).

• Agressivité.

• Hallucinations visuelles, sensorielles ou auditives.

• Troubles hépatiques sévères entraînant une insuffisance hépatique et une inflammation du cerveau.

• Apparition soudaine d'éruptions cutanées sévères, bulles ou desquames importantes de la peau pouvant être associées à une fièvre importante et à des douleurs articulaires (érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson, nécrose épidermique toxique).

• Faiblesse musculaire.

• Gonflement des seins chez l'homme.

• Inflammation de l'intestin (entraînant des diarrhées).

• Si vous prenez OEDES® 20 mg pendant plus de trois mois, il est possible que le taux de magnésium dans votre sang diminue. De faibles taux de magnésium peuvent se traduire par une fatigue, des contractions musculaires involontaires, une désorientation, des convulsions, des sensations vertigineuses, une accélération du rythme cardiaque. Si vous présentez l'un de ces symptômes, veuillez en informer immédiatement votre médecin. De faibles taux de magnésium peuvent également entraîner une diminution des taux de potassium ou de calcium dans le sang. Votre médecin pourra décider d'effectuer des examens sanguins réguliers pour surveiller votre taux de magnésium.

• Eruption cutanée, éventuellement avec des douleurs, dans les articulations.

OEDES® 20 mg peut dans de très rares cas affecter les globules blancs entraînant un déficit immunitaire. Vous devez consulter votre médecin dès que possible si vous avez une infection avec des symptômes tels que de la fièvre avec une fatigue générale très importante, ou de la fièvre avec des symptômes d'infection locale tels que des douleurs dans le cou, la gorge, la bouche, ou des difficultés à uriner. Si vous avez ces symptômes, un déficit de globules blancs (agranulocytose) pourra être éliminé par un test sanguin. Il est important que vous donniez des informations sur vos médicaments dans ces cas.

**Déclaration des effets secondaires :**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne sera pas mentionné dans cette notice.

**8. Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre OEDES® 20 mg, gélule.

OEDES® 20 mg peut masquer des symptômes d'autres maladies.

Par conséquent, avant que vous ne commencez à prendre OEDES® 20 mg ou lorsque vous êtes sous traitement, vous devez informer immédiatement votre médecin si l'un des éléments suivants se produit :

• Vous perdez du poids sans raison ou si vous avez des problèmes à avaler.

• Vous avez des douleurs à l'estomac ou une indigestion.

• Vous vomissez de la nourriture ou du sang.

• Ainsi d'un inhibiteur de pompage de protons tel que OEDES® 20 mg, gélule gastro-résistante, en particulier sur une période supérieure à un an, peut légèrement augmenter le risque de fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres. Prévenez votre médecin si vous souffrez d'ostéoporose ou si vous prenez des corticoïdes qui peuvent augmenter le risque d'ostéoporose.

Si vous avez une éruption sur la peau, en particulier au niveau des zones exposées au soleil, prévenez votre médecin dès que possible, car votre peau devrez être exposée à l'effet de OEDES® 20 mg. N'oubliez pas de mentionner également tout autre effet indésirable tel que des douleurs dans vos articulations.

**Enfants :**

Certains enfants atteints d'une maladie chronique peuvent nécessiter un traitement à long terme bien que celui-ci ne soit pas recommandé. Ne donnez pas ce médicament aux enfants de moins de 1 an ou < 10 kg.

**Mentions relatives aux excipients à effet notoire :**

En raison de la présence de Saccharose, ce médicament est déconseillé chez les patients présentant une intolérance au fructose, au syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un défaut de l'enzymesurase lactosé (maladies héréditaires rares).

**9. Interactions avec d'autres médicaments :**

Prise d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez récemment pris un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou pharmacien. OEDES® 20 mg peut interférer sur le fonctionnement d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur OEDES® 20 mg.

Vous ne devez pas prendre OEDES® 20 mg si vous prenez un médicament contenant du nerflavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).

Veuillez informer votre médecin ou pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants :

• Kétoconazole, Itraconazole, posaconazole ou voriconazole utilisés dans le traitement des infections fongiques;

• Digoxine (utilisé dans le traitement de problèmes cardiaques) ;

• Diazépam (utilisé dans le traitement de l'anxiété, de l'épilepsie ou comme relaxant musculaire) ;

• Phénytoïne (utilisé dans l'épilepsie) ; si vous prenez de la phénytoïne, une surveillance par votre médecin serait nécessaire à début et à l'arrêt de l'administration de OEDES® 20 mg ;

• Rifaxamic (utilisé pour traiter la tuberculose) ;

• Atazanavir (utilisé pour traiter l'infection VIH) ;

• Tacrolimus (dans le cas de greffe d'organe) ;

• Miltegravir (Hypericum perforatum) (utilisé dans le traitement de la dépression modérée) ;

• Clostazol (utilisé dans le traitement de la claudication intermittente) ;

• Saquinavir (utilisé pour traiter l'infection VIH) ;

• Clodiprogrel (utilisé pour prévenir les caillots de sang (thrombus)).

• Erlotinib (utilisé dans le traitement du cancer) ;

• Méthotrexate (médicament utilisé en chimiothérapie à forte dose dans le traitement du cancer) – si vous prenez une forte dose de méthotrexate, votre médecin peut temporairement arrêter votre traitement par OEDES® 20 mg, gélule gastro-résistante.

Si votre médecin vous a prescrit les antibiotiques suivants : amoxicilline et clarithromycine avec OEDES® 20 mg pour le traitement d'un ulcère à Helicobacter pylori, il est important que vous prenez la dose recommandée.

**Interactions avec les aliments et les boissons :**

Voir Posologie.

**Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :**

Sans objet.

**10. Grossesse, Allaitement et Fertilité:**

Si vous êtes enceinte ou que vous allez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

L'oméprazole est excrétée dans le lait maternel mais il est peu probable qu'il y ait une influence sur l'enfant lorsqu'il est utilisé à doses thérapeutiques.

Votre médecin vous dira si vous pouvez prendre OEDES® 20 mg pendant l'allaitement.

**11. Sports :**

Sans objet.

**12. Conduire de véhicule et utilisation des machines :**

OEDES® n'est pas susceptible d'entrainer des effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Des effets secondaires tels qu'un étourdissement et des troubles visuels peuvent se produire (y compris effets indésirables). Si c'est le cas, ne devez pas conduire de véhicules ou utiliser des machines.

**13. Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :**

Si vous avez pris plus de OEDES® 20 mg que vous n'auriez dû : Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

**14. Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :**

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous y pensez. Cependant, si vous êtes à proximité du moment de prendre la dose suivante, ne prenez pas de dose que vous avez oubliée.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

**15. Si vous avez oublié de prendre OEDES® 20 mg :**

N'arrêtez pas de prendre OEDES® 20 mg sans avis au préalable de votre médecin ou pharmacien.

Vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

**16. Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :**

Sans objet.

**Conditions de prescription et de livraison :**

Tableau C (Liste II).

**Précaution particulières de conservation :**

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

**• Précautions particulières d'élimination des médicaments non utilisés ou des déchets provenant de ces médicaments :**

Ne jetez aucun médicament au tout-déchèter ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribuent à protéger l'environnement.

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le : 17/01/2019.**

**COOPER**  
PHARMA

41, rue Mohamed Diouri, 20110 Casablanca.

IMPRIMÉ PAR

774.160.05.19

# Tib

Ornidazole

Omidazole

Anti-infectieux pour

**Composition**

Comprimés : ornidazole

Ampoules (3 ml) : or-

Forme et présentat-

Comprimés à 500 mg

Ampoule de 3 ml à 5

Propriétés, effets

L'absorption de l'omidi-

zole est rapide.

La réduction de l'omidi-

zole par une augmentation

toxique pour la cellulite

En ce qui concerne les

Bactéries

Le spectre d'action de

A : sont sensibles : CM

d'autres *Bacteroides* sp.

B : *Clostridium* sp., *C.*

Eubacterium sp., *ana-*

lérobes

C : *Escherichia coli*, *Enter-*

*coccus faecalis*, *Enterococ-*

*coccus faecium*, *Staphylococ-*

*cus aureus*, *Enterobac-*

*terillus*, *Proteus mirabilis*,

*Yersinia enterocolitica*, *Sal-*

*monas cholerae*, *Giardia intestinalis*.

Le spectre d'action de l'i.

Sont sensibles : CM & B.

Les autres protozoaires sont tous résistants à l'omidazole.

La détermination de la sensibilité des protozoaires n'est normalement pas effectuée en routine, la technique étant exigeante. L'efficacité in vivo de l'omidazole à l'égard des protozoaires cités ci-dessus a fait l'objet d'un documentation détaillée.

Il existe une croisade entre l'omidazole et d'autres nitro-5-imidazoles; on ne connaît pas de résistance croisée avec d'autres substances chimiquement non apparentées.

Il est à noter que des bactéries anaérobies sont résistantes à l'omidazole : une telle résistance n'a été décrite que dans des cas isolés.

Peu de types des bactéries anaérobies normalement sensibles peuvent toujours être considérées comme sensibles à l'omidazole.

**Indications**

Elles procèdent de l'activité antibactérienne et antiparasitaire de l'omidazole et de ses caractéristiques pharmacocinétiques. Elles tiennent compte à la fois des études cliniques auxquelles à donner lieu au médicament, et de sa place dans l'éventail des produits anti-infectieux actuellement disponibles.

Elles sont limitées aux infections dues aux germes définis comme sensibles en pharmacodynamie.

**Indications générales :**

- Traitement curatif des infections médicochirurgicales à germes anaérobies sensibles.

- Traitement préventif des infections à germes anaérobies sensibles lors des interventions chirurgicales comportant un haut risque ou où il existe un risque d'infection.

- Amibiases adénives de localisation intestinale ou hépatique (solution injectable 500mg).

**Spécifique à la forme comprimé :**

- amibiase, qu'elle qu'en soit l'expression clinique (amibiases intestinales et extra-intestinales).

- Trichomonases urogénitales.

- Lambéiasis.

- Relais des traitements par voie injectable des infections à germes anaérobies sensibles, à titre curatif ou préventif.

**Posologie, mode d'emploi**

Les comprimés doivent toujours être pris après les repas. La solution contenue dans les ampoules doit être administrée en perfusion brève. La solution doit toujours être diluée avant l'injection. En ce qui concerne la préparation de la solution à perfuser, voir paragraphe 5.

**Posologie usuelle**

1. Trichomonases

deux schémas thérapeutiques peuvent être recommandés :

Nature du traitement Dose journalière

Adultes et enfants de plus de 35 kg

Enfants jusqu'à 35 kg

a. Traitement par dose unique 3 comprimés le soir 25 mg par kg de poids corporel

b. Traitement de 5 jours 2 comprimés (1 le matin, 1 le soir) non recommandé

Pour éviter une réinfestation, le partenaire doit toujours être également traité par la même dose orale.

Chez l'enfant, le traitement consiste dans l'administration d'une dose unique de 25 mg/kg de poids corporel et par jour.

2. Amibiase.

a. Traitement de 3 jours lors de dysenterie amibiense.

b. Traitement de 5-10 jours pour toutes les formes d'amibiase.

**Durée du Traitement**

Dose journalière

Adultes et enfants de plus de 35 kg

Enfants jusqu'à 35 kg

a. 3 jours 3 comprimés à prendre en une fois. Ainsi, dessous de 60 g de poids corporel : 4 comprimés (2 le matin, 2 le soir)

40 mg/kg. à prendre en une fois.

b. 5-10 jours 2 comprimés (1 le matin, 1 le soir) 25 mg/kg. à prendre en une fois

c. Traitement de l'abcès amibien du foie et de dysenterie amibiense grave

Adultes: perfuser par voie intraveineuse 500-1000 mg en tant que dose initiale, puis 500 mg toutes les 12 heures pendant 3-6 jours en moyenne.

La posologie pour enfants est de 20-30 mg/kg/jour.

**Tibéral® 500 mg**



10 comprimés pelliculés



6 118000 280231

N° D'AMM : 736/16DMP/21/NRQ  
LOT : 22121 PER : 09/2027  
PPV : 48,50 DH

**Laboratoires Steripharma**  
sous licence des Laboratoires SERB  
Z.I. Lina N° 347 Sidi Mâarouf - Casablanca  
Amine TAHIRI - Pharmacien Responsable

3. Giardiose

Durée du traitement

Dose journalière

Adultes et enfants de plus de 35 Kg

Enfants jusqu'à 35 Kg

1-2 jours 3 comprimés/jeu soit à prendre en une fois

40 mg/Kg. à prendre en une fois

4. Infections dues à des bactéries anaérobies

a. Traitement d'infections à bactéries anaérobies

Adultes : perfuser par voie intraveineuse 500-1000 mg en tant que dose initiale, puis 500 mg toutes les 12 heures ou 1 g toutes les 24 heures pendant 5-10 jours. Dès que l'état du patient le permet, passer de la voie parentérale à la voie orale à raison de 1 comprimé à 500 mg toutes les 12 heures.

b. Prophylaxie d'infections à bactéries anaérobies

Perfuser par intraveineuse le contenu de l'ampoule à 500 mg une demi-heure environ avant le début de l'intervention

Prophylaxie et traitement d'infections mixtes : il est recommandé d'utiliser le "Tibéral" en association avec un aminoside, une pénicilline ou une céphalosporine. Les produits doivent toutefois être administrés séparément.

c. Prophylaxie d'infections à bactéries anaérobies

Le chlorure de sodium ou de glucose de 0,9%.

d. Préparation de la solution à perfuser

Important : la solution contenue dans les ampoules doit toujours être diluée avant l'administration.

pour obtenir la solution de "Tibéral" à perfuser, diluer le contenu de l'ampoule à 500 mg dans au moins 100 ml d'un des solutés suivants : glucose à 5%, glucose à 5%, lactose à 10%, télovéose à 5%, solution de Hartmann, solution de Ringer, chlorure de sodium à 0,9% & 2,5% de glucose.

Administrer la solution diluée en perfusion 1 v. brève (durée : 15-30 minutes).

**Contre-indications**

Tibéral® est contre-indiqué en cas d'hypersensibilité connue à l'omidazole ou à d'autres dérivés de l'imidazole, ainsi que chez les patients présentant une affection du système nerveux central, une dyscrasie sanguine ou toute autre anomalie de la formule sanguine.

Précautions d'emploi

En cas de traitement par des doses élevées ou d'une durée supérieure à 10 jours, des contrôles cliniques et biologiques réguliers sont indiqués.

Chez les patients avec des antécédents de dyscrasie sanguine, la formule leucocytaire doit être contrôlée avant et après le traitement, surtout si ce dernier est répété. Des affections sévères des systèmes nerveux central et périphérique peuvent s'aggraver au cours d'un traitement par Tibéral®. En cas de neuropathies périphériques, d'astaxie, de vertiges ou de confusion mentale, le traitement doit être arrêté. Le traitement par l'omidazole peut aggraver une candidose existante. Le cas échéant, prendre les mesures nécessaires.

Chez les patients sous anticonvulsin, tenir compte du raccourcissement de la demi-vie. L'administration d'une dose supplémentaire peut s'avérer nécessaire après la diète.

Chez les patients traités par le lithium et recevant des dérivés de l'imidazole, les concentrations plasmatiques de lithium ainsi que les valeurs de la créatinine et des électrolytes doivent être contrôlées.

Les ampoules de Tibéral® contiennent 30% vol d'alcool. Lorsque la posologie recommandée est respectée, l'administration du contenu de 1 ampoule de 3 ml implique l'apport de 0,9 g d'alcool. Il en résulte un risque pour, notamment, les malades du foie, les alcooliques, les épileptiques, les patients avec lésions cérébrales, les femmes enceintes et qui allaient ainsi que pour les enfants lorsque les doses recommandées sont dépassées. L'effet d'autres médicaments peut être renforcé ou compromis.

**Instructions pour les méthodes de diagnostic**

L'omidazole influe sur les déterminations de la SGOT et de la SGPT.

**Grossesse, allaitement**

Les études de reproduction chez l'animal n'ont pas démontré de risque pour le fœtus, mais on ne dispose pas d'études contrôlées chez la femme enceinte. Par principe, Tibéral® ne doit être administré pendant les premiers mois de la grossesse et la période d'allaitement qu'en cas de nécessité absolue.

**Effets indésirables**

Les effets indésirables du Tibéral® sont généralement dose-dépendants.

Les effets indésirables les plus fréquents (3%) : nausées, vomissements et goût métallique désagréable sont constatés.

Troubles du système nerveux central : de légères effets indésirables tels que vertiges et somnolence peuvent survenir. Tremblement, rigidité, troubles de la coordination, convulsions, troubles de conscience et signes de neuropathie périphérique sensitive ou mixte ont été observés dans des cas rares.

**Des réactions d'hypersensibilité surviennent occasionnellement.**

Anomalies de la formule sanguine : aplasie médullaire et neutropénie peuvent également se produire à l'occasion.

**Interactions médicamenteuses**

Contrairement à d'autres imidazoles, l'omidazole n'empêche pas l'hydrolyse de l'aldehyde déshydrogénase et, de ce fait, pas d'interférence avec le zidovudine. En revanche, l'omidazole renforce l'effet des anticoagulants oraux du type de la coumarine. Il faut en tenir compte et adapter la dose de l'anticoagulant administré de manière concomitante.

Par ailleurs, l'omidazole prolonge l'effet myorelaxant du bromure de véronium.

L'administration simultanée de phénobarbital ou d'autres inducteurs enzymatiques raccourcit la demi-vie sérique de l'omidazole.

En ce qui concerne les interactions lors de traitement simultané par le lithium, voir sous précautions.

**Surdosage**

En cas de surdosage, les symptômes décrits sous effets indésirables surviennent avec une intensité renfoncée. On ne connaît pas d'effets indésirables graves.

Pour éliminer l'omidazole de l'organisme, on peut envisager un lavage gastrique ou une hémodialyse.

En cas de convulsions, il est recommandé d'administrer du diazépam par voie intraveineuse.

**Conditions de conservation et délivrance**

Conserver à une température inférieure à 25°C et à l'abri de la lumière.

Tenir hors de la portée des enfants.

**Liste I : à ne délivrer que sur ordonnance**

Solution injectable pour perfusion : réservée à l'usage hospitalier.

**Laboratoires STERIPHARMA**  
sous licence des Laboratoires SERB  
Z. I. Lina N° 347 Sidi Mâarouf - Casablanca  
Amine TAHIRI - Pharmacien Responsable

**دكير قوي 100 000 وحدة دولية،**

محلول للشرب، علبة من 3 أمبولات.

كوليوكالسيفiro (فيتامين D3).

- يرجى قراءة هذه النشرة بالكامل قبل تناول هذا الدواء لأنها تحتوى على معلومات مهمة.  
 يجب عليكم دائمًا تناول هذا الدواء باتباع المعلومات الواردة في هذه النشرة أو حسب إرشادات الطبيب أو الصيدلي.  
 • احتفظوا بهذه النشرة قد تحتاجون لقرائتها مرة أخرى.  
 • احصلوا بالصيادي على زيزد من المصالح والمعلومات.  
 • إذا أحسست بأثر آخر جديًا أو إذا "عزمت" آخر غير درجة في هذه النشرة، فتحدو إلى الطبيب أو الصيدلي.  
 • يرجى الاتصال بالطبيب إذاً لم تشعروا بأثر تحسن يذكر.

**محتويات النشرة :**

- ما هو دكير قوي ومنى يتم استعماله ؟
- ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل استعمال دكير قوي ؟
- كيفية استعمال دكير قوي ؟
- ما هي الآثار الجانبية المختلطة ؟
- كيفية حفظ دكير قوي ؟
- معلومات إضافية

**1. ما هو دكير قوي ومنى يتم استعماله ؟**  
**الصنف الدوائي الملاجئ:****الفيتامينات:****دواعي الاستعمال:**

يستعمل دكير قوي 100 000 وحدة دولية للعلاج الأولى لنقص الفيتامين (d)

**2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل استعمال دكير قوي ؟**  
**لا تستخدموا هذه الماء:**

- إذا كنت تعانون من الحساسية للكوليوكالسيفiro أو لأي سواهات الدواء ( انظر الفقرة 6 )
- إذا كنت تشتت من 18 سنة من العمر.
- إذا كان لديك فرط كالسيوم الدم ( زيادة الكالسيوم في الدم ) و / او
- إذا كان لديك فرط كالسيوم البول ( زيادة الكالسيوم في البول ).
- إذا كنت تعانون من شبه قصور الغدة الجلوب درجة ( اضطراب في عملية استقلاب هرمون الغدة الجلوب درجة)، لأن الحاجة للفيتامين (d) قد تتضمن خال قرات الحساسية الطبيعية للفيتامين (d).

- في هذه الحال، هناك خطير ظهور اعراض الجرعة الزائدة الفزمن، مشتقات الفيتامين (d) تكون موجودة في هذه الحالات.  
• إذا كان لديك استعداد لكون حسوات الكلي التي تحتوي على الكالسيوم.  
• إذا كان لديك فرط الكالسيوم في الدم.

**تحذيرات خاصة وأحتفاظات الاستعمال :**

- إذا كانت لديك اضطرابات في افراز الكالسيوم والغوففات في البول.
- إذا كنت تتبعين مشتقات البزند وبارازين (التي تستخدم لتفخيم افراز البول).

عند المرضى المعدين لأنهم قد يتعرضون لخطر زيادة الكالسيوم في الدم وزيادة الكالسيوم في البول.

- إذا كنت تعانون من مرض الساركوديز بالنظر إلى مخاطر تحول فيتامين (d) إلى مستقبلاته الشبيهة. في هذه الحال، فإنه من الضروري مرافقته الكالسيوم في الدم وفي

- من الضروري مرافقته تأثير الدواء على عملية استقلاب الكالسيوم والغوففات عند المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي.  
يجب أن تؤخذ الأعيار نسبة الكالسيوم (d) عند استعمال الأدوية التي تحتوي على هذا الفيتامين.

- إن الاستخدام الأضافي للفيتامين (d) أو الكالسيوم يجب أن يتم تحت إشراف طبي. في حالة العلاج لفترات طويلة، ومن أجل التحكم في مستويات الكالسيوم في الدم والبول، من المستحسن قياس الكرياتينين في محل الدم.

- ذلك مرافقية ذات أهمية خاصة عند كبار السن الذين يتلقون العلاج بواسطة الكليوكوسيدات القلبية (التي تستخدم لتفخيم وظيفة القلب) أو مدرات البول (التي تستخدم لتفخيم وظيفة الكلى).

- في حالة ظهور زيادة الكالسيوم الدم أو علامات الفشل الكلوي، ينبغي تخفيف الجرعة أو وقف العلاج مؤقتاً إذا تجاوزت نسبة الكالسيوم في البول 7.5 ململو/24 ساعة (300 مل/24 ساعة).

**نفاذات الماء :**

- لا تتناولوا الماء مع الأدوية الأخرى :  
 إن الاستخدام المترافق للدواء مع الفيتامين (d) عند استعمال الأدوية التي تحتوي على ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها دون وصفة طبية.

- إن مدرات البول التiazيريد (مثل الماشتكات البزند وبارازين) والتي تغير افراز البول يمكن أن تسبب فرط كالسيوم الدم ( زيادة الكالسيوم في الدم ) لأنها تتخلل من افراز البول.

- كما أن الاستخدام المترافق للدواء مع الملاكيوكروكيريدات (التي تستخدم لعلاج نقص امراض الحساسية) قد يتطلب من تأثير فيتامين (d).

- إن خطر حدوث الآثار الجانبية يزداد عند المرضى الذين يتلقون العلاج لتفخيم القلب (التي تستخدم لتفخيم وظيفة القلب) وذلك بسبب زيادة الكالسيوم في الدم خلال فترة العلاج (فيتامين (d)). (خطر عدم انتظام ضربات القلب)، وينبغي اجراء تحكم لقلب ورقة مستويات الكالسيوم في الدم والبول.

- يرجى الانتباه إلى أن هذه الاحتياطات تطبق على الأدوية التي تم تناولها حديثاً.

**التفاعل مع الطعام والشراب :****غير متوفرة.****تناول الدواء أثناء الحمل والرضاعة :**

- يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

- الحمل: لا ينبغي إعطاء الدواء للنساء الحوامل إلا عند ضرورة القصوى وقطب بجرعات ضرورية للغاية لإزالة النقص. ينبغي تجنب الجرعات الزائدة من فيتامين (d) عند النساء الحوامل، لأن زيادة الكالسيوم في الدم وفترات طويلة قد تسبب تأخير نباتها و غالباً ما تؤدي إلى اضطرابات القلب الحقيقة وأمراض العيون .

- الرضاعة: يتم إفراز فيتامين (d) ومستقبلاته في حليب الأم. لم تلاحظ خطأ اعراض الجرعات الزائدة في هذه الحال.

**التاثير الم Harmful للدواء على القرحة على قيادة السيارة أو الاستعمال بعض الأدلة :**

- لا توجد أي احتياطات خاصة.

**3. كيفية استعمال دكير قوي ؟**  
**كيفية وطريقة الاستعمال :****عن طريق الفم:**

- يجب أن تؤخذ أربع ملولات وفقاً لجرعات المددة.

تؤخذ الجرعة كما هي أو ممزوجة مع بعض المسوائل

**وفيرة الاستعمال :**

تحدد الجرعات من طرف الطبيب المعالج حسب كل حالة.

3 ampoules buvables

D-CURE® FORTE

tice :  
l'utilisateur  
100.000 U.I.,  
boule, boîtes de 3.  
(vitamine D 3).

PPV: 49,60 DH  
LOT: 22127  
EXP: 09/2025

lisez cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations

sur le médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Vous pouvez vous adresser à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

#### QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?

1. Qu'est-ce que D-Cure forte et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser D-Cure forte ?
3. Comment prendre D-Cure forte ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver D-Cure forte ?
6. Information supplémentaires.

#### 1. QU'EST-CE QUE D-CURE FORTE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

- Classe pharmaceutique : Vitamines.
- Indications thérapeutiques : D-CURE FORTE 100.000 UI est utilisé en tant que traitement d'attaque pour la carence en vitamine D.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER D-CURE FORTE ?

N'utilisez pas D-CURE FORTE :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au chloécalciférol ou à tout autre excipient de D-CURE FORTE (cf. rubrique 6).
- si vous avez moins de 18 ans.
- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou
- si vous souffrez d'hypercalciurie (augmentation du taux de calcium dans les urines).
- si vous souffrez de pseudo-hypoparathyroïdisme (perturbation du métabolisme de la hormone parathyroïdienne), puisque le besoin en vitamine D peut être réduit lors de phases de sensibilité normale à la vitamine D. Dans ce cas, il y a un risque de surdosage prolongé. Des dérivés de la vitamine D qui se régulent mieux sont disponibles dans ces cas.
- si vous avez une prédisposition à la formation de calculs rénaux contenant du calcium.
- si vous avez une hypervitaminose D.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Utilisez D-CURE FORTE avec précaution :

- si vous présentez des troubles de l'excrétion urinaire de calcium et de phosphate,
- si vous êtes actuellement traité par des dérivés de benzothiadiazine (utilisés pour stimuler l'excrétion urinaire),
- chez les patients immobilisés puisqu'ils risquent de développer une hypercalcémie. (augmentation du taux de calcium dans le sang) et une hypercalciurie (augmentation du taux de calcium dans les urines)
- si vous souffrez de sarcoidose compte tenu du risque accru de conversion de la vitamine D en son métabolite actif. Dans ce cas, il y a lieu de surveiller la calcémie et la calciurie.

Il y a lieu de surveiller l'effet sur le métabolisme calcique et phosphorique chez les patients souffrant d'insuffisance rénale traités avec D-CURE FORTE.

Si d'autres médicaments contenant de la vitamine D sont prescrits, la dose de vitamine D contenue dans D-CURE FORTE doit être prise en considération. L'administration supplémentaire de vitamine D ou de calcium ne peut se faire que sous surveillance médicale. Dans ces cas, les taux de calcium dans le sang et dans les urines doivent être contrôlés.

En cas de traitement prolongé avec D-CURE FORTE, il est recommandé de contrôler les taux de calcium dans le sang et les urines ainsi que la fonction rénale par dosage de la créatinine sérique. La surveillance est particulièrement importante chez les personnes âgées recevant un traitement concomitant par glycosides cardiaques (utilisés pour stimuler la fonction cardiaque) ou diurétiques (utilisés pour stimuler l'excrétion urinaire). En cas d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) ou de signes de dysfonction rénale, la dose doit être réduite ou le traitement interrompu. Il est recommandé de réduire le dosage ou d'interrompre le traitement momentanément si le calciurie dépasse 7,5 mmol/24 heures (300 mg/24 heures).

Autres médicaments et D-Cure forte :

N'oubliez pas de mentionner à votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, y compris les médicaments obtenus sans ordonnance.

L'utilisation concomitante de phénytoïne (utilisée pour traiter l'épilepsie) ou de barbituriques (utilisés pour traiter l'épilepsie, les troubles du sommeil et en tant qu'anesthésique) peut réduire l'effet de la vitamine D.

Les diurétiques thiazidiques (par ex. les dérivés de benzothiadiazine) sont des médicaments qui stimulent l'excrétion urinaire et qui peuvent provoquer une hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) car ils réduisent l'élimination rénale du calcium. Par conséquent, il convient de surveiller les taux de calcium dans le sang et les urines en cas de traitement prolongé.

L'administration concomitante de glucocorticoïdes (utilisés pour traiter certaines maladies allergiques) peut réduire l'effet de la vitamine D.

Le risque d'effet indésirable peut être accru chez les patients prenant des glucosides cardiaques (utilisés pour stimuler la fonction cardiaque) en raison de l'augmentation du taux de calcium dans le sang pendant un traitement par la vitamine D (risque d'arythmies cardiaques). Il convient de faire un ECG ainsi que de surveiller le dosage des taux de calcium dans le sang et les urines.

Veuillez tenir compte du fait que ces précautions s'appliquent également aux médicaments que vous avez pris récemment.

Interactions avec les aliments ou les boissons :

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité :

Demandez toujours conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre un médicament.

D-CURE FORTE ne doit être administré chez la femme enceinte qu'en cas d'extrême nécessité et uniquement à des doses absolument nécessaires pour éliminer la carence. Chez la femme enceinte, un surdosage en vitamine D doit être évité car une hypercalcémie prolongée (augmentation du taux de calcium dans le sang) peut provoquer un retard physique et mental, une maladie cardiaque congénitale et une maladie oculaire chez l'enfant.

La vitamine D et ses métabolites passent dans le lait maternel. Un surdosage induit de cette manière n'a cependant jamais été observé.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Aucune mesure de précaution spéciale n'est requise.

#### 3. COMMENT PRENDRE D-CURE FORTE ?

les d'adulte et/ou

Distribué par MSD MAROC.

AMM N° : 267/19/DMP/21/NRC

P.P.V: 428,00 DH.



6 118001 160488

Distribué par MSD MAROC.

AMM N° : 267/19/DMP/21/NRQ

P.P.V: 428,00 DH.



6 118001 160488

Diplômé de la Faculté de médecine de REIMS (FRANCE)

**HEPATO - GASTRO - ENTEROLOGUE**

(Fibroscopie - Coloscopie)

**Diplômé d'échographie**

**Diplômé de chirurgie proctologique**

(Hémorroïdes, Fissures, fistules de l'anus)

**Diplômé de Régimes - Nutritions Diététiques**

(Obésité - maigreur)

Ex. Attaché au C. H. U. de REIMS

**الدكتور براادة عبد الرحيم**

خريج كلية الطب رانس بفرنسا

**اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي**

(الكشف بالمنظار)

**مجاز في علاج و جراحة المخوج**

(ال بواسير و الدمل)

**مجاز في الكشف بالتلغراف**

**مجاز في وقاية و علاج أمراض التغذية**

(السمنة و الضعف)

**طبيب مساعد سابق بمستشفيات رانس**

## **MR TARHALI MOHAMED CASABLACA LE 07/03/2023**

### **COMPTE-RENDU D'ECHOGRAPHIE ABDOMINALE**

#### **INDICATION**

**DOULEUR ABDOMINALE**

#### **EXAMEN**

##### **Foie-Hile :**

- Le foie est de taille normale, de contours réguliers, d'écho structure Normo-échogène.
- Le hile est normal.
- **Vésicule-Voies Biliaires :**  
La vésicule est de paroi fine, de contenu clair, trans sonique.
- Les voies biliaires intra et extra hépatiques sont de calibres normaux.

##### **Pancréas :**

- Le pancréas est d'échostructure hypo-échogène homogène.

##### **Reins :**


- Les deux reins sont de tailles normales, de contours réguliers , de rapports cortico-médullaires conformes.

##### **Rate :**

- La rate est normale .

#### **CONCLUSOS**

**ECHOGRAPHIE ABDOMINALE NORMALE**



# **Dr. BERRADA Abderrahim**

Diplômé de la Faculté de médecine de REIMS (FRANCE)

**HEPATO - GASTRO - ENTEROLOGUE**

(Fibroscopie - Coloscopie)

**Diplômé d'échographie**

**Diplômé de chirurgie proctologique**

(Hémorroïdes, Fissures, fistules de l'anus)

**Diplômé de Régimes - Nutritions Diététiques**

(Obésité - maigreur)

Ex. Attaché au C. H. U. de REIMS

**الدكتور براادة عبد الرحيم**

خريج كلية الطب رانس بفرنسا

**اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي**

(الكشف بالمنظار)

**مجاز في علاج و جراحة المخرج**

(ال بواسير والدمى)

**مجاز في الكشف بالتلفرة**

**مجاز في وقاية وعلاج أمراض التغذية**

(السمنة والضعف)

طبيب مساعد سابقا بمستشفيات رانس

Casablanca, le .....

الدار البيضاء، في


**MRTARHALI MOHAMED CASABLANCA 07/03/2023**

**C 300DH**

**ECHOGRAPHIE**

**K30 400DH**

**-----  
700DH**



مركز تجاري نادية - عمارة 4 - الشقة 4 - الطابق الأول - شارع ابراهيم الرو丹ني (طريق الجديدة سابقا) المعاريف - الدار البيضاء 20.100

Centre Commercial NADIA, Imm. 4, Appt 4, 1<sup>er</sup> Etage, Bd Brahim Roudani (Ex. Route d'El Jadida) - Maârif Extension - Casablanca 20.100

Tél. : 05 22 98 95 12 / 05 22 98 35 77 : الهاتف - Fax : 05 22 98 35 77 : الفاكس

E-mail : berradagastro@hotmail.fr

07/03/23  
11:43:07  
C 3.5 MHZ

[B] [F] [X]  
fab G R →  
13 Ips

STEATOSE HEPATIQUE

Memoire 1

Standard

FOIE

VESICULE BILIAIRE

REIN DROIT

HILE DU FOIE

NOM : MR TARHALI MOHAMED  
Dr BERRADA ABDERRAHIM  
49 1 49

07/03/23  
11:39:19  
C 3.5 MHZ

[B] [F] [X]  
fab G R →  
13 Ips

Memoire 1

Standard

PANCRÈS

RATE

REIN GAUCHE

NOM : MR TARHALI MOHAMED  
Dr BERRADA ABDERRAHIM  
49 1 49

07/03/23  
11:37:07  
C 3.5 MHZ

[B] [F] [X]  
fab G R →  
13 Ips

Memoire 1

Standard

PROSTATE

VESSIE

NOM : MR TARHALI MOHAMED  
Dr BERRADA ABDERRAHIM  
33 1 33