

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W21-677329

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1608

Société : 157548

☐ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre

Nom & Prénom : TALEB AICHA ep. Azzaoui Adnani

Date de naissance : 1950

Adresse : Rue Ahmed kadmiri Res Nodia Apt 13 casa

Tél : 0663 082 895

Total des frais engagés : 832,50

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. J. SIBAI
CARDIOLOGUE

Angle 38. Bd. Lalla Yacout et
1, Rue El Araar - Casablanca
Tél : 05 22 40 78 90 - 05 22 40 78 90

Date de consultation : 07 AVR. 2023

Nom et prénom du malade : TALEB AICHA

Lien de parenté :

☐ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie : KTA Chronique

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : casa

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 17 AVR. 2023

ACCUEIL

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et Signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
01 AVR. 2023				Dr. I. SIB... 091129718 Angle 28.50 1. Rue El... Tel: 05 22 43 78 90



EXECUTION DES ORDONNANCES	
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Montant de la Facture
PHARMACIE EL MILAL ABOUBI Selwa Cité Plateaux - Casablanca Tel: 05 22 25 96 06 - 05 22 25 96 07	01/04/23 832.50

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

O.D.F. PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE		DES TRAVAUX	
		H 25633412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 00000000 G 35533411 11433553 B	DES TRAVAUX	MONTANTS DES SOINS	DEBUT D'EXECUTION
		[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession	CCEFFICIENT DES TRAVAUX	MONTANTS DES SOINS	FIN D'EXECUTION
			DATE DU DEVIS		
			DATE DE L'EXECUTION		
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS		VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION			

Docteur Jamal SIBAI

CARDIOLOGUE

Diplômé de la Faculté de Médecine
de Paris

Horaires d'ouverture :
du Lundi au Jeudi 9h à 15h.
Samedi 9h à 11h

Fermé le vendredi, samedi après-midi et le dimanche

الدكتور جمال السباعي

اختصاصي في أمراض القلب و الشرايين
خريج كلية الطب بباريس

أوقات العمل من الإثنين إلى الخميس من 9 إلى 15
و السبت من 9 إلى 11
العيادة مغلقة يوم الجمعة و السبت بعد الزوال و الأحد

N° d'identification du praticien : 091129718 : الرقم الوطني الإستدالي :

Casablanca, le 01 AVR. 2023

M^{re} TAREB Aïcha

REGIME SANS SEL

131.50 + 5
657.50

Staval 80,

4.2/j

87.80 + 2
170.00

Nebilet 5,

1/j

TRAITEMENT DE 3 MOIS

TRAITEMENT DE 3 MOIS



PHARMACIE EL HILAL
LAABOUDI Selwa
77, Rue Al Bachir Laïla
Cité Plateaux - Casablanca
Tél: 0522 25 96 06 - 05 22 48 79 79

Dr. J. SIBAÏ
CARDIOLOGUE
Angle 38, Bd. Lalla Yacout et
1, Rue El Araar - Casablanca
Tél.: 05 22 48 79 79 - 05 22 48 78 90

Lot n° :

Exp. :

ستارقال

قالزارتار

تالية: تنفس قصير وتورم القدمين وال
يحدث عندما لا يمكن لمعضلة القلب ض
ورية من الدم إلى الجسم.

إزاء ابتاعه إرشادات الطبيب الموضوعة
تقليل من خطر التأثيرات الغير مرغوب في
باله الشك.

أصغر
غالباً ما لا يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أي ع
على وجود هذا المرض. يمكن لمعظم الناس أن تشعر بشعور طبيعي جداً.
السبب من المهم بصفة خاصة المحافظة على مواظبتك مع طبيبك حتى إذا
تسهر بأنك في حالة جيدة.

- ارتفاع ضغط الدم عند المرضى الباقين: الجرعة الموصى بها هي 80
يومياً. في بعض الحالات، قد يصف الطبيب جرعات أعلى (مثلاً 160 ملغ
320 ملغ). كما يمكن أن تشارك ستارقال، قرص ملبس، مع دواء آخر
مدرا للبول).

- ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين (الذين تتراوح أعمارهم بين
18 سنة)

عند المرضى الذين يقل وزنهم عن 35 كلغ، الجرعة المعتادة هي 40 ملغ
فالمسارنات مرة واحدة في اليوم.

عند المرضى الذين وزنهم 35 كلغ أو أكثر، الجرعة المعتادة هي 80 ملغ
فالمسارنات مرة واحدة في اليوم.

في بعض الحالات، يمكن لطبيبك أن يصف لك جرعات أعلى (يمكن الزيادة
الجرعة إلى 160 ملغ وإلى حد أقصى 320 ملغ).

- بعد الإصابة بأزمة قلبية حديثة عند مرضى الباقين:

بعد الإصابة بأزمة قلبية، يبدأ العلاج عادة بعد 12 ساعة، عادة بجرعة
ملغ. سيزيد طبيبك في الجرعة تدريجياً خلال الأسابيع التالية حتى الجرعة
الأقصى 160 ملغ، مرتين في اليوم. تعتمد الجرعة النهائية على قدرة تح
الفردية.

يمكن إعطاء ستارقال، قرص ملبس، مع علاج آخر للتنبؤات القلبية وسو
طبيبك العلاج المناسب لحالتك.

- قصور القلب عند مرضى الباقين :

يبدأ العلاج عادة بـ 40 ملغ مرتين في اليوم. سيزيد طبيبك الجرعة تدريجياً
خلال الأسابيع التالية إلى جرعة أقصى 160 ملغ، مرتين في اليوم. ت
الجرعة النهائية على قدرة تحملك الفردية. يمكن إعطاء ستارقال، قر
ملبس، مع علاج آخر للقصور القلبي وسيفر طبيبك العلاج المناسب لحالتك
إذا أخذت ستارقال، قرص ملبس، أكثر من اللازم

إذا كان لديك دوار شديد وآرإغماء، إستشر طبيبك على الفور واستلقي.
عددا كبيرا من الاقراص عن طريق الخطأ، استشر الطبيب، الصيدلي
المستشفى.

إذا نسيت أخذ ستارقال، قرص ملبس

إذا نسيت أخذ جرعة، خذها حالما تتذكرها.

ومع ذلك، لا تأخذ الجرعة الممنوعة إذا كانت جرعتك التالية قريبة.
لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي نسيت أخذها.

إذا توقفت عن أخذ ستارقال، قرص ملبس

قد يؤدي وقف العلاج باستخدام ستارقال، قرص ملبس، إلى تفاقم مرض
لا توقف علاجك ما لم ينصح طبيبك بذلك.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استعمال هذا الدواء، اطلب من الطبيب
الصيدلي للحصول على المزيد من المعلومات.

طريقة الاستعمال

يمكنك أن تستعمل ستارقال، قرص ملبس، مع أو بدون الأكل. تنا
ستارقال، قرص ملبس، مع كأس من الماء.

وتيرة الاستعمال

تناول ستارقال، قرص ملبس، كل يوم في نفس الوقت تقريبا.

7. مواقع الاستعمال

لا ينبغي أن يستعمل هذا الدواء في الحالات التالية:

• إذا كنت تعاني من حساسية (فرط الحساسية) من فالمسارنات أو أي
المكونات الأخرى الموجودة في ستارقال، قرص ملبس،

يرجى قراءة كامل هذه النشرة بانتباه قبل استعمال هذا الدواء.

حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها من جديد.

إذا كان لديك أي سؤال آخر، إذا كان لديك أي شك، اطلب معلومات أكثر من

طبيبك أو الصيدلي.

لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً. لا تعطيه أبداً لشخص آخر، حتى في حالة

أعراض مماثلة، قد يضر بـ.

إذا أصبحت إحدى التأثيرات الغير المرغوب فيها خطيرة، أو إذا لاحظت

تأثيراً غير مرغوب فيه غير مذكور في هذه النشرة، يرجى إخبار طبيبك أو

الصيدلي.

1. إسم الدواء

ملغ. 160 ستارقال

ملغ. 80 ستارقال

2. التركيب النوعي والكمي

160 ملغ ستارقال

المادة الفعالة هي:

فالمسارنات 160 ملغ

80 ملغ ستارقال

المادة الفعالة هي:

فالمسارنات 80 ملغ

لكل قرص ملبس

المكونات الأخرى:

التوترا (مشتق): سيلوز دقيق التيلور، كروسوبوفيدون، السيليكا الغروية

اللامانية، ستيارات المغنيزيوم، نشا مهلم مسبقاً، ماء متقى.

التغليف:

(ملغ). 80 (لستارقال أصفر أوبادري

(ملغ). 160 (وردى (لستارقال أوبادري

3. الشكل الصيدلي

يقدم هذا الدواء في علب من 14 و 28 قرص ملبس.

4. الصنف الصيدلي - العلاجي

غير مشتركة II مضادات الأنجيوتنسين

(CODE ATC : C09CA03)

5. الإرشادات العلاجية

يمكن استعمال ستارقال قرص ملبس، لثلاث إصابات مختلفة:

• علاج ارتفاع ضغط الدم عند المرضى الباقين، الأطفال والمراهقين الذين

تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 18 سنة. ارتفاع ضغط الدم يزيد من الجهد

المبذول من قبل القلب والشرايين. في حالة غياب العلاج، يمكن لارتفاع ضغط

الدم أن يثقل الأوعية الدموية للدماغ، القلب والكليتين، ويمكن أن يسبب سكتة

دماغية، قصور القلب أو قصوراً كلوياً. ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر

الإصابة بالتنبؤات القلبية. خفض ضغط الدم إلى المستوى الطبيعي سيسكن من

التقليل من خطر ظهور هذه المضطرابات.

• لعلاج المرضى الباقين الذين أصيبوا بنبوة قلبية حديثة (احتشاء عضلة

القلب). "مؤخراً" هنا تعني ما بين 12 ساعة و 10 أيام.

• لعلاج المرضى الباقين المصابين بقصور قلبي عرضي. يستعمل ستارقال

قرص ملبس، عندما لا يمكن استعمال فئة من الأدوية تسمى مثبطات الأنزيم

المحول للأنجيوتنسين (الأدوية المستخدمة لعلاج قصور القلب). أو يمكن أيضاً

استعماله بالإضافة إلى مثبطات الأنزيم المحول عندما لا يمكن استعمال أدوية

Lot n° :

Exp. :

ستارقال

قالزارتار

تالية: تنفس قصير وتورم القدمين وال
يحدث عندما لا يمكن لمعضلة القلب ض
ورية من الدم إلى الجسم.

إزاء ابتاعه إرشادات الطبيب الموضوعة
تقليل من خطر التأثيرات الغير مرغوب في
باله الشك.

أصغر
غالباً ما لا يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أي ع
على وجود هذا المرض. يمكن لمعظم الناس أن تشعر بشعور طبيعي جداً.
السبب من المهم بصفة خاصة المحافظة على مواظبتك مع طبيبك حتى إذا
تسهر بأنك في حالة جيدة.

- ارتفاع ضغط الدم عند المرضى الباقين: الجرعة الموصى بها هي 80
يومياً. في بعض الحالات، قد يصف الطبيب جرعات أعلى (مثلاً 160 ملغ
320 ملغ). كما يمكن أن تشارك ستارقال، قرص ملبس، مع دواء آخر
مدرا للبول).

- ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين (الذين تتراوح أعمارهم بين
18 سنة)

عند المرضى الذين يقل وزنهم عن 35 كلغ، الجرعة المعتادة هي 40 ملغ
فالمسارنات مرة واحدة في اليوم.

عند المرضى الذين وزنهم 35 كلغ أو أكثر، الجرعة المعتادة هي 80 ملغ
فالمسارنات مرة واحدة في اليوم.

في بعض الحالات، يمكن لطبيبك أن يصف لك جرعات أعلى (يمكن الزيادة
الجرعة إلى 160 ملغ وإلى حد أقصى 320 ملغ).

- بعد الإصابة بأزمة قلبية حديثة عند مرضى الباقين:

بعد الإصابة بأزمة قلبية، يبدأ العلاج عادة بعد 12 ساعة، عادة بجرعة
ملغ. سيزيد طبيبك في الجرعة تدريجياً خلال الأسابيع التالية حتى الجرعة
الأقصى 160 ملغ، مرتين في اليوم. تعتمد الجرعة النهائية على قدرة تح
الفردية.

يمكن إعطاء ستارقال، قرص ملبس، مع علاج آخر للتنبؤات القلبية وسو
طبيبك العلاج المناسب لحالتك.

- قصور القلب عند مرضى الباقين :

يبدأ العلاج عادة بـ 40 ملغ مرتين في اليوم. سيزيد طبيبك الجرعة تدريجياً
خلال الأسابيع التالية إلى جرعة أقصى 160 ملغ، مرتين في اليوم. ت
الجرعة النهائية على قدرة تحملك الفردية. يمكن إعطاء ستارقال، قر
ملبس، مع علاج آخر للقصور القلبي وسيفر طبيبك العلاج المناسب لحالتك
إذا أخذت ستارقال، قرص ملبس، أكثر من اللازم

إذا كان لديك دوار شديد وآرإغماء، إستشر طبيبك على الفور واستلقي.
عددا كبيرا من الاقراص عن طريق الخطأ، استشر الطبيب، الصيدلي
المستشفى.

إذا نسيت أخذ ستارقال، قرص ملبس

إذا نسيت أخذ جرعة، خذها حالما تتذكرها.

ومع ذلك، لا تأخذ الجرعة الممنوعة إذا كانت جرعتك التالية قريبة.
لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي نسيت أخذها.

إذا توقفت عن أخذ ستارقال، قرص ملبس

قد يؤدي وقف العلاج باستخدام ستارقال، قرص ملبس، إلى تفاقم مرض
لا توقف علاجك ما لم ينصح طبيبك بذلك.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استعمال هذا الدواء، اطلب من الطبيب
الصيدلي للحصول على المزيد من المعلومات.

طريقة الاستعمال

يمكنك أن تستعمل ستارقال، قرص ملبس، مع أو بدون الأكل. تنا
ستارقال، قرص ملبس، مع كأس من الماء.

وتيرة الاستعمال

تناول ستارقال، قرص ملبس، كل يوم في نفس الوقت تقريبا.

7. مواقع الاستعمال

لا ينبغي أن يستعمل هذا الدواء في الحالات التالية:

• إذا كنت تعاني من حساسية (فرط الحساسية) من فالمسارنات أو أي
المكونات الأخرى الموجودة في ستارقال، قرص ملبس،

يرجى قراءة كامل هذه النشرة بانتباه قبل استعمال هذا الدواء.

حافظ على هذه النشرة - قد تحتاج لقراءتها من جديد.

إذا كان لديك أي سؤال آخر، إذا كان لديك أي شك، اطلب معلومات أكثر من

طبيبك أو الصيدلي.

لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً. لا تعطيه أبداً لشخص آخر، حتى في حالة

أعراض مماثلة، قد يضر بـ.

إذا أصبحت إحدى التأثيرات الغير المرغوب فيها خطيرة، أو إذا لاحظت

تأثيراً غير مرغوب فيه غير مذكور في هذه النشرة، يرجى إخبار طبيبك أو

الصيدلي.

1. إسم الدواء

ملغ. 160 ستارقال

ملغ. 80 ستارقال

2. التركيب النوعي والكمي

160 ملغ ستارقال

المادة الفعالة هي:

فالمسارنات 160 ملغ

80 ملغ ستارقال

المادة الفعالة هي:

فالمسارنات 80 ملغ

لكل قرص ملبس

المكونات الأخرى:

التوترا (مشتق): سيلوز دقيق التيلور، كروسوبوفيدون، السيليكا الغروية

اللامانية، ستيارات المغنيزيوم، نشا مهلم مسبقاً، ماء متقى.

التغليف:

(ملغ). 80 (لستارقال أصفر أوبادري

(ملغ). 160 (وردى (لستارقال أوبادري

3. الشكل الصيدلي

يقدم هذا الدواء في علب من 14 و 28 قرص ملبس.

4. الصنف الصيدلي - العلاجي

غير مشتركة II مضادات الأنجيوتنسين

(CODE ATC : C09CA03)

5. الإرشادات العلاجية

يمكن استعمال ستارقال قرص ملبس، لثلاث إصابات مختلفة:

• علاج ارتفاع ضغط الدم عند المرضى الباقين، الأطفال والمراهقين الذين

تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 18 سنة. ارتفاع ضغط الدم يزيد من الجهد

المبذول من قبل القلب والشرايين. في حالة غياب العلاج، يمكن لارتفاع ضغط

الدم أن يثقل الأوعية الدموية للدماغ، القلب والكليتين، ويمكن أن يسبب سكتة

دماغية، قصور القلب أو قصوراً كلوياً. ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر

الإصابة بالتنبؤات القلبية. خفض ضغط الدم إلى المستوى الطبيعي سيسكن من

التقليل من خطر ظهور هذه المضطرابات.

• لعلاج المرضى الباقين الذين أصيبوا بنبوة قلبية حديثة (احتشاء عضلة

القلب). "مؤخراً" هنا تعني ما بين 12 ساعة و 10 أيام.

• لعلاج المرضى الباقين المصابين بقصور قلبي عرضي. يستعمل ستارقال

قرص ملبس، عندما لا يمكن استعمال فئة من الأدوية تسمى مثبطات الأنزيم

المحول للأنجيوتنسين (الأدوية المستخدمة لعلاج قصور القلب). أو يمكن أيضاً

استعماله بالإضافة إلى مثبطات الأنزيم المحول عندما لا يمكن استعمال أدوية

Lot n° :

Exp. :

ستارقال

قالزارتار

تالية: تنفس قصير وتورم القدمين وال
يحدث عندما لا يمكن لمعضلة القلب ض
ورية من الدم إلى الجسم.

إزاء ابتاعه إرشادات الطبيب الموضوعة
تقليل من خطر التأثيرات الغير مرغوب في
باله الشك.

أصغر
غالباً ما لا يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أي ع
على وجود هذا المرض. يمكن لمعظم الناس أن تشعر بشعور طبيعي جداً.
السبب من المهم بصفة خاصة المحافظة على مواظبتك مع طبيبك حتى إذا
تسهر بأنك في حالة جيدة.

- ارتفاع ضغط الدم عند المرضى الباقين: الجرعة الموصى بها هي 80
يومياً. في بعض الحالات، قد يصف الطبيب جرعات أعلى (مثلاً 160 ملغ
320 ملغ). كما يمكن أن تشارك ستارقال، قرص ملبس، مع دواء آخر
مدرا للبول).

- ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين (الذين تتراوح أعمارهم بين
18 سنة)

عند المرضى الذين يقل وزنهم عن 35 كلغ، الجرعة المعتادة هي 40 ملغ
فالمسارنات مرة واحدة في اليوم.

عند المرضى الذين وزنهم 35 كلغ أو أكثر، الجرعة المعتادة هي 80 ملغ
فالمسارنات مرة واحدة في اليوم.

في بعض الحالات، يمكن لطبيبك أن يصف لك جرعات أعلى (يمكن الزيادة
الجرعة إلى 160 ملغ وإلي حد أقصى 320 ملغ).

- بعد الإصابة بأزمة قلبية حديثة عند مرضى الباقين:

بعد الإصابة بأزمة قلبية، يبدأ العلاج عادة بعد 12 ساعة، عادة بجرعة
ملغ. سيزيد طبيبك في الجرعة تدريجياً خلال الأسابيع التالية حتى الجرعة
الأقصى 160 ملغ، مرتين في اليوم. تعتمد الجرعة النهائية على قدرة تح
الفردية.

يمكن إعطاء ستارقال، قرص ملبس، مع علاج آخر للتنبؤات القلبية وسو
طبيبك العلاج المناسب لحالتك.

- قصور القلب عند مرضى الباقين :

يبدأ العلاج عادة بـ 40 ملغ مرتين في اليوم. سيزيد طبيبك الجرعة تدريجياً
خلال الأسابيع التالية إلى جرعة أقصى 160 ملغ، مرتين في اليوم. ت
الجرعة النهائية على قدرة تحملك الفردية. يمكن إعطاء ستارقال، قر
ملبس، مع علاج آخر للقصور القلبي وسيفر طبيبك العلاج المناسب لحالتك
إذا أخذت ستارقال، قرص ملبس، أكثر من اللازم

إذا كان لديك دوار شديد وآرإغماء، إستشر طبيبك على الفور واستلقي.
عددا كبيرا من الاقراص عن طريق الخطأ، استشر الطبيب، الصيدلي
المستشفى.

إذا نسيت أخذ ستارقال، قرص ملبس

إذا نسيت أخذ جرعة، خذها حالما تتذكرها.

ومع ذلك، لا تأخذ الجرعة الممنوعة إذا كانت جرعتك التالية قريبة.
لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي نسيت أخذها.

إذا توقفت عن أخذ ستارقال، قرص ملبس

قد يؤدي وقف العلاج باستخدام ستارقال، قرص ملبس، إلى تفاقم مرض
لا توقف علاجك ما لم ينصح طبيبك بذلك.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استعمال هذا الدواء، اطلب من الطبيب
الصيدلي للحصول على المزيد من المعلومات.

طريقة الاستعمال

يمكنك أن تستعمل ستارقال، قرص ملبس، مع أو بدون الأكل. تنا
ستارقال، قرص ملبس، مع كأس من الماء.

وتيرة الاستعمال

تناول ستارقال، قرص ملبس، كل يوم في نفس الوقت تقريبا.

7. مواقع الاستعمال

لا ينبغي أن يستعمل هذا الدواء في الحالات التالية:

• إذا كنت تعاني من حساسية (فرط الحساسية) من فالمسارنات أو أي
المكونات الأخرى الموجودة في ستارقال، قرص ملبس،

يرجى قراءة كامل هذه النشرة بانتباه قبل استعمال هذا الدواء.

حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها من جديد.

إذا كان لديك أي سؤال آخر، إذا كان لديك أي شك، اطلب معلومات أكثر من

طبيبك أو الصيدلي.

لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً. لا تعطيه أبداً لشخص آخر، حتى في حالة

أعراض مماثلة، قد يضر بـ.

إذا أصبحت إحدى التأثيرات الغير المرغوب فيها خطيرة، أو إذا لاحظت

تأثيراً غير مرغوب فيه غير مذكور في هذه النشرة، يرجى إخبار طبيبك أو

الصيدلي.

1. إسم الدواء

ملغ. 160 ستارقال

ملغ. 80 ستارقال

2. التركيب النوعي والكمي

160 ملغ ستارقال

المادة الفعالة هي:

فالمسارنات 160 ملغ

80 ملغ ستارقال

المادة الفعالة هي:

فالمسارنات 80 ملغ

لكل قرص ملبس

المكونات الأخرى:

التواء (مشتق): سيلوز دقيق التبلور، كروسوبوفيدون، السيليكا الغروية
اللامائية، ستيارات المغنيزيوم، نشا مهلم مسبقاً، ماء متقى.

التغليف:

(ملغ). 80 (لستارقال أصفر أوبادري

(ملغ). 160. وردى (لستارقال أوبادري

3. الشكل الصيدلي

يقدم هذا الدواء في علب من 14 و 28 قرص ملبس.

4. الصنف الصيدلي - العلاجي

غير مشتركة II مضادات الأنجيوتنسين

(CODE ATC : C09CA03)

5. الإرشادات العلاجية

يمكن استعمال ستارقال قرص ملبس، لثلاث إصابات مختلفة:

• علاج ارتفاع ضغط الدم عند المرضى الباقين، الأطفال والمراهقين الذين
تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 18 سنة. ارتفاع ضغط الدم يزيد من الجهد

المبذول من قبل القلب والشرايين. في حالة غياب العلاج، يمكن لارتفاع ضغط
الدم أن يلف الأوعية الدموية للدماغ، القلب والكليتين، ويمكن أن يسبب سكتة

دماغية، قصور القلب أو قصوراً كلوياً. ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر
الإصابة بالتنبؤات القلبية. خفض ضغط الدم إلى المستوى الطبيعي سيسكن من

التقليل من خطر ظهور هذه المضطرابات.

• لعلاج المرضى الباقين الذين أصيبوا بنوبة قلبية حديثة (احتشاء عضلة
القلب). "مؤخراً" هنا تعني ما بين 12 ساعة و 10 أيام.

• لعلاج المرضى الباقين المصابين بقصور قلبي عرضي. يستعمل ستارقال
قرص ملبس، عندما لا يمكن استعمال فئة من الأدوية تسمى مثبطات الأنزيم

المحول للأنجيوتنسين (الأدوية المستخدمة لعلاج قصور القلب). أو يمكن أيضاً
استعماله بالإضافة إلى مثبطات الأنزيم المحول عندما لا يمكن استعمال أدوية

Lot n° :

Exp. :

ستارقال

قالزارتار

تالية: تنفس قصير وتورم القدمين وال
يحدث عندما لا يمكن لمعضلة القلب ض
ورية من الدم إلى الجسم.

إزاء ابتاعه إرشادات الطبيب الموضوعة
تقليل من خطر التأثيرات الغير مرغوب في
باله الشك.

غالباً ما لا يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أي ع
على وجود هذا المرض. يمكن لمعظم الناس أن تشعر بشعور طبيعي جداً.
السبب من المهم بصفة خاصة المحافظة على مواضعك مع طبيبك حتى إذا
تغير بأكف في حالة جيدة.

- ارتفاع ضغط الدم عند المرضى الباقين: الجرعة الموصى بها هي 80
يومياً. في بعض الحالات، قد يصف الطبيب جرعات أعلى (مثلاً 160 ملغ
320 ملغ). كما يمكن أن تترك ستارقال، قرص ملبس، مع دواء آخر
مدرا للبول).

- ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين (الذين تتراوح أعمارهم بين
18 سنة)

عند المرضى الذين يقل وزنهم عن 35 كلغ، الجرعة المعتادة هي 40 ملغ
فالمسارتان مرة واحدة في اليوم.

عند المرضى الذي وزنهم 35 كلغ أو أكثر، الجرعة المعتادة هي 80 ملغ
فالمسارتان مرة واحدة في اليوم.

في بعض الحالات، يمكن لطبيبك أن يصف لك جرعات أعلى (يمكن الزيادة
الجرعة إلى 160 ملغ وإلى حد أقصى 320 ملغ).

- بعد الإصابة بأزمة قلبية حديثة عند مرضى الباقين:

بعد الإصابة بأزمة قلبية، يبدأ العلاج عادة بعد 12 ساعة، عادة بجرعة
ملغ. سيزيد طبيبك في الجرعة تدريجياً خلال الأسابيع التالية حتى الجرعة
الأقصى 160 ملغ، مرتين في اليوم. تعتمد الجرعة النهائية على قدرة تحم
الفردية.

يمكن إعطاء ستارقال، قرص ملبس، مع علاج آخر للتنبؤات القلبية وسيو
طبيبك العلاج المناسب لحالتك.

- قصور القلب عند مرضى الباقين :

يبدأ العلاج عادة بـ 40 ملغ مرتين في اليوم. سيزيد طبيبك الجرعة تدريجياً
خلال الأسابيع التالية إلى جرعة أقصى 160 ملغ، مرتين في اليوم. ت
الجرعة النهائية على قدرة تحمك الفردية. يمكن إعطاء ستارقال، قرص
ملبس، مع علاج آخر للقصور القلبي وسيقتر طبيبك العلاج المناسب لحالتك.

إذا أخذت ستارقال، قرص ملبس، أكثر من اللازم

إذا كان لديك دوار شديد وآرإغماء، إستشر طبيبك على الفور واستلقي.
عددا كبيرا من الافراس عن طريق الخطأ، استشر الطبيب، الصيدلي
المستشفى.

إذا نسيت أخذ ستارقال، قرص ملبس

إذا نسيت أخذ جرعة، خذها حالما تتذكرها.

ومع ذلك، لا تأخذ الجرعة الممنوعة إذا كانت جرعتك التالية قريبة.
لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي نسيت أخذها.

إذا توقفت عن أخذ ستارقال، قرص ملبس

قد يؤدي وقف العلاج باستخدام ستارقال، قرص ملبس، إلى تفاقم مرض
لا توقف علاجك ما لم ينصح طبيبك بذلك.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استعمال هذا الدواء، اطلب من الطبيب
الصيدلي للحصول على المزيد من المعلومات.

طريقة الاستعمال

يمكنك أن تستعمل ستارقال، قرص ملبس، مع أو بدون الأكل. تنا
ستارقال، قرص ملبس، مع كأس من الماء.

وتيرة الاستعمال

تناول ستارقال، قرص ملبس، كل يوم في نفس الوقت تقريبا.

7. مواقع استعمال

لا ينبغي أن يستعمل هذا الدواء في الحالات التالية:

• إذا كنت تعاني من حساسية (فرط الحساسية) من فالمسارتان أو أي
المكونات الأخرى الموجودة في ستارقال، قرص ملبس،

يرجى قراءة كامل هذه النشرة بانتباه قبل استعمال هذا الدواء.

حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها من جديد.

إذا كان لديك أي سؤال آخر، إذا كان لديك أي شك، اطلب معلومات أكثر من
طبيبك أو الصيدلي.

لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً. لا تعطيه أبداً لشخص آخر، حتى في حالة
أعراض مماثلة، قد يضر بـ.

إذا أصبحت إحدى التأثيرات الغير المرغوب فيها خطيرة، أو إذا لاحظت
تأثيراً غير مرغوب فيه غير مذكور في هذه النشرة، يرجى إخبار طبيبك أو
الصيدلي.

1. إسم الدواء

ملغ. 160 ستارقال

ملغ. 80 ستارقال

2. التركيب النوعي والكمي

160 ملغ ستارقال

المادة الفعالة هي:

فالمسارتان 160 ملغ

80 ملغ ستارقال

المادة الفعالة هي:

فالمسارتان 80 ملغ

لكل قرص ملبس

المكونات الأخرى:

التوترا (مشتق): سيلوز دقيق التيلور، كروسوبوفيدون، السيليكا الغروية
اللامائية، ستيارات المغنيزيوم، نشا مهلم مسبقاً، ماء متقى.

التغليف:

(ملغ). 80 (لستارقال أصفر أوبادري

(ملغ). 160 (ورددي (لستارقال أوبادري

3. الشكل الصيدلي

يقدم هذا الدواء في علب من 14 و 28 قرص ملبس.

4. الصنف الصيدلي - العلاجي

غير مشتركة II مضادات الأنجيوتنسين

(CODE ATC : C09CA03)

5. الإرشادات العلاجية

يمكن استعمال ستارقال قرص ملبس، لثلاث إصابات مختلفة:

• علاج ارتفاع ضغط الدم عند المرضى الباقين، الأطفال والمراهقين الذين
تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 18 سنة. ارتفاع ضغط الدم يزيد من الجهد
المبذول من قبل القلب والشرايين. في حالة غياب العلاج، يمكن لارتفاع ضغط
الدم أن يلف الأوعية الدموية للدماغ، القلب والكليتين، ويمكن أن يسبب سكتة

دماغية، قصور القلب أو قصوراً كلويًا. ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر
الإصابة بالتنبؤات القلبية. خفض ضغط الدم إلى المستوى الطبيعي سيسكن من
التقليل من خطر ظهور هذه المضطرابات.

• لعلاج المرضى الباقين الذين أصيبوا بنوبة قلبية حديثة (احتشاء عضلة
القلب). "مؤخرًا" هنا تعني ما بين 12 ساعة و 10 أيام.

• لعلاج المرضى الباقين المصابين بقصور قلبي عرضي. يستعمل ستارقال
قرص ملبس، عندما لا يمكن استعمال فئة من الأدوية تسمى مثبطات الأنزيم
المحول للأنجيوتنسين (الأدوية المستخدمة لعلاج قصور القلب). أو يمكن أيضاً

استعماله بالإضافة إلى مثبطات الأنزيم المحول عندما لا يمكن استعمال أدوية

Lot n° :

Exp. :

ستارقال

قالزارتار

تالية: تنفس قصير وتورم القدمين وال
يحدث عندما لا يمكن لمعضلة القلب ض
ورية من الدم إلى الجسم.

إزاء ابتاعه إرشادات الطبيب الموضوعة
تقليل من خطر التأثيرات الغير مرغوب في
باله الشك.

غالباً ما لا يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أي ع
على وجود هذا المرض. يمكن لمعظم الناس أن تشعر بشعور طبيعي جداً.
السبب من المهم بصفة خاصة المحافظة على مواضعك مع طبيبك حتى إذا
تغير بأكف في حالة جيدة.

- ارتفاع ضغط الدم عند المرضى الباقين: الجرعة الموصى بها هي 80
يومياً. في بعض الحالات، قد يصف الطبيب جرعات أعلى (مثلاً 160 ملغ
320 ملغ). كما يمكن أن تترك ستارقال، قرص ملبس، مع دواء آخر
مدرا للبول).

- ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين (الذين تتراوح أعمارهم بين
18 سنة)

عند المرضى الذين يقل وزنهم عن 35 كلغ، الجرعة المعتادة هي 40 ملغ
فالمسارتان مرة واحدة في اليوم.

عند المرضى الذي وزنهم 35 كلغ أو أكثر، الجرعة المعتادة هي 80 ملغ
فالمسارتان مرة واحدة في اليوم.

في بعض الحالات، يمكن لطبيبك أن يصف لك جرعات أعلى (يمكن الزيادة
الجرعة إلى 160 ملغ وإلي حد أقصى 320 ملغ).

- بعد الإصابة بأزمة قلبية حديثة عند مرضى الباقين:

بعد الإصابة بأزمة قلبية، يبدأ العلاج عادة بعد 12 ساعة، عادة بجرعة
ملغ. سيزيد طبيبك في الجرعة تدريجياً خلال الأسابيع التالية حتى الجرعة
الأقصى 160 ملغ، مرتين في اليوم. تعتمد الجرعة النهائية على قدرة تحم
الفردية.

يمكن إعطاء ستارقال، قرص ملبس، مع علاج آخر للتنبؤات القلبية وسيو
طبيبك العلاج المناسب لحالتك.

- قصور القلب عند مرضى الباقين :

يبدأ العلاج عادة بـ 40 ملغ مرتين في اليوم. سيزيد طبيبك الجرعة تدريجياً
خلال الأسابيع التالية إلى جرعة أقصى 160 ملغ، مرتين في اليوم. ت
الجرعة النهائية على قدرة تحمك الفردية. يمكن إعطاء ستارقال، قرص
ملبس، مع علاج آخر للقصور القلبي وسيقتر طبيبك العلاج المناسب لحالتك.

إذا أخذت ستارقال، قرص ملبس، أكثر من اللازم

إذا كان لديك دوار شديد وآلام إزعاج، استشر طبيبك على الفور واستلقي.
عددا كبيرا من الأفراس عن طريق الخطأ، استشر الطبيب، الصيدلي
المستشفى.

إذا نسيت أخذ ستارقال، قرص ملبس

إذا نسيت أخذ جرعة، خذها حالما تتذكرها.

ومع ذلك، لا تأخذ الجرعة الممنوعة إذا كانت جرعتك التالية قريبة.
لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي نسيت أخذها.

إذا توقفت عن أخذ ستارقال، قرص ملبس

قد يؤدي وقف العلاج باستخدام ستارقال، قرص ملبس، إلى تفاقم مرض
لا توقف علاجك ما لم ينصح طبيبك بذلك.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استعمال هذا الدواء، اطلب من الطبيب
الصيدلي للحصول على المزيد من المعلومات.

طريقة الاستعمال

يمكنك أن تستعمل ستارقال، قرص ملبس، مع أو بدون الأكل. تنا
ستارقال، قرص ملبس، مع كأس من الماء.

وتيرة الاستعمال

تناول ستارقال، قرص ملبس، كل يوم في نفس الوقت تقريبا.

7. مواقع استعمال

لا ينبغي أن يستعمل هذا الدواء في الحالات التالية:

• إذا كنت تعاني من حساسية (فرط الحساسية) من فالمسارتان أو أي
المكونات الأخرى الموجودة في ستارقال، قرص ملبس،

يرجى قراءة كامل هذه النشرة بانتباه قبل استعمال هذا الدواء.

حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها من جديد.

إذا كان لديك أي سؤال آخر، إذا كان لديك أي شك، اطلب معلومات أكثر من
طبيبك أو الصيدلي.

لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً. لا تعطيه أبداً لشخص آخر، حتى في حالة
أعراض مماثلة، قد يضر بـ.

إذا أصبحت إحدى التأثيرات الغير المرغوب فيها خطيرة، أو إذا لاحظت
تأثيراً غير مرغوب فيه غير مذكور في هذه النشرة، يرجى إخبار طبيبك أو
الصيدلي.

1. إسم الدواء

ملغ. 160 ستارقال

ملغ. 80 ستارقال

2. التركيب النوعي والكمي

160 ملغ ستارقال

المادة الفعالة هي:

فالمسارتان 160 ملغ

80 ملغ ستارقال

المادة الفعالة هي:

فالمسارتان 80 ملغ

لكل قرص ملبس

المكونات الأخرى:

التواء (مشتق): سيلوز دقيق التبلور، كروسوبوفيدون، السيليكا الغروية
اللامائية، ستيارات المغنيزيوم، نشا مهلم مسبقاً، ماء متقى.

التغليف:

(ملغ). 80 (لستارقال أصفر أوبادري

(ملغ). 160 (ورددي (لستارقال أوبادري

3. الشكل الصيدلي

يقدم هذا الدواء في علب من 14 و 28 قرص ملبس.

4. الصنف الصيدلي - العلاجي

غير مشتركة II مضادات الأنجيوتنسين

(CODE ATC : C09CA03)

5. الإرشادات العلاجية

يمكن استعمال ستارقال قرص ملبس، لثلاث إصابات مختلفة:

• علاج ارتفاع ضغط الدم عند المرضى الباقين، الأطفال والمراهقين الذين
تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 18 سنة. ارتفاع ضغط الدم يزيد من الجهد

المبذول من قبل القلب والشرايين. في حالة غياب العلاج، يمكن لارتفاع ضغط
الدم أن يلف الأوعية الدموية للدماغ، القلب والكليتين، ويمكن أن يسبب سكتة

دماغية، قصور القلب أو قصوراً كلويًا. ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر
الإصابة بالتنبؤات القلبية. خفض ضغط الدم إلى المستوى الطبيعي سيسكن من

التقليل من خطر ظهور هذه المضطرابات.

• لعلاج المرضى الباقين الذين أصيبوا بنبوة قلبية حديثة (احتشاء عضلة
القلب). "مؤخرًا" هنا تعني ما بين 12 ساعة و 10 أيام.

• لعلاج المرضى الباقين المصابين بقصور قلبي عرضي. يستعمل ستارقال
قرص ملبس، عندما لا يمكن استعمال فئة من الأدوية تسمى مثبطات الأنزيم

المحول للأنجيوتنسين (الأدوية المستخدمة لعلاج قصور القلب). أو يمكن أيضاً
استعماله بالإضافة إلى مثبطات الأنزيم المحول عندما لا يمكن استعمال أدوية

NEBILET® 5 mg

V140377/01

* VIGNETTE

NEBILET® 5mg
28 comprimés ○
PPV 87DH50

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable

La substance active est :

Nébivolol 5,00 mg

Sous forme de chlorhydrate de nébivolol 5,45 mg
pour un comprimé quadrisécable

Les autres composants sont :

Polysorbate 80, hypromellose, lactose monohydraté, amidon de maïs, croscarmellose sodique, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

1. QU'EST-CE QUE NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable

ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous la forme d'un comprimé quadrisécable en boîte de 28 comprimés.

Ce médicament est un bêta-bloquant sélectif.

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (d'origine inconnue).

Ce médi-

(un médicament pour le traitement du cancer);

Médicaments pour traiter un excès d'acidité dans l'estomac ou les ulcères (médicament antiacide), par exemple la cimétidine ; NEBILET 5 mg doit être pris pendant les repas et l'antiacide entre les repas.

L'utilisation de ces médicaments est généralement déconseillée sous traitement par nébivolol sauf avis contraire de votre médecin.

3. COMMENT PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable ?

Hypertension

La dose est généralement d'un comprimé par jour. Chez les sujets âgés et chez les insuffisants rénaux, la posologie initiale est de 1/2 comprimé par jour.

L'activité antihypertensive se manifeste généralement après 1 à 2 semaines de traitement, l'effet maximal ne pouvant apparaître qu'au bout de 4 semaines.

Votre médecin peut décider d'associer d'autres médicaments antihypertenseurs, en cas de réponse insuffisante.

Insuffisance cardiaque chronique stable

La posologie est adaptée à chaque patient, par augmentation progressive des doses toutes les 1 à 2 semaines en fonction de la tolérance.

Le traitement est instauré à 1,25 mg (soit 1/4 de comprimé) par jour pendant 1 à 2 semaines, selon la prescription de votre médecin.

Si le médicament est bien toléré, la posologie sera augmentée à 2,5 mg (1/2 comprimé) une fois par jour.