

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M23-003534

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1595 Société : RAM
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : TRIKI KAMAL
Date de naissance : 02/04/1955
Adresse : Rue AL MAN FALON, Casablanca
Tél. : / Total des frais engagés : / Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : / Age : /

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : /

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC M Pathologie : /

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : R. ACCUEIL

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : / Le : /

Signature de l'adhérent(e) : /

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur Date Montant de la Facture

PHARMACIE ROUDANI
Mme LEBBAK Khodja Fd Mikou
46 Bd Bratim Roudani Vers Mv Youssef
Madrif - Casablanca
Tél : 05 22 27 23 06 / 05 22 27 23 07

20.3.23 1376.40

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/> MONTANTS DES SOINS <input type="text"/> DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/> FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE H 25533412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 G 00000000 35533411 11433553 B (Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/> MONTANTS DES SOINS <input type="text"/> DATE DU DEVIS <input type="text"/> DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>
				DATE DU DEVIS <input type="text"/> DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



CABINET MÉDICAL SPÉCIALISÉ

Dr. Mostafa BENMIMOUN

Médecine Interne

Diplômé de l'Université Pierre & Marie Curie

Faculté de Médecine Saint-Antoine-Paris

الدكتور مصطفى بنميمون

الطب الباطني

خريج جامعة بيار و ماري كوري

كلية الطب سانت-انطوان-باريس

الطب الباطني - الأمراض المجموعية - الأعراض الكبرى - أمراض العضام والمفاصل - أمراض الشرايين

Maladies de systèmes - Maladies polyviscérales - Grands syndrômes - Maladies ostéo-articulaires - Pathologie vasculaire



091166298

Casablanca le, 20 MAR 2021

M^r TRIKI Kawal

39000x3

Galvus Met 50/1000

68.80x3

Amarul 4mg

1 — 0 — 0

x 03 mois

TResiba pextouch

1505 le soir

x 03 mois

1376.40

Docteur Mostafa BENMIMOUN
MEDECINE INTERNE
27, Rue Ilyâ Abou Madi (Bd. Brahim Roudani)
Casablanca - Tél: 05 22 29 82 28 - 05 22 20 40 80
ICE : 001700978000087

صيدلية البروداني
PHARMACIE ROUDANI
Mme LEBSAN Khadija
26, Bd Brahim Roudani Vers Mly Youssef
Marrakech - Casablanca
Tél: 05 22 27 23 86 / 05 22 27 22 26

S.V.S.V

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Galvus Met® 50 mg/500 mg
Galvus Met® 50 mg/850 mg
Galvus Met® 50 mg/1000 mg

Comprimés pelliculés. Boîtes de 60
 Vildagliptine/Metformine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Galvus Met et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Galvus Met ?
3. Comment utiliser Galvus Met ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Galvus Met ?
6. Informations supplémentaires

1. **Qu'est-ce que Galvus Met et dans quel cas est-il utilisé ?**

Selon prescription du médecin.

Galvus Met est un médicament utilisé dans le traitement du diabète de type 2 (diabète sucré). Galvus Met contient

les principes actifs vildagliptine et metformine. Il est prescrit en complément à un régime et à l'activité physique chez des patients ayant déjà reçu un traitement par la vildagliptine et la metformine ou en cas de contrôle insuffisant du diabète sous metformine seule ou vildagliptine seule.

Votre médecin peut vous prescrire un traitement par Galvus Met soit seul soit en association avec un autre antidiabétique oral dans le but de contrôler votre glycémie.

Galvus Met est aussi prescrit en traitement adjuvant à l'insuline, en complément à un régime et à l'activité physique, pour améliorer le contrôle de la glycémie chez les patients chez lesquels une dose stable d'insuline et de metformine ne permet pas d'obtenir un contrôle satisfaisant de la glycémie.

Galvus Met aide à contrôler la glycémie (taux de sucre dans le sang). Il fait partie d'un groupe de médicaments appelés antidiabétiques oraux.

Dans le diabète de type 2, votre corps ne produit pas assez d'insuline et/ou trop de glucagon. De plus, l'effet de l'insuline produite par votre organisme peut être altéré. L'insuline est une substance (sécrétée par le pancréas) qui aide à abaisser le taux de sucre dans le sang, en particulier après les repas. Le glucagon est une autre substance également produite par le pancréas. Il stimule la production de sucre, ce qui a pour effet d'augmenter la glycémie.

Galvus Met induit au niveau du pancréas une augmentation de la sécrétion d'insuline et une diminution de la libération du glucagon (effet de la vildagliptine), ainsi qu'une meilleure utilisation de l'insuline (effet de la metformine). Galvus Met contribue donc au contrôle de la glycémie.

Il est très important que vous vous conformiez scrupuleusement, tout au long de votre traitement par Galvus Met, aux recommandations concernant votre régime alimentaire et/ou votre activité physique.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Galvus Met ?

De quoi faut-il tenir compte ?

Un bon contrôle de la glycémie dépend non seulement du traitement, mais aussi et surtout du suivi scrupuleux de votre régime alimentaire approprié et de l'accomplissement de votre activité physique régulière. Consultez votre médecin ou votre spécialiste du diabète.

Quand Galvus Met ne doit pas être utilisé ?

Galvus Met ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Si vous présentez des symptômes de insuffisance rénale (composants du médicament peuvent être éliminés par les reins).
- Si vous souffrez d'insuffisance rénale (fonction rénale).
- Si vous avez subi récemment un infarctus du myocarde, si vous souffrez d'insuffisance cardiaque ou de troubles du rythme du cœur (compris un choc, ou une arythmie) ou si vous avez du mal à respirer.
- Si vous souffrez de complications graves du diabète (complications graves incluent une acidose métabolique, une complication du diabète par une perte de poids importante (vomissements) ou une infection grave).
- Si vous devez vous soumettre à un examen radiologique (un examen radiologique où l'on injecte un colorant pour améliorer l'image) ou si vous devez interrompre votre traitement avant ou le jour de l'examen ou les jours qui suivent.

Quelles sont les précautions d'emploi à prendre avec Galvus Met ?

Ne conduisez pas de véhicules ou des machines en cas de

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال
يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية
يحفظ الدواء داخل العلبة بعيدا عن الرطوبة
يجب قراءة النشرة قبل استعمال الدواء
يحتوي كل قرص مغلف على 50 ملغ من فلدغليتين و 00
اقرأ النشرة للمزيد من المعلومات



6 118001 031092
GALVUS MET® 50 mg/1000 mg
Boîte de 60 comprimés pelliculés
PPV : 390.00 DH

as être pris si vous souffrez de
un diabète de type 1. Galvus Met ne

plusieurs symptômes tels que
malaise, douleurs musculaires,
nausées ou vomissements profus,
têtu, palpitations (troubles du
u respiration rapide, pourrait
d'une acidose lactique, autrement
t grave du métabolisme. Contactez
votre médecin si vous ressentez de tels
symptômes de développer une acidose
chez les patients atteints
de ce diabète.

des nausées, des sudations, une
fièvre, des vertiges, des tremblements
et (signes d'hypoglycémie - taux
faible dans le sang), il pourrait s'agir d'un
effet secondaire, d'un effort physique intense sans
nourriture ou d'une consommation

certaines de ces symptômes,
arrêtez le traitement par Galvus Met et consultez
votre médecin.

Galvus Met en association avec un
traitement oral ou de l'insuline, le risque que

vous présentiez un taux de sucre trop bas dans le sang
(hypoglycémie) peut être augmenté. Votre médecin
diminuera le cas échéant la posologie de ces médicaments.
Pendant la prise de Galvus Met des cas d'inflammations
du pancréas (pancréatite) ont été rapportés. Une
pancréatite est une maladie grave, pouvant mettre la vie
en danger. Arrêtez de prendre Galvus Met et consultez
votre médecin si vous présentez des maux de ventre
intenses et persistants, avec ou sans vomissements, car
vous pourriez souffrir d'une pancréatite.

Si vous devez vous soumettre à une intervention
chirurgicale sous anesthésie générale, le traitement par

Galvus Met doit être interrompu quelques jours avant et
après l'opération. Votre médecin décidera quand vous
devrez interrompre votre traitement par Galvus Met et
quand vous devrez le reprendre.

Galvus Met ne devrait être pris par des personnes âgées
qu'en l'absence d'insuffisance rénale. Si vous êtes une
personne d'un certain âge, votre médecin contrôlera par
conséquent votre fonction rénale plusieurs fois par an.
On ne dispose d'aucune information sur l'utilisation de
Galvus Met chez les enfants et les adolescents (de moins
de 18 ans). L'utilisation de Galvus Met n'est donc pas
conseillée chez ces patients.

Si vous consommez de l'alcool tous les jours ou
occasionnellement de manière excessive.

Ne consommez pas d'alcool en excès ou ne prenez pas
de médicaments contenant de l'alcool pendant que vous
suivez un traitement par Galvus Met.

Prenez contact avec votre médecin en cas de détérioration
soudaine de vos glycémies, en cas de contrôles de
glycémie anormaux ou si vous vous sentez malade.

Veuillez consulter immédiatement votre médecin si vous
ressentez des douleurs, des sensibilités ou des faiblesses
musculaires inexpliquées. Dans de rares cas, les
problèmes musculaires peuvent être graves, notamment
une perte musculaire qui peut entraîner des lésions
rénales. Le risque peut être accru pour des dosages plus
élevés de Galvus Met et chez les patients présentant une
fonction rénale anormale.

Informez votre médecin si vous prenez des médicaments
pour le traitement de l'angine de poitrine, d'infections
par le VIH ou d'un certain type de cancer de la thyroïde
(cancer médullaire de la thyroïde).

Veuillez informer également votre médecin ou votre
pharmacien si :

- vous souffrez d'une autre maladie;
- vous êtes allergique;
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en
automédication!).

précautions à observer lors de la

utilisation et n'utilisez pas de
dosages.



يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال
يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية
يحفظ الدواء داخل العلبة بعيدا عن الرطوبة
يجب قراءة النشرة قبل استعمال الدواء
يحتوي كل قرص مغلف على 50 ملغ من فلدغليبتين و 1000
اقرأ النشرة للمزيد من المعلومات

حفظ بعيدا عن متناول الأطفال
حفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية
يحفظ الدواء داخل العلبة بعيدا عن الرطوبة
يجب قراءة النشرة قبل استعمال الدواء
يحتوي كل قرص مغلف على 50 ملغ من فلدغليبتين و 1000
اقرأ النشرة للمزيد من المعلومات



6 118001 031092
GALVUS MET® 50 mg/1000 mg ○
Boîte de 60 comprimés pelliculés
PPV : 390.00 DH



6 118001 031092
GALVUS MET® 50 mg/1000 mg ○
Boîte de 60 comprimés pelliculés
PPV : 390.00 DH

4 mg



Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca

Amarel 4 mg, cp b 30
P.P.V : 68,80 DH



6 118001 081325

SANOFI 



3 664798 032437

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca

Amarel 4 mg, cp b 30
P.P.V : 68,80 DH



6 118001 081325

SANOFI 



3 664798 03

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca

Amarel 4 mg, cp b 30
P.P.V : 68,80 DH



6 118001 081325

SANOFI 



3 664798 032