

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0056431

157561

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 6931 Société : RAM

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : ESSAKHRI, SEDRA

Date de naissance : 23/11/1966

Adresse : 20000 Casablanca Rue 11 2968

Tél. : 066/052145 Total des frais engagés : ..... Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. SEBILI Fayçal  
Cardiologue  
Bd. Mohamed Ben Ziane 800 Farhat Hached  
1er Etage N° 3 Casablanca  
Tél: 0522 21 14 11 - drsebili.faycal@gmail.com

Date de consultation : 04/04/2013

Nom et prénom du malade : Chams Petouma Age : 1966

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Bilan hypertension

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Centre Allal Ben Abdellah Le : 04/04/2013

Signature de l'adhérent(e) :



## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et-signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
04/04/2023	Consultation	3000	3000	Bd. Mohamed Bouziane Bés. Farhatine 4 1 <sup>er</sup> Etage N°3 Casablanca Tél: 0522 37 13 11 - <a href="mailto:creatifaysal@gmail.com">creatifaysal@gmail.com</a>
04/04/2023	Re-hospitalisation d'appeler	8000	8000	Bd. Mohamed Bouziane Bés. Farhatine 4 1 <sup>er</sup> Etage N°3 Casablanca

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
CHAMULIERES ESPAGNE AVENUE 10 VALLÈS SIDI 0522671386 TEL 0033628500085	04/10/23	1137100

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>EXAMINER LABORATOIRE TAOUFIK LOUANJLI PHARMACIEN BIOLOGISTE EX-DEPTE MEDICAL SIDI OTHMAN EX-DEPTE DE LA PREFECTURE SIDI TAUFIK LOUANJLI EX-DEPTE MEDICAL SIDI OTHMAN EX-DEPTE DE LA PREFECTURE SIDI TAUFIK LOUANJLI</i>	03/04/23	B652 18 - 452 18 - 452 18 - 452 18 - 452	1320

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]  
fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE REVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# Dr SEBTI Fayçal

Spécialiste des Maladies du  
Cœur et des Vaisseaux  
Electrocardiogramme, Holter ECG,  
Holter Tensionel (MAPA)  
Echographie Doppler Cardiaque



الدكتور السبتي فيصل

طبيب إختصاصي في أمراض القلب  
والشرايين والضغط الدموي  
ECG تخطيط القلب، هولتر  
و هولتر الضغط الدموي  
صدى دوبلر القلب

One charts Fettouma.

Casablanca, le 04/04/2023

42,80  
X2

① Avelocandyl 40g  $\rightarrow N^{\circ} 2$   
1/4 4 15 S.V. st

84,50  
X2

② Neovillog 300g  $\rightarrow N^{\circ} 2$   
1/8 4 5 S.V. Sab.

③ Novilon

119,00  
X6

PPC: 119DH  
LOT: NU23  
EXP: 01/26

S.V.

$N^{\circ} 6$

PPC: 119DH  
LOT: NU23  
EXP: 01/26

PPC: 119DH  
LOT: NU23  
EXP: 01/26

Dr. SEBTI Fayçal  
Cardiologue  
Bd. Mohamed Bouziane Rés. Farhatine 4  
1er Etage N° 3 Casablanca  
0522371311 - drsebtifaycal@gmail.com

PPC: 119DH  
LOT: NU23  
EXP: 01/26

PPC: 119DH  
LOT: NU23  
EXP: 01/26

شارع محمد بوزيان، إقامة فرحتين 4، الشقة 3، الطابق 1،  
الهاتف : 05 22 37 13 11 - البريد الإلكتروني: mail.com

residence Farhatine 4, Appt 3, 1er étage, Sidi Othmane, Casablanca  
0522371311 - E-mail : drsebtifaycal@gmail.com

④ 56,30 x 2  
D - Line 25000 UI  N° 2

57,80 1amp ~~Reservoirs~~

⑤ LD - Nor 10g  Soln. N° 1

14/5 15/2

PHARMACIE IBNOULKHATIB Casa  
229 Avenue 10 Mars  
Sidi Othman  
Tel: 05 22 37 13 86  
ICE: 001758290000051

RS 1137100

Dr. SEBTI Fayçal  
Cardiologue  
Bd. Mohamed Bouziane Résidence 4  
1<sup>er</sup> Etage N° 3 - Casablanca  
Tél: 0522 37 13 11 - drsebtifaycal@gmail.com

F

l'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement.

### 3. COMMENT PRENDRE AVLOCARDYL

cable ?

#### Posologie

La posologie est aussi adaptée à AVLOCARDYL 40 mg certaines conditions du rythme cardiaque en fonction de l'âge.

Si les troubles persistent, consultez rapidement votre médecin.

Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

#### Mode d'administration

Ce médicament est utilisé par voie orale. Les comprimés doivent être avalés avec une boisson (par exemple de l'eau).

#### Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez prendre ce médicament. Vous ne devez pas arrêter le traitement sans son autorisation.

#### Si vous avez pris plus de AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable que vous n'auriez dû :

Consultez votre médecin.

#### Si vous oubliez de prendre AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable :

En cas d'oubli, prendre dès que possible votre comprimé et poursuivre votre traitement normalement. Ne jamais prendre une double dose pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

**Effets indésirables fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :** • une fatigue, • des refroidissements des extrémités, • un ralentissement du rythme cardiaque, • des problèmes de circulation du sang au niveau des doigts avec des engourdissements (maladie de Raynaud), • des insomnies, des cauchemars.

**Effets indésirables peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) :** • des troubles gastro-intestinaux (douleurs de l'estomac, nausées, vomissements, diarrhées).

**Effets indésirables rares (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1000) :** • des sensations vertigineuses, • une diminution du nombre de plaquette dans le sang, • une maladie du cœur (insuffisance cardiaque), • des anomalies du rythme cardiaque (troubles de la conduction cardiaque), • une chute de la tension artérielle, • une difficulté à marcher pouvant être aggravée chez une personne qui boitait déjà, • des hallucinations, des troubles psychiatriques (psychoses, modifications de l'humeur, confusion), une impuissance, • divers effets sur la peau et les cheveux, notamment, des tâches rouges (purpura), une chute de cheveux (alopecie), des boutons rouges (psoriasis, ou aggravations d'un psoriasis), • une

01.05.2005  
PER : 05 2025

AVLOCARDYL 40MG

CP SEC B50

P.P.V : 41DH80

6 118000 010227



elle est

à sous  
oubles  
édecin

40000529-02



**IMAG**<sup>®</sup>  
NE  
MAGNÉSIUM it.B6



F  
C  
PR

Lot :

A consommer avant le :  
Ne PPC: 84.50 DH

Nouv.

Magnésium d'or  
bon fonction

Lot :  
A consommer avant le  
PPC: 84.50 DH  
amine B6

musculaire  
de l'organisme : Il participe à réduire la fatigue physique et émotionnelle (nervosité, irritabilité, stress, difficulté d'endormissement et de concentration, surmenage) et à maintenir une fonction musculaire normale (un déficit en magnésium peut être la source de crampes musculaires et de fourmillements).

#### **CONSEILS D'UTILISATION :**

1 gélule par jour avec un grand verre d'eau.

#### **PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée
- Ne pas laisser à la portée des enfants
- A conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur

**Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.**

Fabriqué par les Laboratoires Bioxpert Maroc.  
Distribué au Maroc par MEDIPRO. Casablanca.  
Autorisation du ministère de la santé N°:  
20211412620/MAv4/CA/DMP/18



l'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement.

### 3. COMMENT PRENDRE AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable ?

#### Posologie

La posologie est aussi adaptée à AVLOCARDYL selon certaines conditions du rythme cardiaque en fonction de l'âge. Si les troubles cardiaques sont graves, consultez votre médecin.

#### Mode d'administration

Ce médicament est utilisé par voie orale. Les comprimés doivent être avalés avec une boisson (par exemple de l'eau).

#### Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez prendre ce médicament. Vous ne devez pas arrêter le traitement sans son autorisation.

**Si vous avez pris plus de AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable que vous n'auriez dû :**

Consultez votre médecin.

**Si vous oubliez de prendre AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable :**

En cas d'oubli, prendre dès que possible votre comprimé et poursuivre votre traitement normalement. Ne jamais prendre une double dose pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

**Effets indésirables fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :** • une fatigue, • des refroidissements des extrémités, • un ralentissement du rythme cardiaque, • des problèmes de circulation du sang au niveau des doigts avec des engourdissements (maladie de Raynaud), • des insomnies, des cauchemars.

**Effets indésirables peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) :** • des troubles gastro-intestinaux (douleurs de l'estomac, nausées, vomissements, diarrhées).

**Effets indésirables rares (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1000) :** • des sensations vertigineuses, • une diminution du nombre de plaquette dans le sang, • une maladie du cœur (insuffisance cardiaque), • des anomalies du rythme cardiaque (troubles de la conduction cardiaque), • une chute de la tension artérielle, • une difficulté à marcher pouvant être aggravée chez une personne qui boit déjà, • des hallucinations, des troubles psychiatriques (psychoses, modifications de l'humeur, confusion), une impuissance, • divers effets sur la peau et les cheveux, notamment, des tâches rouges (purpura), une chute de cheveux (alopecie), des boutons rouges (psoriasis, ou aggravations d'un psoriasis), • une

LOT : 22E005  
PER.: 05/2025

AVLOCARDYL 40 MG  
CP SEC B50

P.P.V : 41DH80

6 118000 010227



ie, elle est  
utilisé sous  
s troubles  
à médicin  
sin.

l'annoncance de

4000529-02

D-CURE® AMPOULE



6 118001 320080

PPV: 56,30 DH

LOT: 22B23D

EXP: 02/2024

## ce: Information de l'utilisateur

URE 25 000 UI; solution buvable; boîte de 4 ampoules.

00 UI; solution buvable en gouttes; flacon de 10 ml.  
(Vitamine D 3)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Adressez vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information. Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice. Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que D-Cure et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser D-Cure ?
3. Comment prendre D-Cure ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver D-Cure ?
6. Information supplémentaires.

## 1. Qu'est-ce que D-Cure et dans quel cas est-il utilisé ?

Classe pharmacothérapeutique :

Vitamines.

## Indications thérapeutiques :

Le D-CURE est indiqué dans les cas suivants :

- Prophylaxie de rachitisme et ostéomalacie chez les enfants et les adultes ;
- prophylaxie de rachitisme chez les nouveaux nés prématurés ;
- prophylaxie d'une déficience en vitamine D chez les enfants et les adultes portant un risque identifié ;
- prophylaxie de l'ostéoporose ;
- apport déficient en vitamine D : stéatorrhée, obstruction biliaire, cirrhose, gastrectomie, personnes âgées (alités ou sortant peu) ;
- traitement et/ou prophylaxie de la déficience en vitamine D : croissance, grossesse, lactation, prise d'anti-convulsivants ;
- prophylaxie d'une déficience en vitamine D chez les enfants et les adultes présentant une mal absorption ;
- traitement de rachitisme et ostéomalacie chez les enfants et les adultes ;
- hypoparathyroïdie idiopathique ou post-opératoire, pseudo-hypoparathyroïdie ;
- traitement d'appoint, en association avec le calcium, des médicaments inhibant la résorption ostéoclastique ou stimulant la formation osseuse, utilisés dans le traitement de l'ostéoporose.

N.B. : Une alimentation variée joue également un rôle prépondérant dans la prévention des carences en vitamine D.

## 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser D-Cure ?

Ne prenez jamais D-CURE :

- si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez une sensibilité particulière à la vitamine D (lésions tissulaires de différents organes).
- Si votre sang présente une teneur trop élevée en calcium en particulier chez le nourrisson.
- Si votre urine présente une teneur trop élevée en calcium en particulier lorsque des calculs rénaux sont présents.

## Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre D-CURE.

- La vitamine D sera administrée avec prudence chez les patients présentant une insuffisance rénale, une lithiasis ou une maladie cardiaque car, chez ces patients, les risques liés à une hypercalcémie sont plus importants.
- Il y a lieu de vérifier la phosphatémie.
- Suspendre le traitement en cas de symptômes dus à l'excès en vitamine D : fatigue, nausées, diarrhées, augmentation du volume des urines.
- L'utilisation de fortes doses de vitamine D suppose un contrôle étroit de la teneur en calcium dans le sang et/ou de la teneur en calcium dans les urines.
- La prudence s'impose chez les patients sous médicaments apparentés à la digitaline.
- Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la rubrique « Interactions avec d'autres médicaments ».

## Autres médicaments et D-Cure :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

- La phénobarbital (médicament utilisé dans l'épilepsie), le phénobarbital (somnifère), la carbamazépine, la pyrimidon pris durant des périodes prolongées peuvent accélérer le cycle dans l'organisme du calciférol (= forme majeure circulante de la vitamine D).
- Un traitement aux glucocorticoïdes pourrait altérer le métabolisme de la vitamine D.
- Les risques d'une augmentation de la teneur en calcium dans le sang par excès de vitamine D sont accrus chez les patients sous
- La prise simultanée de fortes doses de vitamine D et de calcium (qui par ailleurs peut être nécessaire) augmente le risque d'un

D-CURE® AMPOULE



6 118001 320080

PPV: 56,30 DH

LOT: 22B23D

EXP: 02/2024

## ce: Information de l'utilisateur

URE 25 000 UI; solution buvable; boîte de 4 ampoules.

00 UI; solution buvable en gouttes; flacon de 10 ml.

(Vitamine D 3)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Adresssez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice. Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que D-Cure et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser D-Cure ?
3. Comment prendre D-Cure ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver D-Cure ?
6. Information supplémentaires.

## 1. Qu'est-ce que D-Cure et dans quel cas est-il utilisé ?

Classe pharmacothérapeutique :

Vitamines.

## Indications thérapeutiques :

Le D-CURE est indiqué dans les cas suivants :

- Prophylaxie de rachitisme et ostéomalacie chez les enfants et les adultes ;
- prophylaxie de rachitisme chez les nouveaux nés prématurés ;
- prophylaxie d'une déficience en vitamine D chez les enfants et les adultes portant un risque identifié ;
- prophylaxie de l'ostéoporose ;
- apport déficient en vitamine D : stéatorrhée, obstruction biliaire, cirrhose, gastrectomie, personnes âgées (alités ou sortant peu) ;
- traitement et/ou prophylaxie de la déficience en vitamine D : croissance, grossesse, lactation, prise d'anti-convulsivants ;
- prophylaxie d'une déficience en vitamine D chez les enfants et les adultes présentant une mal absorption ;
- traitement de rachitisme et ostéomalacie chez les enfants et les adultes ;
- hypoparathyroïdie idiopathique ou post-opératoire, pseudo-hypoparathyroïdie ;
- traitement d'appoint, en association avec le calcium, des médicaments inhibant la résorption ostéoclastique ou stimulant la formation osseuse, utilisés dans le traitement de l'ostéoporose.

N.B. : Une alimentation variée joue également un rôle prépondérant dans la prévention des carences en vitamine D.

## 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser D-Cure ?

Ne prenez jamais D-CURE :

- si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez une sensibilité particulière à la vitamine D (lésions tissulaires de différents organes).
- Si votre sang présente une teneur trop élevée en calcium en particulier chez le nourrisson.
- Si votre urine présente une teneur trop élevée en calcium en particulier lorsque des calculs rénaux sont présents.

## Avertissements et précautions :

Adresssez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre D-CURE.

- La vitamine D sera administrée avec prudence chez les patients présentant une insuffisance rénale, une lithiasie ou une maladie cardiaque car, chez ces patients, les risques liés à une hypercalcémie sont plus importants.

- Il y a lieu de vérifier la phosphatémie.

- Suspender le traitement en cas de symptômes dus à l'excès en vitamine D : fatigue, nausées, diarrhées, augmentation du volume des urines.

- L'utilisation de fortes doses de vitamine D suppose un contrôle étroit de la teneur en calcium dans le sang et/ou de la teneur en calcium dans les urines.

- La prudence s'impose chez les patients sous médicaments apparentés à la digitaline.

- Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la rubrique « Interactions avec d'autres médicaments ».

## Autres médicaments et D-Cure :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

- La phénobarbital (médicament utilisé dans l'épilepsie), le phénobarbital (somnifère), la carbamazépine, la pyrimidon pris durant des périodes prolongées peuvent accélérer le cycle dans l'organisme du calciférol (= forme majeure circulante de la vitamine D).

- Un traitement aux glucocorticoïdes pourrait altérer le métabolisme de la vitamine D.

- Les risques d'une augmentation de la teneur en calcium dans le sang par excès de vitamine D sont accrus chez les patients sous

- La prise simultanée de fortes doses de vitamine D et de calcium (qui par ailleurs peut être nécessaire) augmente le risque d'un

# Cabinet De Cardiologie Dr Sebti Fayçal

## Bulletin D'analyses

Date : 04/04/2023

Nom : chams fettouma

Age : 1866

NFS

Glycémie à jeun

VS

Hémoglobine Glyquée

CRP

Bilan Lipidique : Chol Total

Urée

LDLc

Créatininemie

HDLc

Albuminemie

Triglycerides

Protidemie

Ionogramme Sanguin :

ASAT

Na+

ALAT

K+

Bilirubinemie

Cl-

Microalbuminurie

TSHus  T3  T4

Autres

Famille

Dr. SEBTI Fayçal

Cardiologue

Bd. Mohamed Bouziane Rés. Farhati

Etage N° 3 - Casablanca

Tél: 0522 37 13 11 drsebtifaysal@gmail.com

# LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES



S.A.R.L. au Capital de 100.000,00 Dhs - R.C. 121337 - Patente : 32740051 - Ident. Fiscal : 2821353 - ICE : 000079511000007 - INPE : 093000404  
Centre Médical Sidi-Othman, Av. 10 Mars, Place de la Préfecture, Sidi Othman - CASA - Tél. : 05 22 59 95 95 - WhatsApp : 06 50 34 98 22

Taoufik LOUANJLI  
Pharmacien-Biologiste

N° 2303383

DIS Biologie Médicale  
Biologie de la Reproduction  
Ancien Interne des Hôpitaux de Bordeaux.

Nom/Prénom : **Madame CHAMS Fettouma**

Casablanca le :05/04/2023

Medecin : **Dr Sebti fayçal**

Analyses	Clé	Cotation
Numeration Formule Sanguine	B	65
T.S.H.	B	180
VITAMINES D2/D3 (25 Hydroxy-vi)	B	450
FERRITINE	B	200
TRANSAMINASES ASAT (GOT)	B	40
TRANSAMINASES ALAT (GPT)	B	40
TRIGLYCERIDES	B	50
CHOLESTEROL LDL	B	45
CHOL HDL	B	45
CHOLESTEROL TOTAL	B	20
CREATININE	B	20
UREE	B	20
HEMOGLOBINE GLYCOSYLEE	B	100
<b>Montant en Dhs:</b>	<b>1 320.00</b>	

Arrêtée la présente facture à la somme de: **Mille Trois Cent Vingt Dirhams**

EXAMED  
LABORATOIRE  
TAOUFIK LOUANJLI  
PHARMACIEN-BILOGISTE  
CENTRE MEDICAL SIDI OTHMAN AV 10 MARS  
TÉL. 05 22 59 95 95 - FAX 05 22 59 95 95  
WhatsApp 06 50 34 98 22

Code Patient : 505432  
Date du prélèvement : 05/04/23  
Dossier édité le : 06/04/2023

**Madame Fettouma CHAMS**  
Référence : 050423 511  
Dr. Sebti fayçal

Page: 2/4

**BIOCHIMIE**

Valeurs de référence

Antécédents

**HEMOGLOBINE GLYQUEE (HbA1C) . . . : 5,00**

%

(Par Technique HPLC, Selon le DCCT/NGSP)

-L'hémoglobine glyquée d'un sujet normal ou d'un diabétique équilibré se situe entre 4,2 et 6,5%.

-L'hémoglobine glyquée d'un sujet diabétique non traité ou non équilibré est supérieure à 8,5%.

**UREE . . . . . : 0,12** g/L (0,10 à 0,50)  
ou . . . . . : 1,99 mmol/L (1,70 à 7,60)

**CREATININE . . . . . : 7,2** mg/L (6,0 à 11,0)  
ou . . . . . : 63,4 µmol/L (44 à 106)

**CHOLESTEROL TOTAL . . . . . : 2,33\*\*** g/L (1,40 à 2,20)  
ou . . . . . : 6,01 mmol/L (3,61 à 5,68)

**CHOLESTEROL HDL . . . . . : 0,78** g/l (> à 0,40)  
ou . . . . . : 2,01 mmol/l (> à 1,03)

**CHOLESTEROL LDL . . . . . : 1,36** g/L  
ou . . . . . : 3,51 nmol/L

Nbr de facteurs de risque*	Valeur Cible du LDL-C (g/L)
aucun	< 2,20
1	< 1,90
2	< 1,69
> ou = 3	< 1,30
Patient à haut risque	< 1,00

\*: Diabète, obésité, HTA, age>60ans, tabac, HDL-C<0,40g/L et antécédents familiaux de maladie coronaire.

(AFSSAPS, Prise en charge thérapeutique du patient dyslipidémique. Recommandations, 2005.)

**TRIGLYCERIDES . . . . . : 0,94** g/l (< à 1,50)  
ou . . . . . : 1,07 mmol/l (< à 1,72)

**TRANSAMINASES ALAT (GPT) . . . : 14** UI/L (<50)

**TRANSAMINASES ASAT (GOT) . . . : 18** UI/L (<40)

**EXAMED**  
LABORATOIRE  
**Taoufik LOUANJLI**  
Pharmacien - Biologiste  
Centre Medical Sidi-Othman, Av. 10 Mars  
Place de la Préfecture - Sidi Othmane - Casablanca  
Tél. : 05 22 59 95 95 - WhatsApp : 06 50 34 98 22

Biologiste

Code Patient : 505432  
Date du prélèvement : 05/04/23  
Dossier édité le : 06/04/2023

**Madame Fettouma CHAMS**  
Référence : 050423 511  
Dr. Sebti fayçal

Page: 1/4

## HEMATOLOGIE

Valeurs de référence

Antécédents

### HEMOGRAMME SYSMEX XN-1000

<b>GLOBULES ROUGES .....</b>	<b>4,97</b>	M/mm3	(4,0 à 5,3)
<b>HEMOGLOBINE .....</b>	<b>14,1</b>	g/dL	(12 à 16)
<b>HEMATOCRITE .....</b>	<b>43</b>	%	(37 à 46)
<b>V.G.M .....</b>	<b>87</b>	u3	(80 à 95)
<b>T.C.M.H .....</b>	<b>28</b>	pg	(28 à 32)
<b>C.C.M.H .....</b>	<b>33</b>	g/dL	(30 à 35)
<b>GLOBULES BLANCS .....</b>	<b>5 600</b>	/mm3	(4 000 à 10 000)

### FORMULE LEUCOCYTAIRE :

<b>POLYNUCLEAIRES NEUTROPHILES .....</b>	<b>55</b>	%	(40 à 75)
Soit ....	3 080	/mm3	(2000 à 7500)
<b>LYMPHOCYTES .....</b>	<b>31</b>	%	(20 à 45)
Soit ....	1 736	/mm3	(1500 à 4000)
<b>MONOCYTES .....</b>	<b>11</b>	%	(3 à 11)
Soit ....	616	/mm3	(120 à 1100)
<b>POLYNUCLEAIRES EOSINOPHILES .....</b>	<b>2</b>	%	(0 à 4)
Soit ....	112	/mm3	(40 à 300)
<b>POLYNUCLEAIRES BASOPHILES .....</b>	<b>1</b>	%	(0 à 1)
Soit ....	56	/mm3	(0 à 100)
<b>PLAQUETTES .....</b>	<b>215 000</b>		(150 000 à 400 000)

### COMMENTAIRES :

La formule leucocytaire est contrôlée sur frottis sanguin.

**EXAMED**  
LABORATOIRE  
**Taoufik LOUANJLI**  
Pharmacien - Biologiste  
Centre Médical Sidi Othman, Av. 10 Mars  
Place de la Préfecture - Sidi Othmane - Casablanca  
Tel. : 05 22 59 95 95 - WhatsApp : 06 50 34 98 22

Biologiste

**Taoufik LOUANJLI**  
Pharmacien-Biogiste

DIS Biologie Médicale  
Biologie de la Reproduction  
Ancien Interne des Hôpitaux de Bordeaux.

Code Patient : 505432  
Date du prélèvement : 05/04/23  
Dossier édité le : 06/04/2023

**Madame Fettouma CHAMS**  
Référence : **050423 511**  
Dr. Sebti fayçal

Page: 4/4

1 à 5 ans	0,80 à 6,25 uUI/mL
6 à 10 ans	0,80 à 5,40 uUI/mL
11 à 14 ans	0,70 à 4,61 uUI/mL
15 à 18 ans	0,50 à 4,33 uUI/mL
>19 ans	0,25 à 5,00 uUI/mL

**EXAMED**  
LABORATOIRE  
**Taoufik LOUANJLI**  
Pharmacien - Biogiste  
Centre Médical Sidi Othman - Av. 10 Mars  
Place de la Préfecture - Sidi Othmane - Casablanca  
Tél. : 05 22 59 95 95 - WhatsApp : 06 50 34 98 22

Biogiste

Code Patient : 505432  
Date du prélèvement : 05/04/23  
Dossier édité le : 06/04/2023

**Madame Fettouma CHAMS**  
Référence : 050423 511  
Dr. Sebti fayçal

Page: 3/4

**FERRITINE** ..... : 17,7 ng/mL  
Technique ELFA, Automate mini-vidas

**Valeurs de référence de la ferritine (ng/mL) en fonction de l'âge:**

Enfants: A naissance.....: 150 à 450 ng/ml  
2 à 3 mois.... : 80 à 500 ng/ml  
4 mois à 16 ans : 20 à 200 ng/ml  
Femmes cycliques.....: 13 à 150 ng/ml  
Femmes ménopausées.....: 30 à 400 ng/ml  
Hommes.....: 30 à 400 ng/ml

## VITAMINES

Valeurs de référence

Antécédents

### VITAMINES D2/D3 (25 Hydroxy-vitamine D)

(Technique ELFA - Automate Mini-vidas)

Résultat ..... : 27 ng/ml  
Soit : 68 nmol/l

Valeurs Souhaitables ..... : 30 à 100 ng/ml (75 à 250 nmol/l)  
Insuffisance ..... : 20 à 29 ng/ml (50 à 72,5 nmol/l)  
Déficience ..... : < 20 ng/ml (< 50 nmol/l)  
Potentiel toxicity.....: >100 ng/ml (>250 nmol/l)

## ENDOCRINOLOGIE

Valeurs de référence

Antécédents

**TSH ULTRASENSIBLE** ..... : 1,72 uUI/mL  
Technique : ELFA VIDAS Biomerieux

**Valeurs de référence de la TSH (mUI/L) en fonction de l'âge:**

Age	Valeur de référence
0 à 1 mois	0,70 à 18,10 uUI/mL
1 à 12 mois	1,12 à 8,21 uUI/mL

1717,10

# Cabinet De Cardiologie Dr Sebti Fayçal

## Reçu de Paiement

Nom :Chams

Casablanca, le 04/04/2023


Prénom :Fetouma

Examens	Prix Unitaire TTC
Echocardiographie Doppler	800dh
Montant Total TTC :	800dh

ICE : 002220599000012

INPE : 091228957

Dr Sebti Fayçal  
Cardiologue  
Bd. Mohamed Bourziane 4  
Jér. Stage N° 3 - Casablanca  
Tél: 0522 37 13 11 - drsebtifaycal@gmail.com



# Cabinet De Cardiologie Dr Sebti Fayçal



## Compte Rendu d'échocardiographie Doppler

ID patient : Nom : Chams F. Houma Genre : Femini  
Date : 04/04/2023 Age : 1966 Indication : Bilan Hépatique

### Ventricule Gauche :

VGtd : 44 — VGts : 25 — PPtd : 05 — PPts : 12 —  
SIVtd : 07 — SIVts : 12 — FEteicholz : 70%  
FEVGs4c : FEVGs2c : FEVGbiplan : 70%.

### Valve Mitrale :

E: 0,6 m/s A : 0,5 m/s, E/A : 1,2 TD : 221 ms, E' : 8, E/E' : 7  
Morph : fer Grade Fuite : mine  
SMplan : cm<sup>2</sup>, Gradmoy : mmhg, SurfPHT : cm<sup>2</sup>  
ITVm : , SOR : , OG : 44 — OGplan : 17 cm<sup>2</sup>

### Valve Aortique :

Racine : mm, sinus : mm, jonction st : mm, asc : mm, abdo : mm  
Aorte : 26 mm, ITV CCVG : mm, CCVG : mm, débit :  
Morph : fer Grade Fuite : 0  
Diamètre jet : mm, V Isthme m/s, PHT IAO :  
ITV Ao : Gmoy Ao : , Surface Ao : cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>, IP : .

### Cavités Droites :


SOD : 18 — VDDia : 41 — TAPSE : 22 mm S'VD :  
IT : petite Gradmoy : 16,8 — Grad max pulm :  
IP : B. PAPS : 22 — TAP : VCI : 18/10 —

### Pericarde : Sec

- Ventouse grande de taille normale.
- Bonne fonction systolique des deux ventouses.
- $FEV1 = 70\%$ ,  $TAPSE = 22\text{--}$
- Dilatation légère des canaux droits.
- $SDD = 18\text{--}$ ,  $DVDd = 41\text{--}$ .
- PR normal, PRVT normale.
- VR fine, siège de l'IT minime, sans sténose
- VAO fine, sans lente, -sténose
- IT petite, PAPSA à 22-Hg
- VCI fine / corphate.
- Pneu à sec.

Sur total:  $FEV1 = 70\%$ ,  $TAPSE = 22\text{--}$

- légère dilatation des canaux droits
- IT minime.
- IT petite, PAPSA à 22-Hg
- Ailleurs & RAS.



Patient







N°  
Nom  
D. naissance  
Sexe

1260  
CHAMS, FETTOUMA  
11-08-1966  
Féminin

Exam

N° d'accès  
Dte exam.  
Description  
Opérateur

04-04-2023



Patient







N°  
Nom  
D. naissance  
Sexe

1260  
CHAMS, FETTOUMA  
11-08-1966  
Féminin

Exam

N° d'accès  
Dte exam.  
Description  
Opérateur

04-04-2023



ID: Chams Rettouma  
D-naisse: 1966

4-Avr-2023 16:17:50 Fréq. Card.: 68 BPM  
Axes P-R-T: 47 22 20 Int PR: 166ms  
Dur.QRS: 96ms QT/QTc: 371/387ms

Dr. SEBTI Fayçal  
Cardiologue

Ed. Mohamed Bouziane Rés. Farhatine 4  
1<sup>er</sup> Etage N°3 Casablanca  
Tél: 0522 37 13 11 - drsebtifaysal@gmail.com

