

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de ta mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com  
 Prise en charge : pec@mupras.com  
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

## Déclaration de Maladie

N° W21-730165



### Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1825

Société :

Actif

Pensionné(e)

Nom & Prénom : Sebsi

Autre :

Abdelkader

158199

Date de naissance : 1936

Adresse : Habituelle

Tél. : 0661564793

Total des frais engagés :

813,10

Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. ASMOUNI Ahmed  
Spécialiste de Médecine 2 ème année  
Dictionnaire de Médecine 2 ème année  
Plante 2 ème année  
Khouriha 2 ème Etage Derb Omar  
Assurance Tél: 022.31.58.50/41

Date de consultation : 16 MARS 2023

Nom et prénom du malade : SF NIARI Zoubida

Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : ya stolome shimpli



En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :



### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
1 MARS 2023	E1	1	282.00	INP : 0911013169 Dr. ASMOUDI Ahmed Specialist in Internal Medicine Phone: 022.31.58.50/41 Elouribga Tel. 022.31.58.50/41 Casablanca

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Al Akhawayn Berrechid Mokadem Berrechid 06 68 08 20 65	16/03/23	563,10

### ANALYSES - RADIGRAPHIES


Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### VOLET ADHERENT

\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



### O.D.F PROTHESES DENTAIRES



### DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	35533411	11433553
G		

### [Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# Dr ASMOUN Ahmed

SPECIALISTE DES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF

ESTOMAC, FOIE, INTESTIN

Chirurgie anale: Hérmoroides, Fistules, Fissures

Endoscopie digestive

Ex ASSISTANT TITULAIRE D'ENDOCRINOLOGIE ET DIABETE

Ex ENSEIGNANT A LA FACULTE DE MEDECINE DE

CASABLANCA

الدكتور أسمون أحمد

إختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي

جراحة المخرج وال بواسر

داخلي سابق بقسم أمراض السكر والغدد

مدرس سابق بكلية الطب

بالدار البيضاء

Casablanca le : 16 MARS 2023 الدار البيضاء في :

SE HAIRI zoubiria

44,80x2 = 89,60

- can 100 g 100% SN N. 2

56,60 / 100g N. 1

stilux 100g N. 1

123,60 x 3 = 370,80

- INEXISTANT N. 3

100g N. 1

100g N. 1



29.10

No 3 ir



مینی

نٹ

sor سوپر



می

563.10

~~Dr. ASMOUDI Ahmed  
Specialist  
Plastic  
Khosht  
Consultant  
Lot: 022-01-58-50/48  
Bab  
Oman~~



1481  
1/16/03/23

# NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR **CARBOSYLANE, gélule**

Charbon activé, siméticone

ette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des info

médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies ci

urriez avoir besoin de la relire.


ien pour tout conseil ou information.

l effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

meilleur médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous

LOT : 100  
EXP : 04-2024

Sontherapie  
L. Tazi, Pharmacien Resp.  
**CARBOSYLANE - 24 doses**  
PPV 44.60 DH



6118001070386

## **Si vous oubliez de prendre CARBOSYLANE, gélule :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement

**gélule ET DANS QUELS**

# NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR **CARBOSYLANE, gélule**

Charbon activé, siméticone

ette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des info

médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies ci

urriez avoir besoin de la relire.

ien pour tout conseil ou information.

l effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

meilleur médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous

LOT : 100  
EXP : 04-2024

Sontherapie  
L. Tazi, Pharmacien Resp.  
**CARBOSYLANE - 24 doses**  
PPV 44.60 DH



6118001070386

## **Si vous oubliez de prendre CARBOSYLANE, gélule :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement

**gélule ET DANS QUELS**

# Stilnox® 10 mg

Tartrate de zolpidem

Comprimé

PEL : 01  
101 : 226003  
STILNOX 10 MG  
CP PEL SEC 820

SANOFI

Veuillez lire  
ce médicament  
pour vous :

- Gardez-le.
- Si vous avez des questions, consultez votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Voir rubrique 4.

## 1. QU'EST-CE QUE STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : hypnotiques et sédatifs-code ATC : N05CF02.

Ce médicament est apparenté aux benzodiazépines.

Ce médicament est indiqué chez l'adulte dans le traitement de courte durée de l'insomnie.

Chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans, étant donné l'absence de données, l'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE STILNOX 10mg, comprimé pelliculé sécable ?

Avant de prendre ce médicament, veuillez lire la rubrique 4.

### Ne prenez pas STILNOX 10mg, comprimé pelliculé sécable :

- Si vous êtes allergique à la substance active, à la classe de produits apparentés aux benzodiazépines ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez une insuffisance respiratoire grave.
- Si vous avez une maladie grave du foie (insuffisance hépatique grave).
- Si vous souffrez d'un syndrome d'apnée du sommeil (trouble caractérisé par des arrêts de la respiration pendant le sommeil).
- Si vous souffrez de myasthénie (maladie des muscles).
- Sur une période prolongée. Le traitement doit être aussi court que possible car le risque de dépendance augmente avec la durée du traitement.
- Si vous avez déjà présenté des épisodes de somnambulisme ou tout autre comportement inhabituel en dormant (comme conduire, manger, passer un appel téléphonique ou avoir des relations sexuelles, etc.) sans être complètement éveillé(e) après avoir pris STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable ou d'autres

médicaments contenant du zolpidem.

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable.

### Risque d'abus, de dépendance et de syndrome de sevrage

Veuillez informer votre médecin ou pharmacien si vous avez déjà souffert de troubles psychiatriques ou si vous avez abusé ou avez été dépendant de l'alcool, de médicaments ou de drogues.

N'utilisez pas Stilnox 10 mg, comprimé pelliculé sécable, sur une période prolongée. Le traitement doit être aussi court que possible. La prise de ce type de médicament peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un usage abusif et un état de dépendance physique et psychique (effets physiques ou psychiques produits par une compulsion à continuer à prendre le médicament).

Le risque de dépendance augmente avec la dose et la durée du traitement. Des cas de dépendance ont été rapportés plus fréquemment chez les patients traités par Stilnox 10 mg, comprimé pelliculé sécable pendant plus de 4 semaines. Le risque de dépendance est également augmenté si vous avez des antécédents de troubles psychiatriques, d'alcoolisme, de dépendance aux médicaments ou aux drogues, d'abus médicamenteux ou de drogues.

La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs favorisants.

Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas la dose.

Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de signes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires, mais on peut observer également une agitation, une irritabilité, des maux de tête; un engourdissement où des picotements des extrémités, une sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts physiques, etc...

Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être définies avec votre médecin.

La diminution très PROGRESSIVE des doses et l'espacement des prises représentent la meilleure prévention de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant plus longue que le traitement aura été prolongé.

### Risque d'un PHENOMENE DE REBOND

Malgré la décroissance progressive des doses, un phénomène de REBOND sans gravité peut se produire, avec réapparition TRANSITOIRE des symptômes (insomnie) qui avaient justifié la mise en route du traitement.

### Troubles de la mémoire

Des troubles de la mémoire sont susceptibles d'apparaître dans les heures qui suivent la prise du médicament.

Dans les heures qui suivent, il peut survenir une difficulté à coordonner certains mouvements (altération des fonctions psychomotrices), une diminution de la capacité à conduire, en particulier si :

- vous prenez ce médicament moins de 8 heures avant d'effectuer des activités nécessitant de la vigilance,

# **SORBHEPAT**

## **FORME ET PRÉSENTATION**

Comprimés effervescents : tube de 20

## **COMPOSITION**

- Sorbitol .....
- Phosphate disodique anhydre .....
- Sulfate de sodium anhydre .....
- Excipient q.s.p .....

## **PHARMACODYNAMIE**

Le sorbhepat est une association conférant au produit un effet cholal l'acide chlorhydrique en excès dans l'estomac.

Le sorbitol en plus de ses actions cholécystokinétique et cholérétique, stimule le péristaltisme en déclenchant la sécrétion de la villikinine et au pancréatiques en déclenchant la sécrétion de la pancréozymine.

## **INDICATIONS**

- Dyspepsie
- Pesanteurs
- Constipation
- Dyskinésies biliaires

## **MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE**

1 comprimé à dissoudre dans 1/2 verre d'eau avant les repas.

**SORBHEPATIC**

20 comprimés  
effervescents



6 118000 031956



PPV 17 DH00  
EXP 06/2024  
LOT 14038 7

# NORDAZ® 15 mg

Nordazépam

Comprimés tétrasécables

Nordaz® 15 mg

30 comprimés tétrasécables

PROMOPHARMA.



6 118000 240549

23,20

## Composition :

Nordazépam.....1 comprimé tét  
Excipients (dont lactose et amidon de blé) q.s.p.....

## Propriétés :

Le nordazépam a une activité myorelaxante, anxiolytique, sédative, hypnotique, sivante, amnésiante.

## Indications thérapeutiques :

- Anxiété réactionnelle, notamment les troubles de l'adaptation avec humeur et l'anxiété post-traumatique.
- Traitement d'appoint de l'anxiété au cours des névroses (notamment hysterie, la phobie).
- Anxiété associée à une affection somatique sévère ou douloureuse.
- Anxiété généralisée.
- Crise d'angoisse.
- Prévention et traitement du delirium tremens.
- Sevrage alcoolique.

Le trouble panique n'est pas une indication.

## Contre-indications :

- Hypersensibilité aux benzodiazépines
- Insuffisance respiratoire sévère
- Syndrome d'apnée du sommeil
- insuffisance hépatique sévère (risque de survenue d'une encéphalopathie)

# INexium 20 mg, comprimé

# INexium 40 mg, comprimé

ésoméprazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice.
- Si vous avez acheté ce médicament pour d'autres personnes, conservez-le pour elles.
- Si vous ressentez des effets indésirables après avoir lu cette notice, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

EXP 09-2025  
LOT ZPLT

**SYNTHEMEDIC**

22 rue zoubir bennou al bouam roches  
noires casablanca

**INEXIUM**

40 mg Cpr GR.

Boîte 14

641/15DMP/21/NRQ P.P.V : 123,60 DH

 6 118001 020607

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium
3. Comment prendre INexium
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver INexium
6. Contenu de l'emballage et autres informations

## 1. Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé?

INexium contient un médicament appelé ésoméprazole. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelé "inhibiteurs de la pompe à protons". Ceux-ci agissent en diminuant la quantité d'acide produite par l'estomac.

INexium est utilisé dans le traitement des affections suivantes :

Adultes

- «La maladie du reflux gastro-oesophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.
- Ulcères gastriques dus à des médicaments appelés AINS (médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens). INexium est également indiqué dans la prévention des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS.
- Acidité gastrique accrue due à une tumeur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger- Ellison).
- Poursuite du traitement après la prévention d'une récidive hémorragique d'ulcères avec INexium par voie intraveineuse.

Adolescents âgés de 12 ans et plus

- «La maladie du reflux gastro-oesophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.

## 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium

# INexium 20 mg, comprimé

# INexium 40 mg, comprimé

ésoméprazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice.
- Si vous avez acheté ce médicament pour d'autres personnes, conservez-le pour elles.
- Si vous ressentez des effets indésirables après avoir lu cette notice, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

EXP 09-2025  
LOT ZPLT

**SYNTHEMEDIC**

22 rue zoubir bennou al bouam roches  
noires casablanca

**INEXIUM**

40 mg Cpr GR.

Boîte 14

641/15DMP/21/NRQ P.P.V : 123,60 DH

 6 118001 020607

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium
3. Comment prendre INexium
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver INexium
6. Contenu de l'emballage et autres informations

## 1. Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé?

INexium contient un médicament appelé ésoméprazole. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelé "inhibiteurs de la pompe à protons". Ceux-ci agissent en diminuant la quantité d'acide produite par l'estomac.

INexium est utilisé dans le traitement des affections suivantes :

Adultes

- «La maladie du reflux gastro-oesophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.
- Ulcères gastriques dus à des médicaments appelés AINS (médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens). INexium est également indiqué dans la prévention des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS.
- Acidité gastrique accrue due à une tumeur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger- Ellison).
- Poursuite du traitement après la prévention d'une récidive hémorragique d'ulcères avec INexium par voie intraveineuse.

Adolescents âgés de 12 ans et plus

- «La maladie du reflux gastro-oesophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.

## 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium

# INexium 20 mg, comprimé

# INexium 40 mg, comprimé

ésoméprazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice.
- Si vous avez acheté ce médicament pour d'autres personnes, conservez-le pour elles.
- Si vous ressentez des effets indésirables après avoir lu cette notice, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

EXP 09-2025  
LOT ZPLT

**SYNTHEMEDIC**

22 rue zoubir bennou al bouam roches  
noires casablanca

**INEXIUM**

40 mg Cpr GR.

Boîte 14

641/15DMP/21/NRQ P.P.V : 123,60 DH

 6 118001 020607

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium
3. Comment prendre INexium
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver INexium
6. Contenu de l'emballage et autres informations

## 1. Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé?

INexium contient un médicament appelé ésoméprazole. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelé "inhibiteurs de la pompe à protons". Ceux-ci agissent en diminuant la quantité d'acide produite par l'estomac.

INexium est utilisé dans le traitement des affections suivantes :

Adultes

- «La maladie du reflux gastro-oesophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.
- Ulcères gastriques dus à des médicaments appelés AINS (médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens). INexium est également indiqué dans la prévention des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS.
- Acidité gastrique accrue due à une tumeur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger- Ellison).
- Poursuite du traitement après la prévention d'une récidive hémorragique d'ulcères avec INexium par voie intraveineuse.

Adolescents âgés de 12 ans et plus

- «La maladie du reflux gastro-oesophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.

## 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium