

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie

M22- 0028923

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2538 Société : Ret RAM
☒ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre : 158521
Nom & Prénom : KACHANI MUSTAPHA
Date de naissance : 01/01/1951
Adresse : JAMILA 5 Rue 187 N° 29 C/D CASA 04
Tél. : 0667028836 Total des frais engagés : 548,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : Dr. JOURJI Mouna
Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie
Maladies Métaboliques et Nutrition
Jamilat 2, Boulevard de l'Indépendance, N°225, 1er Etage
C.D. - Casablanca - Tél. 05 22 37 00 37
Date de consultation : 25/4/2023
Nom et prénom du malade : KACHANI Mustapha Age : 72
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : Diabète type 2 / HTA
Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le :
Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
25/04/2023	CS	200	48	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	25/04/23	34800 DH

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
				Coefficient DES TRAVAUX														
				MONTANTS DES SOINS														
				DEBUT D'EXECUTION														
				FIN D'EXECUTION														
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table border="1"> <tr> <td>H</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>B</td> </tr> </table>		H	H	25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B	B	Coefficient DES TRAVAUX	
	H	H																
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D	G																
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B	B																
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		MONTANTS DES SOINS															
			DATE DU DEVIS															
		DATE DE L'EXECUTION																

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Mouna JOUBIJ

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

Nutrition et maladies métaboliques

Diplômée de la Faculté de Médecine et

De Pharmacie de Casablanca

Ancienne interne au CHU Ibn Rochd Casablanca



الدكتورة موني جوبيج

أخصائية في أمراض الغدد والسكري

والتهغدية وأمراض الأيض

خريجة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء

طبيبة داخلية سابقة بالمستشفى الجامعي

ابن رشد بالدار البيضاء

Casablanca, le 25/4/2023 في الدار البيضاء

Mr KACHANI Mustapha

3800 x 3

3800 x 3

1/ Diabalex 60mg cp

1 cp 1x le matin à jeun

1800 x 9

2/ Diaformine 850mg cp

1 cp x 3 après repas

7200

3/ Lisor 10mg 15mg cp

34800

1 cp 1x le matin à jeun

Dr. JOUBIJ Mouna
Spécialiste en Endocrinologie-Diabétologie
et Nutrition
106, Bd Mohammed VI, 225, 1er Etage
Jamilia 3, Avenue Dakhla, N° 225, 1er Etage, CD - Casablanca
Tél : 05 22 37 40 87

جميعه 3 شائع رقم 225 الطابق الأول ق. ح الدار البيضاء - الهاتف: 05 22 37 40 87

Jamilia3, Avenue Dakhla, N° 225, 1er Etage, CD - Casablanca - Tél : 05 22 37 40 87

E-mail : joubij.mouna@gmail.com

DIAFORMINE® 850 mg METFORMINE

COMPOSITION Chlorhydrate de metformine 850,00 mg

FORME PHARMACEUTIQUE Exipient : q. s. pour un comprimé.

Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE Antidiabétiques oraux - Biguanides.

INDICATIONS

Associé à un régime alimentaire adéquat, ce médicament est un antidiabétique oral destiné au traitement du diabète de type 2. Il peut parfois être prescrit chez les patients diabétiques traités par l'insuline.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Les doses de ce médicament sont déterminées individuellement par votre médecin en fonction des résultats d'exames de laboratoire (glycémie). En moyenne, la posologie usuelle est de 1 comprimé 2 fois par jour.

Les comprimés sont à avaler sans les croquer au cours ou à la fin des repas : par exemple, 1 comprimé au petit déjeuner et 1 comprimé aux repas du soir si la posologie est de 2 comprimés par jour.

Ce médicament doit être pris chaque jour, strictement à l'ordonnance de votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

• insuffisance rénale modérée (détaillez la fonction rénale même si elle est augmentée) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

• insuffisance rénale grave (détaillez la fonction rénale) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

• insuffisance rénale modérée (détaillez la fonction rénale même si elle est augmentée) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

• insuffisance rénale grave (détaillez la fonction rénale) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

• insuffisance rénale grave (détaillez la fonction rénale) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

• insuffisance rénale grave (détaillez la fonction rénale) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

Évitez toute consommation de boissons alcoolisées.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un médicament contenant de l'alcool même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

En cas de grossesse, le traitement du diabète fait nécessairement appel à l'insuline. La découverte d'une grossesse alors que vous prenez ce médicament impose de changer votre traitement pour de l'insuline.

Prévenez votre médecin traitant qui se chargera de modifier votre traitement.

En cas de désir de grossesse, prévenez votre médecin.

Alimentation : Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce médicament est contre-indiqué en période d'allaitement.

Effets secondaires : Comme tous les médicaments, DIAFORMINE 850 mg, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce médicament utilise sans nuire à la conduite de véhicules.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce médicament utilise sans nuire à la conduite de véhicules.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce médicament utilise sans nuire à la conduite de véhicules.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce médicament utilise sans nuire à la conduite de véhicules.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce médicament utilise sans nuire à la conduite de véhicules.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce médicament utilise sans nuire à la conduite de véhicules.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce médicament utilise sans nuire à la conduite de véhicules.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce médicament utilise sans nuire à la conduite de véhicules.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce médicament utilise sans nuire à la conduite de véhicules.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce médicament utilise sans nuire à la conduite de véhicules.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce médicament utilise sans nuire à la conduite de véhicules.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce médicament utilise sans nuire à la conduite de véhicules.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce médicament utilise sans nuire à la conduite de véhicules.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce médicament utilise sans nuire à la conduite de véhicules.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce médicament utilise sans nuire à la conduite de véhicules.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce médicament utilise sans nuire à la conduite de véhicules.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce médicament utilise sans nuire à la conduite de véhicules.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce médicament utilise sans nuire à la conduite de véhicules.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce médicament utilise sans nuire à la conduite de véhicules.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce médicament utilise sans nuire à la conduite de véhicules.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce médicament utilise sans nuire à la conduite de véhicules.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce médicament utilise sans nuire à la conduite de véhicules.

DIAFORMINE® 850 mg METFORMINE

COMPOSITION Chlorhydrate de metformine 850,00 mg

FORME PHARMACEUTIQUE Exipient : q. s. pour un comprimé.

Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE Antidiabétiques oraux - Biguanides.

INDICATIONS

Associé à un régime alimentaire adéquat, ce médicament est un antidiabétique oral destiné au traitement du diabète de type 2. Il peut parfois être prescrit chez les patients diabétiques traités par l'insuline.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Les doses de ce médicament sont déterminées individuellement par votre médecin en fonction des résultats d'exames de laboratoire (glycémie). En moyenne, la posologie usuelle est de 1 comprimé 2 fois par jour.

Les comprimés sont à avaler sans les croquer au cours ou à la fin des repas : par exemple, 1 comprimé au petit déjeuner et 1 comprimé aux repas du soir si la posologie est de 2 comprimés par jour.

Ce médicament doit être pris chaque jour, strictement à l'ordonnance de votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

• insuffisance rénale modérée (détaillez la fonction rénale même si elle est augmentée) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

• insuffisance rénale grave (détaillez la fonction rénale) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

• insuffisance rénale modérée (détaillez la fonction rénale même si elle est augmentée) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

• insuffisance rénale grave (détaillez la fonction rénale) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

• insuffisance rénale grave (détaillez la fonction rénale) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

• insuffisance rénale grave (détaillez la fonction rénale) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

Évitez toute consommation de boissons alcoolisées.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un médicament contenant de l'alcool même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

En cas de grossesse, le traitement du diabète fait nécessairement appel à l'insuline. La découverte d'une grossesse alors que vous prenez ce médicament impose de changer votre traitement pour de l'insuline.

Prévenez votre médecin traitant si vous envisagez de modifier votre traitement.

En cas de désir de grossesse, prévenez votre médecin.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Ce médicament est contre-indiqué en période d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Le médicament utilisé seul n'entraîne pas d'hypoglycémie et n'a donc pas d'effet sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

Par contre, en association avec d'autres antidiabétiques hypoglycémisants (sulfamides, insuline, repaglinide), il convient d'attirer l'attention sur les risques de survenue d'une hypoglycémie.

EFFETS SECONDAIRES Comme tous les médicaments, DIAFORMINE 850 mg, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Au début du traitement, quelques troubles digestifs peuvent se manifester (nausées, vomissements ou diarrhées) surtout si les comprimés sont absorbés en dehors des repas. Ces troubles sont en fin de traitement.

Si ces troubles persistent, arrêtez ce médicament et consultez votre médecin.

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, de douleurs abdominales accompagnées de crampes musculaires ou de maux de tête avec sensation de grande fatigue, peut être le signe d'un déséquilibre grave de votre diabète.

Arrêtez aussitôt ce médicament et consultez immédiatement votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

CONSERVATION Si vous avez pris plus de DIAFORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre DIAFORMINE 850 mg, comprimé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple.

Ras de précautions particulières de conservation.

Ne laissez ni à la portée ni à la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Tableau A (Liste I)

b

82, Allée des Casernes - Aïn Sébah
S. Bachouch - Pharmacie Respou
bottu s.a.

6118000042726

30 comprimés pelliculés
Mettormine® 850 mg

02071 LOT
12/25 PER
18000 PPV

DIAFORMINE® 850 mg METFORMINE

COMPOSITION Chlorhydrate de metformine 850,00 mg

FORME PHARMACEUTIQUE Exipient : q. s. pour un comprimé.

Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE Antidiabétiques oraux - Biguanides.

INDICATIONS

Associé à un régime alimentaire adéquat, ce médicament est un antidiabétique oral destiné au traitement du diabète de type 2. Il peut parfois être prescrit chez les patients diabétiques traités par l'insuline.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Les doses de ce médicament sont déterminées individuellement par votre médecin en fonction des résultats d'exames de laboratoire (glycémie). En moyenne, la posologie usuelle est de 1 comprimé 2 fois par jour.

Les comprimés sont à avaler sans les croquer au cours ou à la fin des repas : par exemple, 1 comprimé au petit déjeuner et 1 comprimé aux repas du soir si la posologie est de 2 comprimés par jour.

Ce médicament doit être pris chaque jour, strictement à l'ordonnance de votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

• insuffisance rénale modérée (détaillez la fonction rénale même si elle est augmentée) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

• insuffisance rénale grave (détaillez la fonction rénale) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

• insuffisance rénale modérée (détaillez la fonction rénale même si elle est augmentée) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

• insuffisance rénale grave (détaillez la fonction rénale) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

• insuffisance rénale grave (détaillez la fonction rénale) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

• insuffisance rénale grave (détaillez la fonction rénale) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

Évitez toute consommation de boissons alcoolisées.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un médicament contenant de l'alcool même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

En cas de grossesse, le traitement du diabète fait nécessairement appel à l'insuline. La découverte d'une grossesse alors que vous prenez ce médicament impose de changer votre traitement pour de l'insuline.

Prévenez votre médecin traitant si vous envisagez de modifier votre traitement.

En cas de désir de grossesse, prévenez votre médecin.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Ce médicament est contre-indiqué en période d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Le médicament utilisé seul n'entraîne pas d'hypoglycémie et n'a donc pas d'effet sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

Par contre, en association avec d'autres antidiabétiques hypoglycémisants (sulfamides, insuline, repaglinide), il convient d'attirer l'attention sur les risques de survenue d'une hypoglycémie.

EFFETS SECONDAIRES Comme tous les médicaments, DIAFORMINE 850 mg, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Au début du traitement, quelques troubles digestifs peuvent se manifester (nausées, vomissements ou diarrhées) surtout si les comprimés sont absorbés en dehors des repas. Ces troubles sont en fin de traitement.

Si ces troubles persistent, arrêtez ce médicament et consultez votre médecin.

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, de douleurs abdominales accompagnées de crampes musculaires ou de maux de tête avec sensation de grande fatigue, peut être le signe d'un déséquilibre grave de votre diabète.

Arrêtez aussitôt ce médicament et consultez immédiatement votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

CONSERVATION Si vous avez pris plus de DIAFORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre DIAFORMINE 850 mg, comprimé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple.

Ras de précautions particulières de conservation.

Ne laissez ni à la portée ni à la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Tableau A (Liste I)

DIAFORMINE 850 mg
Mettormine

30 comprimés pelliculés

6118000042726

bottu s.a.

82, Allée des Casernes - Aïn Sebaïa - S. Bachouch - Pharmacie Respou

DIAFORMINE® 850 mg METFORMINE

COMPOSITION Chlorhydrate de metformine 850,00 mg

FORME PHARMACEUTIQUE Exipient : q. s. pour un comprimé.

Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE Antidiabétiques oraux - Biguanides.

INDICATIONS

Associé à un régime alimentaire adéquat, ce médicament est un antidiabétique oral destiné au traitement du diabète de type 2. Il peut parfois être prescrit chez les patients diabétiques traités par l'insuline.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Les doses de ce médicament sont déterminées individuellement par votre médecin en fonction des résultats d'exames de laboratoire (glycémie). En moyenne, la posologie usuelle est de 1 comprimé 2 fois par jour.

Les comprimés sont à avaler sans les croquer au cours ou à la fin des repas : par exemple, 1 comprimé au petit déjeuner et 1 comprimé aux repas du soir si la posologie est de 2 comprimés par jour.

Ce médicament doit être pris chaque jour, strictement à l'ordonnance de votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

• insuffisance rénale modérée (détaillez la fonction rénale même si elle est augmentée) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

• insuffisance rénale grave (détaillez la fonction rénale) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

• insuffisance rénale modérée (détaillez la fonction rénale même si elle est augmentée) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

• insuffisance rénale grave (détaillez la fonction rénale) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

• insuffisance rénale grave (détaillez la fonction rénale) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

• insuffisance rénale grave (détaillez la fonction rénale) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

Évitez toute consommation de boissons alcoolisées.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un médicament contenant de l'alcool même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

En cas de grossesse, le traitement du diabète fait nécessairement appel à l'insuline. La découverte d'une grossesse alors que vous prenez ce médicament impose de changer votre traitement pour de l'insuline.

Prévenez votre médecin traitant qui se chargera de modifier votre traitement.

En cas de désir de grossesse, prévenez votre médecin.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Ce médicament est contre-indiqué en période d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : le médicament peut entraîner une hypoglycémie.

Par contre, en association avec d'autres antidiabétiques hypoglycémisants (sulfamides, insuline, repaglinide), il convient d'attirer l'attention sur les risques de survenue d'une hypoglycémie.

EFFETS SECONDAIRES Comme tous les médicaments, DIAFORMINE 850 mg, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Au début du traitement, quelques troubles digestifs peuvent se manifester (nausées, vomissements, diarrhées) surtout si les comprimés sont absorbés en dehors des repas. Ces troubles sont en fin de traitement.

Si ces troubles persistent, arrêtez ce médicament et consultez votre médecin.

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, de douleurs abdominales accompagnées de crampes musculaires ou de maux de tête, avec sensation de grande fatigue, peut être le signe d'un déséquilibre grave de votre diabète.

Arrêtez aussitôt ce médicament et consultez immédiatement votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

CONSERVATION Si vous avez pris plus de DIAFORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre DIAFORMINE 850 mg, comprimé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple.

Ras de précautions particulières de conservation.

Ne laissez ni à la portée ni à la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Tableau A (Liste I)

b

82, Allée des Casernes - Aïn Sebaïa
S. Bachouch - Pharmacie Respo

6118000042726

30 comprimés pelliculés
Mettormine® 850 mg

PPV : 18D00
PER : 12/25
LOT : 0271

0271

DIAFORMINE® 850 mg METFORMINE

COMPOSITION Chlorhydrate de metformine 850,00 mg

FORME PHARMACEUTIQUE Exipient : q. s. pour un comprimé.

Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE Antidiabétiques oraux - Biguanides.

INDICATIONS

Associé à un régime alimentaire adéquat, ce médicament est un antidiabétique oral destiné au traitement du diabète de type 2. Il peut parfois être prescrit chez les patients diabétiques traités par l'insuline.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Les doses de ce médicament sont déterminées individuellement par votre médecin en fonction des résultats d'exames de laboratoire (glycémie). En moyenne, la posologie usuelle est de 1 comprimé 2 fois par jour.

Les comprimés sont à avaler sans les croquer au cours ou à la fin des repas : par exemple, 1 comprimé au petit déjeuner et 1 comprimé aux repas du soir si la posologie est de 2 comprimés par jour.

Ce médicament doit être pris chaque jour, strictement à l'ordonnance de votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

• insuffisance rénale modérée (détaillez la fonction rénale même si elle est augmentée) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

• insuffisance rénale grave (détaillez la fonction rénale) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

• insuffisance rénale modérée (détaillez la fonction rénale même si elle est augmentée) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

• insuffisance rénale grave (détaillez la fonction rénale) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

• insuffisance rénale grave (détaillez la fonction rénale) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

• insuffisance rénale grave (détaillez la fonction rénale) ;

• insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique) ;

• insuffisance cardiaque, ou insuffisance respiratoire ;

Évitez toute consommation de boissons alcoolisées.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un médicament contenant de l'alcool même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

En cas de grossesse, le traitement du diabète fait nécessairement appel à l'insuline. La découverte d'une grossesse alors que vous prenez ce médicament impose de changer votre traitement pour de l'insuline.

Prévenez votre médecin traitant si vous envisagez de modifier votre traitement.

En cas de désir de grossesse, prévenez votre médecin.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Ce médicament est contre-indiqué en période d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Le médicament utilisé seul n'entraîne pas d'hypoglycémie et n'a donc pas d'effet sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

Par contre, en association avec d'autres antidiabétiques hypoglycémisants (sulfamides, insuline, repaglinide), il convient d'attirer l'attention sur les risques de survenue d'une hypoglycémie.

EFFETS SECONDAIRES Comme tous les médicaments, DIAFORMINE 850 mg, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Au début du traitement, quelques troubles digestifs peuvent se manifester (nausées, vomissements ou diarrhées) surtout si les comprimés sont absorbés en dehors des repas. Ces troubles sont en fin de traitement.

Si ces troubles persistent, arrêtez ce médicament et consultez votre médecin.

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, de douleurs abdominales accompagnées de crampes musculaires ou de maux de tête avec sensation de grande fatigue, peut être le signe d'un déséquilibre grave de votre diabète.

Arrêtez aussitôt ce médicament et consultez immédiatement votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

CONSERVATION Si vous avez pris plus de DIAFORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre DIAFORMINE 850 mg, comprimé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple.

Ras de précautions particulières de conservation.

Ne laissez ni à la portée ni à la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Tableau A (Liste I)

b

82, Allée des Casernes - Aïn Sébah
S. Bachouch - Pharmacie Respou
bottu s.a.

6118000042726

30 comprimés pelliculés
Mettormine® 850 mg

02071 LOT
PER: 12/25
PPV: 18D00

DIAFORMINE[®] 850 mg METFORMINE

COMPOSITION Chlorhydrate de metformine 850,00 mg

Excipient : q. s. pour un comprimé.

Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antidiabétiques oraux - Biguanides.

INDICATIONS

Associé à un régime alimentaire adéquat, ce médicament est un antidiabétique oral destiné au traitement du diabète de type 2. Il peut parfois être prescrit chez les patients diabétiques traités par l'insuline.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Les doses de ce médicament sont déterminées individuellement par votre médecin en fonction des résultats d'examen de laboratoire (glycémie). En moyenne, la posologie usuelle est de 1 comprimé 2 fois par jour.

Les comprimés sont à avaler sans les croquer au cours ou à la fin des repas : par exemple, 1 comprimé au petit déjeuner et 1 comprimé aux repas du soir si la posologie est de 2 comprimés par jour.

Ce médicament doit être pris chaque jour, strictement à l'ordonnance de votre médecin.

ATTENTION : TOUS LES CAS SE CONFORMENT STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDecin.

CONTRE-INDICATIONS

DIAPHORMINE 850mg, comprimé pelliculé NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

• en cas de déshydratation du diabète acido-cétosé.

• en cas de déshydratation rénale même si elle est modérée (détaillez la cause des reins avec augmentation des produits radiopharmaceutiques).

• si vous avez une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire.

• si vous avez une insuffisance hépatique (détaillez la fonction).

• en cas de diarrhée persistante, de vomissements répétés.

• pendant l'allaitement.

MISES EN GARDE SPECIALES

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, de douleurs abdominales accompagnées de crampes musculaires ou de maux de tête avec sensation de grande fatigue peut être le signe d'un déshydratation grave de votre diabète.

Prévenir aussitôt votre médecin sans reprendre votre médicament avant sa visite.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination de ce médicament se fait en grande partie par les reins.

Vous devez faire appel à votre médecin pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse ou virale : grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire.

La survenue de certaines maladies ou la prise de certains médicaments (corticoïdes et certains diurétiques, rifampine, salbutamol et théophylline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déshydrater plus ou moins gravement le diabète et nécessiter un recours transitoire à l'insuline.

En cas d'hospitalisation pour examen, pour une intervention chirurgicale ou pour une complication comme une maladie cardiaque, informez le médecin que vous prenez ce médicament.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

En cas de grossesse, le traitement du diabète fait nécessairement appel à l'insuline. La découverte d'une grossesse alors que vous prenez ce médicament impose de changer votre traitement pour de l'insuline.

Prévenez votre médecin traitant qui se chargera de modifier votre traitement.

En cas de désir de grossesse, prévenez votre médecin.

Alimentation Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce médicament est contre-indiqué en période d'allaitement.

Effets secondaires Comme tous les médicaments, DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Au début du traitement, quelques troubles digestifs peuvent se manifester (nausées, vomissements ou diarrhées) surtout si les comprimés sont absorbés en dehors des repas. Ces troubles sont en fin de repas.

Si ces troubles persistent, arrêtez ce médicament et consultez votre médecin.

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, de douleurs abdominales accompagnées de crampes musculaires ou de maux de tête avec sensation de grande fatigue, peut être le signe d'un déshydratation grave de votre diabète.

Arrêtez aussitôt ce médicament et consultez immédiatement votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

Si vous avez pris plus de DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

Consulter immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre DIAPHORMINE 850 mg, comprimé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple.

Ras de précautions particulières de conservation.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Tableau A (Liste I)

CONSERVATION

STOCKAGE

STOCKAGE

STOCKAGE

STOCKAGE

STOCKAGE

STOCKAGE

STOCKAGE

STOCKAGE

STOCKAGE

Evitez toute consommation de boissons alcoolisées.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Veuillez indiquer à votre médecin si vous prenez ou avez pris récemment un médicament contenant de l'alcool même si l'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

En cas de désir de grossesse, prévenez votre médecin.

Alimentation Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce médicament est contre-indiqué en période d'allaitement.

Effets secondaires Comme tous les médicaments, DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Au début du traitement, quelques troubles digestifs peuvent se manifester (nausées, vomissements ou diarrhées) surtout si les comprimés sont absorbés en dehors des repas. Ces troubles sont en fin de repas.

Si ces troubles persistent, arrêtez ce médicament et consultez votre médecin.

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, de douleurs abdominales accompagnées de crampes musculaires ou de maux de tête avec sensation de grande fatigue, peut être le signe d'un déshydratation grave de votre diabète.

Arrêtez aussitôt ce médicament et consultez immédiatement votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

Si vous avez pris plus de DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

Consulter immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre DIAPHORMINE 850 mg, comprimé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple.

Ras de précautions particulières de conservation.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Tableau A (Liste I)

CONSERVATION

STOCKAGE

STOCKAGE

STOCKAGE

STOCKAGE

STOCKAGE

STOCKAGE

STOCKAGE

STOCKAGE

82, Allée des Casernes - Aïn Sebaâ
S. Bachouch - Pharmacie Respo

6118000042726

30 comprimés pelliculés
Mettormine 850 mg

0,1

PPV : 18D00
PER : 12/25
LOT : 0271

DIAFORMINE[®] 850 mg METFORMINE

COMPOSITION Chlorhydrate de metformine 850,00 mg

Excipient : q. s. pour un comprimé.

Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antidiabétiques oraux - Biguanides.

INDICATIONS

Associé à un régime alimentaire adéquat, ce médicament est un antidiabétique oral destiné au traitement du diabète de type 2. Il peut parfois être prescrit chez les patients diabétiques traités par l'insuline.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Les doses de ce médicament sont déterminées individuellement par votre médecin en fonction des résultats d'examen de laboratoire (glycémie). En moyenne, la posologie usuelle est de 1 comprimé 2 fois par jour.

Les comprimés sont à avaler sans les croquer au cours ou à la fin des repas : par exemple, 1 comprimé au petit déjeuner et 1 comprimé aux repas du soir si la posologie est de 2 comprimés par jour.

Ce médicament doit être pris chaque jour, strictement à l'ordonnance de votre médecin.

ATTENTION : TOUS LES CAS SE CONFORMENT STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDecin.

CONTRE-INDICATIONS

DIAPHORMINE 850mg, comprimé pelliculé NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

• en cas de déshydratation du diabète acido-cétosé.

• en cas de déshydratation rénale même si elle est modérée (détaillez la cause des reins avec augmentation des produits radiopharmaceutiques).

• si vous avez une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire.

• si vous avez une insuffisance hépatique (détaillez la fonction).

• en cas de diarrhée persistante, de vomissements répétés.

• pendant l'allaitement.

MISES EN GARDE SPECIALES

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, de douleurs abdominales accompagnées de crampes musculaires ou de maux de tête avec sensation de grande fatigue peut être le signe d'un déshydratation grave de votre diabète.

Prévenir aussitôt votre médecin sans reprendre votre médicament avant sa visite.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination de ce médicament se fait en grande partie par les reins.

Vous devez faire appel à votre médecin pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse ou virale : grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire.

La survenue de certaines maladies ou la prise de certains médicaments (corticoïdes et certains diurétiques, méthotrexate, salbutamol et théophylline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déshydrater plus ou moins gravement le diabète et nécessiter un recours transitoire à l'insuline.

En cas d'hospitalisation pour examen, pour une intervention chirurgicale ou pour une complication comme une maladie cardiaque, informez le médecin que vous prenez ce médicament.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Tableau A (Liste I)

CONSERVATION

Nes pas de dose double pour conserver la dose simple.

Ras de précautions particulières de conservation.

Néanmoins, il est recommandé de ne pas dépasser la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Evitez toute consommation de boissons alcoolisées.

Veillez à indiquer à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un médicament contenant de l'alcool même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

En cas de grossesse, le traitement du diabète fait nécessairement appel à l'insuline.

La découverte d'une grossesse alors que vous prenez ce médicament impose de changer votre traitement pour de l'insuline.

Prévenez votre médecin traitant qui se chargera de modifier votre traitement.

En cas de désir de grossesse, prévenez votre médecin.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DE MACHINES :

Le médicament utilisé sans traitement peut provoquer des effets indésirables.

Au début du traitement, quelques troubles digestifs peuvent se manifester (nausées, vomissements ou diarrhées) surtout si les comprimés sont absorbés en dehors des repas. Ces troubles sont en général passagers (une dizaine de jours) et réduits par l'absorption des comprimés au cours ou à la fin du repas.

Si ces troubles persistent, arrêtez ce médicament et consultez votre médecin.

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, de douleurs abdominales accompagnées de crampes musculaires ou de maux de tête avec sensation de grande fatigue, peut être le signe d'un déshydratation grave de votre diabète.

Arrêtez aussitôt ce médicament et consultez immédiatement votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

Si vous avez pris plus de DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

Si vous avez pris plus de DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

Si vous avez pris plus de DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

Si vous avez pris plus de DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

CONSERVATION

Nes pas de dose double pour conserver la dose simple.

Ras de précautions particulières de conservation.

Néanmoins, il est recommandé de ne pas dépasser la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

CONSERVATION

Nes pas de dose double pour conserver la dose simple.

Ras de précautions particulières de conservation.

Néanmoins, il est recommandé de ne pas dépasser la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

CONSERVATION

Nes pas de dose double pour conserver la dose simple.

Ras de précautions particulières de conservation.

Néanmoins, il est recommandé de ne pas dépasser la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

CONSERVATION

Nes pas de dose double pour conserver la dose simple.

Ras de précautions particulières de conservation.

Néanmoins, il est recommandé de ne pas dépasser la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

CONSERVATION

Nes pas de dose double pour conserver la dose simple.

Ras de précautions particulières de conservation.

Néanmoins, il est recommandé de ne pas dépasser la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

CONSERVATION

Nes pas de dose double pour conserver la dose simple.

Ras de précautions particulières de conservation.

Néanmoins, il est recommandé de ne pas dépasser la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

CONSERVATION

Nes pas de dose double pour conserver la dose simple.

Ras de précautions particulières de conservation.

Néanmoins, il est recommandé de ne pas dépasser la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

CONSERVATION

Nes pas de dose double pour conserver la dose simple.

Ras de précautions particulières de conservation.

Néanmoins, il est recommandé de ne pas dépasser la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

CONSERVATION

Nes pas de dose double pour conserver la dose simple.

Ras de précautions particulières de conservation.

Néanmoins, il est recommandé de ne pas dépasser la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

CONSERVATION

Nes pas de dose double pour conserver la dose simple.

Ras de précautions particulières de conservation.

Néanmoins, il est recommandé de ne pas dépasser la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

CONSERVATION

Nes pas de dose double pour conserver la dose simple.

Ras de précautions particulières de conservation.

Néanmoins, il est recommandé de ne pas dépasser la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

CONSERVATION

Nes pas de dose double pour conserver la dose simple.

Ras de précautions particulières de conservation.

Néanmoins, il est recommandé de ne pas dépasser la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

CONSERVATION

Nes pas de dose double pour conserver la dose simple.

Ras de précautions particulières de conservation.

Néanmoins, il est recommandé de ne pas dépasser la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

CONSERVATION

Nes pas de dose double pour conserver la dose simple.

Ras de précautions particulières de conservation.

Néanmoins, il est recommandé de ne pas dépasser la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

CONSERVATION

Nes pas de dose double pour conserver la dose simple.

Ras de précautions particulières de conservation.

Néanmoins, il est recommandé de ne pas dépasser la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

CONSERVATION

Nes pas de dose double pour conserver la dose simple.

Ras de précautions particulières de conservation.

Néanmoins, il est recommandé de ne pas dépasser la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

DIAFORMINE[®] 850 mg METFORMINE

COMPOSITION Chlorhydrate de metformine 850,00 mg

Excipient : q. s. pour un comprimé.

Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antidiabétiques oraux - Biguanides.

INDICATIONS

Associé à un régime alimentaire adéquat, ce médicament est un antidiabétique oral destiné au traitement du diabète de type 2. Il peut parfois être prescrit chez les patients diabétiques traités par l'insuline.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Les doses de ce médicament sont déterminées individuellement par votre médecin en fonction des résultats d'examen de laboratoire (glycémie). En moyenne, la posologie usuelle est de 1 comprimé 2 fois par jour.

Les comprimés sont à avaler sans les croquer au cours ou à la fin des repas : par exemple, 1 comprimé au petit déjeuner et 1 comprimé aux repas du soir si la posologie est de 2 comprimés par jour.

Ce médicament doit être pris chaque jour, strictement à l'ordonnance de votre médecin.

ATTENTION : TOUS LES CAS SE CONFORMENT STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDecin.

CONTRE-INDICATIONS

DIAPHORMINE 850mg, comprimé pelliculé NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

• en cas de déshydratation du diabète acido-cétosé.

• en cas de déshydratation rénale même si elle est modérée (détaillez la cause des reins avec augmentation des produits radiopharmaceutiques).

• si vous avez une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire.

• si vous avez une insuffisance hépatique (détaillez la fonction).

• en cas de diarrhée persistante, de vomissements répétés.

• pendant l'allaitement.

MISES EN GARDE SPECIALES

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, de douleurs abdominales accompagnées de crampes musculaires ou de maux de tête avec sensation de grande fatigue peut être le signe d'un déshydratation grave de votre diabète.

Prévenir aussitôt votre médecin sans reprendre votre médicament avant sa visite.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination de ce médicament se fait en grande partie par les reins.

Vous devez faire appel à votre médecin pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse ou virale : grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire.

La survenue de certaines maladies ou la prise de certains médicaments (corticoïdes et certains diurétiques, méthotrexate, salbutamol et théophylline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déshydrater plus ou moins gravement le diabète et nécessiter un recours transitoire à l'insuline.

En cas d'hospitalisation pour examen, pour une intervention chirurgicale ou pour une complication comme une maladie cardiaque, informez le médecin que vous prenez ce médicament.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Tableau A (Liste I)

CONSERVATION

Nes pas de dose double pour conserver la dose simple.

Ras de précautions particulières de conservation.

Néanmoins, il a la vue des enfants.

Néanmoins, il a la vue des enfants.

Néanmoins, il a la vue des enfants.

Néanmoins, il a la vue des enfants.

Néanmoins, il a la vue des enfants.

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

DIAFORMINE[®] 850 mg METFORMINE

COMPOSITION Chlorhydrate de metformine 850,00 mg

Excipient : q. s. pour un comprimé.

Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antidiabétiques oraux - Biguanides.

INDICATIONS

Associé à un régime alimentaire adéquat, ce médicament est un antidiabétique oral destiné au traitement du diabète de type 2. Il peut parfois être prescrit chez les patients diabétiques traités par l'insuline.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Les doses de ce médicament sont déterminées individuellement par votre médecin en fonction des résultats d'exames de laboratoire (glycémie). En moyenne, la posologie usuelle est de 1 comprimé 2

à 3 fois par jour.

Les comprimés sort à avaler sans les croquer au cours ou à la fin des repas : par exemple, 1 comprimé au petit déjeuner et 1 comprimé aux repas du soir si la posologie est de 2 comprimés par jour.

Ce médicament doit être pris chaque jour, strictement à l'ordonnance de votre médecin. Toute interruption sans recommandation particulière du médecin.

ATTENTION : TOUS LES CAS SE CONFORMENT STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDecin.

CONTRE-INDICATIONS

DIAPHORMINE 850mg, comprimé pelliculé NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

cas de déséquilibre du diabète avec acido-cétose, si vous avez une insuffisance rénale même si elle est modérée (détaillez la fonction rénale avec augmentation des produits radio-pharmaceutiques).

si vous avez une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire, si vous avez une insuffisance hépatique (détaillez la fonction hépatique).

en cas de diarrhée persistante, de vomissements répétés, en cas de consommation importante de boissons alcoolisées, pendant l'allaitement.

MISES EN GARDE SPECIALES

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, de douleurs abdominales accompagnées de crampes musculaires ou de maux de tête avec sensation de grande fatigue peut être le signe d'un déséquilibre grave de votre diabète.

Prévenir aussitôt votre médecin sans reprendre votre médicament avant sa visite.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination de ce médicament se fait en grande partie par les reins. Vous devez faire appel à votre médecin pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse ou virale : grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire.

La survenue de certaines maladies ou la prise de certains médicaments (corticoïdes et certains diurétiques, rifampine, salbutamol et théophylline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement le diabète et nécessiter un recours transitoire à l'insuline.

En cas d'hospitalisation pour examen, pour une intervention chirurgicale ou pour une complication comme une maladie cardiaque, informez le médecin que vous prenez ce médicament.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.



b

82, Allée des Casernes - Aïn Sebaïa
S. Bachouch - Pharmacie Respo



30 comprimés pelliculés
Diaphormine 850 mg
Mettormine

0,1

PPV : 18D00
PER : 12/25
LOT : 0271

Tableau A (Liste I)

CONSERVATION
Ne pas de dose double pour compenser la dose simple.
Consulter immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
Si vous oubliez de prendre DIAPHORMINE 850 mg, continuez à prendre votre médicament à l'heure habituelle.
Pas de précautions particulières de conservation.
Ne laissez ni à la portée ni à la vue des enfants.
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Évitez toute consommation de boissons alcoolisées.
Veuillez indiquer à votre médecin si vous prenez ou avez pris récemment un médicament contenant de l'alcool même si l'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.
En cas de grossesse, le traitement du diabète fait nécessairement appel à l'insuline. La découverte d'une grossesse alors que vous prenez ce médicament impose de changer votre traitement pour de l'insuline.
Prévenez votre médecin traitant si vous envisagez de modifier votre traitement.
En cas de désir de grossesse, prévenez votre médecin.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Allaitement
Ce médicament est contre-indiqué en période d'allaitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Conduite de véhicules et utilisation de machines :
Ce médicament utilise sans nuire à l'efficacité des machines.
Conduite de véhicules ou utilisation des machines.
Au début du traitement, quelques troubles digestifs peuvent se manifester (nausées, vomissements ou diarrhées) surtout si les comprimés sont absorbés en dehors des repas. Ces troubles sont en général passagers (une dizaine de jours) et réduits par l'absorption des comprimés au cours ou à la fin du repas.

EFFETS SECONDAIRES
Comme tous les médicaments, DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Au début du traitement, quelques troubles digestifs peuvent se manifester (nausées, vomissements ou diarrhées) surtout si les comprimés sont absorbés en dehors des repas. Ces troubles sont en général passagers (une dizaine de jours) et réduits par l'absorption des comprimés au cours ou à la fin du repas.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

Arrêtez aussitôt ce médicament et consultez immédiatement votre médecin.

Il peut s'agir d'une acétose lactique, d'un déséquilibre grave de votre diabète.

Si vous avez pris plus de DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

Si vous oubliez de prendre DIAPHORMINE 850 mg, continuez à prendre votre médicament à l'heure habituelle.

Si vous avez pris plus de DIAPHORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

- si votre pression sanguine est trop faible (hypotension sévère)
- si vous présentez un rétrécissement de l'aorte (sténose aortique), d'une valve cardiaque (rétrécissement mitral), un épaississement du muscle cardiaque (cardiomyopathie obstructive) ou un choc cardiogénique (insuffisance de l'apport sanguin aux tissus)
- si vous présentez un angor instable (à l'exception de l'angor de Prinzmetal)
- si vous avez eu une crise cardiaque (infarctus du myocarde) au cours des 28 derniers jours
- si vous êtes enceinte ou pensez l'être
- si vous allaitez

Faites attention avec LISOR:

Veuillez demander conseil à votre médecin avant de prendre ce médicament si vous :

- avez des problèmes cardiaques
- avez des problèmes rénaux
- avez des problèmes de foie
- êtes sous dialyse
- allez subir un traitement appelé LDL-aphérese destiné à l'élimination du cholestérol
- avez plus de 65 ans
- suivez un régime pauvre en sel et utilisez des suppléments
- prenez d'autres médicaments contenant du potassium
- avez des vomissements
- avez une désensibilisation afin de réduire l'allergie
- avez des guêpes
- avez un épertorié ci-dessous.

Médicaments :

Si vous avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre pharmacien.

Les médicaments suivants peuvent être pris conjointement à LISOR uniquement sous étroite surveillance médicale.

Il convient d'être particulièrement prudent en cas de prise conjointement aux médicaments suivants :

- diurétiques (employés afin de réduire la rétention d'eau)
- autres médicaments employés afin de réduire la rétention d'eau (anti-hypertenseurs)
- anti-inflammatoires
- acides

Effets secondaires très rares

Réactions allergiques, anomalies des tests hépatiques, inflammation du foie (hépatite), jaunissement de la peau (ictère), élévation de la glycémie, crise cardiaque (infarctus du myocarde), battements de cœur irréguliers (arythmie), toux, réactions cutanées sévères, gencives enflées ou endolories, plaques rouges sur la peau.

Lisinopril

Effets secondaires fréquents

Maux de tête, étourdissement ou vertige notamment en se levant rapidement, diarrhée, toux, vomissements, réduction du volume d'urine.

Effets secondaires peu fréquents

Dérèglements de l'humeur, angio-œdème (réaction d'hypersensibilité avec gonflement soudain des lèvres, du visage et du cou, ainsi qu'occasionnellement des pieds et des mains ; taux plus élevé d'angio-œdèmes chez les patients de race noire), changement de couleur (bleu pâle suivi d'une rougeur) et/ou engourdissement ou picotement au niveau des doigts ou orteils (phénomène de Raynaud), changements dans les sensations gustatives, fatigue, somnolence ou difficulté à s'endormir, rêves étranges, battements de cœur rapides, écoulement nasal, nausée, mal au ventre ou indigestion, éruption cutanée, démangeaisons, impuissance, lassitude, faiblesse musculaire.

Effets secondaires rares

Confusion, problèmes rénaux aigus, sécheresse de la bouche, perte de cheveux, psoriasis, augmentation mammaire chez l'homme. Détérioration du bilan sanguin : diminution des globules rouges, des plaquettes (thrombopénie), des globules blancs (neutropénie, leucopénie, agranulocytose). Il peut en résulter des saignements prolongés, une fatigue, une faiblesse, une maladie des ganglions lymphatiques ou une maladie auto-immune. Le médicament peut également retourner contre lui-même.

Effets secondaires

Diarrhée

Lot: T23390C
PER: 03/2025
PPV: 72.00 DH



1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

