

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)
Matricule : **5849**

Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : **ABOULFAID MOSTAFA**

Date de naissance : **14/07/1965**

Adresse : **67 ELWAHDA 2 N° 306 DEROUT**

Tél. **0667 31 27 01** Total des frais engagés **200,100 + 182,830** Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : **14/3/2023**

Nom et prénom du malade : **Aboufaid mostafa** Age : **58**

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : **Diabète type 2**

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **Casablanca**

Signature de l'adhérent(e) : **Aboufaid mostafa**

Le : **17/03/2023**

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre Coefficient	Montant détaillé des Honoraire	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
14/03/2023	CS	200 CTS	200 CTS	Dr. JOUSSI Mouna Spécialiste en Radiologie et en Imagerie, Médecin Radiologue, N° 225, 1er Etage Rue 3, Bouloumié, Dakhla, N° 225, 1er Etage CD - Radiologie - Tel: 05 22 37 40 87

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE DE DEROUA EL HAÏK Fouad Centre Commercial Deroua Tél.: 05 22 53 21 77 Fax: 05 22 53 25 25	17/03/23	1828,30

ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux															
																			
																			
O.D.F PROTHESES DENTAIRES																			
DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE				Coefficient des Travaux															
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>H</td> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				H	25533412	21433552	D	00000000	00000000		00000000	00000000	B	35533411	11433553	G			
H	25533412	21433552																	
D	00000000	00000000																	
	00000000	00000000																	
B	35533411	11433553																	
G																			
<p>[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>				Montants des Soins															
				Date du devis															
				Date de l'Execution															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Mouna JOUBIJ

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

Nutrition et maladies métaboliques

Diplômée de la Faculté de Médecine et

De Pharmacie de Casablanca

Ancienne interne au CHU Ibn Rochd Casablanca



الدكتورة مونى جوبيج

أخصائية في أمراض الغدد والسكري

والندبة وأمراض الأيض

خريجة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء

طبيبة داخلية سابقة بالمستشفى الجامعي

ابن رشد بالدار البيضاء


Casablanca, le ١٤/١٢/٢٠٢٣ الدار البيضاء في

Mr Aboufaid

Mostafa

Montant de soin = 100dkk

(mesure de la cétonémie
avec bâches , correcteur)



جميلة 3 شارع الداخلة رقم 225 الطابق الأول ق ج الدار البيضاء - الهاتف: 05 22 37 40 87

Jamila3, Avenue Dakhla, N° 225, 1er Etage, CD - Casablanca - Tél : 05 22 37 40 87

E-mail : joubij.mouna@gmail.com

Dr. Mouna JOUBIJ

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

Nutrition et maladies métaboliques

Diplômée de la Faculté de Médecine et

De Pharmacie de Casablanca

Ancienne interne au CHU Ibn Rochd Casablanca



الدكتورة مونى جوبيج

أخصائية في أمراض الغدد والسكري

والتنفسية وأمراض الأيض

خريجة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء

طبيبة داخلية سابقة بالمستشفى الجامعي

ابن رشد بالدار البيضاء

Casablanca, le ١٤/١٣/٢٠٢٣ الدار البيضاء في

MR Abafaid

Mostafa

٩٢٧٠٠ X ٣

٢١ Amarel 3mg q

scplj le matin

٩٣٣٤٦

PHARMACIE DE DEROUA
EL HAIK Fouad
Pharmacien
Centre Commercial Deroua
Tél.: 0522532177
Fax: 0522532510

٤٧١٠٠ X ٢

٢١ Jeuta Ducto 2,5mg ١٨٥٠mg

scp midi soir après repas

١٥٢,٥٠ X ٤

٣١ Lantess Solostar

٩١ UI à ٢١h

Dr. JOUBIJ

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87

1828, 30

Spécialiste en endocrinologie et diabétologie

05 22 37 40 87

Malades

Jamila 3, Bni 10, Casablanca - Tél: 05 22 37 40 87


Jentadueto®

2,5 mg/850 mg comprimés pelliculés
2,5 mg/1000 mg comprimés pelliculés

linagliptine/chlorhydrate de metformine

311126-04

 Boehringer
Ingelheim



peut être utilisé seul ou avec d'autres médicaments antidiabétiques comme les sulfamides hypoglycémiants ou l'insuline.

Qu'est-ce que le diabète de type 2 ?

Le diabète de type 2 est également appelé diabète non insulino-dépendant, ou DNID. Le diabète de type 2 est une maladie au cours de laquelle votre corps ne produit pas assez d'insuline et l'insuline produite par votre corps n'agit pas aussi bien qu'elle le devrait. Il se peut également que votre corps produise trop de sucre. Dans ce cas, le sucre (glucose) s'accumule dans le sang. Cela peut conduire à des problèmes médicaux graves tels que maladie cardiaque, maladie rénale, cécité et amputation.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre JENTADUETO ?

Ne prenez jamais JENTADUETO

- si vous êtes allergique à la linagliptine ou à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6) ;
- si vous avez un diabète non contrôlé avec, par exemple, une hyperglycémie importante (un taux de glucose sanguin élevé), des nausées, des vomissements, une déshydratation, une perte de poids rapide ou une acidocétose. L'acidocétose est une affection au cours de laquelle des substances appelées « corps cétoniques » s'accumulent dans le sang, pouvant conduire à un précoma diabétique. Les symptômes incluent une perte de poids rapide, une sensation de malaise ou de nausées, des douleurs à l'estomac, une respiration profonde, une somnolence inhabituelle ou une haleine de diabétique ;
- si vous avez des antécédents de diabète ;


Jentadueto®

2,5 mg/850 mg comprimés pelliculés
2,5 mg/1000 mg comprimés pelliculés

linagliptine/chlorhydrate de metformine

311126-04

 Boehringer
Ingelheim



peut être utilisé seul ou avec d'autres médicaments antidiabétiques comme les sulfamides hypoglycémiants ou l'insuline.

Qu'est-ce que le diabète de type 2 ?

Le diabète de type 2 est également appelé diabète non insulino-dépendant, ou DNID. Le diabète de type 2 est une maladie au cours de laquelle votre corps ne produit pas assez d'insuline et l'insuline produite par votre corps n'agit pas aussi bien qu'elle le devrait. Il se peut également que votre corps produise trop de sucre. Dans ce cas, le sucre (glucose) s'accumule dans le sang. Cela peut conduire à des problèmes médicaux graves tels que maladie cardiaque, maladie rénale, cécité et amputation.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre JENTADUETO ?

Ne prenez jamais JENTADUETO

- si vous êtes allergique à la linagliptine ou à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6) ;
- si vous avez un diabète non contrôlé avec, par exemple, une hyperglycémie importante (un taux de glucose sanguin élevé), des nausées, des vomissements, une déshydratation, une perte de poids rapide ou une acidocétose. L'acidocétose est une affection au cours de laquelle des substances appelées « corps cétoniques » s'accumulent dans le sang, pouvant conduire à un précoma diabétique. Les symptômes incluent une perte de poids rapide, une sensation de malaise ou de nausées, des douleurs à l'estomac, une respiration profonde, une somnolence inhabituelle ou une haleine de diabétique ;
- si vous avez des antécédents de diabète ;

Amarel® 1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

Glimepiride

Comprimé

SANOFI

1. QU'EST-CE QU'AMAREL COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique oral, appartenant à la famille des sulfonylurées, qui diminue le taux de sucre dans le sang.

AMAREL, comprimé agit en augmentant la qualité d'insuline libérée par votre pancréas. L'insuline fait ensuite baisser votre taux de sucre dans le sang.

Dans quel cas

AMAREL, c'est lorsque le taux de sucre dans le sang est trop élevé et que les médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang (glibenclamide), aux sulfamides antibactériens (médicament pour les infections bactériennes, tels que le sulfamethoxazole), ou à l'un des autres composants contenus dans AMAREL, comprimé (voir « Que contient AMAREL, comprimé ») ;

2. QUELLES COMPRIMES NE prenez pas

- si vous êtes

(médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang)

glibenclamide), aux sulfamides antibactériens (médicament pour les infections

bactériennes, tels que le sulfamethoxazole), ou à l'un des autres composants

contenus dans AMAREL, comprimé (voir « Que contient AMAREL, comprimé ») ;

- si vous avez un diabète insulino-dépendant (diabète de type 1) ;

- en cas de décompensation acido-cétosique (complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains des signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et raideur musculaire) ;

- en cas de coma diabétique ;

- si vous avez une maladie grave des reins ;

- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Fautes attention

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien si :

• Vous vous rétablissez d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin car un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.

• Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux du sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :

- malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

- modification du régime alimentaire ;
- prise de plus d'AMAREL, comprimé que ce dont vous avez besoin ;
- fonction rénale diminuée ;
- maladie grave du foie ;
- si vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles de la glande thyroïde, de la glande hypophysaire ou des glandes surrenales) ;
- consommation d'alcool (en particulier en l'absence de repas) ;
- prise de certains autres médicaments (voir « Prise d'autres médicaments ») ;
- si votre activité physique est augmentée, si vous ne mangez pas suffisamment ou que vous mangez des aliments contenant moins de glucides qu'habituellement. Les signes de l'hypoglycémie incluent :

- faim intense, maux de tête, nausées, vomissement, apathie, somnolence, troubles du sommeil, agitation, agressivité, difficultés de concentration, diminution de la vigilance et des réactions, dépression, confusion, troubles visuels et de la parole, difficulté à articuler, tremblement, paralysie partielle, troubles sensitifs, vertiges, sensation de faiblesse.

- les signes suivants peuvent également survenir : sueurs abondantes, peau moite, anxiété, accélération du pouls, hypertension artérielle, palpitation, douleurs intenses, et soudaine dans la poitrine pouvant irradier dans les régions voisines (angine de poitrine et troubles de rythme cardiaque).

Si votre taux de sucre dans le sang continue de baisser, vous pouvez présenter : un état confusionnel important (délire), des convulsions, une perte de la maîtrise de soi, une respiration courte et rapide, un ralentissement de votre rythme cardiaque, une perte de connaissance. Une hypoglycémie sévère peut également ressembler à une attaque cérébrale.

Traitement de l'hypoglycémie :

Dans la plupart des cas, les signes d'hypoglycémie disparaissent très rapidement après l'ingestion de sucre : par exemple morceaux de sucre, boisson sucrée ou thé sucré. Vous devez donc toujours avoir du sucre (morceaux de sucre) avec vous. Par contre, les édulcorants de synthèse ne sont pas efficaces.

Contactez votre médecin ou allez à l'hôpital si l'ingestion de sucre n'est pas efficace ou en cas de réapparition des symptômes.

Tests de laboratoire

Votre taux de sucre dans le sang ou dans les urines doit être contrôlé régulièrement. Votre médecin peut vous demander de faire des analyses de sang pour vérifier le nombre de cellules sanguines ainsi que votre fonction hépatique.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Votre médecin peut être amené à modifier la dose d'AMAREL, comprimé si vous prenez d'autres médicaments. En effet, ceux-ci peuvent diminuer ou augmenter l'effet d'AMAREL, comprimé sur votre taux de sucre dans le sang.

L'effet d'AMAREL, comprimé (diminution du taux de sucre dans le sang) peut être augmenté par les médicaments suivants et entraîner un risque d'hypoglycémie :

- autres médicaments pour traiter le diabète (tels que l'insuline ou la metformine, azopropazone, oxyphenbutazone, aspirine) ;
- médicaments pour traiter la douleur ou l'inflammation (phénylbutazone, azopropazone, oxyphenbutazone, aspirine) ;
- médicaments pour traiter les infections urinaires (tels que certains sulfamides antibactériens à longue durée d'action) ;
- médicaments pour traiter les infections bactériennes et fongiques (tétracyclines, chloramphénicol, flucconazole, miconazole, les quinolones, clarithromycine) ;
- médicaments pour empêcher la coagulation du sang (antivitamines K de type dérivés coumariniques tels que la warfarine) ;
- médicaments favorisant le développement musculaire (anabolisants) ;
- médicaments utilisés pour la thérapie de substitution par hormones sexuelles masculines ;

Amarel® 1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

Glimepiride

Comprimé

SANOFI

1. QU'EST-CE QU'AMAREL COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique oral, appartenant à la famille des sulfonylurées, qui diminue le taux de sucre dans le sang.

AMAREL, comprimé agit en augmentant la qualité d'insuline libérée par votre pancréas. L'insuline fait ensuite baisser votre taux de sucre dans le sang.

Dans quel cas

AMAREL, c'est lorsque le taux de sucre dans le sang est trop élevé et que les médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang (glibenclamide), aux sulfamides antibactériens (médicament pour les infections bactériennes, tels que le sulfamethoxazole), ou à l'un des autres composants contenus dans AMAREL, comprimé (voir « Que contient AMAREL, comprimé ») ;

2. QUELLES

COMPRIMÉ

Ne prenez

- si vous êtes

(médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang)

glibenclamide), aux sulfamides antibactériens (médicament pour les infections

bactériennes, tels que le sulfamethoxazole), ou à l'un des autres composants

contenus dans AMAREL, comprimé (voir « Que contient AMAREL, comprimé ») ;

- si vous avez un diabète insulinodépendant (diabète de type 1) ;

- en cas de décompensation acido-cétosique (complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains des signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et raideur musculaire) ;

- en cas de coma diabétique ;

- si vous avez une maladie grave des reins ;

- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Fautes attention

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien si :

• Vous vous rétablissez d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin car un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.

• Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux du sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :

- malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

- modification du régime alimentaire ;
- prise de plus d'AMAREL, comprimé que ce dont vous avez besoin ;
- fonction rénale diminuée ;
- maladie grave du foie ;
- si vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles de la glande thyroïde, de la glande hypophysaire ou des glandes surrenales) ;
- consommation d'alcool (en particulier en l'absence de repas) ;
- prise de certains autres médicaments (voir « Prise d'autres médicaments ») ;
- si votre activité physique est augmentée, si vous ne mangez pas suffisamment ou que vous mangez des aliments contenant moins de glucides qu'habituellement. Les signes de l'hypoglycémie incluent :

- faim intense, maux de tête, nausées, vomissement, apathie, somnolence, troubles du sommeil, agitation, agressivité, difficultés de concentration, diminution de la vigilance et des réactions, dépression, confusion, troubles visuels et de la parole, difficulté à articuler, tremblement, paralysie partielle, troubles sensitifs, vertiges, sensation de faiblesse.
- les signes suivants peuvent également survenir : sueurs abondantes, peau moite, anxiété, accélération du pouls, hypertension artérielle, palpitation, douleurs intenses, et soudaine dans la poitrine pouvant irradier dans les régions voisines (angine de poitrine et troubles de rythme cardiaque).

Si votre taux de sucre dans le sang continue de baisser, vous pouvez présenter : un état confusionnel important (délire), des convulsions, une perte de la maîtrise de soi, une respiration courte et rapide, un ralentissement de votre rythme cardiaque, une perte de connaissance. Une hypoglycémie sévère peut également ressembler à une attaque cérébrale.

Traitement de l'hypoglycémie :

Dans la plupart des cas, les signes d'hypoglycémie disparaissent très rapidement après l'ingestion de sucre : par exemple morceaux de sucre, boisson sucrée ou thé sucré. Vous devez donc toujours avoir du sucre (morceaux de sucre) avec vous. Par contre, les édulcorants de synthèse ne sont pas efficaces.

Contactez votre médecin ou allez à l'hôpital si l'ingestion de sucre n'est pas efficace ou en cas de réapparition des symptômes.

Tests de laboratoire

Votre taux de sucre dans le sang ou dans les urines doit être contrôlé régulièrement. Votre médecin peut vous demander de faire des analyses de sang pour vérifier le nombre de cellules sanguines ainsi que votre fonction hépatique.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Votre médecin peut être amené à modifier la dose d'AMAREL, comprimé si vous prenez d'autres médicaments. En effet, ceux-ci peuvent diminuer ou augmenter l'effet d'AMAREL, comprimé sur votre taux de sucre dans le sang.

L'effet d'AMAREL, comprimé (diminution du taux de sucre dans le sang) peut être augmenté par les médicaments suivants et entraîner un risque d'hypoglycémie :

- autres médicaments pour traiter le diabète (tels que l'insuline ou la metformine, azopropazone, oxyphenbutazone, aspirine) ;
- médicaments pour traiter la douleur ou l'inflammation (phénylbutazone, azopropazone, oxyphenbutazone, aspirine) ;
- médicaments pour traiter les infections urinaires (tels que certains sulfamides antibactériens à longue durée d'action) ;
- médicaments pour traiter les infections bactériennes et fongiques (tétracyclines, chloramphénicol, flucconazole, miconazole, les quinolones, clarithromycine) ;
- médicaments pour empêcher la coagulation du sang (antivitamines K de type dérivés coumariniques tels que la warfarine) ;
- médicaments favorisant le développement musculaire (anabolisants) ;
- médicaments utilisés pour la thérapie de substitution par hormones sexuelles masculines ;

Amarel® 1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

Glimepiride

Comprimé

SANOFI

1. QU'EST-CE QU'AMAREL COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique oral, appartenant à la famille des sulfonylurées, qui diminue le taux de sucre dans le sang.

AMAREL, comprimé agit en augmentant la qualité d'insuline libérée par votre pancréas. L'insuline fait ensuite baisser votre taux de sucre dans le sang.

Dans quel cas

AMAREL, c'est lorsque le taux de sucre dans le sang est trop élevé et que les médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang (glibenclamide), aux sulfamides antibactériens (médicament pour les infections bactériennes, tels que le sulfamethoxazole), ou à l'un des autres composants contenus dans AMAREL, comprimé (voir « Que contient AMAREL, comprimé ») ;

2. QUELLES

COMPRIMÉ

Ne prenez

- si vous êtes

(médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang)

glibenclamide), aux sulfamides antibactériens (médicament pour les infections

bactériennes, tels que le sulfamethoxazole), ou à l'un des autres composants

contenus dans AMAREL, comprimé (voir « Que contient AMAREL, comprimé ») ;

- si vous avez un diabète insulinodépendant (diabète de type 1) ;

- en cas de décompensation acido-cétosique (complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains des signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et raideur musculaire) ;

- en cas de coma diabétique ;

- si vous avez une maladie grave des reins ;

- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Fautes attention

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien si :

• Vous vous rétablissez d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin car un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.

• Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux du sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :

- malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

- modification du régime alimentaire ;
- prise de plus d'AMAREL, comprimé que ce dont vous avez besoin ;
- fonction rénale diminuée ;
- maladie grave du foie ;
- si vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles de la glande thyroïde, de la glande hypophysaire ou des glandes surrenales) ;
- consommation d'alcool (en particulier en l'absence de repas) ;
- prise de certains autres médicaments (voir « Prise d'autres médicaments ») ;
- si votre activité physique est augmentée, si vous ne mangez pas suffisamment ou que vous mangez des aliments contenant moins de glucides qu'habituellement. Les signes de l'hypoglycémie incluent :

- faim intense, maux de tête, nausées, vomissement, apathie, somnolence, troubles du sommeil, agitation, agressivité, difficultés de concentration, diminution de la vigilance et des réactions, dépression, confusion, troubles visuels et de la parole, difficulté à articuler, tremblement, paralysie partielle, troubles sensitifs, vertiges, sensation de faiblesse.
- les signes suivants peuvent également survenir : sueurs abondantes, peau moite, anxiété, accélération du pouls, hypertension artérielle, palpitation, douleurs intenses, et soudaine dans la poitrine pouvant irradier dans les régions voisines (angine de poitrine et troubles de rythme cardiaque).

Si votre taux de sucre dans le sang continue de baisser, vous pouvez présenter : un état confusionnel important (délire), des convulsions, une perte de la maîtrise de soi, une respiration courte et rapide, un ralentissement de votre rythme cardiaque, une perte de connaissance. Une hypoglycémie sévère peut également ressembler à une attaque cérébrale.

Traitement de l'hypoglycémie :

Dans la plupart des cas, les signes d'hypoglycémie disparaissent très rapidement après l'ingestion de sucre : par exemple morceaux de sucre, boisson sucrée ou thé sucré. Vous devez donc toujours avoir du sucre (morceaux de sucre) avec vous. Par contre, les édulcorants de synthèse ne sont pas efficaces.

Contactez votre médecin ou allez à l'hôpital si l'ingestion de sucre n'est pas efficace ou en cas de réapparition des symptômes.

Tests de laboratoire

Votre taux de sucre dans le sang ou dans les urines doit être contrôlé régulièrement. Votre médecin peut vous demander de faire des analyses de sang pour vérifier le nombre de cellules sanguines ainsi que votre fonction hépatique.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Votre médecin peut être amené à modifier la dose d'AMAREL, comprimé si vous prenez d'autres médicaments. En effet, ceux-ci peuvent diminuer ou augmenter l'effet d'AMAREL, comprimé sur votre taux de sucre dans le sang.

L'effet d'AMAREL, comprimé (diminution du taux de sucre dans le sang) peut être augmenté par les médicaments suivants et entraîner un risque d'hypoglycémie :

- autres médicaments pour traiter le diabète (tels que l'insuline ou la metformine, azopropazone, oxyphenbutazone, aspirine) ;
- médicaments pour traiter la douleur ou l'inflammation (phénylbutazone, azopropazone, oxyphenbutazone, aspirine) ;
- médicaments pour traiter les infections urinaires (tels que certains sulfamides antibactériens à longue durée d'action) ;
- médicaments pour traiter les infections bactériennes et fongiques (tétracyclines, chloramphénicol, flucconazole, miconazole, les quinolones, clarithromycine) ;
- médicaments pour empêcher la coagulation du sang (antivitamines K de type dérivés coumariniques tels que la warfarine) ;
- médicaments favorisant le développement musculaire (anabolisants) ;
- médicaments utilisés pour la thérapie de substitution par hormones sexuelles masculines ;

rice :
INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

 **Lantus® SoloStar®**

**100 unités/ml
solution injectable en stylo prérempli
insuline glargin**

SANOFI 

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1
Aïn Sebaâ Casablanca
Lantus Solostar 100U/ml inj
b1 Sty 3ml
P.P.V : 152,50 DH



6 118001 081608

**'intégralité de
ce médicament
ations importantes
ent lire le mode
, stylo prérempli,
ent.**

gardez cette notice. vous pourriez avoir besoin
de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce que Lantus et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Lantus
3. Comment

rice :
INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

 **Lantus® SoloStar®**

**100 unités/ml
solution injectable en stylo prérempli
insuline glargin**

SANOFI 

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1
Aïn Sebaâ Casablanca
Lantus Solostar 100U/ml inj
b1 Sty 3ml
P.P.V : 152,50 DH



6 118001 081608

**'intégralité de
ce médicament
ations importantes
ent lire le mode
, stylo prérempli,
ent.**

gardez cette notice. vous pourriez avoir besoin
de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce que Lantus et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Lantus
3. Comment

rice :
INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

 **Lantus® SoloStar®**

**100 unités/ml
solution injectable en stylo prérempli
insuline glargin**

SANOFI 

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1
Aïn Sebaâ Casablanca
Lantus Solostar 100U/ml inj
b1 Sty 3ml
P.P.V : 152,50 DH



6 118001 081608

**'intégralité de
ce médicament
ations importantes
ent lire le mode
, stylo prérempli,
ent.**

gardez cette notice. vous pourriez avoir besoin
de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce que Lantus et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Lantus
3. Comment

rice :
INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

 **Lantus® SoloStar®**

**100 unités/ml
solution injectable en stylo prérempli
insuline glargin**

SANOFI 

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1
Aïn Sebaâ Casablanca
Lantus Solostar 100U/ml inj
b1 Sty 3ml
P.P.V : 152,50 DH



6 118001 081608

**'intégralité de
ce médicament
ations importantes
ent lire le mode
, stylo prérempli,
ent.**

gardez cette notice. vous pourriez avoir besoin
de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce que Lantus et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Lantus
3. Comment