

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0007696

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 50049 Société : 159076

Actif  Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : KHAOUF ABO ABIDA

Date de naissance : 01.01.1934

Adresse : 103, Rue Oumaima SAYAH  
Al Massira Al Khadra - Casa

Tél. : Total des frais engagés : 2068.00 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

**Docteur Hassan JAMMI**  
CARDIOLOGUE  
1, Rue Oumaima SAYAH  
Al Massira Al Khadra - Casa  
Tél. 0522 39 37 01 - Fax: 0522 36 79 35  
INP: 091080218  
ICE: 001698148000061

18 AVR. 2023

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : KHOUF ABO ABIDA CHADDAIJ Age: 88

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : HDA - ACPA

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie : /


En cas d'accident préciser les causes et circonstances : /

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : / /

Signature de l'adhérent(e) : / /



## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le paiement des Actes
18 AVR 2023	C 2 K 16 (E CG)		300 DH	Docteur HASSAN CARDIOLOGISTE 20, Rue El Maima Tel. 0522 39 30 01 Fax. 0522 39 35 05 ICE INP : 09 080218 000021 Docteur HASSAN AMMARS CARDIOLOGISTE 20, Rue El Maima Tel. 0522 39 30 01 Fax. 0522 36 79 35
18 AVR 2023	Echo le dupp. cardiaque		800 DH	

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 <b>PHARMACEUTIQUE</b> <b>AL BOUSTANI</b> <b>Le Riad Sina Saida</b> <b>05 22 90 33 97</b>	13.04.85	968,00

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIR

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant

### Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553

### [Création, remont, adionction]

Fonctionnel. Thérapeutique, nécessaire à la profession

The diagram shows a dental arch with 16 numbered teeth. The teeth are arranged in four quadrants: upper right (1, 2, 3, 4, 5, 6), upper left (7, 8, 9, 10), lower left (11, 12, 13, 14), and lower right (15, 16). A coordinate system is overlaid on the arch, with the horizontal axis pointing left (D) and right (G), and the vertical axis pointing up (H) and down (B).

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

**Dr Hassan JAMMI**

Email : drjammi@hotmail.com

ECHO DOPPLER CARDIAQUE ET VASCULAIRE - EPREUVE D'EFFORT - HOLTER RYTHMIQUE ET TENSIONNEL

Casablanca le

18 AVR. 2023

## NOTE D'HONORAIRES

<b>NOM</b>	: HASSAN JAMMI
<b>PRENOM</b>	: Khaddouj
<b>ORGANISME</b>	: MUPRAS.

<u>CONSULTATION + ELECTROCARDIOGRAMME</u>	: 300,00
<u>ECHO DOPPLER CARDIAQUE</u>	: 800,00
ECHO DOPPLER ARTERIEL DES MI	:
ECHO DOPPLER DES VAISSEAUX DU COU	:
ECHO DOPPLER DES ARTERES RENALES	:
ECHO DOPPLER VEINEUX MI	:
EPREUVE D'EFFORT	:
HOLTER RYTHMIQUE DE 24 H	:
HOLTER TENSIONNEL DES 24 H	:
AUTRE .....	:
<b>TOTAL</b>	: 1100,00 DHs

Soit: Mille cent dirhams.

PATENTE N° : 35719032

IF : 40301337

Docteur Hassan JAMMI  
CLINIQUE CARDIOLOGIE  
SOCIETE D'ANALYSES MEDICALES  
EXAMINATIONS CARDIOVASCULAIRES  
Téléphone: 0523 36 93 22  
Im. Sidi Youness, n° 20, Rue Oumaima  
Quartier Racine, Bd Al Massira  
Tel : 02 22 39 31 01, Fax : 02 22 36 79 35,  
Email : drjammi@hotmail.com  
ICP: 001086218  
ICP: 08148000061

CABINET DE CARDIOLOGIE DR HASSAN JAMMI

## Cardiac Func. Exam.

---

### Patient Information

17-04-2023

ID : x230417-123039  
Name : ABOUO BIDA KHADDOUJ  
Sex : Female

## Site Information

### Study Description :

**Referring Physician:**

Referring Physician: \_\_\_\_\_  
Reporting Physician: \_\_\_\_\_

## Reporting Physician Sonographer :

<B mode LA/RA Volume>

### Simpson(Disc) Method

### Area-Length Method

LAL4s	67.6mm
LAS4s	47.7mm
LALA4s	28.84cm <sup>2</sup>
RAL4s	
RAS4s	
RALA4s	
%difS	

#### <M mode LV Function>

	Pombo	Teichholz
EDV	148ml	135ml
ESV	42ml	51ml
SV	105ml	84ml
CO		
EF	71.2%	62.5%
FS	34.0%	
LVM/BSA		
HR		

	Diastole	Systole
LVID	52.9mm	34.9mm
IVS	12.0mm	16.1mm
LVPW	9.4mm	15.1mm

### User's Calculation

### <Comments>

HTA, ACFA, IM ET IAO A CONTROLER.

VG de taille normale. Pas d'hypertrophie pariétale.

Pas d'anomalies de la cinétique segmentaire. Bonne fonction systolique globale.

ras d'anomalies de la synchrone segmentaire, biais OG et OP dilatées. Libres d'échos. VR non dilaté.

et les dilatées, fibres d'échos, IT minime PAPS estime à 45 mmhg


11 minute, FAPS e  
IM grade 2 a 3/4

TM grade 2 a  
1AO grade 2

VCI non dilatée - compliant à 50%

Physician's SIGNATURE

obale.



# CABINET DE CARDIOLOGIE

## ET D'EXPLORATIONS CARDIO-VASCULAIRES

Résidence Star Youness, Rue Oumaïma Sayeh, N°20, 2ème étage, Appt. N°6  
Boulevard Al Massira Al Khadra, Quartier Racine - Casablanca 20000

18 AVR. 2023

الدكتور حسن جمبي  
أمراض القلب والشرايين

Dr. Hassan JAMMI  
CARDIOLOGUE

Diplômé de l'Université de Nice - Sophia Antipolis  
Ex. Assistant spécialiste des Hôpitaux de France

PHARMACIE AL BOUSTANE  
Rue Oumaïma Sayeh, N°20  
Boulevard Al Massira Al Khadra  
Casablanca 20000  
Tél. : 05 22 39 31 01

GSM : 06 61 14 94 22  
Tél : 05 22 39 31 01  
Fax : 05 22 36 79 35

Dr. Hassan JAMMI  
CARDIOLOGUE  
Rue Oumaïma Sayeh, N°20  
Boulevard Al Massira Al Khadra  
Casablanca 20000  
Tél. : 05 22 39 31 01 - Fax : 0522 36 79 35  
INP : 091080218  
ICE : 001098148000061

ABSOLOUT khoddy  
not  
Nedjer 10  
269 5  
Nobilar 5  
100,00  
Sifinor  
Sifinor 10 1/2 gr (1/2 gr)  
Levo Xanax 25 1er not  
not 2nd  
Levo Xanax 25 1er not  
not 2nd  
Tixaz 24,70  
Per 968.00

• Troubles sévères de la circulation sanguine dans les bras et dans

**Précautions particulières à prendre avec NEBILET 5 mg comprimé quadrifiable:**

### Mises en garde

#### En général

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

En l'absence de données, NEBILET 5 mg, comprimé quadrifiable ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent.

L'association du nébivolol au vérapamil ou au diltiazem, aux anti-arythmiques de classe I, aux antihypertenseurs centraux n'est généralement pas recommandée.

Ne jamais arrêter le traitement brutalement sans avis de votre médecin.

#### Hypertension artérielle essentielle

chez les patients souffrant d'insuffisance rénale, la dose initiale recommandée est de 2,5 mg par jour (1/2 comprimé). Si nécessaire, la dose journalière peut être augmentée à 5 mg par jour.

Chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique, la dose journalière peut être augmentée à 5 mg par jour. Cependant la limite chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique doit être assurée.

chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique doit être assurée. Si la première dose est bien tolérée, le traitement sera poursuivi avec une posologie progressivement croissante.

L'initiation du traitement par nébivolol nécessite une surveillance particulière. Elle comprend une surveillance clinique avec mesure de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, et un électrocardiogramme si nécessaire.

Chez les sujets ayant une insuffisance rénale légère à modérée, aucun ajustement posologique n'est nécessaire étant donné que la phase de titration pour atteindre la dose maximale tolérée est individuellement ajustée. En l'absence de données, l'utilisation du nébivolol chez les patients atteints d'une insuffisance rénale sévère (créatininémie  $\geq 250$  mol/L) n'est pas recommandée.

#### Précautions d'emploi

- Anesthésie générale : si vous devez subir une anesthésie générale prévenez l'anesthésiste que vous prenez du nébivolol.
- Fréquence cardiaque anormalement faible (en-dessous de 50-55 battements par minute au repos).
- Insuffisance cardiaque non traitée.
- Angine de poitrine (angor).
- Troubles de la conduction cardiaque (bloc auriculo-ventriculaire du 1er degré).
- Mauvaise circulation au niveau des extrémités.
- Douleurs dans la poitrine au repos (angor de Prinzmetal).
- Diabète : une surveillance devra être effectuée chez les patients diabétiques, car certains symptômes de l'hypoglycémie peuvent être masqués par l'effet du nébivolol.



NEBILET 5 mg, comprimé pelliculé doit être pris tous les jours.

Il est conseillé de prendre votre traitement chaque jour au même moment de la journée pour éviter tout oubli.

L'hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque chronique sont des maladies qui nécessitent un traitement prolongé. Il est donc particulièrement important que vous preniez ce médicament aussi longtemps que votre médecin vous l'a demandé.

**Si vous avez pris plus de NEBILET 5 mg, comprimé quadrifiable que vous n'auriez dû :**

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Peut apparaître un pouls anormalement faible, une baisse de la pression artérielle, des difficultés respiratoires et des problèmes cardiaques.

Avant l'arrivée du médecin, vous pouvez prendre du charbon activé (disponible chez votre pharmacien) qui adsorbera le produit présent dans l'estomac.

**Si vous oubliez de prendre NEBILET 5 mg, comprimé quadrifiable :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, NEBILET 5 mg, comprimé quadrifiable est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Dans l'hypertension artérielle essentielle, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont :

- Mauvaise circulation au niveau des extrémités des membres.
- Etourdissements.
- Fourmillements, picotement au niveau des extrémités des membres.
- Esofflement.
- Constipation.
- Nausées.
- Diarrhée.
- Fatigue.
- Gonflement (des mains, des pieds ou d'une autre partie du corps).

Plus rarement, ont également été rapportés :

- Cauchemars.
- Troubles de la vue.
- Ralentissement du rythme cardiaque, insuffisance cardiaque, troubles de la conduction cardiaque.
- Diminution anormale de la pression artérielle, aggravation d'une claudication intermittente.
- Respiration difficile.
- Digestion difficile, gaz intestinaux, vomissements.
- Démangeaisons, éruption cutanée.
- Impuissance.
- Douleurs de type crampes à la marche
- Dépression.

Effets indésirables très rares (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10000) :

- Evanouissements
- Aggravation d'un psoriasis (maladie de la peau - plaques roses squameuses)

Les effets indésirables suivants ont été rapportés dans des cas très rares :

\* VIGNETTE

NEBILET® 5 mg  
28 comprimés O  
PPV 87DH50

10/1991/101A

• Troubles sévères de la circulation sanguine dans les bras et dans

**Précautions particulières à prendre avec NEBILET 5 mg comprimé quadrisécable:**

### Mises en garde

#### En général

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

En l'absence de données, NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent.

L'association du nébivolol au vérapamil ou au diltiazem, aux anti-arythmiques de classe I, aux antihypertenseurs centraux n'est généralement pas recommandée.

Ne jamais arrêter le traitement brutalement sans avis de votre médecin.

#### Hypertension artérielle essentielle

chez les patients souffrant d'insuffisance rénale, la dose initiale recommandée est de 2,5 mg par jour (1/2 comprimé). Si nécessaire, la dose journalière peut être augmentée à 5 mg par jour.

Chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique, la dose journalière peut être augmentée à 5 mg par jour. Cependant la limite chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique doit être assurée.

chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique doit être assurée. Si la première dose est bien tolérée, le traitement sera poursuivi avec une posologie progressivement croissante.

L'initiation du traitement par nébivolol nécessite une surveillance particulière. Elle comprend une surveillance clinique avec mesure de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, et un électrocardiogramme si nécessaire.

Chez les sujets ayant une insuffisance rénale légère à modérée, aucun ajustement posologique n'est nécessaire étant donné que la phase de titration pour atteindre la dose maximale tolérée est individuellement ajustée. En l'absence de données, l'utilisation du nébivolol chez les patients atteints d'une insuffisance rénale sévère (créatininémie  $\geq 250$  mol/L) n'est pas recommandée.

#### Précautions d'emploi

- Anesthésie générale : si vous devez subir une anesthésie générale prévenez l'anesthésiste que vous prenez du nébivolol.
- Fréquence cardiaque anormalement faible (en-dessous de 50-55 battements par minute au repos).
- Insuffisance cardiaque non traitée.
- Angine de poitrine (angor).
- Troubles de la conduction cardiaque (bloc auriculo-ventriculaire du 1er degré).
- Mauvaise circulation au niveau des extrémités.
- Douleurs dans la poitrine au repos (angor de Prinzmetal).
- Diabète : une surveillance devra être effectuée chez les patients diabétiques, car certains symptômes de l'hypoglycémie peuvent être masqués par l'effet du nébivolol.



NEBILET 5 mg, comprimé pelliculé doit être pris tous les jours.

Il est conseillé de prendre votre traitement chaque jour au même moment de la journée pour éviter tout oubli.

L'hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque chronique sont des maladies qui nécessitent un traitement prolongé. Il est donc particulièrement important que vous preniez ce médicament aussi longtemps que votre médecin vous l'a demandé.

**Si vous avez pris plus de NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable que vous n'auriez dû :**

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Peut apparaître un pouls anormalement faible, une baisse de la pression artérielle, des difficultés respiratoires et des problèmes cardiaques.

Avant l'arrivée du médecin, vous pouvez prendre du charbon activé (disponible chez votre pharmacien) qui adsorbera le produit présent dans l'estomac.

**Si vous oubliez de prendre NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Dans l'hypertension artérielle essentielle, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont :

- Mauvaise circulation au niveau des extrémités des membres.
- Etourdissements.
- Fourmillements, picotement au niveau des extrémités des membres.
- Esofflement.
- Constipation.
- Nausées.
- Diarrhée.
- Fatigue.
- Gonflement (des mains, des pieds ou d'une autre partie du corps).

Plus rarement, ont également été rapportés :

- Cauchemars.
- Troubles de la vue.
- Ralentissement du rythme cardiaque, insuffisance cardiaque, troubles de la conduction cardiaque.
- Diminution anormale de la pression artérielle, aggravation d'une claudication intermittente.
- Respiration difficile.
- Digestion difficile, gaz intestinaux, vomissements.
- Démangeaisons, éruption cutanée.
- Impuissance.
- Douleurs de type crampes à la marche
- Dépression.

Effets indésirables très rares (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10000) :

- Evanouissements
- Aggravation d'un psoriasis (maladie de la peau - plaques roses squameuses)

Les effets indésirables suivants ont été rapportés dans des cas très rares :

Dans les hyperpressions artérielle essentielle, les effets des effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont :

- Maux de tête.
- Étourdissements.
- Fourmillements, picotement au niveau des extrémités des membres.
- Essoufflement.
- Constipation.
- Nausées.
- Fatigue.
- Damarée.
- Gonflement (des mains, des pieds ou d'une autre partie du corps).
- Troubles de la vue.
- Ralentissement du rythme cardiaque,
- insuffisance cardiaque,
- diminution normale de la pression artérielle,
- aggrégation d'une coagulation intermitente.
- Réspiration difficile.
- vomissements.
- Démaugaisons, éruption cutanée.
- Impuissance.
- Débuts de type crampes à la marche
- Dépression.

\* VIGNETTE  
**NEBILET® 5m**  
28 comprimés  
PPV 87DH5

Si vous avez pris plus de NEBILLET 5 mg,  
compresse quadratisée que vous n'auriez  
consultez immédiatement votre médecin ou votre  
pharmacien.  
Preuvent apparaître un pouls anormalement faible,  
une baisse de la pression artérielle, des difficultés  
respiratoires et des problèmes cardiaques.  
Avant d'arriver au médecin, vous pouvez  
prendre du charbon actif (disponible chez votre  
pharmacien) qui adsorbera le produit présent  
dans l'estomac.

NEBILLET 5 mg, comprimé pelliculé doit être pris tous les jours, jusqu'à ce que le symptôme disparaît. Il est conseillé de prendre votre traitement chaque jour au même moment de la journée pour éviter toute surdosage. Si vous avez des réactions indésirables, arrêtez l'usage et consultez votre pharmacien ou votre médecin. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, consultez votre pharmacien ou votre médecin. Si vous avez des réactions indésirables, arrêtez l'usage et consultez votre pharmacien ou votre médecin. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, consultez votre pharmacien ou votre médecin.

## Précautions d'emploi

- toutes les services de la circulation et en gérance dans les bras et dans les jambes.
- En général misse en garde NEBILLET 5mg comprimé quadriseptable: Precautions particulières à prendre avec En prison de la présence de l'acide, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de gélification, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase

# SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

Pour les médicaments suivis à la page 1  
Veutiez lire attentivement

medicamenteusement

• Si

à ce

leur m

Sei l'ur

efet in

medeci

1. Que c

2. Qu'est

3. Quelle

4. mg, co

5. Comme

6. Quels s

7. Comme

7. Informati

1. EST-CE

2. QUELLES

3. CLASSE PHA

4. ANTIHISTO

5. ANTIROU

6. INDUCTO

7. CÉ MÉDICA

8. AVANT

9. AVANT

10. AVANT

11. AVANT

12. AVANT

13. AVANT

14. AVANT

15. AVANT

16. AVANT

17. AVANT

18. AVANT

19. AVANT

20. AVANT

21. AVANT

22. AVANT

23. AVANT

24. AVANT

25. AVANT

26. AVANT

27. AVANT

28. AVANT

29. AVANT

30. AVANT

31. AVANT

32. AVANT

33. AVANT

34. AVANT

35. AVANT

36. AVANT

37. AVANT

38. AVANT

39. AVANT

40. AVANT

41. AVANT

42. AVANT

43. AVANT

44. AVANT

45. AVANT

46. AVANT

47. AVANT

48. AVANT

49. AVANT

50. AVANT

51. AVANT

52. AVANT

53. AVANT

54. AVANT

55. AVANT

56. AVANT

57. AVANT

58. AVANT

59. AVANT

60. AVANT

61. AVANT

62. AVANT

63. AVANT

64. AVANT

65. AVANT

66. AVANT

67. AVANT

68. AVANT

69. AVANT

70. AVANT

71. AVANT

72. AVANT

73. AVANT

74. AVANT

75. AVANT

76. AVANT

77. AVANT

78. AVANT

79. AVANT

80. AVANT

81. AVANT

82. AVANT

83. AVANT

84. AVANT

85. AVANT

86. AVANT

87. AVANT

88. AVANT

89. AVANT

90. AVANT

91. AVANT

92. AVANT

93. AVANT

94. AVANT

95. AVANT

96. AVANT

97. AVANT

98. AVANT

99. AVANT

100. AVANT

101. AVANT

102. AVANT

103. AVANT

104. AVANT

105. AVANT

106. AVANT

107. AVANT

108. AVANT

109. AVANT

110. AVANT

111. AVANT

112. AVANT

113. AVANT

114. AVANT

115. AVANT

116. AVANT

117. AVANT

118. AVANT

119. AVANT

120. AVANT

121. AVANT

122. AVANT

123. AVANT

124. AVANT

125. AVANT

126. AVANT

127. AVANT

128. AVANT

129. AVANT

130. AVANT

131. AVANT

132. AVANT

133. AVANT

134. AVANT

135. AVANT

136. AVANT

137. AVANT

138. AVANT

139. AVANT

140. AVANT

141. AVANT

142. AVANT

143. AVANT

144. AVANT

145. AVANT

146. AVANT

147. AVANT

148. AVANT

149. AVANT

150. AVANT

151. AVANT

152. AVANT

153. AVANT

154. AVANT

155. AVANT

156. AVANT

157. AVANT

158. AVANT

159. AVANT

160. AVANT

161. AVANT

162. AVANT

163. AVANT

164. AVANT

165. AVANT

166. AVANT

167. AVANT

168. AVANT

169. AVANT

170. AVANT

171. AVANT

172. AVANT

173. AVANT

174. AVANT

175. AVANT

176. AVANT

177. AVANT

178. AVANT

179. AVANT

180. AVANT

181. AVANT

182. AVANT

183. AVANT

184. AVANT

185. AVANT

186. AVANT

187. AVANT

188. AVANT

189. AVANT

190. AVANT

191. AVANT

192. AVANT

193. AVANT

194. AVANT

195. AVANT

196. AVANT

197. AVANT

198. AVANT

199. AVANT

200. AVANT

201. AVANT

202. AVANT

203. AVANT

204. AVANT

205. AVANT

206. AVANT

207. AVANT

208. AVANT

209. AVANT

210. AVANT

211. AVANT

212. AVANT

213. AVANT

214. AVANT

215. AVANT

216. AVANT

217. AVANT

218. AVANT

219. AVANT

220. AVANT

221. AVANT

222. AVANT

223. AVANT

224. AVANT

225. AVANT

226. AVANT

227. AVANT

228. AVANT

229. AVANT

230. AVANT

231. AVANT

232. AVANT

233. AVANT

234. AVANT

235. AVANT

236. AVANT

237. AVANT

238. AVANT

239. AVANT

240. AVANT

241. AVANT

242. AVANT

243. AVANT

244. AVANT

245. AVANT

246. AVANT

247. AVANT

248. AVANT

249. AVANT

250. AVANT

251. AVANT

252. AVANT

253. AVANT

254. AVANT

255. AVANT

256. AVANT

257. AVANT

258. AVANT

259. AVANT

260. AVANT

261. AVANT

262. AVANT

263. AVANT

264. AVANT

265. AVANT

266. AVANT

267. AVANT

268. AVANT

269. AVANT

270. AVANT

271. AVANT

272. AVANT

273. AVANT

274. AVANT

275. AVANT

276. AVANT

277. AVANT

278. AVANT

279. AVANT

280. AVANT

281. AVANT

282. AVANT

283. AVANT

284. AVANT

285. AVANT

286. AVANT

287. AVANT

288. AVANT

289. AVANT

290. AVANT

&lt;p

**SINTROM® 4mg Camrimé Boîte de 10.**

Acénocoumaro

Medicamenteusement autorisé N° : 51211DM. -

Médicament autorisé N° : 5121/1  
Produit sous licence à la vente

**Sintrom® 4 mg**

PPV  
Exp  
N° 1 of

#### la prise de traitement anticoagulant, en

présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase (chez l'homme) ou un surrénalisme de malabsorption du glucose et du galactose (maladie de Laron).  
**COMMENT PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé?**  
**INFORMATION pour un bon usage:** administration **équarquée**, d'au moins 4 comprimés par jour, à l'heure fixe, avec ou sans repas.

lez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « *en ordre spéciales* ».

La dernière dose est choisie par votre médecin en fonction de votre situation. Celle-ci est modifiée par votre médecin en fonction des résultats de l'INR.

Les **instructions de doses** doivent toujours être décidées par un **médecin**, si quelqu'un suit votre traitement et jamais par vous-même.

ice d'administration régulière et sans oubli de ce médicament est déterminante dans le traitement. L'heure de prise doit être fixe par jour. Il est préférable de le prendre le soir, afin que votre médecin vous donne une dose plus élevée le matin.

Il peut être divisé en dose égale.  
nous vous conseillons de faire ce que posséder après les résultats de l'IRIN.  
nous les cas, respectez l'ordonnance de votre médecin.  
u traitement.

**mes et conduite à tenir en cas de surdosage :** n'avez plus de SINTRON 4 mg, comprimé que vous n'auriez dû : surdosage peut se manifester par :

friction d'un saignement (lire rubrique « Mises en garde spéciales ») ; supérieur à 5, avec ou sans saignement associé. Ces situations, prévenir rapidement un médecin, si possible celui qui vous

rtains cas, il faudra simplement modifier la dose, dans d'autres cas une délivrance devra être effectuée en urgence.

**Ne pas oublier de tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :**

oublez de prendre Sintrom 4 mg comprimé, il ne faut jamais prendre plus de 4 comprimés.

si la dose prévue dans la même journée.  
La médicamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 à 12 heures, mais il faut alors prendre la dose oubliée.

Si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage : *syndrome de sevrage* aux substances psychotropes.

# SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

Pour les médicaments suivis à la page 1  
Veutiez lire attentivement

medicamenteusement

• Si

à ce

leur m

Sei l'ur

efet in

medeci

1. Que c

2. Qu'est

3. Quelle

4. mg, co

5. Comme

6. Quels s

7. Comme

7. Informati

1. EST-CE

2. QUELLES

3. CLASSE PHA

4. ANTIHISTO

5. ANTIROU

6. INDUCTO

7. CÉ MÉDICA

8. AVANT

9. AVANT

10. AVANT

11. AVANT

12. AVANT

13. AVANT

14. AVANT

15. AVANT

16. AVANT

17. AVANT

18. AVANT

19. AVANT

20. AVANT

21. AVANT

22. AVANT

23. AVANT

24. AVANT

25. AVANT

26. AVANT

27. AVANT

28. AVANT

29. AVANT

30. AVANT

31. AVANT

32. AVANT

33. AVANT

34. AVANT

35. AVANT

36. AVANT

37. AVANT

38. AVANT

39. AVANT

40. AVANT

41. AVANT

42. AVANT

43. AVANT

44. AVANT

45. AVANT

46. AVANT

47. AVANT

48. AVANT

49. AVANT

50. AVANT

51. AVANT

52. AVANT

53. AVANT

54. AVANT

55. AVANT

56. AVANT

57. AVANT

58. AVANT

59. AVANT

60. AVANT

61. AVANT

62. AVANT

63. AVANT

64. AVANT

65. AVANT

66. AVANT

67. AVANT

68. AVANT

69. AVANT

70. AVANT

71. AVANT

72. AVANT

73. AVANT

74. AVANT

75. AVANT

76. AVANT

77. AVANT

78. AVANT

79. AVANT

80. AVANT

81. AVANT

82. AVANT

83. AVANT

84. AVANT

85. AVANT

86. AVANT

87. AVANT

88. AVANT

89. AVANT

90. AVANT

91. AVANT

92. AVANT

93. AVANT

94. AVANT

95. AVANT

96. AVANT

97. AVANT

98. AVANT

99. AVANT

100. AVANT

101. AVANT

102. AVANT

103. AVANT

104. AVANT

105. AVANT

106. AVANT

107. AVANT

108. AVANT

109. AVANT

110. AVANT

111. AVANT

112. AVANT

113. AVANT

114. AVANT

115. AVANT

116. AVANT

117. AVANT

118. AVANT

119. AVANT

120. AVANT

121. AVANT

122. AVANT

123. AVANT

124. AVANT

125. AVANT

126. AVANT

127. AVANT

128. AVANT

129. AVANT

130. AVANT

131. AVANT

132. AVANT

133. AVANT

134. AVANT

135. AVANT

136. AVANT

137. AVANT

138. AVANT

139. AVANT

140. AVANT

141. AVANT

142. AVANT

143. AVANT

144. AVANT

145. AVANT

146. AVANT

147. AVANT

148. AVANT

149. AVANT

150. AVANT

151. AVANT

152. AVANT

153. AVANT

154. AVANT

155. AVANT

156. AVANT

157. AVANT

158. AVANT

159. AVANT

160. AVANT

161. AVANT

162. AVANT

163. AVANT

164. AVANT

165. AVANT

166. AVANT

167. AVANT

168. AVANT

169. AVANT

170. AVANT

171. AVANT

172. AVANT

173. AVANT

174. AVANT

175. AVANT

176. AVANT

177. AVANT

178. AVANT

179. AVANT

180. AVANT

181. AVANT

182. AVANT

183. AVANT

184. AVANT

185. AVANT

186. AVANT

187. AVANT

188. AVANT

189. AVANT

190. AVANT

191. AVANT

192. AVANT

193. AVANT

194. AVANT

195. AVANT

196. AVANT

197. AVANT

198. AVANT

199. AVANT

200. AVANT

201. AVANT

202. AVANT

203. AVANT

204. AVANT

205. AVANT

206. AVANT

207. AVANT

208. AVANT

209. AVANT

210. AVANT

211. AVANT

212. AVANT

213. AVANT

214. AVANT

215. AVANT

216. AVANT

217. AVANT

218. AVANT

219. AVANT

220. AVANT

221. AVANT

222. AVANT

223. AVANT

224. AVANT

225. AVANT

226. AVANT

227. AVANT

228. AVANT

229. AVANT

230. AVANT

231. AVANT

232. AVANT

233. AVANT

234. AVANT

235. AVANT

236. AVANT

237. AVANT

238. AVANT

239. AVANT

240. AVANT

241. AVANT

242. AVANT

243. AVANT

244. AVANT

245. AVANT

246. AVANT

247. AVANT

248. AVANT

249. AVANT

250. AVANT

251. AVANT

252. AVANT

253. AVANT

254. AVANT

255. AVANT

256. AVANT

257. AVANT

258. AVANT

259. AVANT

260. AVANT

261. AVANT

262. AVANT

263. AVANT

264. AVANT

265. AVANT

266. AVANT

267. AVANT

268. AVANT

269. AVANT

270. AVANT

271. AVANT

272. AVANT

273. AVANT

274. AVANT

275. AVANT

276. AVANT

277. AVANT

278. AVANT

279. AVANT

280. AVANT

281. AVANT

282. AVANT

283. AVANT

284. AVANT

285. AVANT

286. AVANT

287. AVANT

288. AVANT

289. AVANT

290. AVANT

&lt;p

# SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

Pour les médicaments suivis à la page 1  
Veutiez lire attentivement

medicamenteusement

• Si

à ce

leur m

Sei l'ur

efet in

medeci

1. Que c

2. Qu'est

3. Quelle

4. mg, co

5. Comme

6. Quels s

7. Comme

7. Informati

1. EST-CE

2. QUELLES

3. CLASSE PHA

4. ANTIHISTO

5. ANTIROU

6. INDUCTO

7. CÉ MÉDICA

8. AVANT

9. AVANT

10. AVANT

11. AVANT

12. AVANT

13. AVANT

14. AVANT

15. AVANT

16. AVANT

17. AVANT

18. AVANT

19. AVANT

20. AVANT

21. AVANT

22. AVANT

23. AVANT

24. AVANT

25. AVANT

26. AVANT

27. AVANT

28. AVANT

29. AVANT

30. AVANT

31. AVANT

32. AVANT

33. AVANT

34. AVANT

35. AVANT

36. AVANT

37. AVANT

38. AVANT

39. AVANT

40. AVANT

41. AVANT

42. AVANT

43. AVANT

44. AVANT

45. AVANT

46. AVANT

47. AVANT

48. AVANT

49. AVANT

50. AVANT

51. AVANT

52. AVANT

53. AVANT

54. AVANT

55. AVANT

56. AVANT

57. AVANT

58. AVANT

59. AVANT

60. AVANT

61. AVANT

62. AVANT

63. AVANT

64. AVANT

65. AVANT

66. AVANT

67. AVANT

68. AVANT

69. AVANT

70. AVANT

71. AVANT

72. AVANT

73. AVANT

74. AVANT

75. AVANT

76. AVANT

77. AVANT

78. AVANT

79. AVANT

80. AVANT

81. AVANT

82. AVANT

83. AVANT

84. AVANT

85. AVANT

86. AVANT

87. AVANT

88. AVANT

89. AVANT

90. AVANT

91. AVANT

92. AVANT

93. AVANT

94. AVANT

95. AVANT

96. AVANT

97. AVANT

98. AVANT

99. AVANT

100. AVANT

101. AVANT

102. AVANT

103. AVANT

104. AVANT

105. AVANT

106. AVANT

107. AVANT

108. AVANT

109. AVANT

110. AVANT

111. AVANT

112. AVANT

113. AVANT

114. AVANT

115. AVANT

116. AVANT

117. AVANT

118. AVANT

119. AVANT

120. AVANT

121. AVANT

122. AVANT

123. AVANT

124. AVANT

125. AVANT

126. AVANT

127. AVANT

128. AVANT

129. AVANT

130. AVANT

131. AVANT

132. AVANT

133. AVANT

134. AVANT

135. AVANT

136. AVANT

137. AVANT

138. AVANT

139. AVANT

140. AVANT

141. AVANT

142. AVANT

143. AVANT

144. AVANT

145. AVANT

146. AVANT

147. AVANT

148. AVANT

149. AVANT

150. AVANT

151. AVANT

152. AVANT

153. AVANT

154. AVANT

155. AVANT

156. AVANT

157. AVANT

158. AVANT

159. AVANT

160. AVANT

161. AVANT

162. AVANT

163. AVANT

164. AVANT

165. AVANT

166. AVANT

167. AVANT

168. AVANT

169. AVANT

170. AVANT

171. AVANT

172. AVANT

173. AVANT

174. AVANT

175. AVANT

176. AVANT

177. AVANT

178. AVANT

179. AVANT

180. AVANT

181. AVANT

182. AVANT

183. AVANT

184. AVANT

185. AVANT

186. AVANT

187. AVANT

188. AVANT

189. AVANT

190. AVANT

191. AVANT

192. AVANT

193. AVANT

194. AVANT

195. AVANT

196. AVANT

197. AVANT

198. AVANT

199. AVANT

200. AVANT

201. AVANT

202. AVANT

203. AVANT

204. AVANT

205. AVANT

206. AVANT

207. AVANT

208. AVANT

209. AVANT

210. AVANT

211. AVANT

212. AVANT

213. AVANT

214. AVANT

215. AVANT

216. AVANT

217. AVANT

218. AVANT

219. AVANT

220. AVANT

221. AVANT

222. AVANT

223. AVANT

224. AVANT

225. AVANT

226. AVANT

227. AVANT

228. AVANT

229. AVANT

230. AVANT

231. AVANT

232. AVANT

233. AVANT

234. AVANT

235. AVANT

236. AVANT

237. AVANT

238. AVANT

239. AVANT

240. AVANT

241. AVANT

242. AVANT

243. AVANT

244. AVANT

245. AVANT

246. AVANT

247. AVANT

248. AVANT

249. AVANT

250. AVANT

251. AVANT

252. AVANT

253. AVANT

254. AVANT

255. AVANT

256. AVANT

257. AVANT

258. AVANT

259. AVANT

260. AVANT

261. AVANT

262. AVANT

263. AVANT

264. AVANT

265. AVANT

266. AVANT

267. AVANT

268. AVANT

269. AVANT

270. AVANT

271. AVANT

272. AVANT

273. AVANT

274. AVANT

275. AVANT

276. AVANT

277. AVANT

278. AVANT

279. AVANT

280. AVANT

281. AVANT

282. AVANT

283. AVANT

284. AVANT

285. AVANT

286. AVANT

287. AVANT

288. AVANT

289. AVANT

290. AVANT

&lt;p

**SINTROM® 4mg Camrimé Boîte de 10.**

Acénocoumaro

Medicamenteusement autorisé N° : 51211 DWI

Médicament autorisé N° : 51211 - [www.santebelgique.be](http://www.santebelgique.be)

**Sintrom® 4 mg**

PPV :  
Exp :  
N° lot :

présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase (chez l'homme) ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladie de Lapp).  
**COMMENT PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé?**  
**INFORMATION pour un bon usage:** administration **économique**, d'administration **uniquement sous surveillance médicale**.

ice d'administration régulière et sans oubli de ce médicament est déterminante dans le traitement. L'heure de prise doit être fixe par jour. Il est préférable de le prendre le soir, afin que votre médecin vous donne une dose plus élevée le matin.

**mes et conduite à tenir en cas de surdosage :** n'avez plus de SINTRON 4 mg, comprimé que vous n'auriez dû : surdosage peut se manifester par :

friction d'un saignement (lire rubrique « Mises en garde spéciales ») ; supérieur à 5, avec ou sans saignement associé. Ces situations, prévenir rapidement un médecin, si possible celui qui vous

rtains cas, il faudra simplement modifier la dose, dans d'autres cas une délivrance devra être effectuée en urgence.

**Ne pas oublier de tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :**

oublez de prendre Sintrom 4 mg comprimé, il ne faut jamais prendre plus de 4 comprimés.

si la dose prévue dans la même journée.  
La médicamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 à 12 heures, mais il faut alors prendre la dose oubliée.

le suivant, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage : *syndrome de sevrage* aux substances psychotropes.

## Si vous oubliez de prendre FOSAVANCE

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez un comprimé de FOSAVANCE le lendemain matin du jour où souvenue. *Ne prenez pas deux comprimés le même jour.* Reprenez votre traitement d'un comprimé une fois par jour, prévu au jour correspondant à votre choix initial.

## Si vous arrêtez de prendre FOSAVANCE

Il est important de prendre FOSAVANCE aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit. Comme on ne sait pas de temps vous devez prendre FOSAVANCE, vous devrez discuter périodiquement avec votre médecin de la nécessité de poursuivre ce traitement afin de déterminer si FOSAVANCE vous convient toujours.

Une carte d'instructions est incluse dans la boîte de FOSAVANCE.

Elle contient des informations importantes vous rappelant comment prendre correctement FOSAVANCE.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

**Consultez votre médecin immédiatement** si vous ressentez un des effets indésirables suivants, qui pourrait être grave et pour lequel vous pourriez avoir besoin d'un traitement médical urgent : Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :

brûlures d'estomac ; difficulté ou douleur pour avaler ; ulcération de l'œsophage (œsophage : tube qui relie la bouche à l'estomac) qui peut entraîner des douleurs dans la poitrine, des brûlures d'estomac ou une difficulté ou une douleur pour avaler.

Rare (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) :

réactions allergiques telles que urticaire ; gonflement de la face, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge pouvant entraîner une difficulté à respirer ou avaler ; réactions cutanées sévères.

70058199/00-1  
AMM 294/17 DMP/21/NRQ

DISTRIBUÉ PAR MSD MAROC B.P. 136 - BOUSKOURA  
P.P.V: 193.60 DH



## Si vous oubliez de prendre FOSAVANCE

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez un comprimé de FOSAVANCE le lendemain matin du jour où souvenue. *Ne prenez pas deux comprimés le même jour.* Reprenez votre traitement d'un comprimé une fois par jour, prévu au jour correspondant à votre choix initial.

## Si vous arrêtez de prendre FOSAVANCE

Il est important de prendre FOSAVANCE aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit. Comme on ne sait pas de temps vous devez prendre FOSAVANCE, vous devrez discuter périodiquement avec votre médecin de la nécessité de poursuivre ce traitement afin de déterminer si FOSAVANCE vous convient toujours.

Une carte d'instructions est incluse dans la boîte de FOSAVANCE.

Elle contient des informations importantes vous rappelant comment prendre correctement FOSAVANCE.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

**Consultez votre médecin immédiatement** si vous ressentez un des effets indésirables suivants, qui pourrait être grave et pour lequel vous pourriez avoir besoin d'un traitement médical urgent : Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :

brûlures d'estomac ; difficulté ou douleur pour avaler ; ulcération de l'œsophage (œsophage : tube qui relie la bouche à l'estomac) qui peut entraîner des douleurs dans la poitrine, des brûlures d'estomac ou une difficulté ou une douleur pour avaler.

Rare (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) :

réactions allergiques telles que urticaire ; gonflement de la face, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge pouvant entraîner une difficulté à respirer ou avaler ; réactions cutanées sévères.

70058199/00-1  
AMM 294/17 DMP/21/NRQ

DISTRIBUÉ PAR ASD MAROC B.P. 136 - BOUSKOURA  
P.P.V: 193.60 DH



## Si vous oubliez de prendre FOSAVANCE

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez un comprimé de FOSAVANCE le lendemain matin du jour où souvenue. *Ne prenez pas deux comprimés le même jour.* Reprenez votre traitement d'un comprimé une fois par jour, prévu au jour correspondant à votre choix initial.

## Si vous arrêtez de prendre FOSAVANCE

Il est important de prendre FOSAVANCE aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit. Comme on ne sait pas de temps vous devez prendre FOSAVANCE, vous devrez discuter périodiquement avec votre médecin de la nécessité de poursuivre ce traitement afin de déterminer si FOSAVANCE vous convient toujours.

Une carte d'instructions est incluse dans la boîte de FOSAVANCE.

Elle contient des informations importantes vous rappelant comment prendre correctement FOSAVANCE.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

**Consultez votre médecin immédiatement** si vous ressentez un des effets indésirables suivants, qui pourrait être grave et pour lequel vous pourriez avoir besoin d'un traitement médical urgent : Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :

brûlures d'estomac ; difficulté ou douleur pour avaler ; ulcération de l'œsophage (œsophage : tube qui relie la bouche à l'estomac) qui peut entraîner des douleurs dans la poitrine, des brûlures d'estomac ou une difficulté ou une douleur pour avaler.

Rare (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) :

réactions allergiques telles que urticaire ; gonflement de la face, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge pouvant entraîner une difficulté à respirer ou avaler ; réactions cutanées sévères.

70058199/00-1  
AMM 294/17 DMP/21/NRQ

DISTRIBUÉ PAR MSD MAROC B.P. 136 - BOUSKOURA  
P.P.V: 193.60 DH

