

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



## Déclaration de Maladie

M22- 0030897

### Maladie

### Dentaire

### Optique

### Autres

#### Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 0000657

Société :

R.A.M 159377

Actif

Pensionnée

Autre :

Nom & Prénom : H. HAZ Hour

Sarah

Date de naissance : 19.9.5

Adresse : El massoudia Rue 29 N°25 cité Djemaa Casablanca

Tél. : ..... Total des frais engagés : ..... Dhs

#### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Mustapha OUDRAIRI  
Spécialiste en Médecine Interne et en Gériatrie  
49, Bd 2 Mars N°7 Casablanca  
tel 0522 26 02 48 / 0522 26 11 04

Date de consultation : ..... / ..... / .....

Nom et prénom du malade : MELLOUK Ezzitouni ep HATHOUR

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : ALD + Alzheimier

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie : .....

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : .....

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : casablanca

Le : 29/11/2013

Signature de l'adhérent(e) : .....

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
07/04/23	C		400,00	Musapna OUDJANI Médecin Interne et en Casablanca Box 2602 Mars N°7 - Casablanca 26 02 46 / 0522 26 11 04

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Gourisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE KOUTOURA Loussemement INPE: 92036904 Tél: 0522 373107 - 0522 573923	29/04/23	152,00

## ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H 25533412 00000000 00000000 35533411	21433552 00000000 00000000 11433553	B	MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



**AKDITALIFE**

CLINIQUE DU BIEN-ÊTRE BOUSKOURA

Mme MELLOUK EZZITOUN

Né le : 01/01/1932



CBB23D10095948

27,70

Cardioastinum 100

1. PHARMACIE

1 g / à midi

Casablanca, le 29/04/2023

(S.V)

pendant 2 mois

152,00

Inosam 7,5

1 g / à midi pendant 15 jrs

Diflupredn 50 mg

1 g x 3 / à midi tous

Neogaflex 500

1 g x 2 / pendant

10 jrs

Potassium - simp

1 g x 3 / pendant 10 jrs

82,10

6.

Inexium 20

(S.V)

42,20

1 g / pendant 14 jrs

7.

Glicia

(S.V)

Clinique du Bien-Être Bouskoura, Bouskoura Golf City

(Prestigia), Casablanca 27182

Tél. : 05 22 06 48 48 - Fax : 05 22 78 2692

E-mail : Direction@akditalife-bouskoura.ma

Site web : www.akditalife-bouskoura.ma

Dr. Mustapha OUBRI  
Spécialiste Médecine Interne et en Gérontologie  
Diplômé En Diabétologie  
45, Bd 2 Mars N° 7 - Casablanca  
Tél: 0522 25246 / 0522 261104

menter le risque d'hémorragies. La prise concomitante de CardioAspirine et de préparations à base de cortisone ou d'alcool peut augmenter le risque d'ulcères gastro-intestinaux.

La tendance hémorragique peut être augmentée également après de petites interventions, par exemple des extractions dentaires.

Même à faibles doses, l'acide acétylsalicylique diminue l'excrétion d'acide urique. Cela peut déclencher une crise de goutte chez des patients dont l'excrétion d'acide urique est déjà réduite.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si :

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

Interrogez ou informez votre médecin ou votre dentiste sur la prise de CardioAspirine avant des interventions chirurgicales ou dentaires.

#### **Grossesse et allaitements :**

Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement. Si vous devez poursuivre ou commencer un traitement par CardioAspirine au cours d'une grossesse, sur prescription de votre médecin, suivez strictement ses indications et ne poursuivez ce traitement que pendant les 6 premiers mois de la grossesse. Vous ne devez pas prendre CardioAspirine au cours du dernier trimestre de la grossesse, en raison du risque potentiel pour l'enfant à naître, du risque d'hémorragies et d'un éventuel dépassement du terme.

Lors d'une utilisation régulière à doses élevées au cours de l'allaitement, il faut procéder au sevrage.

#### **3. COMMENT PRENDRE CARDIOASPIRINE 100 MG ?**

Sauf prescription contraire du médecin:

- Prévention des thromboses artérielles sans opération de pontage sur les vaisseaux coronaires et après dilatation (par ballonnet) de vaisseaux coronaires obstrués: 100 mg/jour.
- Prévention des thromboses artérielles après opération de pontage sur les vaisseaux coronaires et après dilatation (par ballonnet) de vaisseaux coronaires obstrués: 100–300 mg/jour.
- Prévention des attaques cérébrales: 100 mg 3 fois par jour ou 300 mg 1 fois par jour.
- Prévention des thromboses après un infarctus du myocarde et traitement de l'angine de poitrine instable: 100 mg 1 fois par jour.

- En cas d'infarctus du myocarde aigu:

En cas de survenue d'un infarctus du myocarde aigu, 200 à 300 mg d'acide acétylsalicylique vous sont administrés à l'hôpital par voie intraveineuse. En alternative, un produit contenant de l'acide acétylsalicylique à résorption rapide peut vous être administré par voie orale. À partir du deuxième jour, la dose quotidienne est de 100 mg de CardioAspirine.

Le médecin traitant décidera du dosage et de la durée du traitement.

- Prévention de l'infarctus du myocarde chez les patients chez lesquels le médecin a constaté un risque élevé:

100 mg 1 fois par jour.

- Prévention de l'aggravation d'une artériopathie oblitérante (artérite):

100 mg 1 fois par jour.

Il est recommandé de prendre les comprimés avec du liquide, si possible après les repas. Boire ensuite un demi à un verre de liquide.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimatez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

En cas de prise incontrôlée (surdosage), consultez sans tarder votre médecin. Les étourdissements et/ou des sueurs peuvent indiquer une surdosage.

**Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.



# CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résist

Cardioaspirine 100 mg/30cps

Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



6 118001 090280

## Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

## 1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le comprimé ne se dissout que dans l'intestin grêle. C'est pour cette raison que CardioAspirine ménage la muqueuse gastrique.

CardioAspirine ne doit être pris que selon la prescription du médecin.

CardioAspirine est indiqué pour:

- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur les artères coronaires ( pontage et suppression d'une sténose des artères coronaires);
- la prévention des attaques cérébrales, suite à l'apparition de signes précurseurs (accidents ischémiques transitoires, AIT);
- la prévention des thromboses artérielles (caillots sanguins dans les vaisseaux coronaires) suite à un infarctus (prophylaxie secondaire de l'infarctus);
- la prévention de l'infarctus du myocarde chez les patients chez lesquels le médecin a constaté un risque élevé. Les affections concomitantes telles que hypertension artérielle, diabète sucré, taux de lipides élevés, doivent également être traitées. De plus, il faut arrêter de fumer;
- le traitement de l'angine de poitrine instable;
- le traitement de l'infarctus du myocarde aigu;

après des opérations sur des vaisseaux;

**b) MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTION D'EMPLOI**

Prendre des précautions particulières avec CALCIFIX® D3 en cas :

- de traitement prolongé, il est nécessaire de faire contrôler régulièrement la quantité de calcium éliminée dans les urines (calciurie). En fonction du résultat, votre médecin pourra être amené à réduire, voire à interrompre votre traitement,
- d'administration supplémentaire de calcium et de vitamine D à fortes doses qui doit se faire sous stricte surveillance médicale,
- de traitement associé à base de bisphosphonates, ainsi qu'en cas de traitement avec un antibiotique de la famille des cyclines, il est conseillé d'attendre au moins deux heures entre les prises de ces médicaments et de CALCIFIX® D3,
- de sarcopose ou d'insuffisance rénale,
- d'intolérance au fructose (maladie métabolique héréditaire), en raison de la présence de sorbitol,
- d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

**EN CAS DE DOUCE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**c) INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS**

**AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN** en particulier les digitaliques, les cyclines, les bisphosphonates, l'estramustine, les sels de fer, les antiépileptiques et les diurétiques thiazidiques, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

**d) GROSSESSE - ALLAITEMENT**

En cas de grossesse, ne pas dépasser 1500 mg de calcium et 600 UI par jour de vitamine D3, soit un comprimé par jour.

**D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MÉDICAMENT.**

**e) LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS**

Aspartam, sorbitol et saccharose.

**COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?**

**a) POSOLOGIE**

Réservez à l'adulte.

La posologie quotidienne est de 2 comprimés par jour soit 1 comprimé matin et soir.

**DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.**

**b) MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION**

Voie orale.

Les comprimés sont à croquer, puis à avaler avec un grand verre d'eau, ou à sucer.

**c) FRÉQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ**

Prendre ce médicament à distance des repas.

**d) DURÉE DU TRAITEMENT**

**DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.**

**e) CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE**

Lors de la prise d'une dose excessive de ce médicament, les symptômes suivants peuvent apparaître : nausées, vomissements, soif intense, constipation.



Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à une personne présentant des symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

#### DÉNOMINATION

CALCIFIX® D3 500 mg/400 UI

#### COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Carbonate de calcium correspondant à calcium élément.....

Cholécalciférol enrobé à 100 000 UI/g\* correspondant à cholécalciférol (Excipients .....

\* mélange de cholécalciférol, d'alphatocophérol, de graisses alimentaires et de vitamine E.

#### FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION

Boîte de 30 comprimés à croquer ou à sucer.

#### CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

APPORT VITAMINO D-CALCIQUE.

#### DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué :

- chez le sujet âgé, en cas de carences en calcium et en vitamine D,
- en association aux traitements de l'ostéoporose, lorsque l'apport de calcium et de vitamine D est insuffisant.

#### ATTENTION !

##### a) DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- antécédents d'allergie à la vitamine D ou à l'un des constituants,
- immobilisation prolongée,
- quantité de calcium dans le sang anormalement élevée (hypercalcémie),
- élimination exagérée de calcium par l'urine (hypercalciurie),
- calculs rénaux (lithiasie calcique),
- phénylcétonurie (maladie héréditaire due à un déficit enzymatique), en raison de la présence d'aspartam.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.



## Notice: information du patient

# INexium 20 mg, comprimés gastro-résistants

## INexium 40 mg, comprimés gastro-résistants

ésoméprazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium
3. Comment prendre INexium
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver INexium
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé

INexium contient un médicament appelé ésoméprazole. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelé "inhibiteurs de la pompe à protons". Ceux-ci agissent en diminuant la quantité d'acide produite par l'estomac.

INexium est utilisé dans le traitement des affections suivantes :

#### Adultes

- «La maladie du reflux gastro-œsophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée *"Helicobacter pylori"*. Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.
- Ulcères gastriques dus à des médicaments appelés AINS (médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens). INexium est également indiqué dans la prévention des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS.
- Acidité gastrique accrue due à une tumeur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger- Ellison).
- Poursuite du traitement après la prévention d'une récidive hémorragique d'ulcères avec INexium par voie intraveineuse.

#### Adolescents âgés de 12 ans et plus

- «La maladie du reflux gastro-œsophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée *"Helicobacter pylori"*. Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.

### 2. Quelles sont

Ne prenez jamais

- Si

Traitement des ulcères dus à des infections par *Helicobacter pylori* et prévention de leur récidive :

- La dose recommandée est d'un comprimé gastro-résistant de INexium 20 mg deux fois par jour pendant une semaine.
- Votre médecin vous prescrira également des antibiotiques, par exemple amoxycilline et clarithromycine.

### Prise du médicament

- Vous pouvez prendre vos comprimés à n'importe quel moment de la journée.
- Vous pouvez prendre vos comprimés avec de la nourriture ou quand votre estomac est vide.
- Avalez vos comprimés en entier avec un verre d'eau. Les comprimés ne peuvent être ni mâchés ni écrasés, parce que les comprimés contiennent des empêchent que ce médicament soit altéré par l'acide dans votre ne pas endommager les granules.

### Que faire si vous avez des problèmes pour avaler vos comprimés

- Si vous avez des problèmes pour avaler vos comprimés :
  - Mettez-les dans un verre d'eau plate (non gazeuse). N'utilisez pas d'eau chaude.
  - Remuez jusqu'à ce que le comprimé soit décomposé (le liquide immédiatement ou dans les 30 minutes) puis buvez le liquide immédiatement ou dans les 30 minutes.
  - Pour être sûr que vous avez pris toute la dose, rincez bien le verre avec un demi-verre d'eau et buvez ce liquide. Les particules solides contiennent le médicament. Elles ne doivent être ni mâchées, ni écrasées.
- En cas d'impossibilité à avaler, le comprimé pourra être dispersé dans un peu d'eau et introduit dans une seringue. Il pourra alors être administré à l'aide d'un tube allant directement dans votre estomac (sonde gastrique).

### Utilisation chez les enfants de moins de 12 ans

INexium, comprimés gastro-résistants, n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 12 ans. L'information sur le dosage pour des enfants âgés de 1 à 11 ans est fournie dans l'information du produit INexium sachet (Consultez votre médecin ou pharmacien si vous désirez plus d'informations).

### Personnes âgées

Aucun ajustement de dose n'est nécessaire chez les personnes âgées.

### Si vous avez pris plus de INexium que vous n'auriez dû

Si vous prenez plus de INexium que la dose prescrite par votre médecin, parlez-en immédiatement à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Si vous oubliez de prendre INexium

- Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez-la dès que vous y pensez. Cependant, si c'est bientôt le moment de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose oubliée.
- Ne prenez pas de dose double (deux doses en même temps) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### 4. Quels sont les effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais il ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous remarquez un des effets indésirables sévères suivants, arrêtez de prendre INexium et contactez immédiatement un médecin :

• Troubles respiratoires soudaine à respirer, gonflement des

**SYNTHMEDIC**  
22 rue zoubier binou al aouam reches  
noures casablanca  
**INEXIUM**  
20 mg Cpr GR  
Boîte 14 640/15MP/21/NRQ P.P.V : 82,10 DH  
6 118001 020591

# إينكسيوم 20 ملخ، قرص صامد لحموضة المعدة

# إينكسيوم 40 ملخ، قرص صامد لحموضة المعدة

ازوبيرازول

لعلاج القيحات الناتجة عن الإصابة بعدوى هيليكوباكتر بيليوري وللوقاية من معاودة ظهورها:

- الورعه المنصوح بها هي قرص واحد صامد لحموضة المعدة من إينكسيوم 20 ملخ مرتين في اليوم لمدة أسبوع واحد.
- سصف لك الطبيب أيضاً مفاهيم حيوية، مثل الأموكسيسيلين وكلاريثروميسين.

## تناول الدوا

- يمكنك تناول الأقراص في أي وقت من اليوم.
- يمكنك تناول الأقراص مع الطعام أو على معدة فارغة.
- تناول الأقراص كاملة مع كوب من الماء. لا تقطع ولا تكسر الأقراص وذلك لأنها تحتوي على حبيبات مغلقة تمنع تغير الدوا، ففعل أحماض المعدة. عدم تلف المببات أمر ضروري.

## ماذا تفعل إذا كانت لديك مشاكل في ابتلاع الأقراص

- إذا كانت لديك مشاكل في ابتلاع الأقراص:
  - صعباً في كوب من الماء، (غير غازي). لا تستلزم سوائل أخرى.
  - حرك إلى غاية تخل الفرض (المزيج غير صاف)، يمكنك شرب السائل على الفور أو في غضون 30 دقيقة. حرك دائماً المزيج قبل الشرب.
  - للتأكد من تناول الورعه كاملة، اشطف جيداً الكوب بنصف كوب من الماء ثم اشربه.
  - تنتهي المببات الصلبة على الدوا، يجب أن لا تتمضغ أو سحقها.
  - في حالة استهلاكه البالى، يمكن فك القرص في قليل من الماء، ثم سحبه داخل محنة للتمكن من إعطائه عن طريق أنبوب مباشرة في المعدة (أنبوب معدى).

## الاستعمال لدى الأطفال أقل من 12 سنة

- لا ينصح باستخدام إينكسيوم، قرص صامد لحموضة المعدة لدى الأطفال أقل من 12 سنة. المعلومات المتعلقة بالجرعات الخاصة بالأطفال بعمر يتراوح من سنة واحدة إلى 11 سنة مرتفقة في نشرة إينكسيوم كيس (استشر الطبيب أو الصيدلي للحصول على معلومات أوثق).

## المرضى كبار السن

لا حاجة إلى تعديل الجرعة لدى المرضى كبار السن.

## إذا تناولت جرعة زائدة من إينكسيوم

إذا تناولت جرعة زائدة من الحاجة من إينكسيوم، استشر الطبيب أو الصيدلي على الفور.

## إذا نسبت تناول إينكسيوم

إذا نسبت تناول جرعة واحدة، تناولها بمجرد تذكرها. لكن، إذا اقترب موعد تناول الجرعة

## إذا تناولت جرعة زائدة من نفس الوقت للتعميق عن الحرارة المنессية

لا تتناول جرعة زائدة (جرعتين اثنين في نفس الوقت) للتعميق عن الحرارة المنессية.

## إذا كانت لديك أية أسئلة حول استخدام هذا الدوا، اطلب معلومات أوثق من الطبيب أو الصيدلي.

## 4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة

كثيره من الأدوية، من المحتمل أن يسبب هذا الدوا، آثاراً جانبية لكنها لا تظهر لدى جميع المرضى بالضرورة.

## إذا لاحظت أحد الآثار الجانبية التالية، توقف عن تناول إينكسيوم واتصل فوراً بالطبيب:

- صعوبة مفاجأة في البلع (تفاعل أرجي شديد).
- احمرار الجلد مصهوب بشكل فقاعات أو تشققات. قد تظهر أيضاً في الشفتين، العينين، الفم، الأنف والأعضاء التناسلية.
- «تنفس منسون» أو «تشئ الأنسجة المثلثة».

يرجى قراءة هذه النشرة بتمعن قبل الشروع في استعمال هذا الدوا، لأنها تحتوي على معلومات تهمك.

• احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قرايتها من جديد.

• إذا كانت لديك أسئلة أخرى، استشر الطبيب أو الصيدلي الأعراض يمكن لذلك أن يضر به.

• إذا تفاقم أحد الآثار أو لاحظت ظهور أي أثر جانبى غير مذكور في هذه النشرة أبلغ الطبيب أو الصيدلي. راجع القسم 4

## على ماذا تتوافق هذه النشرة

1. ما هو إينكسيوم وما هي دواعي استعماله

2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول إينكسيوم

3. كيف تناول إينكسيوم

4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة

5. كيف يحفظ إينكسيوم

6. محتوى العلبة ومعلومات إضافية.

## 1. ما هو إينكسيوم وما هي دواعي استعماله

يحتوي إينكسيوم على مكون يدعى الإزوميبيرازول. ينتمي إلى مجموعة الأدوية التي تسمى "مثبطات مضخة البروتون". تجعل من خلال تقليل إفراز الحمض في المعدة.

يستعمل إينكسيوم لعلاج الحالات التالية:

البالغين:

• "د. الأخر المعدى" الغربي RGO الذي يسبب خروج حمض المعدة إلى المري، (الأنبوب الذي يربط بين الملقن والمعدة) مما يسبب الألم، الالتباس والمارقة.

• قرحة المعدة أو المز، العلوي من الأمعاء المصابة بالكتيريا المسماة "هيليكوباكتر بيليوري". في هذه الحالة، قد يصف لك الطبيب بعض المضادات الحيوية لعلاج العدوى والسماع للقرحة بالشفاء.

• قرحة المعدة الناتجة عن الأدوية المسماة "مضادات الالتهاب اللاستيرويدية" AINS. يمكن أيضاً استعمال إينكسيوم لإيقاف عملية تشكيل الفححات في حالة تناول مضادات الالتهاب اللاستيرويدية AINS.

• زيادة حموضة المعدة بسبب وجود ورم في البنكرياس (متلازمة زولينغر - إلسون).

• مواصلة العلاج بعد الوقاية من تكرار ظهور تزيف في القرحة عند استعمال إينكسيوم عن طريق الحقن الوريدي.

الماراهقين البالغين 12 سنة وأكثر:

• "د. الأخر المعدى" الغربي RGO الذي يسبب خروج حمض المعدة إلى المري، (الأنبوب الذي يربط بين الملقن والمعدة) مما يسبب الألم، الالتباس والمارقة.

• قرحة المعدة أو المز، العلوي من الأمعاء المصابة بالكتيريا المسماة "هيليكوباكتر بيليوري". في هذه الحالة، قد يصف لك الطبيب بعض المضادات الحيوية لعلاج العدوى والسماع للقرحة بالشفاء.

## 2. ما هي المعلومات

لا تناول أبداً

• إذا كان